





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.298






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.298



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.298



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CfMAGL 1.7.298

IM. 7

1. 7. 298


Mr. John G. Marmie - 184


402


XV


MERC. de

Mulier Affection.









Ex legatō J. Equitēs Antonii
Francisci de Maronis

D E
MVLIERVVM
AFFECTIONIBVS.
EARVMQVE
CVRATIONE;

LIBRI QVATVOR.

*Primus, De Communibus Mulierum passionibus disserit.
Secundus, Virginum, & Viduarum morbos tractat.
Tertius, Sterilium, & Pregnantium } accidentia ad vnguem
Quartus, Puerperarum, & Nutricum } exequitur.*

AVCTORE LVDOVICO MERCATO
Doct. Medic. Et in Vallis Soletanæ Academia
primariæ Cathedræ Professore.

Cum Indice Capitum, tum rerum omnium locupletissimo.




VENETIIS, Apud Ioannem Guerilium, M D XCVII.

De Legibus de iurisdictione.

Vincen, Vincen, Miniacensis

bitter
illum
clar
in p
Me
offic
mod
bus
tia, s




PRÆSTANTISSIMO VIRO

D. SALVO SCLANO

NEAPOLITANO,

Philosopho, & Medico Excellentissimo,

Ioannes Guerilius. S. D.



L I I alia de causa, aliaq; mente duci solent, vt alicui, vel suas, vel aliorum lucubrationes inscribant, & cōsacrent. Ego verò, cum iam sit occasio denuo typis cudendi Ludouici Mercati Librum de Mulierum affectionibus, idq; mihi contigerit, arbitratus sum æquum esse, ac mihi bono omini futurum, si illum è nostra Officina in publicum emitterem sub tui præclarissimi nominis auspicijs. Quod sanè vt facerè, duo me in primis cōmonuere. Nam perspiciebā, tum inter ipsum Mercatum, & Te conuenientiam quandā intercedere: tum officij mei esse, aliquo meo munusculo Tibi, quo possem modo, meæ in Te obseruantie significationem dare: ex quibus vtrisque videtur huic meo facto, & voluntati aliqua gratia, & satis probata ratio inesse. Nam constat Ludouicum

* 2 Mer-

Mercatum, & publice artem Medicam docendo, & eam in
ēgris exercēdo magnum sibi peperisse nomen, magnamq;
laudē: cuius liber de Mulierum Affectionibus, ita probatur
a doctis, ita expetitur, vt diu nō possint illo nostrę Officinę
carere. Quem cum mea nunc cura, & editione reparem, &
instaurem; cui conuenientius illum, cui decentius, quā
Tibi potui ipse dicare? Quandoquidē Tu, dum feliciter
medicinam facis in Regno Neapolitano, apud omnes ma-
gnam consequeris gratiam, magnumq; honorē: dum au-
tem veterum de eadem scientia monumentis insignibus
interpretationes adhibes summo à Te ingenio elaboratas,
scriptisq; eas cōmendas, etiam tui nominis fama per mul-
tos populos celebris vagatur. Tu enim probatissima com-
mentaria in Aphorismos Hippocratis euulgasti: alia etiam
quę in Artem Galeni Medicinalem acri studio perpolisti,
modò excuduntur: alia pręterea sunt Tibi, vt audio, in ma-
nibus. Rursus frater meus, qui Neapoli commoratur, ita est
Tuę virtuti, Tuęq; probitati addictus, vt me quoque suis
literis, quę de Te sepe multa prędicant, impulerit ad tui ho-
noris studium, & Tui nominis cultum: quem, cum longe
absim, quo quęso modo alio demonstrē, quā mea hac
pręsenti Ludouici Mercati editione? Itaque hac pręsertim
de causa cum Tibi nuncupo, cum Tibi muneri mitto, vt
istud ipsum nunc, quā scilicet ego celebritati nominis
tui, quā item meus frater faueamus, & bene cupiamus,
primum Tibi, deinde alijs protegetur. Quamobrem Te
oro, vt quo animo à me traditur, eo à Te suscipiatur, bene-
uolo nimirum, benigno, ac comi. Vale.

LVDO-

L V D O V I C V S M E R C A T V S. A D L E C T O R E M.



SÆPER mecum ipse excogitavi, candide Lector, ac veluti
 à longè prospexi, medicam artem non mediocrem interi-
 tum minari. Quinimodò, si quis diligenti animo id intuea-
 tur instantem iam ruinam certò polliceri. Nam quis praesa-
 gium futuri mali non persentiret, si quæ arti, & ijs, qui
 ei operam præstant, quotidie accidunt, cordatius pensitet,
 & diligenter examinet. Cum maiorem huius artis professorum
 partem, quæ suæ deditam magis esse, quàm bonarum literarum
 cultui, & ornamento euidenter constet; ita ut non paucos repries,
 qui practicis quibuscumque libellis, aut chymicis fidei. omnibus contenti,
 quod perfectum est, & pulchrum, ac
 summo opere in arte notè futurum, tanquam inutile, ac vanum iudicent;
 & viros strenuos, & studiosos, vel continentiant, vel otio habeant, aut inutilem,
 & inanem eorum vitam ipsius studijs deditam existiment. Iusticia quæ hoc hominum genus in alijs
 etiam vanum, quod nec ipsi habeant, nec consequi amant. Quamobrem mirum non
 est, mulierculis, aut rectoribus, tutius aliquando concretam esse laborantem
 salutem quàm ijs, qui se hoc vineti genere Medicos reputant: dignum quidem im-
 peritis, sed tuis, vel ijs, qui tantum quæstui indulgent, supplicium. Quippe hoc
 ultimum vitium non minus in re medica affert periculi, quàm imperium quemvis
 adferre comperimus. Nam lucro magis, quàm communi, vel privato bono inniti,
 hallucinari quidem, vel peritissimos cogit. Centrosion enim virum, & artis huius
 dignum, ne olfacere quidem pecuniam, fas est: illud quidem grati laborantis mu-
 nus exstat, non Medici, cui satis est morbum superasse. Quid enim illi pretiosius
 ore, aut utilius existimas? nil profecto: nam reliqua veluti accidentia considerasse
 sat est. Quæ sunt omnia cum considero, me quidem totum libentissimo animo labo-
 ribus, vigilijs, ac literarum studijs dedito, ut & mihi, & alijs prodesse aliquando
 possim: ac docere quanti momenti magis sit in probò viro finis suæ artis, quàm quæ-
 stui inniti. Illud proculdubio pretiosum est, & utile quidem, ac gloriæ, & hono-
 ris plenum: hoc re. dè dedecoris, & contemptus sibi, & arti. Quam sanè rationem
 insequens & grauiorū virorum vestigia, qui huic etiam operi plurimum insu-
 darunt (ut desit otiosis communis excusatio, qua non raro suæ ignorantie, & pi-
 gritiæ

gritiae culpam reiecerunt in pleraque eorum, quae arti proficua, & necessaria sunt, cum vel obscura, vel defecta, ac mutila, aut perperam distributa, dissectaq; adhuc in arte existant) ego etiam ob id communissimam illam rationalem methodum per singula auxilia, & indicationes distributam, non sine magnis laboribus, & vigilijs scribere studui. Necnon & pulsum artem, quam tantum maior Medicorum pars exhorrescit, ut inutilem arbitretur, pauca solum ex ea colligens, cetera vero ob difficultatem deferens. Pari etiam ratione febrium omnium naturam, causas, digressionem, & veram, ac vberissimam curandi rationem typo mandauimus: sicut febris maligna non contemnenda praecpta & curationem. Quae sane omnia considerans, ac diu insequens artis arcana, compertum proculdubio habui, alteram nostrae artis partem, quam feminis propriam, & peculiarem esse existimaui, mutilam esse, & defectam, ac incultam, ita ut misere feminas ipsas mille morbis premi conspiciamus, nullo vel inutili, aut alieno prestito auxilio, quod veluti viri curentur, nulla facta, vel leui distinctione earum affectionum, quae illis sub ratione sexus succrescunt: praesertim cum Hippocra. tantum huic parti insudasse constet. Quem sane laborem, vel praevetustate, aut posterorum incuria, vel nostri negligentia, veluti mutilum iudicamus. Quo factum esse censeo, ut femineum genus valetudinarium, plerumque existat, ut nec sibi, nec viris prodesse possit. Cuius rei rationem reddens Hippocrat. lib. de morb. mulier. haec refert verba de hydropse loquens; Periculosa vero sunt, velut dictum est, & plerumque acuta & magna, & intellectu difficilia, eo quod mulieres participant morbis, & aliquando, neque ipse sciunt, quod agrotant prius quam morbos experiantur a mensibus, & seniores factae fuerint. Tunc autem & necessitas, & tempus ipsas morborum causas docent, & quandoque non cognoscentibus ex quo morbo agrotent, morbi incurabiles fiunt, antequam doceatur recte Medicus ab agrotante. Verentur enim narrare, etiam si sciant, & praeter imperitia, & ignorantia turpe sibi id esse putant. Sed & Medici simul peccant non exacte causam morbi percontantes, sed velut viriles morbos sanantes, & multas noviam ab huiusmodi affectionibus correptas. Quare statim causam exacte interrogare oportet: multum enim differt muliebrium morborum, ac virilium curatio. Quae sane Hippocrat. sententia me compulit, in viridi senectute mea, huic artis parti nonnihil etiam insudare, & Hippocra. praecpta lucidiora reddere, distinctiusq; ea discernere, & cuique affectioni, quod ex eis proprium existit, ut par est, dicere. Quae proculdubio necessitas me plurimum coegit, ut susceperem eius rei descriptionem, quam non solum meum, verum, & multorum ingenium superare existimo. Ceterum, ut posteris principium ad perfectionem huius partis subsit: satius esse iudicavi, aliquid in hac re utile scribere, dicit nomen audacis subeam, quam fugiens huiusmodi calumniam, quae multis profutura spero, celare. Qua in re feminarum affectiones in quatuor partes dividens, quatuor subinde libros construxi: quorum primus feminei sexus morbos in genere recenset: secundus, eos omnes, qui virginibus, & viduis peculiare sunt: tertius vero quos sterilibus, & pregnantibus accidere compertimus: quartus denique & ultimus, eos nimirum, quos ipsae, quae pepererunt, aut nutrices sunt, accidere scimus. Ob quam sane tractationem hoc opus gynaecias iure optimo, ut antiqui assenerant, appellamus: quippe gynaecias, feminarum affectiones nuncuparunt: sumpta nimirum ratione, ab antiquissima vocabuli significatione,

nam

nam gynæconites, siue gynæcium locus eorum secretior, in quo solæ mulieres habita-
bant, dictus erat. Unde Panthedas Spartanus cum in Asia obiret legationem,
ostentantibus quibusdam murum valde munitum, latum, ac sublimem: fertur di-
xisse. Per Deos, o hospites, pulchra gynæconites, id est, domus mulierum. Apud
Iurisperitos etiam gynæcium capitur pro secretiore loco, in quo opera textoria, &
ista muliebria conficiuntur: & gynætiari pro ijs, qui ea muliebria opera conficiunt.
Sed & gynæconitis mentionem quoque fecit Procopius in bello Vandalico lib. 3.
ubi satis declarat, locum esse secretiorem semine solum dicatum. Sic & Vitruvius
idem fateri videtur. Ex quo sane, iuxta optimam rationem viri docti non pauci,
librum eum, qui feminarum continet actiones, gynæcias appellarunt. Quem si ex
toto evulceris, equoq; animo, legeris, quantum utilitatis sis extrahatur, tu ipse vi-
deris. Vale, & lege, & magis hoc labore bonis aures frære.

CATALOGVS CAPITVM LIBRORVM OMNIVM.

PRIMI.

D E sexus differentia. Cap. 1	
De affectionibus vtriq; sexuum cōmunibus, & cuiq; proprijs. cap. 2	
De affectionibus quæ feminis oībus sunt cōes, ac de alijs q̄ cuiq; feminarū sorti peculiares existūt. cap. 3	
De menstrua purgatione. cap. 4	
De feminis quibus menses nunquam fluxerunt. cap. 5	
De his quæ clausa habent genitalia, et vterum. cap. 6	
De menstruis per locum non naturalem erumpentibus. cap. 7	
De menstruis superfluis. cap. 8	
De menstruum suppressione. cap. 9	
De menstruis diminutis, ac de menstruum stillicidio. cap. 10	
De menstruis difficillimis, & cum grauissimis accidentibus. cap. 11	
De menstruis quæ debitum tēpus anteuertunt. cap. 12	
De menstruis quæ debitum tēpus remorantur. cap. 13	
De menstruis corruptis. cap. 14	
De albis vteri purgamentis. cap. 15	
De menstruum cum morbis implexi, & prouidentia. cap. 16	
De duris, & cancris mammarum tumoribus. cap. 17	

De febre alba, & de virginum obstructionibus. cap. 6	20
De vehementi pulsatione quæ in artibus iuxta dorsum, in plerisq; feminis reperitur. cap. 7	21
De varijs ventriculi accidentibus ex vtero. cap. 8	22
De varijs, & grauissimis totius corporis, & capitis doloribus ex vtero. cap. 9	23
De pruritu, & furore vteri, ac de symptomate turpitudinis. cap. 10	24
De vteri procidentia. cap. 11	25
De auersione seu recurſu vteri ad varias partes. cap. 12	26
De vteri imbecillitate. cap. 13	27
De varijs vteri doloribus. cap. 14	28
De vteri hydrope. cap. 15	29
De vteri inflationi. cap. 16	30
De vteri inflammatione. cap. 17	31
De scirrroso vteri tumore. cap. 18	32
De vteri cancro. cap. 19	33
De vteri vlceribus. cap. 20	34
De vteri rhagadijs. cap. 21	35
De vteri condilomate. cap. 22	36
De vteri, ac pudendi verrucis thymijs & ficu. cap. 23	37
De scabris vteri ac pudēdi pustulis. cap. 24	38
De vteri fistulis. cap. 25	39
De vteri hæmorrhoidibus. cap. 26	40
De vteri calculo. cap. 27	41
De vteri vermibus. cap. 28	42

SECUNDI.

D E vteri natura ac de morbis, quibus affici potest. cap. 1	
De hysterice affectu in genere. cap. 2	
De vteri strangulatione. cap. 3	
De virg. & vidu. melancholia. cap. 4	
De varietate epilepsiæ ex vtero. cap. 5	

TERTII.

D E sterilitate in genere. cap. 1	321
De feminæ sterilitate per collationem ad virum. cap. 2	322
De sterilitate morbosa. cap. 3	323
De sterilitate quæ fit ad tēpus. cap. 4	324
De virorum sterilitate. cap. 5	325
De conceptu. cap. 6	326

De

I N D E X.

De monstroso conceptu. cap.	7	De partu naturali, ac difficili, & laborio	5
De uteri mola. cap.	8	lo. cap.	5
De falsa grauidatione. cap.	9	De secunda relicta. cap.	4
De picaceo pregnantium appetitu. cap.	10	De foetu mortuo. cap.	5
De pregnantium inappetentia. cap.	11	De mola post partum in utero relicta.	6
De pregnantibus, quæ cibum euomunt.	12	cap.	6
De vetric dolore in pregnantib. cap.	13	De his quæ à partu accidunt, ac primo de	7
De cordis saltu, ac de syncope in prægnā	14	enixæ providentia. cap.	7
tibus. cap.	14	De torminibus à partu. cap.	8
De pregnantium tulli. cap.	15	De immodico sanguinis fluxu post par-	9
De aluo suppressa, aut nimis citata in	16	tum. cap.	9
pregnantibus. cap.	16	De diminuto sanguinis fluxu post partu.	10
De inflatis pregnantium crurib. cap.	17	cap.	10
De sanguinis profusione à pregnantium	18	De recta curandi methodo adseruanda	11
uteris. cap.	18	in his affectionibus, quæ enixis super-	11
De mammis pregnantium gracilibus,	19	ueniunt. cap.	11
aut lacte turgentibus. cap.	19	De uteri inflammatione, & vlcerib. à par	12
De pregnantibus quibus aqua ab utero	20	tu relicta. cap.	12
prodit. cap.	20	De rugis quæ post partum in ventre su-	13
De pregnantium moderamine, & custo-	21	persunt. cap.	13
dia. cap.	21	De virginali adstrictione à partu compa	14
De pregnantibus morbo acuto correptis	22	randa. cap.	14
cap.	22	De nutrice eligenda, & moderanda.	15
		cap.	15
		De lactis defectu. cap.	16
		De lactis redundantia. cap.	17
		De lactis vitiosi emendatione. cap.	18
		De lactis concretionc. cap.	19

Q V A R T I.

De partu. Cap.	1
De abortu. cap.	2

De partu. Cap.	1
De abortu. cap.	2

INDEX RERVM OMNIVM
QVAE IN HOC OPERE CONTINENTVR
C O P I O S I S S I M V S .

- A**
ABORSVS minoris ætatis, sa-
lubrior aborsu maioris ætatis,
433. A
Ætas aptior ad concubitum tam in viris,
quàm in feminis, 330. B
Alba uteri purgamenta, lege uteri purga-
menta.
Anastomosis, diapedesis, & diæresis differen-
tia, 37. C
Angina correptis puerperis quomodo etiam
fluente partus purgatione sanguis ex bra-
chio mitti debet, 512. C
Animaliū sexus triplex reperitur apud Ari-
stotelem, 4. C
Appetentia abolita & diminuta ad animæ
facultatem perinet, at hoc vel illud appe-
tere, aut odio habere, ad facultatem natu-
ralem appetitiuam, 225. C
Appetitus viciatus quid indicet, 227. B
Appetitus deprauati causa, 408. C
Appetitus carbonum ab exusto humore pro-
uenit, 409. A
Aqua frigida nidoroso ventriculo confert,
412. A
Aqua fluens in prægnantibus quando abor-
sum ostendit, 427. C
Aqua aluminosa plurimum valet ad uteri
ulcera erodentia abluenda, 299. A
Aqua ex theriaca extracta, quando profit
doloribus uteri, 260. B
Aqua theriacalis uteri inflationibus prodest
& eius cõpositio vtendi modus, 270. B
Aretusam feminam in virum Aristẽ nomi-
ne commigrasse, & barba, ac virilitate, ac
quisita uxorem faustè duxisse, Lucius Mu-
cianus refert, 225. C
Aristolochiæ longe radix accelerat partus.
403. B
Aristoteles explicatur, 439. C
Ars medica minatur ruinam, in arg. in prin.
Ars feminas curandi, mutila. ibid. C
Auersio uteri quid sit. 245. C
Auersio uteri non sit propria uteri sede de-
relieta, 246. A
Auersionis uteri causa, 246. B C
Auersionis uteri signa secundum omnes eius
differentias, 246. & 247. C
Auersionis uteri curatio secundum omnes
differentias. 248. 249. & 250.
Auersio, seu retractio uteri si versus intesti-
na, vesicam, vel pedes fuerit, tutius est ex
brachio, quam ex talo sanguinem mittere
præcipuè si menstruationis tempus nõ in-
stauerit. 251. A
Auersioni uteri quando vomitus conueniat,
ibidem A
Auxilia frigida propè uerum maiore men-
sium fluorem solent concitare. 42. B
Auxilia quæ ad immodicū mensium fluxum
parantur. 44. C. & 45. A B
B
B Alnea ex sulphure profunt ad corrigen-
dam partis dolentis intempericm præ-
sertim si pars dolore affecta in tumore at-
tollatur, 233. A
Barba quare feminis plerunque a. nascatur,
235. B C
Barba tam feminam ob mariti absentiam, &
mensium suppressione Hippocra. refert.
ibidem.
C
C Alculos in utero fieri ibidemq; non esse
solutos, ac liberos, quemadmodū in
vesica, sed tunicis uteri, aut colo adnasci,
velut callosa substantia, 315. C
Calida, aut frigida femina temperies, quibus
signis inuestigari possit, 331. C
Caliditas partium genitalium femina, quo-
modo attemperanda, 334. A
Cancer

- Cancer duplex ulceratus, & non ulceratus,**
 & utriusque definitio, 285. B C
Canceri uteri cause, ibidem
Canceri uteri signa, 290. A B
Canceri uteri curatio, 290. C
Cancerosus mammarium tumor, 145. A
Cancrofi tumoris, & ulcerati differentia, &
descriptio, ibi. B
Cancrorum materia qualis, ibid.
Cancrofi & ulcerati tumoris curatio. 146. B
Cancrosus tumor duobus modis fit, 139. B
Cancrofi tumoris causa, 140. A
Cancrofi tumoris signa, ibid. C
Cancrofi tumoris curandi ratio, 141. B
Cancrofi tumoris curandi ratio cauta, & ua-
ria, 142. A B C
Capitis habitualis siccitas, nulla debet euacuatione curari, sed solum humectantibus
& quibus, 234. A
Capitis traumatica affectio, quando uelut mor-
bis Gallicus curari desideres, & quibus,
 233. B
Capitis reumatica affectio quanto roboratior
desideret. Et paulatim euacuationem.
 ibidem
Capiti quod malū habitum contraxit fonta-
nellam in brachijs aperire prodest, ibid.
Capiti ab utero recipienti fontanella cruri-
bis affixæ presentaneum & ultimum re-
medium existunt, ibid.
Capiti irradiationis mō dolore infestato leue
ulcus caudenti ferro illatū, tanquā fidissi-
mū experimentū medetur, maxime si pe-
rierat eū dolore nobis cōpertū sit. 233. C
Casini uirgo in puerū cōmutata, ideoq; auru-
spiciū in suā insula deserta, 245. C. 251. A
Chalybis uariæ præparationes, & utendi mo-
di, 287. 288. 289
Chalybis præparati usus oīb. obstruēt. prof-
icius, & de hi plurima uariosq; modos præ-
parandi pro uarijs obstruētū generibus
reperies, 213. C. 214. & deinceps.
Chelidonie succus mammis appositus uteri
sanguinem sistit, 53. B
Clyster in uentris prægnantium dolore com-
modus, 413. C
Clyster lubricans utero gerentibus qualis,
 416. C
Concepcio quid sit, 373. A
Conceptionis tempus quale sit, ibid. B C
Concepcio ex quo sanguine fiat, 374. A
Conceptionis cause, 374. B. 375. A
Conceptus penes quid differat a fœtu. ibi. A
Conceptus signa plurima, 383. A
Concubitus uiri, quibus fœminarum morb.
prosit, & quibus noceat, 360. A
Condiloma uteri quod genus tuberculi sit, &
quomodo differat à thymis, & in quibus
uteri partibus fiat, 303. B
Condilomatis uteri curatio, ibid. C
Consensus ratio in utero uaria, 148. B
Cordis saltus maioris mali præsignū. 414. A
Cor uirtualiter omnium membrorum naturā
obinet, 392. B
Cor nō opus fuit, ut prius uiueret q̄ cerebrum
sed si nūc efformantur. Et quare. 378. B
Cucurbitæ suris, aut femorib. affixæ, et scarifi-
cate, quā lo puerperis sint ex usu, 505. C
Cucurbita nō umbilico, sed fœmorib. sūt ponē-
da tēpore accessionis epilepsie, & si ea
ex uero sit, si menstrua defecerint, ibid.
 D
Eliniū post partū adueniens, 214. B
Disimilitudo natorum ad parentes, &
monstrorum generatio quibus de causis
contingat, 393. B C
Dolentis parvis distēperies corrigenda depōsi-
ta prius plenitudine & humorū copia præ-
sertim uiscosorum, & tenatiū. 233. &
qualis debeat esse alteratio, ibidem, et qui-
bis medicamentis fidei debeat, ibid.
Dolor si alicui parti sit fixus, leui partis usio-
ne ex candenti ferro, tanquam fidelissimo
experimento curatur, 233. C
Dolores uehementissimi ex leuissima uteri
affectione oboriuntur, 256. A
Doloris uteri uariæ cāe. 156. B C. 257. A B
Doloris uteri ex fluat signa. 257. C. ex gru-
 moso sang. 258. A. Ex cohibetur priuatione
 aut humoris acrimonia, aut externa cā. ib.
 † † 2 Dolo-

Dolorem vteri sedantia quæ, 238. B C
 Dolentibus vteris quando sanguinis missio
 prodest ex brachio, quando ex talo, & quā
 do purgatio, 250. A
 Dolorum grauissimorum totius corporis, &
 capitis ex vtero differentie, causa signi,
 & curatio, 229. C. & deinceps
 Dolorū triplex cā, triplicē quoq; in cerebro,
 vel dolēte parte efficit affectionē, 231. A
 Dolorib. capitis qua ratione posset ceratū ex
 thecamahaca, aut carannia, aut similibus
 temporibus appositum, 232. A

E

Elementa & famina vicem obtinere, et
 quando generent, 3. B C
 Epilepsia post partum adueniens, 214. B
 Epilepsia quid & quō geretur, 288. B
 Epilepsia a duplici causa semper fieri, & de
 his vide pulchra, 286. A
 Epilepsia causæ, & quō differat ab apoplexia
 & paralyti, etsi ab eodem humore fiant,
 190. 191. A
 Epilepsia quō sine obstructione cerebri fiat
 ex aura, vel tenuissimis halitib. aut ex so-
 la sensus acrimonia, 191. B
 Epilepsia ex veneno qua rōne fiat, 161. C
 Epilepsia per cōsensum ab utero mille varieta-
 tib. implexa induit accidentia, & eorum
 plures recensetur differe tiæ, 162. AC
 Epilepsia ex vtero vtiq; fiat semper ha-
 bet habitum caput ferientem, 162. C
 Epilepsia per cōsensū ab vtero signa, 163. C
 Epilepsie ex vtero præsagium, 163. A
 Epilepsia vtero affectis fæminis nō oīno cor-
 poris motus sunt prohibendi, 194. B
 Epilepsia ex vtero eadē medentur præsidia,
 quæ suapte natura nata sunt epilepsiam
 efficere, & quare hoc fiat, 194. B C
 Epilepsie ex vtero prodest aqua stillatitia. ce-
 rasorū epota, & aqua hirudinum, ibid.
 Epilepsie ex vtero accensionī aliquando pro-
 dest sanguinis missio ex talo, 195. A
 Epilepsiam fæminarum curaturus oportet ut
 pe uliāres & indiuiuales earum condi-
 tiones consideret, 195. B C

Epilepsia in vtero gerente famina, quomodo
 curanda, 195. C
 Epilepsia ex vtero quæ ex menstruo sangui-
 ne redundante fit, curatio, 196. A
 Epilepsia ex vtero, q̄ fit ex menstruo sangui-
 ne redundante, medicamenta expurgatiua
 vsualia parum profunt, 196. A B
 Epilepsiam producentes flatus, q̄ discutiant,
 198. A B
 Epilepsius ex redundantib. mensuris, in qua
 piuita, vel crassi, ac visci humores redū-
 dant, quando alia medicamenta non pro-
 sunt, stibij vsus confert, 197. A
 Epilepsia ex utero fontanella altero, uel uiro
 que crare ad aperta, maximum præsidium
 est, 197. C
 Epilepsia affectis fæminis quibus rē edijis ca-
 put debeat tutari, 198. C. 199. C
 Enaporationes ex iure pingui galli veteris ad
 dolores vteri sedandos quō parētur. 261. A
 Eunuchi nomen tripliciter ab antiquis dictū.
 370. AB

Explū utero gerētib. accommodatū, 419. B
 Exercitiū omnibus partib. obstructis triplex
 præstat beneficium, 212. C. 213. A
 Exercitium moderatum, & continuū ad cor-
 rigendam partis dolentis intemperie pro-
 dicit, 233. A

F

Febrium quodam genus puerperis pecu-
 liare, 508. C
 Febris alba signa, 201. B C. 204. B
 Febris alba quare sic dicatur, cū non necessa-
 rio fæminæ sic affecte febricitet, 202. A
 Febris alba qua rōne icterus albus dici possit
 202. C
 Febris alba quare paratiores sint pulchriores
 fæminæ, 201. A
 Febris alba qua ratione respirationis & pul-
 sus interceptiones efficiat, 203. C
 Febris alba, vt curetur quantūuis suppressa
 fiat menstrua, prius ex brachio, quam ex
 talo mittendus est sanguis, 205. B
 Febris alba ex icteris obstructiōe affecta cor-
 pora, quibus medicamentis, & quo ordine
 purgare

I N D E X.

- purgare conueniat. 205. C. & deinceps.
- Ficus vteri quomodo curetur. 307. A
- Figura deprauata vteri menstrue priuationis causa. 28. A
- Fistularum natura, & differentia. 309. AB
- Fistula si na tam simplicis q̄ duplicis secundu omnes eius differentias ibi. & 310. A
- Fistulis affecta corpora quibus medicamentis debeant euacuari. ibid. B
- Fistula vteri os edum spongia dilatandū, vt medicamenta debite administrentur. ibid. C
- Fistularum vteri callus quando per medicamenta acria, & quando per fractionem, aut r̄sionem debeat extirpari. 311. A
- Fistula ex morbo gallico contracte, validissima fuerunt medicamenta. 312. A
- Fluxum sanguinis a uena rupta statim compescere. 50. C
- Femellæ initio pragnationis periclitantur magis, mares vero post primos menses. 415. A
- Femella que pridie fuerat ipso nuptiarum die in virum commutata. 235. C
- Fetidi vt sint viri quatuor requiruntur. 369. C
- Feminae que ante 14. annum vel antequam menses fluant, nubunt, vel steriles sūt aut debiles, & cum periculo abortus. 359. B
- Feminarum, & masculorum ratio generationis, & in quo cōsistat cā diuersitatis sexus de qua re varia referuntur, & repellūtur antiquorum opiniones. 380. B. 381. A
- Femina a viro tribus rōnibus differt, 9. A
- Feminae sunt viris morbosiores. ibid. B
- Feminarum morbi proprii, & cōes. 11. C
- Feminarum temperamentum sanguinis generationi idaneum. 14. B
- Feminae que menses accelerent, anteuertantve, 15. B
- Feminae decem vel nouem annorum grauidæ 16. A
- Feminae maiori ex parte mox a purgatione mensium grauidæ sūnt. 19. A
- Feminae pingues magis exangues sunt alijs 24. C
- Feminae vtero clausæ viris coire poterunt. 31. A
- Famini pinguibus ob sanguinis defectū menses supprimuntur, 54. C
- Famini & viri cōmunia accidere mala propter quid, & virorum propria accidentia. 7 C & 8. B. A.
- Feminae reperiuntur, in omnibus que natura constant, 1. B
- Femineam virtutem multa habent. 1. C
- Femineam, & masculinam virtutem plures plantæ habent. ibid.
- Famina, & mas generationis animalium sūt principia, 2. A
- Femina quomodo necessaria, 4. C
- Femina quomodo a viro differat. ibid.
- Feminam viro coniungi opus est, vt generet, & quare, 5. B.
- Femina quid habeat in sanitate, aut morbis commune cum viro, 6. A
- Femina quid conferat ad generationem, & qua via, 9. B
- Femina qua ratione præter similitudinis naturæ principium, ibid.
- Feminam imperfectiorem esse viro, quo modo concehit. Autor.
- Femina perfectiones habet viro æquales. 7. C
- Femina finis ratione aquæ perfecta est ac vir 7. C
- Fetus efformatio quid sit, & penes quid a cōceptu differat, 375. A
- Fetus membranæ quot sint, & earum dispositio, & vsus, 377. A
- Fetus prima delineatio quot diebus perficiatur, & quomodo autorum sententiæ de hac re intelligantur, 373. C. 378. B
- Fetus non ab omnibus vteri venis alimentū suscipit, 420. B
- Fetus præstantiorem sanguinis partem ad se allicit, 408. A
- Fomenta humida, & iniectiones in pregnantibus fugienda, 413. C
- Fontanellæ in brachijs aperta capiti quod malum habitum contraxerit prosunt. 233. B

INDEX.

Fontanella in cruribus aperta capiti ab utero
recipienti profunt, *ibid.*
Fontanellæ aut seton quare si diu sint aperta
virilis sterilitatem inferant, 371. B
Formationis fœtus omnia tempora, & quo
modo penes temporum differentias diuer
sas sortiatur appellationes. 376. vsque ad
379.
Formationis maior terminus est 45. dierum,
minor verò 30. dierum, et quare, 539. C
Formatiua, & uegetatiua seminis facultas eo
vsque durant, quousque corrumpitur, &
in fœtus membra degenerat *ibid.*

G

Galenus reprehenditur, 419. C
Generationis appetitus, & necessitas.
vnde, 572. BC
Genitura prima delineatio quot diebus fiat,
377. C. 378. B
Grandulosi tumoris in venis causa, signum,
& curandi ratio, 129. ABC
Grauidationis signa plurima, 383. A
Grauidationis falsa signa, 406. B

H

Hæmorrhoides vteri quan'o mori, fi
cus, aut vna formam referant, 313. B
Hæmorrhoidum vteri ratio, 312. BC. causæ
ibidem.
Hæmorrhoides vteri totum in abs. indere te
meritas est, *ibid.* BC
Hæmorrhoides vteri sanguinem *ibidem* con
cretum habentes rescindere temerarium
est, sed medicamentis sunt tractanda, &
quibus, 314. BC
Hæmorrhoides vteri inurere non conuenit et
si immodice sanguis fluat, sed alijs medi
camentis sistendus est sanguis, & quibus
ibidem.
Hæmorrhoidum vteri casole sunt rescinden
de quorum tota excrementa in fungosam
carnem degenerauit, 315. B
Humoris abundantia in mensum fluore, vt
dignoscas, 40. B
Hydrops vteri generatio, & causæ. 262. BC
signa, 263. BC.

Hydrops vteri vomitiones medentur, 265. B
Hydrops vteri fontanellæ in cruribus aperta
profunt, 266. B
Hydrops vteri stibium preparatum prodest
ibidem.
Hysterica affectio in genere qualis, 153. B
Hystericorum affectum varietas, 154. A
Hystericorum accidentium varietatis ratio
159. B
Hystericorum accidentium in accessione pro
uidencia, 168. C
Hystericorum accidentium per causas curan
di ratio, 170. ABC

I

Imaginationis vis in monstrorum genera
tione quanta debeat censer, 393. C
Imbecillitas vteri ut pars simplex est, & qua
cam sequuntur affectiones, 350. C
Imbecillitas vteri quatenus pars instrumen
talis est, & eius signa, 251. A
Imbecillitas vteri propriè qui fit, *ibid.*
Imbecillitas vteri dua causæ speciales, et que
251. C
Imbecillitatis vteri signa omnia, 251. C
Imbecillitatis vteri ex calore curatio à san
guinis missio: e auspicanda, vel ex talo uel
ex saluarella dextre manus, 252. C
Imbecillitatis vteri ex siccitate curatio,
253. B. ex frigidiute, *ibidem*, ex humidi
tate, 254. B
Imbecillitas vteri ex humiditate non curetur
à principio pharmacis astringentibus, &
succantibus, & quare, 254. C
Impotentes & libidinosiores homines æquita
tionem efficere, quò sit intelligendum ex
plicaturq;. Hip. & Arist. loca. 370. C
Infantès quales uegetiores, 430. C
Inflammatiō vteri quid sit, 272. A
Inflammationis vteri causæ, 273. AB
Inflammationis vteri signa, *ibid.* C
Inflammationis vteri curatio somni immo
derantiam prohibet & quare, 276. B
Inflammatiō vtero quando brachiorum veng
secande, & quando malleolorum, & qua
re, 276. C
In-

INDEX

- Inflammationi vteri quando cucurbitula scarificata dorso affixa medentur, 277. A*
In vteri inflammatione vomitiones consulit Auicenna, & quare, 277. B
Inflammationes vteri iam suppurata quo modo disruptionis tempus cognoscimus, & quomodo disruptio procuranda, 280. B
Inflammationi vteri à partu relicta quomodo subueniendum, 216. AB
Inflammatiō vteri à partu relicta si in vlcus degeneret quō tractanda, 216. C & 217
Inflationes quae puerperis eueniunt siue in pedibus siue in toto corpore quomodo curentur, 514. C
Inflatio vteri quid sit, & quas habeat causas, 266. C. 267. A & signa.
Inflationi vteri expurgantia medicamenta quando noceant, 269. A
Inflationi vteri sanguinis missio quando proficit, ibidem.
Inflationi vteri cucurbitula scarificata prodest, 270. C
Inflationi vteri quae balnea sint proficua, 271. C
- L**
- L**ac cur vltimis mensibus generetur. 440. A
Lac maternum etiam si optimum non sit praestantius censetur quam cuiusvis nutritis, 519. C
Lac primum, quod colostrum appellatur, infanti praeberi non debet, quousque expurgetur, 520. A
Lac non corrumpi si ex eodem viro famina rursus concipiat, est qui asserat, 520. C
Lactis generatio quomodo fiat, & ex qua materia, & quo loco, 521. ABC
Lactis defectus refertur ad ea, quae immodicè reuocantur, ibid.
Lactis defectus causae, & eorum signa, 522. AB
Lactis defectus, quomodo curetur, 522. C
Lactis redundantiae causae, 524. C
Lac redundans quō debeat minui, 525. A
Lac reducendus, vt oīno restringatur, 525. BC
Lactis vitiosi signa, & curatio, 526. EC
- Lac in grumos conuertitur à frigiditate, in ca sei verò naturam à caliditatis efficacia, 527. AB*
Lactis conuertio quō curetur, 527. C. 328
Lapis in vtero quomodo fiat, vide calculos in vtero,
Lapis vteri signa, & causa, 316. AB
Lapis vteri quomodo extrahendus est, 316. C. 317. AB
Lienis inueteratis affect. onibus uenae aperit, quae ad lienem nigricant maximè profuit, 208. C
Lieni valentiora quam hepatis conueniunt medicamenta, 209. B
Lieni diuretica, quare profunt, 209. C
Lienis tumores, & obstructions disutientia & aperientia vnguenta, & emplastra, 219. C
Lienis affectionibus non conueniunt copiosae sanguinis missiones, 208. C
Lumbri: quare frequenter intestinis, raro uero in vtero, & in vima uesica generetur, 317. C
Lumbri: os quare pueri frequentius generent, 318. A
Lumbrici quare exigui, & eis qui vocantur ascarides per similes in vtero generentur, ibidem.
Lumbrici os aliquando ex intestinis in vteri migrare, ibid.
Lumbricorum vteri signa, ibid.
Lumbrici vteri non sunt interficiendi potionibus, sed vterinis clysteribus, 319. M
- M**
- M**agnetis lapidis vsus iam omnibus vteri auersionibus, 250. C
Malacca oris ventriculi affectio, 408. A
Mammarum magnitudo, aut paruitas unde veniat, 424. B
Mammarum laxitas, & mollities fatum imbecillum insinuat, 424. C
Mammarum tumores qualiter distinguuntur, 124. ABC
Mammarum fistulosus tumor qualiter cognoscatur, quas habeat causas & qualiter curetur, †† 4

I N D E X.

- retur, 125
- Mammæarum duri, & turgētis tumoris signa
causa, & curandi ratio. 127. A B C
- Mammæarum scrofulæ, & duræ glandulæ, quæ
proprie dicantur, 128. B
- Mammæarum canerosus tumor qualis, quas
differentias habeat, & qualem materiam,
145. C
- Mammæarum tumores duri, qui mereantur
nomen zaratanes, 138. B
- Mammæarum canerosi tumores duobus mo-
dis fiunt, 239. B (132. A B)
- Mammæarum scierofus tumor qualis naturæ,
Mammæarum scirrhusi tumoris causa. ibid.
- Mammæarum scirrhusi tumoris signa, & cu-
randi ratio, 133. A B
- Maris, & femine speciem in lapidibus repe-
ritur, 3. B
- Maris formatio integra 35. diebus, femine
verò 45. 379. C
- Mares quare potius genereantur quam femi-
na, aut è contra: refeluntur de hac re va-
riæ opiniones, 379. C
- Masculi, & femine generatio quo modo fiat
& sexus distinctio, 5. B
- Masculorum generationi quæ uictus ratio sit,
conueniens, 582. B
- Mas an femina in utero geratur quibus di-
gnoscatur, 384. B
- Mas trimestris femina, quadrimestris motum
habet, 402. B
- Materia quibus modis fiat inepta ad veram
similitudinem comparandam, 393. C
- Melancholia virg. & vid. qualis, 179. B
- Melancholice virg. & vid. causa, 180. A
- Melancholice virg. & vid. signa, 181. B
- Melancholice virg. & vid. curandi ratio, 183. A
- Mensium suppressio morbofa ab utero gesta-
tione qualiter distinguatur, 57. A
- Mensium suppressio quæ causa, 58. A B
- Mensium suppressio, quæ mala, 69. A B
- Mensium suppressio, curatio ex pituita 60. A B
- Menses mouentia qualia, 65. B
- Menses mouentia apozemata, 66. C
- Menses mouentes trochisci, 68. A
- Menses mouentia fomenta, & infusiones. ib.
- Menses mouentes aromatum suffusus, 69. C
- Menses mouentes pesi, & infusiones. 70. B
- Menses mouentes externæ iniectiones. 72. A
- Mensium suppressionis curatio melancholice
redundante. 72. 73. A
- Mensium diminutio quid. 77. C.
- Mensium diminutionis causa, 78. B
- Mensium diminutionis signa, 79. B
- Mensium diminutionis curatio, 80. B
- Mensium difficultas quid sit. 82. C
- Mensium difficultatis signa, 84. B
- Mensium difficultatis curatio, 85. A
- Menses debitum tempus anteuerentes qui di-
cantur, 87. C
- Mensium debitum tempus anteuerentium
causa, & dignoscendi ratio, 88. BC
- Mensium qui debitum tempus anteuerunt cu-
randi ratio, 89. A
- Mensium remoratio qualis affectis, 91. B
- Mensium qui debitum tempus remorantur
causa & dignoscendi ratio, 92. A C
- Mensium remorantium curatio, 93. A
- Menses corrupti qui dicuntur, 95. A B
- Mensium corruptorum curandi ratio, 97. A
- Mensium cum morbis amplexus, & providen-
tia, 117. C
- Mensium corruptorum causa, & dignoscendi
ratio, 95. BC
- Mensium cum morbis variis implexus, 118. ABC
- Mensium cum morbis implexibus qualiter
subueniendum, 119. 120. 121
- Menstrui sanguinis vitium sterilitatis esse cau-
sam, & quomodo dignoscatur, & curetur
356. B
- Menstruis fluentibus cauendum est à concubi-
tine monstrum generetur, 397. C
- Mensis octauus utero gerentibus longe dete-
rior tertio, & quartus sexto, 434. BC
- Menses qui deteriores utero gerentibus, &
qui securiores, 435. C
- Mensium fluor ante 12. annum propter quid
15. B
- Menstrua purgatio nequit sola quantitate pec-
care, 19. C

Menstrua

INDEX.

- Menstrua purgatio propter quid singulis mē-
sibus,* 20. A
- Menstrua purgatio nō equali tempore in om-
nibus mulieribus venit, neque equalibus
diebus durat,* 20. B
- Menstruorum profusio evidens signum est fe-
minam esse viri matutam,* 24. A
- Menstruorum priuationis causæ. 25. & dein
ceps.*
- Menstrua purgatio per digitum minimam si-
nistre manus facta,* 33. A
- Menstrua purgatio in ruborem maxillarum
conuersa,* 33. A
- Menstrua purgatio per oculos facta,* ibid.
- Menstruorum errantium curatio,* 34. C
- Menstruorum minima profusio qua dicatur,*
36. C
- Menstrua purgatio quo modo dicatur toto ge-
nere præter naturam,* 37. A
- Mensium fluor quam causam habeat, & con-
ceptui esse impedimentum,* 38. B C
- Mensium fluoris signa,* 37. C. & 38. A
- Mensium fluor per vteri cervicis venas, &
per internas fit, & quomodo dignoscatur.*
40. B
- Mensium fluor qua mala portendat,* ibid.
- Mensium fluor si per eclipsem Solis, aut Lune
profluat non admittit curationem,* 40. B
- Mensium fluor qua deo compescendus,* 40. C
- Mensium fluor ex abortu, vel partu peculia-
rem requirit curam si rationem,* ibid.
- Mensium fluori immoico cucurbita iecori,
aut spleni apposita prodest,* 41. C
- Quibus curetur auxilys. 44. & 45. AB.*
medicamenta possi i vteri admoneri 46. C
- Quando à bile prouenit, quibus compescatur*
47. B
- Mensis fluxus immodicus quando supprimen-
dus sine consideratione ad causam,* 50. A
- Mensium suppressionum tria sunt genera cau-
sarum,* 54. C
- Metalla etiam maris, & samina distinctio-
nem obtinere,* 4. B
- Mercur. herba mas, facit ut mares gignatur,
samina verò, ut gignatur semina,* 482. C
- Mola quid, & ouo gallinarum subuentaneo
proportionate respondet,* 399. A
- Mola vteri plures differentia,* 399. B C
- Mola vteri causæ,* 400. A
- Mola à quibus generentur,* 401. A
- Molam membranaceam qua generent. ibid.*
- Mole signa,* 401. C
- Mole & conceptus differentia,* ibid.
- Mole per tres annos, & plures durare pos-
sunt,* 402. A
- Mole aliquando animal aliquod representant.
ibidem.*
- Mola si grandis nimis fiat mortalis,* ibid.
- Molam que à corpore trudent,* 403. B C
- Mola reiecta quid agendum,* 404. A
- Mostrorum generatio qualis. 385. A. 386. A*
- Monstrorum varia exempla,* 386. C
- Monstrorum quinque genera,* 387. B
- Monstrorum causæ,* 387. C
- Monstrorum dissimilitudo ad parentes tripli-
ci genere contriuctur,* 393. AB
- Monstra dissidentia parentum natura tribus
modis,* 394. A
- Monstrorum generationi quantum conferat
imaginatio, & quid suspicandum sit si se-
mina luti alicuius formam referentē pa-
rentis fecum,* 395. A B C
- Mostruosi conceptus an sint aliqua sig. 396. B*
- Monstrorum generatio quo præcaueda, 396. C*
- Motus deprauatus vteri triplex; suffocatio,
contorsio, & procidentia,* 240. C
- Mulier absque menstrua purgatione ut possit
concipere.* 23. C

N

- Narcoticis auxilijs quando utendū est
in vteri doloribus,* 262. A
- Natura in generatione quomodo progredia-
tur perficiendo per assensum.* 404. C
- Nature perfectiones quatuor.* ibid.
- Nigri coloris virgines salaces, & lasciuæ
sunt.* 236. C
- Nymphotomia quid ab Antiquis appellatur
& quid re vera sit.* 235. A
- Nymphotomia efflētis feminas Antiqui par-
te prominente rescissa citra distinctionem
cura-*

INDEX.

- carabant, & quare non sit semper facien-
dum, ibid.
Nymphotomiam symptoma turpitudinis mul-
ti appellabant, 235. B
Nymphaea apud Areteu cuius partis sit mor-
bus, & quis morbus, ibid.
Nymphaea quando scindi debet, ibid.
Nymphaeam, et non nymphotomiam esse quā
Antiqui rescindendā esse censebant, ibid.
Nymphaeam esse affectionem in qua feminas
in uiros migrare existimāt, & quid de hoc
sentientum, ibid.
Nymphotomia quod nomen est remedij, pro
affectu ab aliquibus usurpatur, 235. A
Nutrix qualis eligenda, 519. A
Nutricis custodia quō habenda, 520. B
Nutrici menses fluere quare infanti noceat,
ibidem.

O

- Obesitas preter naturam sterilitatis cau-
sa est, 330. C
Obstructa corpora quare magnas purgatio-
nes perferre nequeunt, 205. C
Obstructionem efficientes humores concoqui
non possunt, & ideo in eis ad purgationē
concocto expectari non debet, ibid.
Odorata per uterum, & fatida iuxta nares
quando conueniunt, 250. B

P

- Partus decimestris similatur octimestri,
421. B
Partus indagatur ex motibus infantis in ute-
ro, 447. AB
Picaceus appetitus quia sanguinis utero; ge-
rentibus primis mensibus conspurcatur,
408. C
Picaceus appetitus ab halitu sanguinis men-
strui, ibid.
Picaceus appetitus in pregnante maximē pri-
mis duobus mensibus, 409.
Pituita in utero facit defluere satū, 442. A
Plato uterum tanquam animal vorax motu
animali in omnem situs dimensionem mo-
ueri putat, 240. C
Polipodij appetit. deprauati auxiliū, 409. C
Pregnantis mulieris signa plurima, 383. A
Pregnantium alui vacuationes, quā sistendae
sunt, 417. A
Pregnantium crura inflata, quomodo subue-
niantur, 417. C
Pregnantes cur tempore pregnationis melius
curvè peius se habeant, 430. A
Pregnantes cur pallido calore afficiantur,
430. C
Pregnantium color pallidus semper propter
quid, 433. C
Pregnantes propter quid alienos appetat ci-
bos, ibid.
Pregnantes acutis morbis obnoxia, ibid.
Pregnantibus deteriore esse morbum ex hu-
more quieto quam ex humore turgente,
436. C
Principium morbi in puerperis quando a die
partus debeat computari, & quando n. n.
505. AB
Procidentia uteri quid sit, 240. B
Prominentia uteri, per procidentiam intelli-
gitur, 240. C
Prouidentia uteri tres species, ibid.
Prouidentia uteri causa, 341. AB
Procidere aliquibus feminis uterum ex coe-
uendi desiderio, aut longiore ueneris absti-
nencia Aristoteles scribit, ibid.
Procidentia uteri signa, 241. C
Procidentia uteri curatio, 242. & 243. &
244.
Pruritus pudendorum in feminis quid sit, &
quas habeat causas, 236. B
Pruritus pudendorum & symptomatis, tur-
pitudinis in feminis curatio, 239. ABC
Puerperis grauiora mala ex filiarum quā ex
filiis partu eueniunt, 505. B
Puerperis tempore quando copiosius rem opor-
teat excitare uteri purgationem, 505. C
Puerperis quando venam tali scindere con-
ueniat, ibid.
Puerperis quando conueniat hemorrhoides,
aperire, & quare, ibid.
Puerperarum febres, & plures de his Hip. hi-
storia, 507.

Puer-

INDEX.

- Puerperis* quando noxiū humoris purgatio per pharvacū sit ex usu et quare, 506. A
- Puerperis* quibus ex immodica purgatione morbus suboritur, quomodo subueniendū est, 506. B
- Puerperis* purgatione, ut expellet fluente, ali quando conuenit alia curationis genere uti prout morbus exposculauerit, 506. C
- Puerperarum* febribus sanguinis missio ex uena tali ad plenitudinem deponendam prodest, 508. A
- Puerperis* febricitantibus uena brachij uel iecoris quando aperienda, 508. B
- Puerperis* febricitantibus purgatio per pharvacum quando conueniat, ibid.
- Puerperis* est quodam februm genus peculiariter ex purgamentis in utero detentis, & suppuratis. 508. C. huius febris curatio, 509.
- Puerperarum* febres ex purgamentis uteri suppuratis quomodo cognoscemus communes iam fieri reliquis corporis humoribus, 509. C
- Puerperarum* febres expurgamentis in utero putrefactis. quo modo etiam ipsae ab utero fluentibus purgationem per alium exposcant, 210. AB
- Puerperis* alius soluta ocysimē est cohibenda, 210. C
- Puerperis* vomitus accidunt, aut ex noxio aliquo humore, aut ex alimento, aut ex sanguine, 511. C
- Puerperis* vomitus qua methodo sistendi, 512. AB
- Puerperis* angina, aut difficili respiratione laborantibus, quando & quaprameditatione sanguis ex brachio mitti debeat, a illic fluentibus menstruis, 212. C
- Puerperis* pleuritida afflētis non primo statim accessu sanguis ex brachio mittendus, sed ex talo prius, deinde verò ex brachio, & quare, 213.
- Puerperarum* tussis quō cohibenda, 214. A
- Puerperarum* epilepsia, aut delirium, 214. B
- Puerperarum* inflationes à quibus causis fiāt & quomodo curētur. siue in pedibus, siue in toto corpore eueniant, 214. C. et 215.
- Pulendi* uicibus mala figura quetuplex sit, et quomodo sterilitatis sit causā, 368. AB.
- Pueri* deterius in plenilunio se habēt, & grauius magis fastidiunt, 410. C
- Pueri* quanto principijs generationis proximiores sunt, tanto laudabiliorem substantiam habent, 18. A
- Pul. briores* feminae quare frequentius quam aliae incidunt in febrem ablam, obstructions, aut melancholiam, 201. AB
- Pulsationis* vehementis, quae in arterijs dorsi reperitur, quam causam reddat Arctaeus, 218. C. 219. AB
- Pulsare* ēt vehementer mesenterici arterias dum vehementer inflammatur maximē in melancholia hypochondriaca Fernellius censet & quatenus verum habeat, 219. B
- Pulsatio* conspicua in ventris arterijs duplex est, 219. C
- Pulsatio*, rehemens in arterijs dorsi una ē tribus causis sēsitur, 220. BC. & 221. AB
- Pulsationem* rehementem arteriarum dorsi quae signa comitentur, 221. C
- Pulsationis* rehemētis arterie dorsi ex uenacāe sibi adherētis plenitudine, aut inflāmātiōe, peculiaria signa, et p̄sagia, 222. ABC
- Pulsationis* rehemētis arterie dorsi ex incēsiōe uenarum partium, aut ex obstructione p̄sagia, 222. & 223. A
- Pulsationi* rehementi, quae ex inflammatione uenae uel arterie dorsalis sit, sanguis missio ex uenis cubiti confert, non semel uersa sed partitis vicibus facta, 223. B
- Pulsationi* dorsali quando cucurbitula dorso affixa proficiat, & quando, quomodo, & quibus medicamentis frigidis corpus alterare expediat, 223. C
- Pulsationi* dorsali raro, & leuia purgantia pharmaca conueniunt, & quae, 224. A
- Pulsationis* dorsalis ex nuda distemperie calida curatio, 224. C
- Pulsationis* dorsalis ex alicuius uisceris obstructione curatio, 225. A

PH-

INDEX.

- Purgantia uterum,** 64. ABC
Purgatio quam commoditatem pregnantibus inferat, 436. A
Purgatio per epicrasim humoribus excedentibus debetur magis quam alijs humoribus. 52. B
Pus in utero contentum aliquando sterilitatis causa est, 360. C
Pustularum scabrarum, quę pudendis mulieribus adnascuntur ratio, 307. BC
Pustularum pudendi curatio, 308. AB
Pustulis pudendi aqua utilissima, & eius descriptio, ibid.
Putrefactio tanto est maior, quanto substantia perfectioris nature. 18. B
- R
- R** Hagadię uteri quid sint, earum differentię, causę, signa, & curatio, 300. & de inceptis,
Roborantia uterum varijs modis confecta, 255. BC
Ruge in ventris cute a partu relicte quomodo auferende, & quomodo ante partum prohibendum est ne fiant, 218.
- S
- S** Aluatella dextre manus aborsum non mouet, 413. A
Sanguis, & semen cum temperate sint nature, dum putrescunt, tam seua efficiunt accidentia, ut sunt hysterica, 158. AB
Sanguinis missio in puerperis, quibus adhuc fuit puerperij purgatio, quando fieri debeat ex brachio, & qua premeditatione, 212. A.
Sanguis in grauidis tribus e partibus prosilit. 419. C
Sanguis in grauidis quando per anostomofim fluat, 422. B
Sanguinis detractio in grauidis similem peti scopum ac etas, 439. A
Sanguis mensium qualis sit, 17. A
Sanguinis detractio in pregnantibus duplici ratione moderatur, 439. B
Sanguinis missio an inedia in grauidis vitanda, 441. B
Sanguinis narum profusiones in viris, idem
- inditium quod feminam menses** 15. C
Sanguis mensium mille monstra, & accidentia generat, 17. A
Sanguis mensium in virginibus per quas venas fluat, 22. A
Sanguis mensium purior est sanguine alitioni parato saltim equalis illis, 18. A
Sanguis vna die ultra mensem detentus plus noxie acquirit quam toto mensis tempore. 19. A
Sanguis menstruus in pregnantibus per quas venas fluat, 22. A
Sanguinis fluxum immodice concitare per mensium suppressiones, periculosum. 42. C
Satyrasis persimilis affectio in feminis, & quę sit, 234. C
Satyrasis priapismi, & uterini furoris differentia, ibid.
Satyrasi vera seminas non tentari, sed aliquid ei persimile eis accidere, ibid.
Satyrasis faminarum ab Antiquioribus nymphotomia appellabatur, 235. A
Scirrhus uteri quid, & eius differentię aliquot, 281. AB
Scirrhi materiā quatuor modis fieri, 182. A
Scirrhus uteri signa, 194
Scirrhus uteri sanguinis missio ex hemorrhoidibus commodior est, quam ex alia parte, & quare, 284. C
Scirrhus uteri tumori, quę localia medicamenta conueniant, 285.
Scirrhus tumoribus nullum calfaciens, & siccans medicamentum, etiamsi lenē sit, diutius est adhibendum, 286. C
Scirrhus uteri tumori chalybis usus utilissimus, & quomodo chalybis preparatur, & plura pulchra de hac re, 287. et deinceps
Scirrhusus mammarum tumor qualis nature, 132. AB
Scirrhusi mammarum tumoris signa, causę, & curandi ratio, 133. AB
Scirrhusis in tumoribus qualiter emolliendum, 134. AB
Semen non magis continet formam viri quam feminę, 9. A
Semen in virginibus grauissima concitat accidentia

- Incidentia,* 12. C
Sembris & sanguinis menstrui corruptio an fiat in eius strangulatione intra vterum, & in vasis, 165. B
Sembris generationis prohibitio, & iam corruptie incutio, 177. ABC
Semen quantum in vtero detineatur, & putrescat, inflammationem efficere non potest, 293. A
Semine a viro in balneum proiecto feminam suscepto illo in balneo ingressu coecepisse, prae ter rationem & falsum censetur. 29. C
Semnis vitium sterilitatis est causa, & quo cognoscatur & curetur, 257. B
Semen est animatum anima vegetativa, non in actu secundo sed in actu primo, 395. B
Semini virtus a parente transmissa intiget et ad fetus formationem matris virtute, quae simul cogit, quae non tantum virtus materiam seminis est, & quae sit, 375. B C
Semen quod in vasis spermaticis sit, penes quid differat a semine, quod constituitur in testibus, 361. B C
Semini quare pusillitas detumescat, & tertio cesset fluxu per intestina excreto, 394. B
Sentientis anima quo tempore in statu educatur de potentia materiae & quo tempore anima rationalis introducat, 380. A
Senatu in ossibus de articulationibus prius adhibendum quod exemplum consolidatum, 192. C
Sexus differentia penes quid verè attendatur 381. C
Sexus distinctio probat summa ratio, & eius exempla, 2. A
Sexus distinctio omnibus reb. 2. B
Signa quibus distinguuntur accidentia praegnantium accidentibus virginum in mensuum suppressione, 39. C
Similitudo in sexu unde prodeat, 9. C
Similitudo penes quod debeat attendi, 387. C
Similitudinis tres modi, ibid.
Similitudo in specie quomodo ex facultate formativa seminis proficiatur, & quo formativa facultas, cum de genere naturalium sit, disponere materiam possit sibi
subiectam ad suscipiendam sensitivam formam, 388. A B
Similitudo individualis naturae ad parentes à quibus causis proficiatur, & quae sit causarum ratio. 388 & 389. & 390. deinceps.
Similitudinis in sexu ratio, 362. B C
Satus veri vitiosus sterilitatem efficit, 355. B
Spiritus gentium quid sit, 361. C
Splen nulla causa citius obstructione, aut scirrhus afitur, quam menstruis, vel haemorrhoidibus suppressis, 208
Splenis affectus copiosas sanguinis detractiones minime ferunt, vide licet affectiones.
Sterilitas seminarum quid sit, & quo vterus, quatenus generationis instrumentum est, triplex vitiorum genus pariat, 422. C
Sterilitas quadruplex species, 323. A
Sterilitatis in genere cause. 232. B C
Sterilem aut fecundam esse feminam, quae in hoc experimenta, 324
Sterilitas a feminam ne, aut ad virtutem sit referenda, quomodo probatur, 235. C 236
Sterilitati aut sit unitati, quae veriusque coniugis temperatura sit aptior, temperata ne, an distemperata, 327. B C
Sterilitas quo ob vitium partium genitalium veriusque coniugis proveniat, 328. C
Sterilitas ob vitium seminis quo contingat. 326. B
Sterilitas gratis ratione aut iunioris, aut senioris, 326. C
Sterilitatis causa est obesitas nimia, aut gracilitas, 330. C
Sterilitatis morbose quatuor cause. 335. C
earum signa & curationes. 339. C
Sterilitati ex vteri morbose frigiditye quando conveniunt suffitus, & quando evaporaciones, & quando pesaria, & alia remedium genera, 245. B
Sterilitati morbose ex frigiditye, humiditate & fluxibus in vtero contentis remedium ex perimento confirmatum, 351. A
Sterilitas morbose aliquando fit ob aeternam membranam ante vteros. 352. A
Sterilitas ad tempus, 359
 S. 2.

I N D E X.

- Sterilitatis eius feminae, qua iam semel concepit, causa aliquando est pus in utero contentum,* 393. C
- Sterilitatis causa in aliquibus feminis est semel peperisse,* 391. A
- Sterilitatis virorum causa,* 394. A
- Sterilitas virorum, vide virorum sterilitas.*
- Stibij preparati vsus vteri hydropi prodest.* 299. B
- Strangulatio vteri quis affectus,* 191. C
- Strangulationis uteri differentiae,* 191. A
- Strangulationis uteri differentia ab alijs affectibus,* 192
- Strangulationis uteri causa,* 193. A
- Strangulationis uteri, & eius causarum signa,* 199. C
- Sudores quomodo parentur pro mensis floris distractione,* 43. A
- Superfetatione differentiae & causae,* 384. C
- Suppressionis mensium causae,* 58. A B
- Suppressionis mensium curatio,* 90. A B
- T
- T***emperatam viri usque coniugis naturam fecundissimam esse, secundam quoque immoderatam utriusque dummodo non sit exasperantia in extremo, & uehemens,* 537. C
- Temperamentum, seu calor influens uirtutes obtinet particularium temperamentorum omnium partium totius corporis.* 391. C
- Tempus triplex ad munia naturae,* 448. A
- Testium calidiorum aut frigidiorum signa,* 332. A
- Thymus uteri quid sit,* 305. C
- Thymum uteri Tarsecum uocauit Auic.* ibid.
- Thymorum uteri curatio,* 306. C
- Tussis puerperarum quomodo curanda.* 514. A
- Tussis an ab halitu, suppressioni alui mensis, an a capitis defluxu ueniat,* 415. B
- V
- V***acuacionem debere fieri per conuenientem regionem, & cui natura inmititur, quomodo sit intelligendum,* 510. A
- Valnea in mensis fluore sunt suspecta.* 41. A
- Varietas accidentium hystericorum unde oritur.* 149. da 149
- Varietatis accidentium hystericorum in genere causa.* 159. A
- Vena humeraria in grauidis secunda* 440. C
- Venenum cur in feminarum ueris diu recodatur.* 149. A
- Venenum triplicem corpore noxae modum infert, secundum quod per uenas, arterias, aut nervos inducit noxam.* 191. C
- Venerem excitantia auxilia, alia seminis abundantiam praestant, alia ipsum, quod iam est genitum prouocant, alia flatum generant, erectioni pudendi uirilis idoneum.* 365. C
- Venerem excitantia quando ex pudendi uirilis ignauia proficiuntur, uaria remedia.* 365. C. 369. 367
- Vegetatiua facultas feminis quo tempore incipiat operari in formatione fetus omnino ignoratur.* 379. C
- Vene sectio, in puerperis, quibus adhuc purgatio fuit quando & qua praemeditatione ex brachio debeat fieri.* 212. C
- Ventriculus quare ex utero tot symptomatum differentias patiatur, cum causa una sit, habitus nimirum ab utero ad uentriculum transmissus.* 226. B. & 227. A
- Vermium generatio in utero.* 317. C. & uide lumbrici.
- Verrucarum uteri differentiae omnes & earum descriptiones.* 305. A B
- Verrucarum uteri causae.* ibid.
- Verrucarum uteri curatio a totius corporis prouidentia debet incipere, & quomodo.* ibid. C
- Verruca uteri quomodo excidenda.* 306. A
- Verruca uteri quibus medicamentis urenda & modus ustionis candenti ferro, quomodo faciens.* ibid.
- Verrucarum uteri curationi pinguis & laxa pharmaca conuenire.* 307. A
- Viduae minus quam uirgines molestantur.* 13. A
- Vinum quando & quare nutriti, interdendum.* 502. C
- Vinum rubrum chalybeatum quibus mensium fluoribus prodest.* 42. B
- Virginum peculiaria accidentia.* 12. B
- Virgines propter quid obstruantur.* ibid.
- Virginalis affectio quomodo a partu comparatur.*

I N D E X.

- retur. 228. C
Virgineus morbus quare sic appelletur, & quare et dicatur febris alba. 201. A
Virginei morbi signa. 204. C
Virgineo morbo affectis quo ordine debeat mitti sanguis. 205. B
Virgineo morbo ex hepatis obstructione affectis quò aliquando præhabita purgatione expediat sanguinem ex saluatella, & aliquando ex talo mittere. 207. B
Virginei morbi cum lienis obstructione cause & signa peculiaria. 208. A B
Virginei affectus cum lienis obstructione curatio. ibid.
Virgineus morbus ex meserei obstructione abortus per se quid differat a melancholia hypochondria ex eadè aborta cā. 211. B
Virginei morbi ex meserei & ventriculi obstructione curatio. 211. C
Virgineo morbo chalybis præparati usus commodissimus & quando ab eo ordinanda est curatio, & quando non. 212. B C. & 213. & deinceps.
Virgineo morbo affectis tripliciter prodest exercitium, & qua lege eo sit utendum. 212. C. 213. A
Virgines grandiores factæ difficulter concipiunt. 356. C
Virg. & uid. melancholia qualis. 176. B
Virg. & uid. melancholia causa. 180. A
Virg. & uid. melancholia signa. 181. B
Virg. & uid. melancholia curandi rō. 183
Viri quib. de cau. steriles reddantur. 393. A
Viri quatuor rebus ad fecunditatē indigent. 396. C
Viri quatuor de causis steriles fiunt. 386. C
 370
Viris quare sterilitatem inferat uisio uel uenarum sectio retro aures. 371. B C
Virorum sterilitas ob totius corporis intemperamentum, uel nimiam obesitatē. 398. C
Virorum sterilitas ob alicuius membri principis insignem noxam. 396. B
Virorum propria accidentia. 6. C
Virum esse sēmina calidiorem quò est intelli-
gendum, & qua ratione fiat. 8. A B
Virtutem actiuam & passiuam habent plantarum plures. 1. C
Vlcerum diuersitas sumitur in utero à causa ab accidentibus & à loco. 236. A
Vlcerum uteri cause secundum omnes eorū differentias. 293. B
Vl. erum uteri & causarum eorū signa omnia. 364. A
Vlcerū uteri uniuersam curationē indicationē quo loco cōplexus fuit Hip. 265. C
Vlcus cuiusq; loco sit, duplicem habet ad curationem indicationem. 269. C
Vlcerū uteri cū distēperie curatio. 267. C
Vlcerum uteri cum humorum fluxione curatio. 167. C
Vlceri uteri cum dolore curatio. 268. A
Vlceris uteri erudentis curatio. 278. C
Vlceris uteri sordidi curatio. 268. B
Vlceris puris uteri curatio. 266. C
Vlcera uteri quæ degenerauit inflammatio à partu relicta, quomodo cognoscenda, & curanda. 210. C & 217
Vomitibus conferunt auersioni uteri, quæ fit uersus inferiora, & quare. 250. A
Vomitibus in puerperis quibus de causis fiat, & quomodo curandi. 511. & 512
Vomitibus auersioni uteri quando conueniat. 210. A
Vomitionibus prægnantium quomodo subueniendum. 312. B
Vtero gerētis mulieris pluriā signa. 483. A
Vterinus furor medius est inter affectus uteri, ut pars similis est, & ut pars instrumentaria. 233. C
Vterini furoris natura partim pertinet ad appetitum naturalem uteri lēsum, partium ad cerebrum, quod uterum in consortium trahit. ibid.
Vterinus quid sit. 234. A
Vterini furoris morbi causarum, & symptomatum consideratio. ibid.
Vterini furoris morbus intemperies est, & quæ. ibid.
Vterini furoris distēperies in ea parte residet
 in

I N D E X.

<i>in qua niget coeundi appetitus, & que sit,</i>	<i>Vterus ex quibus constet,</i>	151. B C
<i>& quo appetitum excitet,</i>	<i>Vteri usus & morbi,</i>	152. B
<i>Vterini furoris ad famem caninam, & sitim</i>	<i>Vterus quas habeat consensus differentias,</i>	
<i>insatiabilem collatio,</i>		158. B
<i>Vterinum furorem committatur relictum ce-</i>	<i>Vteri strangulatio quis affectus,</i>	160. C
<i>rebri facultatum error,</i>	<i>Vteri strangulationis differentie,</i>	161. A
<i>Vterinus furor ponere quid differat à fœmi-</i>	<i>Vteri strangulationis tres species,</i>	162. A
<i>narum satyriasi,</i>	<i>Vteri strangulatio qui differat ab alijs affe-</i>	
<i>Vterini furoris cause secundum eius differen-</i>	<i>tionibus sibi similibus,</i>	162. B
<i>tias,</i>	<i>Vteri strangulationis cause,</i>	163. A
<i>Vterini furoris signa,</i>	<i>Vterus in strang. non mutatur,</i>	164. B
<i>Vterini furoris curatio,</i>	<i>Vteri strangulationis, & eius causarum si-</i>	
<i>Vterus varijs modis à propria sede dimoue-</i>	<i>gna,</i>	166. C
<i>tur,</i>	<i>Vtero gerens si menses singulis mensib. fluat</i>	
<i>Vteri situs & alligatio,</i>	<i>debilitari est necessum,</i>	400. C
<i>Vteri motus naturalis, & præter naturã qui.</i>	<i>Vterus neq; uteri partes in mensium fluere</i>	
	<i>immodico non sunt tractanda medicamē-</i>	
	<i>tis,</i>	42. A
<i>Vteri gestatio à mensium suppressione quali-</i>	<i>Vterus nullã peculiarẽ edit actionẽ, sed usum</i>	
<i>ter signis distinguatur,</i>	<i>tantum, suspensioni idoneum,</i>	20. C
<i>Vteri alba purgamenta que dicantur, & qua-</i>	<i>Vterus à sanguine menstruo non nutritur,</i>	
<i>lis sit affectio,</i>		21. A
<i>Vteri varius fluxus,</i>	<i>Vteri intemperies calida gravissimorum acci-</i>	
<i>Vteri fluxionum causa,</i>	<i>dentium causa,</i>	25. B
<i>Vteri fluxionum dignoscendi, & distinquen-</i>	<i>Vteri intemperiei calidę provida curatio,</i>	
<i>di ratio,</i>		26. B
<i>Vteri fluxionum à qua parte prodeant di-</i>	<i>Vteri intemperies sicca, vacuationi inimica,</i>	
<i>gnoscenti ratio,</i>		28. A
<i>Vteri fluxionum qualis diuersitas & natura</i>	<i>Vteri symptomatum præcipua curatio est, ab</i>	
	<i>eorum causis habita indicatione,</i>	29. A
<i>Vteri fluxione præsagium,</i>	<i>Vteri vasa angusta siue à natura, siue à visci-</i>	
<i>Vteri fluxionũ curandi rō, & nũ à toto cor-</i>	<i>dis succis mensium suppressionis sunt cau-</i>	
<i>pore fiat dignotio & medela,</i>	<i>sa,</i>	55. C
<i>Vteri fluxiones licet urinam mouentibus ali-</i>	<i>Vteri retractio, aut contorsio ex quacunque</i>	
<i>quando inueniuntur, id tamen cautẽ efficien-</i>	<i>occasione mēsiũ suppressionis est cā.</i>	56. B
<i>dum,</i>	<i>Vteri frigiditas impedit mensium fluxum,</i>	
<i>Vterus q̃ habet naturam & compositionem</i>	<i>ibi dem.</i>	
<i>& quibus morbis afficiatur,</i>		
<i>Vteri structura,</i>		
<i>Vteri situs,</i>		
<i>Vteri quantitas,</i>		

Z Aratanes qui tumores in mammis di-
cantur 138. B

T A B U L A E F I N I S.



L V D O V I C V S M E R C A T V S.

De communibus mulierum Affectionibus.

LIBER PRIMVS.

B

De Sexus differentia.

Cap. I.



COE MINAS in omnibus natura constantibus reperi-
ri, mille modis testatum esse apud omnes Philosophos
haud difficulter quivis reperiet. Nam cum per genera-
tionem, & novam rerum propagationem cōtinuo suc-
cessu species conservationem nanciscantur: ex neces-
sitate naturæ prodit, fæminas esse in omni genere neces-
sarias ad ipsius naturæ perfectionem. Generationē ete-
nim esse actionem in substantia, à substantia, & ad sub-
stantiam asseruit Empedocles, & inficiabitur nemo.
Quamobrem habere, & efficientē, & effectiōnem, & effectum, & ex quo fit, &
in quo fit necessum sanè erat. Atqui cum ea omnia idem & vnum præstare non
possit: ob id decuit naturæ perfectionem, & maiestatem omnia hæc, & diuersa,
& præstō cuius generationi esse. Actionē. n. & passionem in omnibus rebus à
seipsis vna ratione, & propter eundē finem inesse, erat impossibile, licet in ali-
quo rerum genere id reperiri ex necessitate naturæ oportebat. Quamobrē con-
venientissimum fuit in ips, quæ generationi erant profutura aliquid esse, q̄ in
se conciperet, aut generaret, aliquid verò, q̄ in alio. Quod sanè ex rerū omniū
natura educta ratione facild probari potest, ex cuius nimirum aptitudine ad
agendum, aut patiendum. Nā sunt inter ea, quæ natura constant, plurima, quæ
virtutem tantum passiuam habent, & omnino fæmineam naturam referūt. Ad
quorum generationem cælum virile robur tantummodo præstat. Huius con-
ditionis sunt animalia, & plantæ, q̄ citra semen generantur ex apta materia, vir-
tute cælestiū corporum concurrente. His etiam accedunt alia, quæ in se virtu-
tē habent actiuam, & passiuam, natura sua id exposcentem: nihil. n. aliud perfe-
ctius plantæ habent, q̄ generationem, & ob id hoc naturæ beneficio fruuntur
plantæ, quæ semen habent, ne in officio deficerent. Quamobrem conuenienter
omni tēpore, comites habent virtutem actiuam, & passiuā generandi, ut etiam

A omni

omni tpe generarent: siquidē id solū erat illis vitæ munus, & ea perfectio. Item A
 sunt p̄dictis pleraq; perfectiora habētia qdē virtutē actiuam, aut passiuam s̄m
 sexum, mas qdē actiuam, fœmina verò passiuam. Itaq; ex patiendi, aut agēdi po
 tentia euidenter constat necessum esse, sexus differentiam constituere. Verū
 quia est aliquod vitæ opus nobilius in animalibus (quibus proprior est huius
 sexus distinctio) q̄ generatio, cui vita principaliter dirigit: ideo omni tpe sexus
 masculinus fœmineo decebat coniungi, vt plantis, sed solū tpe coitus, quo v
 num ex mare, & fœmina fieret (sicut in planta omni tpe fit) eò q̄ oportuit ea dis
 iuncta esse, ad altiora intellectus ministeria. Verū qn̄ generationē fieri opus
 est, commisceant, coeantq; necessarium existit, vt ex ambobus, seiunctis ac co
 pulatis, vnum tandē animal fiat. Nam generationis aīalium principia marē, ac
 fœminam esse (illum, vt motus, & generationis originē; hanc verò, ut materiā
 præstet) ex Arist. li. 1. de gen. anim. c. 2. & li. 2. c. 1. multis rōnibus probatum su
 perest, quoniā q̄ generatur interim dum fit cā generante eget proxima, vt effe
 ctum attingat; sic etenim, semen viri necessum erat aliqua parte recipi, vbi ope
 ri incumberet ad qd̄ tanq̄ commodissimum locum fabrefecit natura vterum. B
 Fuit proculdubio apud oēs, tū philosophos, tum astronomos, & sapientissimos
 alios viros, tam euidentis, & probata distinctionis sexus rō; vt nulli dubiū esset,
 potissimam fœcunditatis rerum oīum cā, in sexus distinctione sitam esse. Li
 cet Arist. li. 1. de gene. anim. c. 20. & ultimo, non semel scribat, marem ac fœmi
 nam nō separari in herbis, plātis, arboribus, & virgultis: quod item astruit li. 4.
 de histor. anim. c. 11. Alij tñ naturæ rerum scriptores, hisce plantis, aut alijs re
 bus, quibus, maior vis est, masculi nomen ac titulum assignant: quibus verò mi
 nor, fœminæ, vt patet ex Dioscor. li. 4. c. 5. & Theophrast. lib. 3. de histor. plan. ca.
 10. & Plinio lib. 21. cap. 21. & Galeno lib. 9. de simplic. Sed specialius idem Pli
 nius lib. 13. cap. 4. Arboribus, inquit, immo magis omnibus; quæ terra gignit,
 herbisq; etiam virunque sexum esse, diligentissimi naturæ indagatores tradūt.
 Quod & ipse innuit lib. 16. cap. 33. dicens, hederæ esse duo genera, scilicet, ma
 rem, & fœminam, vt reliquarum herbarum. Quod etiam ex Beato Basilio, &
 Ambrosio li. Hexameron, homilia 5. euidenter constare arbitror. Sicut ex Theo
 phra. lib. 1. cap. vlt. & lib. 3. c. 9. Sic Aegyptij, & sapientes astronomi vetustam C
 quandam superstitionem de sexu signorum Zodiaci apertè profitentur. Nec du
 bium quidem est apud prædictos viros; cum quadraginta octo imaginum cele
 stium, aliæ præ se ferant nomen, & vestigium fœminæ; aliæ verò, maris: iuxta cō
 gressus eorum fœcundam, aut sterilem fieri rerum omnium, quæ celi imperio
 gubernantur naturam, & sortem. Nam nisi masculus masculo, aut fœmina fœmi
 neo sexui adhæreat, aut fortè eundem intueatur: rerum productiones cessare, &
 congressus fieri steriles, illis esse compertū reor. Verū si opposito ordine mas
 fœminæ, aut fœmina maris congressum consequatur: fœcunda, plenaq; esse eo tē
 pore, ex influxu exorta omnia. Neque dissimili ratione viri philosophi, omniū
 rerum prima principia, & elementa in mixtorum confectione, vicem quoque
 maris & fœminæ gerere, tanquam firmissimum existimarunt: mixtionis omnis
 ignem credentes parentem esse, & autorem: terram verò, matrem. Sic Plato in
 Timæo, mundū ex his duobus elementis, veluti ex parentibus constare, euiden
 ter affirmat. Est proculdubio ignis omnium actionum autor, ac vir: terra verò
 veluti

A veluti susceptrix, & receptaculum, matri iure optimo assimilata, & ea nomine ex philosophorum oīum decreto gaudens. Verum, quia lenissimū corpus grauiissimo non solum non coherere sua sponte potest, sed proprio genio dissidere semper & distate conatur: hinc proculdubio periclitari rerum oīum principia necellum erat, ni esset aliquod vinculū, quo mundi parentes coherere, & adinuicem misceri possent, vt secundi ex coniugio facti, rerū propagationes magis perficerent. Cui sanē operi prouidit natura duo alia elementa adiungere, quorū interuentu, & mundus esset solidus, vt Plato ait, & vterq; patens congressu alterius, generationi acquiesceret, vt ambobus sic iunctis, secundū coniugium fieret. Itaq; quemadmodum vniuersa hæc elementorū sphaera, quæ ex quatuor elementis constituitur, se hēt veluti quædā materiei massa, & moles, q̄ corpus cœleste effingit, & format: ita cetera elementa si igni comparentur, habent se tanquam materia, ignis verò velut forma eorum est, & figulus, qui tanq̄ vir attemperatis oīum viribus, vberriam prolem ex terra matre, fecunda ex adhæsit viri facta, producat. Quod ex necessitate naturæ quoq; probauerit Hip. li. de Dieta, dicens. Quicquid igitur in aliud corpus ingreditur, non augefcit, quicquid verò in feminā, augefcit, si ea quæ ipsi congrua sunt, contingant. Et paulò inferius subdit rationem, & modum generationis masculi, & femine, referens vniuersam huius rei rationem ad calorem, & frigiditatem: nam eodem lib. paulò inferius inquit. Ex omnibus aut masculi calidiores sunt, & sicciores, femine verò humidiores, ac frigidiores: propterea quod ab initio vtrique in talibus geniti sunt, & à talibus augefcunt. Præterea, ad eò creuit sexus diuersitatis indigentia, vt et in mixtis adhuc anima carentibus fecundissima natura quodammodo vestigium femine delineauerit. Quis vsquam capere pōt, lapides esse quosdā, qui feminarum more conceptus in alueis quibusdā, quibus intus scatent, progignunt: ipsi crescentes ex humiditate quadam in alueis contenta, abrupto lapide in lucem prodeunt? Fertur quidem tales fuisse repertos, in quorū sinibus lapillos quosdā inesse alios cōcretos, alios glutinoso luto p̄similes, alios verò crassioris aquæ naturā referentes. Quid quæso poterit esse aliud, q̄ inter lapides et quosdā esse fecundos, & feminis p̄similes, q̄ in se generent: alias verò steriles. Pari quoq; rōne chimicæ artis professores publicè fatentur, metalla et parētes habere alios, præter terram, & Solis virtutem. Existimant quidem argentum viuum, Mercurium ab ipsis appellatum, auri & argenti esse progenitorē, nō solum in ijs, quæ ipsi chimica arte imaginantur fieri posse: verum natua sorte in terra ipsa ex certa quadā massa, quæ matrem & fecunditatem æmulatur. Et ea certitudine id cōpertum esse existimat, q̄ facitantes ex certis quibusdā simplicibus, materie, seu matri illi quid p̄simile, existimant Mercurio permixto metalla illa in aurum posse degenerare. Ij verò vtri, qui de re rustica, & plantis accuratè disputarunt, non minori conatu, multis rationibus probarunt, plātas tantò esse fecundiores, quantò aut vtriusq; sexus sunt participes, aut (si altero tantū gaudent) dum disiunctas esse contingit, & per se steriles, virilibus plantis adhærent, vt mutua fecunditate luxuriēt, & fructus pariant. Sic Theop. li. 3. de Hist. plant. c. 12. disiunctim plantarum sexus annumerat, recensens ex plātis quasdā esse masculas quasdā feminas. Item li. 1. de cau. plantar. c. 9. querit, cur femine magis quàm masculi augeantur. Pari quoq; ratione cap. 28. eiusdem lib. refert,

A 2 in

in arborum genere fœminas longè fœcundiores esse, quamquam minis calide
 quàm masculæ sint, & masculas, crispas, hirsutas, densiores, & tortuosiores esse:
 sicut fœminas proceras, molliores, fœcundiores, & enodes. Apud alios quoque
 viros passim quibus reperiet, ex plantis quasdam fuisse fœminas appellatas, aliàs
 masculas, illaq; esse fœcundiores, quò proprius masculis implantantur, sterilef-
 que fieri, si longis intervallis distitæ sint. Verùm quòd in alijs plantis vterq; se-
 xus cohæreat, ex ratione superius à me adducta patere satis arbitror: siquidem
 constat, necessum esse aliquid obtinere, quod vtriq; sexui correspondeat, si fœ-
 cundæ, & sui similes generatrices, erant futuræ. Animalia verò longè præstan-
 tiori, & euidentiori rōne constat, sexibus esse disincta, quemadmodum passim
 in omnibus conspicitur. Ea tamen diuisit Arist. lib. 4. de hist. anim. c. 11. & li. 1.
 de Gen. anim. c. 1. in tria potissima genera: quorum vnum cōtinet animalia, quæ
 sexus dissidio distinguuntur, in quibus mas, & fœmina seortum existunt: alterū
 verò ea complectitur, quæ nullo sexu participant, qualia sunt, quæ vitam stabi-
 lem degunt, aut omnino testa integuntur, & saxi, ac lapidibus fixa inhærent.
 Inquit. n. Arist. lib. 1. de Gener. anim. c. 1. Quæ autem non gressilia sunt, vt testatū
 animalium genus, & quæ saxi adhærentia viuunt, quoniam natura simili plan-
 tis constant, hinc vt in illis, sic in ijs mas deest, & fœmina, sed similitudine, pro-
 portioneq; nomen sexus accipiunt. Quo et modo plantas quasdam vtroq; sexu
 constare est intelligendum: vt optime hoc loco Arist. aduertit, aut potestate, vt
 lib. 1. de Plantis. Sed ex animalibus huius sortis esse credidit Arist. lib. 4. de Hist.
 anim. c. 11. anguillam, & piscium plures, quos ipse loco citato aperte refert. Ul-
 timum autem genus vtroq; sexu gaudere asseuerat li. 1. de Gen. anim. c. 1. Ex an-
 guium verò, inquit, quædam marem, & fœminam habent, ut sobolem eiusdem
 generis procreent: præterquam q̃ hermaphroditos non paucos fuisse repertos,
 constanti doctissimorū viutorum consensu reperimus. Quibus omnibus procul
 dubio constat, quanti vsus naturæ fuerit, in maiori omnium rerum parte, marē
 & fœminā distinxisse. Fœmineum sexum viris societate stare coniunctū, nō vnio-
 ne, abundè cenſeo superius esse probatum. Nunc verò super est probare, cōmi-
 ſceri adinuicē necessarium esse. Quod sanè eleganti quadam rōne probat Bea-
 tus Thom. p. 1. q. 92. art. 1. quo loco inquit. Necessarium fuit fœminam fieri, idq;
 in adiutorium viri: nam fœmina ad generationem adiuvat. Quod vñ probare cō-
 tra afferentes, fœminam fuisse necessariam ad alia opera simul cū uiro perficien-
 da. Verùm fœminā solum operi generationis fuisse deditam viro, ex eo probat,
 quia vir solus non sufficiebat ad generationis opus perficiendum: & consequē-
 ter cū sit generationi aptus, eget adiutorio. Talis quidem erat fœmina, ergo ne-
 cessaria. Ex quibus, generationis operi necessariam fuisse fœminam, probat. Nā
 quæ natura constant animalia, ex semine genitali, & sanguine menstruo cōsta-
 re, est necessum: hæc autem à mare fœminaq; suppeditari oportebat, in quibus
 hæc principia erāt necessaria, quemadmodū in animalibus, ac præsertim in ho-
 minibus; in quibus ex alterutro solum omnis ad generationem apta potentia
 emanare, erat impossibile. Quamobrē necessū fuit, nō solū potētia differre, sed
 & partibus corporis, quibus procul dubio mas, & fœmina dissidēt: alias quippe
 partes mas forma, & situ discretas, ad generandū, aliàs fœmina obtinet. Ob id p-
 fectō cū, & facultate, & munere quodā atq; officio mas, & fœmina dissideant,
 & ad

- A & ad oēm quidē officij functionem, & materia, & effectū principio, & ministerio opus sit: hac sanē ratione necesse est, in procreationis munere inter n, ac feminam conuenire, ut alter materiam, instrumenta, & efficaciam simul ad generationis munus idonea, alter affectuum principium subministraret. Ideoq; ad procreationem partes aliquas esse idoneas, easq; inter se diuersas, quibus mas a femina differat, opus est. Nam licet (ut rectē Arist. aduertit lib. 1. de Gener. an. cap. 2.) de toto animali mas, & femina dicatur: non tamen quauis sui parte potentiaque idem mas, aut femina est, sed certa quadam virtute, ac parte. Ob idq; separata atq; discreta cū generandi munus explere nequeant: coniungi ea oportet. Muis itaque, ac feminae coniunctione ad procreationem necessariū est opus. Quapropter constat (ut Arist. refert lib. 1. de Histor. anim. cap. 18.) optimē dixisse Empedoclem, nimirum, maris ac feminae quasi symbolum esse, totum verō à neutro perfici, nec ex utroque eadē secedere: ob id alterū alterius coitum, ac copulam desiderare, quod materiam femina, mas principium motus præbeat. Sed coniugij huius efficacissimam omnium rationem affert Arist. lib. 2. de Gener. anim. cap. 4. nimirum, quod animal sensu à planta differat, neq; fieri posse, ut uel facies uel manus, uel alia quæpiam pars sit, nisi anima sensualis, insit, aut actu, aut potentia, & aut aliquatenus, aut simpliciter: & subdit. Erit. n. ut mortuus, aut pars mortui, cūque mas semen genitale proiciat potentia animatum, ut Gal. affirmat lib. de semine, sensualisq; animæ pars sit efficiens (ut ex Arist. verbis constare arbitror) fieri sanē non potest, ut ex se ipsa femina animal generet, sed uirum, cū quo congregiatur, desideret: cuius sanē societatem auidē concupiscat. Atqui cū adhaesu, coituque generatio procedat (quod sine maris & feminae coniunctione perfici nullo pacto potest) necesse proculdubio est, ab utroq; materiam quandam emitti, in qua illorum vis, & potestas contenta tertium quidpiam generet. Attulimus quidem causas omnes, cur ad procreandum mare, & femina sit opus, neque alterum sine altero generandi munus explere possit: quod mas, & si gignendi habeat efficaciam, locum tamen, in quo conceptus formari effingique possit, minimē habet: femina verō & si idonea ad conceptum continendum, & formandum loca habeat, principio tamen destituitur. quo fit, ut neuter sine altero perfectum edere fœtum possit. Quibus iam euidenter constat, necessariam fuisse sexus in omnibus rebus, ac præsertim in animalibus, & potiori adhuc ratione in hominibus, distinctionem ob adductas à me rationes, & plures alias, quas breuitatis studio prætermitto.

De affectionibus utriq; sexui communibus & cuiq; proprijs. Cap. II.

IN omni quidem generatione cū generans sibi simile generare ex intentione nitatur: sit multis rationibus natos parentibus esse similes. id enim est, quod generans intendit. Quod profectō illis accidere constat vno ex tribus modis: in forma nimirum, aut in specie, aut in sexu. Atqui licet generans id omne proculdubio nitatur: non tamen semper consequitur, quia plerumque in aliquo, aut pluribus ex necessarijs vel deficit, uel nequit, quod intendit. Quæ si exactē perpenderit, constabit euidenter quid in sani-

tate, ac morbis cōe habeat femina cum viro, quid verò vnusquisque propriū A
 ac peculiare, siue in ijs, q̄ s̄m naturam sūt, siue in ijs, quæ præter naturam acci-
 dunt, obtineat. Sic specie simile genitum efficitur, vt ex Arist. constat, & ex Ga-
 le. li. 2. de semine, ex matre, seu ex materia: nam quod producit, leonem esse,
 equum, aut hoīem ex materia fieri fatentur, seu ex matre. Quod intelligendum
 esse cenſeo (vt inferiūs latiūs monstrabo, quemadmodum refert Bea. Tho. Sum-
 ma contra gentes cap. 95. inquit enim; Ratio igitur determinatæ speciei cōsistit
 in hoc, q̄ natura cōis in determinato gradu entis collocatur. Et quia in rebus
 ex materia, & forma compositis, forma est quasi terminus, id autem, quod ter-
 minatur per eam est materia vel materiale: oportet quod ratio generis sumatur
 ex materiali; differentia verò specifica, ex formali: & ideo ex differentia, & ge-
 nere fit unum, sicut ex materia, & forma. Et sicut una, & eadem est natura, quæ
 ex materia, & forma constituit: ita differentia non addit extraneum quandā na-
 turam super genus, sed est q̄dā determinatio ipsius naturæ generis. Vnde patet
 quod accidit generi, & differentia, vt determinatio quædam, quam differentia
 importat, ex alio principio cauſetur, q̄ natura generis: ex eò q̄ natura, quam si-
 gnat diffinitio, est composita ex materia, & forma, sicut ex terminante, & termi-
 no. Qua igit̄ rōne constat genitum esse matri ratione materiæ simile in genere,
 quod Arist. & Gal. in specie, lata significatione intelligunt: siquidem species in
 forma contineri, & ab ipsa terminari dictum est. At femina eam materiam præ-
 stat, & cum quadā agente facultate, ex qua, virtute utriusque seminis fœtus for-
 mari oībus esse compertum reor. Nam cū uirtus formatrix seminis fœminei
 sit designatam materiam contracta, ab illa recipit ut producat speciem similem,
 rōdentem tñ certis diffinitisq; affectibus, & proprietatibus eius indiuidui, un-
 de decissa est. Cū enim sit uis corporea informatrix residua in parentis mem-
 bris, & sui similitudinem testibus inducat: necessario inducet similitudinē non
 solum actus, & formæ, in qua species consistat, sed & materiæ, & qualitātū cor-
 poralium, in quibus similitudo hæc intelligitur. Similitudo uerò, quæ in for-
 ma reperitur in genitis, ex utroque simul semine agente, & mouente adinuicē
 alterum, proficiscitur. Vnde fit, ut diuersa facta motione superantis naturam, &
 formam sequatur in totū, aut in partem, iuxta victoriæ seminis rōnē. Qui uerò
 desiderat de similitudine copiosiora audire, legat caput de monstruoso concep-
 tu lib. huius operis 3. Tertia uerò similitudo, & quam huius cap. instituto con-
 ducere existimo, fit in sexu, cuius latē meminimus li. 3. cap. de cōceptu, paragra-
 pho de masculorū generatione: quæ proculdubio temperiem totius coniuncti
 seminis sequitur. Ob id igitur dum totum coniunctū ad calidum inclinauerit,
 masculum fieri, unanimi oīum Medicorum consensu constare arbitror, sin mi-
 nus, fœminā: qualiter autem hoc dogma sit intelligendum cap. de masculorum
 conceptu, scriptum reperies. Nam in ore est oībus philosophis fœminam esse
 masculo frigidiorem, ideoq̄ in sinistro uteri sinu, ut ex Hip. lib. 4. Apho. 48. &
 6. popu. parte 2. 44. constat genitam, sicut marem in dextro: itē, eam genitalia in-
 tus reclusa habere, marē uerò extra prominentia. Esse uerò uiros fœminis cali-
 diores multis rationibus, & locis apud Gal. & Hipp. probatū inueniēs: quippe
 referunt id ita factū esse ob fœminæ imperfectionē, quam ex frigidityte conij-
 ciunt. Nā ce: tum est calorem esse omnium actionum potissimum instrumen-
 tum,

A tum, quo feminae carentes imperfectiores actiones perficiunt. Referunt etiam huiusmodi imperfectionem ad officium: quippe nullo prorsus modo generationi apta fieret femina, nisi plurimo sanguine abundaret, qui vberem suppeditaret generationi materiam: is quidem copiosior sit, ubi tantum caloris subest, quantum plurimo sanguini gignendo sufficiat: quod sane sit, dum feminam viro frigidiorē esse contigerit: nam aliter licet plus gignant, æqualem tamen copiam dissipabunt. Atque has esse imperfectionis formarum rationes ferè omnes philosophi existimant. Quas porro, & si veras esse censeam, non ob id existimo feminam esse viro imperfectionem. Nam omnis naturalium rerum perfectio (præter formam, quæ eandem constituit speciem in utroque sexu) ex fine naturæ intento querenda proculdubio est. Atqui cum ea beati Thom. sententia superius probatum sit feminam viro esse coniunctam generationis, & propagationis speciei gratia: sequitur proculdubio, prædictas rationes feminam æquè viro esse perfectam, potius quam contrarium probare. Nam, & frigiditatem, & formationis membrorum diuersitatem, generationis melioris gratia tributam inficiabitur quidem nemo (præsertim habitu respectu ad finem) & ob id æquè perfectas esse iudicandas. Itaque si nec forma, nec materia, neque perfectione finis differre, omnibus sit in confesso: constabit igitur, neque perfectione. Nam qua ratione virum si natura frigidiorē effecisset, aut genitalia introuersa, eum monstruosum, & imperfectum existimarem: eadem proculdubio, & feminam, si calidior esset, aut alia figura efformata genitalia haberet. Itaque si viro accedit perfectio ex calore: femina quidem, ex frigore: atque si illi quoque oportebat genitalia inesse prominentia, femina quidem, intus recondita. Quibus sanè rationibus moueor, ut credam, habitu respectu ad finem feminam esse æquè perfectam viro. Secus autem se res habet in alijs actionibus, in quibus mihi non est dubium, virum esse aptiorem, & perfectiorem femina. Quod si rursus aliquis arguat feminæ imperfectionem, eò quod ex communi omnium philosophorum consensu constet, feminam fieri præter institutum generantis, esseque aliquid deficiens, & occasionatum: huic quidem dicemus verum esse, fieri præter intentionem agentis particularis, at fieri iuxta intentionem uniuersalis naturæ ad opus generationis ordinatam, & ob id nullam hac ratione subire imperfectionem. Præterea licet virtus, quæ est in semine prima intentione feratur ad generationem masculinam: tamen si illud, aut ex defectu materiæ, aut ex quauis alia causa euenire non possit, fertur secundariò ad feminæ generationem, tanquam ad id, quod primo intentioni est propinquum. Ob idque constat feminam generationi perficiendæ temperamento, & instrumentis esse æquè perfectam. Ex ante dictis constare videtur mares, & feminas conuenire forma, materia & temperamento, utriqueque sexui communibus: quamobrem nec solum erat, utriusque quosdam accidere morbos, qui sanè ex specie, ex materia, & ex temperamento illo, quo conueniunt, euidenter communes proficiuntur. Nam ex animali, potentia communes vir, & femina sortiuntur affectu, tam in potentijs interioribus quam in exterioribus: in illis quidem deliramenta, amentia, stultitia, & memoria varios defectus perpetiuntur: in his verò, & paralyses, & apoplexias, & stupores, & conuulsiones, in quouis sensuum alia penè innumera accidentia, quæ utrique sexui esse communia inficiabitur profecto nemo. Vitiis verò materiæ utriqueque esse communia ex ipsa rei natura, & ijs, quæ accidunt euidenter constans licet

morbi non sint materiae vitia, sed materiae formae, cum hoc tamen vitia, q̄ parti
 bus suboriuntur ex similium crassitie, tenuitate, raritate, & densitate substan-
 tia, necnon ex abundantia, aut defectu, vel nimia ipsarum partium mole, aut di-
 minuta, vtriq; sexui esse communia norunt profecto omnes. Simili quoq; ra-
 tione cum ex huiusmodi simplici materia instrumenta vtriq; sexui communia
 natura efformauerit: in eisdem communia vitia subesse necessum quoq; erat. Sic
 actiones in vtroq; laeduntur ex uitata conformatione, magnitudine, numero,
 coniunctione, & similium partium vnione. Cōsimiles etiam vterq; sexus pa-
 titur affectus ex communi viuentium temperamento: nam licet fēminā à viro
 quodam modo differre temperie dictum sit, cum hoc tamen communi quodā
 temperamento conuenire philosophis omnibus compertum est, eò nimirum,
 q̄ vtriq; quatenus viuentes sunt, commune est, & ob id etiam quod omnibus
 alijs conueniant. Ex quo sanè communi dono communia quoq; vitia prodire
 compertum, & necessum est. Quamobrem vterq; varios temperamentū totius,
 & partis morbos pati rationi videtur consonum. Sic febres omnis generis an-
 bobus esse communes euidenter constare arbitror, sicut alios innumeros affe-
 ctus, quos ex naturae vnitate, & reliquis in quibus conuenire dictum est, illis
 accidere comperimus. Verum cum mares sexu esse à fēminis distinctos dictū
 superius sit, eo ipso, quo differunt, nō dubito affectus ipsi accidere proprios, &
 peculiare. Sic in iumento, & pudendo varijs morbis vexari solent, quibus fēmi-
 nas carere cernimus. At qui praeter certum Priapismi modū, & alia vitia ex pecu-
 liari temperamento oborta, viro etiā peculiare subsunt effeminationes, coeun-
 di impotentia, sterilitas, & ad virorum munia ineptitudo. Praeterquā quod ad-
 huc in communibus morbis diuerso, & peculiari modo, ac fēminae ipsae, affi-
 ciuntur. Inquit. n. Hipp. lib. 6. Vulg. par. 7. loquens de fēminarū morbis. Nequa-
 quam similiter, & viri morbis corripiuntur. Pari quoq; ratione in libris ferē
 omnibus de morbis vulgaribus plures reperiuntur morborum constitutiones,
 in quibus longē diuersa accidentia viris succrescebant, ab ijs quae fēminis acci-
 disse refert Hipp. Ex quibus constare censeo, viros sua propria, & peculiaria pa-
 ti vitia, non solum in ijs omnibus, in quibus à fēminis dissidere cognoscimus,
 sed, & in cōmunibus: nam qua ratione sua cuiq; sanitas est, sua etiam uiuēdi rō,
 eadem procul dubio peculiare morbos obtinere necessum erat; quos sanè bre-
 uitati consulens praetermitto, ne videar scribendi institutum transgredi.

Refert quidem Fabius fēminas multorum morborum esse participes: quod
 quidem censeo, antea Hipp. dixisse, qui lib. de Morbis mulierū haec refert ver-
 ba, de hydropē loquens. Periculosa verò sunt velut dictum est, & plerunq; acu-
 ta, & magna, & intellectu difficilia, eò q̄ mulieres participant morbis, & aliqñ
 neq; ipsae sciunt quod aegrotant, priusquam morbos experiantur à mensibus,
 & seniores factae fuerint. Tunc autem, & necessitas, & tempus ipsas morborum
 causas docent; & qñq; non cognoscentibus ex quo morbo aegrotent, morbi in-
 curabiles sunt, antequam doceatur rectē medicus ab aegrotante ex quo morbo
 aegrotet. Verentur. n. narrare, etiam si sciant, & praeter imperitia, & ignorantia tur-
 pe sibi id esse putant. Sed, & medici simul peccant non exactē causam morbi per-
 contantes, sed velut viriles morbos sanantes. Et multas noui iam ab huiusmodi
 affectionibus correptas: quare statim causam exactē interrogare oportet, multū
 enim

A enim differt muliebrum morborum, ac virilium curatio. Ex quo locum euidéret conflare arbitror, feminas, & varijs morbis, & diuersis à virorum affectionibus frequenter corripí, & ob id diuersam exposcere medendi rationem. Prodit quidem huius diuersitatis ratio ex diuerso sexu, quo sunt à natura cōstituta: à quo sanè omnes, peculiaris & proprij morbi cōditio principiū sortitur. Idq; tribus potissimum rationibus, quibus à viro differre censemus. Prima quidem ex ortu ac principijs generationis, cum femina ex virtutis actiue debilitate, ut Beatus Th. euidenter docet. p. 1. q. 92. art. 1. ad 1. ac similiter pp aliquam materiæ ineptitudinem, vel et pp aliq transmutationem ab extrinseco, nimirum, flantibus australibus ventis. vt q. 99. art. 2. ad 2. Quod etiam ex Arist. mente lib. de animalibus refertur: inquit. n. lib. 4. de Gen. ani. c. 6. Sunt. n. femina sua natura debiliores, frigidioreq; & sexum femineum quasi lesionem naturalem, & detrimentum esse putandum. Ob id quidem necessum erat, plerunq; ex natua sorte illis inesse peculiarem quendam apparatus, peculiaribus et morbis idoneum; q; diuerso modo à viris frequentiusq; ex innata imbecillitate corriperentur. Nā licet vtrunq; semen pariter habeat in se vim gignendi hominem, ut latius inferius. Deo fauente maximo, suū probaturus, quoniā in semine est solū forma hominis, eo modo, quo superius dictū est, cuius mas, & femina equaliter sunt participes: nō est tū in semine forma femina, potius q; maris, quoniā mas, & femina, forma non differunt, sed solo sexu: mas. n. femina calidior est, ex quo calore certum quendam perfectionis modum philosophi arguunt, & propterea mas à perfectioribus principijs debet gigni. Atqui cum, vt dictum est, perfectio hæc non possit sumi à substantiali forma: necesse est, vt sumatur ab accidenti aliquo, nempe à primis qualitatibus, quibus illa vti ad efformanda naturæ opera. Quāobrem dū semen calidius, concoctūq; probè est, masculum fieri contingit: dum vord frigidius, & malè elaboratum, aut feminū, aut nihil efficit. Qd Arist. dixisse comperimus lib. 4. de Gen. ani. ob idq; constat ex innato principio, & habitu feminas esse non solū viris morbosiores, verum, & peculiaria sibi habere vitia, coadiuantibus duabus causis, quas mox referam, quarū rōne vitii aliquod signatim contrahunt. Secūda porro causa ex tēperamēto natuo à primis principijs cōtracto, sortē nanciscit. Cui et tēperamēto peculiare accidere morbos oportet. Nā qua rōne feminas, & sanitate frui, & peculiaria, ac feminea munia obire cōperimus huius particularis tēperamenti beneficio: eadē profecto erat opus peculiaribus quoq; affectibus, eodē tēperamēto uitiato, aut quoquo modo mutato, corripí. Tertia verd, & ultima causa profici scitur ex diuersafiguratione partiū, quibus et, & euidētius femina à viro dissident. Quod pulchra quadā snia dixerat Arist. lib. 1. de Gen. ani. c. 2. per hæc verba. Mas aut, & femina inter se differunt ratione, q; facultas utriusque diuersa est, sensu aut partibus quibusdam discrepant. Et subdit paulò inferius. Sed cum facultate, & munere quodam hæc distinguantur, ad omnē aut officij functionē instrumēto opus sit, instrumentaq; facultatibus partis corporis accommodantur: ad procreationē quoq; & coitum partes aliquas esse accommodatas necesse est, easq; inter se diuersas, quibus mas à femina dissidet. Nā, & si de toto animali mas, aut femina dicatur: tamen non quauis sui parte, potentiaq; idē mas, aut femina est, sed certa quadam virtute, seu potentia, & parte, sicut, & nūc cernendi, gradiēdiq; ob-

tinet.

tinet. Partes verò eiusmodi sunt fœminæ uteri, & vuluæ: maris, testes, & collis **A**
 in oïbus sanguine præditus. Itaque potissima causa diuersitatis sexus est, diuer-
 sa genitalium structura, & sedes. Quapp li. i. de Histor. anim. cap. i. 9. solo utero
 masculum à femina dissidere idē autor testatur. Quæ etiam genitalium diuersi-
 tate non solum sexu dissidere comperimus, verum, & animalium species inter
 se diuersitas esse, ex diuerso genitalium situ, & diuersa positura, ut apertè testa-
 tus est Arist. li. i. de Gener. animal. ca. 3. inquit enim. Testes, & uteri, aut vuluæ,
 non pari ratione in omnibus sanguine præditis animalibus sunt. Iam enim (ut
 primùm de testibus dicam) alia omnino testibus carent, ut pisces, & serpentes.
 dixerat enim lib. 5. de Histor. anim. cap. 5. Testes igitur neque pisces habent, ne-
 que ullū aliud genus, quod careat pedibus: & subdit eo loco. Et hac in parte
 meatusq; unū geminos semini genitali perscriptos obinent. Alia habent quidē
 testes, sed intus lumbis adhaerentes, quia renes continent: cuius sanè generis cre-
 duntur esse anes. Alias itē recenset ea parte genitalium posituras, quibus, & fœ-
 minam à mare, & animatorum species dissidere cognoscimus. Neq; dissimili ra- **B**
 tione uterum bipartitum esse idem autor testatur lib. 3. de Histo. anim. ca. i. me-
 lioris nimirum, & copiosioris generationis gratia. Refert quoque eodem lib. j.
 de Gener. cap. 2. diuersam uterum obtinere sedem, ut testes, in diuersis animato-
 rum speciebus: verum in oïbus intus reclusum esse & custodiæ fœtus, & melio-
 ris coctionis gratia: præterquam q̃ etiam fœminis testes intus reconditos con-
 cesserit natura, maribus uerò extra pendentes. Ex hac igitur genitalium uarieta-
 te in situ, ac figura, et fœminis succrescere varios affectus, ipsisq; peculiare mi-
 hi certè est compertum: itaque ex hac cā, & sexus dissidium, & affectuum pecu-
 liaritas proculdubio prodeunt. Caterum non id unica rōne fœminis accidit,
 sed varijs: nam uterus, & partes omnes genitales, quibus fœminæ sexu à mari-
 bus distinguuntur, varios possunt progignere affectus, quos uiri ne gustare
 quidem vsquam possunt. Ex quo fonte, & distemperantiæ omni gena uarieta-
 te, & uitio et eorum munerum, quæ harum partium temperamento natura exe-
 quitur: item ex excrementis, aut humoribus, quæ ex naturæ errato in his parti-
 bus supersunt, tot solēt oriri uitiorū genera, ut uix usquam aliquis uel maxima **C**
 diligentia numerare ea possit. Idq; dum fœminarum uterum, & verenda uelut
 partes simplices consideramus, tribus potissimum occasionibus morbos illis
 succrescere contingit: una quidē, ex distemperie, qua frequēter frigidiores, &
 calidiores, humidiores, aut sicciores extra manifestā cām, aut internā, q̃ homi-
 nibus sit cōis, sed noua quadam, & mirabili ratione cōspicimus; ac rursus dum
 sic affectæ sunt, à cōibus auxilijs, & hijs, quæ alijs huius sortis distemperamen-
 tis prodesse solent, plurimum offenduntur. Altera uerò (præter frigus, aut calo-
 rem, quem oēs ferē, aut præcipuas corporis partes ex prædicta causa perferunt)
 ex uitio actionum naturalium, quæ fœmineis partibus insunt proficiscitur. Quæ
 quidem causa dum uterus perperam naturalia munia exequitur, mille mor-
 borum sortibus vniuersum fœminarum corpus premit: quas specialiùs inferius
 monstrabo. Hinc enim prodeunt muliebres fluxus, hinc uteri hydropes, hinc
 obstructions, ac totius corporis alienus à naturali color, aut insolita impotētia
 & frequenter ex hoc naturalium potentiarū uitio prodit fœminas ineptas fieri
 munijs fœminarū exequendis, ut mox docebo. Vltima quidem causa, qua, &
 peculia-

A peculiare, & p̄ uarietate incognitos affectus feminas frequēter pati conspici-
mus, ea sanē est, q̄ ex defectu, aut copia excrementorum, aut humorum à vitio
facultatum naturalium factorum, principium sortitur: nam ut hæc uaria esse
possunt in propria natura iuxta distemperiei uarietatem, in uarios nata sunt
efficere affectus, etiam si excrementa, aut humores, qui supersunt nullo uitio
afficiantur. Verū cū eò miseria femina deuenit, ut aliquid horum corrup-
tionem aliquam, aut uitium aliud subeat (cū hoc habeat proprium id, quod
præter naturam est, ut tam sit uarium, & dissimile, ut incomprehensibile penē
sit) tot prodeunt morborum monstra, ut nullus cognoscere, aut distinguere a-
damus possit, ut cap. de hysteris affectibus sum probaturus. Secunda mor-
borum series, quos peculiarius feminas pati cognoscimus, ex eo sanē prodit,
quod uterus (præter actiones naturales, quas ut simplex pars perficit) pars sit
corporis instrumentalis, & organica, multis sanē in generationis opere officijs
dicata. Ob id quidem ex uberrimo hoc fonte, & in situ, quem mille modis mu-
tar, & in omnis figuræ conditionibus, ac partibus omnigena vitiorum sorte fe-
minas corripī comperimus. **B** A quibus porro uitijs quæ symptomata prodeant,
quantumque à uirorum symptomatis dissidentia credere haud facile possis. Itē
ex uteri structura prodit menstruationis, & conceptus officio assilere: ex quo
quidem ministerio in mensiua purgatione uaria uitiorum fors producitur,
atque etiam in sterilitate, aut conceptione, iudem in conceptus formatione, re-
tentione, partu, purgatione, lacte, aut lactis defectu. Quæ omnia, & pleraque
alia feminarum natura, & fors, ex sexus proprietate peculiariter patitur. Quæ
sanē, ut præsentaneum auxilium ex nostris laboribus suscipere possint; specia-
lius, & diligentius expendere oportet.

*De affectibus, quæ feminis omnibus sunt communes; ac de alijs, quæ cuique femi-
narum sorti peculiare existunt. Cap. III.*



C VCVSQVE porro dictum est, qua lege feminarum affectus
à uirorum affectionibus natura dissideant; ac dictum etiam est
quæ uitia feminarum nature sint propria, & peculiaris, facto
dissidio inter uirum, & feminam. Superest quidem nunc do-
cere ex eis uitijs, quæ feminis propria esse diximus, quæ sint
omnibus communia, quæ uerò quibusdam propria, & pecu-
liaria, Censeo quidem semellas, ante menstruationis tempus suos pati pecu-
liares affectus, etiam si toto eo tempore, ab exortu nimirum usque ad men-
struationem maiori ex parte communes cum uiris perferre morbos constet:
omnibus tamen ab hoc tempore commune esse ex menstruali purgatio-
ne mille affectibus corripī, siue nupta, siue innupta, aut uidua sit, dum-
modò utero non gerat, et sequē illis hoc malum commune, donec ætate fe-
niores factæ, natura ab huiusmodi necessitudine immunis, sponte hunc san-
guinis fluorem cohibeat. Quo etiam tempore multigena humiditatis al-
bæ, aut alterius coloris uacuatione, misere uexari solent. Itaque his duo-
bus affectibus mira uarietate ludentibus feminae omnes donec plurimum con-
senescant, affici in communi assolent. Verū licet alios affectus ipsas quan-
doq;

doq; corripere conspiciamus: nihilominus tñ cū id rārū sit, censemus eos, A
 non esse ita cōes, ut possint frequenter oībus fēminarum statibus accidere. Nā
 cū menstrualis purgatio fēminis sit natura indita: sit profectō, ut vitia, q̄ in ea
 contingere possunt (q̄ plurima quidem sunt) oībus quoq; cōmunia sint. Quam
 sanē uacuationem si fēminā alicui natura denegauerit, non minus multorum
 morborum causam existere censemus, q̄ dū improspere prorumpit: qd̄ mul-
 tis profectō modis fieri contingit. Namque, aut mentes illis supprimuntur, aut
 immodicē profluunt, aut diminutē, aut cum accidentibus grauioribus solito,
 aut demū inordinatē, & uarijs alijs modis, quibus ex naturali uacuatione prae-
 ternaturalis sit & morbosa. Pari quoq; rōne cōis fēminarū sexus frequentissi-
 mē albis uteri purgamentis corripitur, cū uterus, aut prauē conficit sibi cō-
 missum atimentum, aut suscepat a toto corpore vitiosum, & crudum sanguinē,
 uel testes tenuius generant semen, & minus probē q̄ par est, continent. Itē men-
 ses decolores, aut uarij coloris prorumpunt, ita ut ex officio mēstruationis hęc
 etiā oīa vitia fēminis accidere conspiciamus. Et ob id necessum profectō est B
 conijcere, hęc mala omnibus esse communia; quippe re uera uiduis, uirgini-
 bus, & nuptis frequentissimē hęc omnia accidere constat, ita ut nulla ætas, nul-
 lusue fēminarum status immunis ab huiusmodi uitijs, quæ ex menstrua purga-
 tione cessante uel prauē fluente prodeunt, reperiatur, nisi utero gerat. Quo etiā
 statu id aliquando accidisse constat, ut suo loco latius sumus dicturi.

Virgines uerō (id exposcente sexus, & status natura) peculiāres sibi habent
 affectus, uarios, multiplicisq; naturæ, & sortis. Nā primō fēnellæ ante purgatio-
 nis tempus præsertim instante iā iā purgatione, obstructionibus, & febre alba
 corripiuntur, idq; iuxta optimam rōnē: nam cum meatus illi, per quos sanguis
 prorumpere nititur, non sint ex usu, neq; à natura satis aperti, sit faciliē ut redun-
 dante sanguine repleantur, obstruanturq;. Sic. n. dixit Hipp. lib. de Natura mu-
 lier. Iuuenulas humidiores esse, & multo sanguine refertas. Et lib. de Gen. re-
 fert, illis esse angustas uenas: Præterquam q̄ sanguis, qui menstruationi parat̄,
 crassior est, & paulatim congeritur in uenis uteri: quibus angustioribus ex na-
 tura existentibus, nil mirum si protinus obstruantur. Ex qua sanē occasione, p- C
 dit uirgines decolores fieri, & febribus quibusdam lentis frequentissimē corri-
 pi. Quod si omnino defecerint, & debitum tempus transgrediantur prædictæ
 purgationes, ætate eas exposcente, euidentiores fiunt febres, & maiores obstru-
 ctiones, quæ non solum uterum ipsum obsident, uerū, & membra ipsa nutri-
 mentalia, & uiscera ferē oīa: quorū deinceps consensu, aut principaliora mem-
 bra afficiunt, aut in maiora mala paulatim fēmella deducitur. Cæterū si men-
 struus ille sanguis, q̄ præternaturā retentus abundat, putredinosam aliquā qua-
 litatem acquisierit, euidentioribus, ac efficacioribus febribus deinceps miserē
 correptas conspiciamus. Sicut si citra putredinē uitium aliud huiusmodi sanguis con-
 trahat: capitis doloribus importunis, uentriculi extorsionibus, uentris tormini-
 bus, lassitudine, & alijs plerisque morbis corripitur, obseruatione certissimum es-
 se existimo. Præterea factis iam natu grandioribus etiā si menses prorumpāt
 (dum castē ac pudicē uiuant) ex retento semine uaria, & grauiissima symptoma-
 ta accidere frequenter conspiciamus: nam plerunque uirginibus grandiori-
 bus grauiora symptomata euenire refert Hipp. libro de Natura mulie. quippe
 cūm

A cum semen turgat, & uterus genituram exposcat: facile ex seminis vbertate, & excrementorum copia, quam uterus trahendi avidus vndiq; allicit, in omnigenam morborum varietatem decidunt, & modis affectionum exquisitissimis corripuntur. Quæ omnia proculdubio graviora ipsis superueniunt, si forte contingat semen ipsum corrumpi, aut alio quouis modo (vt latius proprio huic rei dicato cap. sumus dicturi) sedari contingat. Hinc enim tot epilepsie monstra, hinc cibi fastidium, hinc depravatarum rerum appetentiæ prodeunt, sicut dolores, & lassitudines, ac alia penè innumera mala, quæ pudicis virginibus, ac religiosis accidere quotidie videmus.

Prædictæ ferè sortis sunt feminae, quæ viduæ cum sint, & viro orbatæ, castæ, & religiosè viuunt, præsertim si antea pepererint: quibus ab eisdem causis, licet non aequè efficacibus ob meannum laxitatem ex uiri accessu, aut partu factam, eadem ferè succrescunt accidentia. Inquit enim Hippocr. lib. 1. de morbis mulierum. Fluidas autem ipsas facit purgatio illa, quæ fit à partu: quo fit, vt minus quàm virgines molestari soleant. Quas tamen maiori ex parte corripere assuescunt mœstitiæ, mœrores, melancholicæ affectiones, aut articulares affectus, & huius census alia multa, præsertim hemicranici dolores, aut uteri subuersiones, & denique hysterici appellati affectus. Nam sæpe tam graue damnum succrescit ex assueta vacatione relicta, quantum ex ea, quam natura appetit, si cohibeatur. Et ob eam causam dictum est, viduas castas, & pudicas finitimos pati affectus ijs, qui virginibus accidunt: licet, vt dictum est, non sint ita graues. Dimitto etiam hac in parte morbos, quos cum viris communes habent, proficiscentes tamen à causis nuper dictis: quorum quidem suo loco meminero.

C Reliquæ verò feminae, quæ viro vtuntur, præter dictas affectiones, quas sæpillimè gustarunt, alias quasdam habent proprias, & peculiare: nam quædam steriles existunt, alia licet concipiant, frequenter abortiunt. Item alie etiam utero gerentes, aut sanguinem singulis mensibus fundunt, aut vomitibus infestantur creberrimis, aut cibum fastidiunt, aut alium à natura alienum appetunt, & exequuntur, aut mille alijs accidentibus oppressæ conspiciuntur. Præterea dum fœtum statuto tempore in lucem edunt, alia cum grauissimis symptomatis, pleræque difficulter, quædam secundam sibi retinent. Item alijs accidit, aut immodicus uteri fluxus, aut diminutus, vel tormina, & grauissimi cruciatus. Alijs verò lac superabundat, plerisque deficit. Nonnullis autem superfœtationes contingunt, & falsæ imprægnationes: quibus omnibus, & multis alijs hoc fœminarum genus passim corripitur. Quapropter horum omnium prouidentiam ediscere conuenit, ut cuique iuxta affectus, & accidentium naturam utile, & debitum auxilium dicare possimus initio sumpto à menstrua purgatione.



DE MINARVM affectus (non solum eos, qui præter naturã sunt sed eos etiã qui naturales, & ingenti existunt) qui enarrare, & docere studuerit, hoc sibi persuasum primò habeat, rem grauissimã, & quæ paucis, ijsq; doctissimis conceditur, humeris suis imponerita vt rei difficultatem veritus, & pertimescens Hip. à dijs exordium esse censuerit, & iuxta optimam rationem consuluerit principio lib. de nat. mulier. Atqui si quis rem diligentius mente euoluat, quantò magis nos docet, qui sacrosantam Christi redemptoris nostri religionem, maximo Dei opt. max. beneficio, & misericordia profiteamur, ad Deum ipsum recurrere, & supplices in sancto Domini timore eius diuinum auxilium in quauis re implorare: præsertim cum de me magnificè nihil sentiam. Ob id igitur diuina misericordia fauere, & beatissima Virgine Maria, & omnibus Sanctis gloriosa intercessione adiuantibus, rem quamq; aggrediar, etiamsi difficillima sit.

Et feminarum equidẽ officio constat, necessum esse (si cõceptioni, & formationi fœtus, materiam sunt præstaturã) tantum in ipsis redundare sanguinis, quantum alendo fœtui sufficiat naturæ. Et ob id sagacissima rerum omnium magistra natura, temperamentum fœminis præstitit copioso sanguini gignẽdo idoneum: denegauit autem id, quod resolutioni erat aptum, præstatura eam temperiem maribus: ita vt quod ipsi plus sanguinis generare ex propria natura, & caloris vbertate nati sunt, frequenti & maiori ipsius dispendio ex vitæ studio, & innato calore psoluerent. Quocirca fœminæ copiosiore sanguine abundant, quæ nec ex caloris vi, nec ex vitæ instituto par est generationi dispendiũ. Docebat sanè naturæ ministeriũ, fœminã esse lege hac efformatã, quippe quæ futura erat generationi fœtus sedes, & seminis receptaculum, ac materiæ fœtui efformando, alendo aptum domicilium. Quamobrem rationi consonum est, si plus quàm sibi sanguinis erat cõsectura, aliquid eius superesse, & redundare, quod nisi pellat, necessum est in mille morbos precipitat. Hinc autem decretum est naturæ melioris gratia, statutis quibusdam temporibus, quod sanguinis superest, per uterum innoxie excernere: tum vt ei loco (ad quem tempore concentus præstatura est eundem sanguinem) assuescat, tum verò, vt à superfluo per commodum regionem corpus vindicare possit. Quem sanè sanguinem hac lege, & natura excretum, menstrua Medici, & Philosophi omnes nuncupare soliti sunt, principio tñ ab Hip. accepto, qui lib. 1. de mor. mul. id expressè primus omnium protulit, dicens. Sanguis menstruus exit interualli victimæ iugulata sanguini similis rubens. Cuius verbo vñus fuit etiam Arist. lib. 7. de Hist. ani. c. 1. dicens. Fœminis etiam per id tempus exurgunt vbera, quod fratrare dicitur, & quæ menſtrua vocantur, erumpunt, quod sanguis, quasi recens occisi animalis est. Quo loco etiã fœmellas adseruare iubet, & eisdem menses albos proficere refert. Neque eadem ratione credendum est, vini paris omnibus animalibus menſtrua succrescere, etiamsi id ab aliquibus insinuaturn videatur: nam ferè omnia animalia id materiæ, quod superuacuum est, aut in corporis alimentum vertunt, aut in corticem, squaminam, aut pennarũ frequentia, pillos vrinasve multas, & crassas

B

C

A las commutant. Ob idq; (vt Arist. refert lib. 6. de Histor. anim. c. 20.) mulieribus inter feminas, uberior euenit huiusmodi purgatio, equabus minor, & adhuc parciore vaccis, alijs autem ferè insensibiliter profluit; nulli quidem ut mulieri, ut idem autor refert eodem lib. 18. Scribit quoq; Gal. de menstrua purgatione, lib. de Venæ sectio. aduersus Era. hæc verba. Mulieres cunctas natura singulo mense euacuat, sanguine superfluo foras effuso. Et subdit docens quos præster usus huiusmodi superabundans sanguis. Muliebri enim genus, vt quod dormi ageret, neque vehementibus laboribus exercetur, aut sub claro Sole viueret, ac ob vtraq; hæc multitudinem humorum coarceuat, ipsam euacuationem plenitudinis tanquam remedium naturale obtinere opus habebat. Et unum istud naturæ quidē opus est, alterum uerò purgatio post partum contingens existit, licet & fætura ipsa species sit euacuationis. Nā ex sanguine uteri cōceptus nutrirī solet. Tum nerò postquā editus est fētus, generatio lactis in mammillis, vacuatio hæc quoq; est plenitudinis parua. Indiderūt enim prisce illi medici huic vacuationis generi nomen à propria substantia quidem, sed ab accidenti, nimirum, quoddam singulis mensibus eius excretionem natura molitur, ita ut sine præter naturam, siue natura supprimatur, minimè desinat menstruus sanguis dici. Ex his proculdubio arbitror haud obscurum esse qualis sit menstruorum ratio, & natura, & quale fuerit eius purgationis principium, & naturæ decretum in eadem excitanda. Verū vt exactè perpendere possimus (cognita simul quæ secundum naturam esse vacuatione) qua via, quibusve modis menstrualis fluxus præter naturam fieri possit: operæpretium duxi, primum, quo tpe profluere ex naturæ lege teneatur, secundum, qualis sit eius sanguinis substantia; tertium, tempus, & rationem congestionis, & expulsionis perihodicæ; quartum verò, & vltimum, qualis sit locus in quo aggregatur, & per quem secernitur, explicare.

Tempus igitur huic purgationi idoneum præfinire vnum certum, ac determinatum minimè potest: nam id profectò euariat feminarum natura, & educatio. Constat etenim quasdam esse inter feminas, quibus, & carnis mollities, & meatuum laxitas tanta inest, vt mirum non sit, ante duodecimum annū menses prorumpant. Item aliæ sunt hirsutæ, graciles, & paucō sanguine, & carne præditæ, vt et post decimum quartum, aut quintum annum menses protrahant, præsertim si viarum angustia adiungatur. Item casta, & pudica educatio, & à viro- rum consortio aliena remorari menses assolet, sicut lasciuia, & venereis imaginibus plena antenertere. Nam id tēpus natura huic purgationi dicauit, in quo femina viri accessum, & amant, & perferre citra damnum possunt. Ob id profectò Arist. dixisse constat lib. 7. de Hist. anim. c. 1. feminis per id tempus exurgere vbera, quod frattare dicitur, & quæ menstrua vocantur erumpere. Et subdit. Sed menses tunc plurimi fiunt, cum iam vbera ad duos digitos prominent, & vox eodem tempore puellarum mutatur in grauiorem. Et paucis interpositis subdit. Fit etiam, vt per id tempus custodiri præcipuè debeant, maximè. n. ad vsum rei venereæ incitantur, cum hæc incipiunt. Deniq; prouida natura dum feminarum corpus cognoscit conceptui esse idoneū, mox menstrua pellit, signū alioqui, quo feminas viro esse aptas cognoscimus. Qua etiam ætate prodit Hip. sanguinis è naribus profusiones matribus, puellis uerò menstruum eruptiones contingere. Cui consimilem sententiam li. 4. sermone. 4. ca. 4. Aetium retulisse

lisse constat. Qua profe dō rōne (licet vt ex Paulo constat li. 3. c. 60. plerisq; pur- A
 gatio mensū contingat circa decimumquartum annū, paucis citius circa deci-
 mumtertium, aut duodecimū, non paucis aut tardius quatuordecim annis) con-
 stat vltra id, quod frequentius euenire solet, quibusdā anno vndecimo menses
 profluere: quas ob id censeo breuioris esse vitæ. Quod si autoribus fides tribuē-
 da sit, constat ex multorū testimonio, plures fœminas vīas fuisse vtero gestare,
 dū tantum nouē, aut decē essent annorum: quibus liquet, etsi maiori ex parte
 decimoquarto, aut decimoquinto anno menses prorumpant, nullū esse illis p-
 finitum tēpus. Nā quibusdā atas maturius provenit, vt q̄ vndecim, aut duode-
 cim annorū spatio circumscribatur, alijs verò quindecim annorum curriculum
 non sufficere certum est. Quare optimē dictum esse Hip. censeo, atate ab atate
 differre, & naturā à natura: qñ quidem id tempus, quod vni est pueritia, alteri
 adolescentiam esse pater. Itaq; postq̄ abundantiorē sanguinem, q̄ p cuiusvis
 fœminæ corpore necessum est, natura procreauerit: menstrua moueri tunc inci-
 piunt. Quæ proculdubio aliqñ ex cocto perfecteq; consummato sanguine pro-
 rumpuut, nonnunq̄ verò ex crudo, & subalbido, praesertim in delicatioeibus B
 iā mellis, q̄ potius purgamenta vteri menses iamiam minantia, q̄ menstrua ap-
 pellanda esse censeo. Cuius sanè excrementi meminit et Arist. li. 1. de Gen. ani.
 c. 20. diuidens menstrua purgationē in albam, & rubram, illam quidē fœmel-
 lis, hanc verò perfectis iam fœminis propriam. Nec satis certē est nosse, quo tē-
 pore menses fœminis prorumpant, nisi nouerimus exactē qua ætatis parte de-
 sinant; nam hoc ēt maximi est momenti ad dignoscendos fœminarū affectus.
 Desinunt fœminarum plerisq; mēstrua quadragesimo, aut quadragesimoquin-
 to anno; quē si præterierint, mirum non est, si sexagesimum attigerint. Licet ra-
 ro fœminas à quadragesimo quinto vterius fœcundas esse contingat: rarò prin-
 cipium, & finis menstruationis, & emissionis seminis fœcundus esse pōt. Quod
 ob id fecisse naturā censeo, quia fœtus procreandi, & conficiendi calor in cor-
 poribus idoneus amplius reperiri non pōt. Et qua rōne ante quatuordecimū
 annum (quia caloris paucitas fœtui efformando impedimento est) fœminis mē-
 strua non præbuit natura: eadem quoq; proculdubio supprimit senioribus iā
 factis. Id quod eleganti paraphrasi docuerat Hip. li. 2. pop. par. 3. tex. 33. dicens: C
 Donec ossa solida fiunt mensium circuitus est, q̄ ante hæc fiunt, grabia sunt, la-
 boribus octimestriū germana, & primipararū. Qua snia recenset menstrua du-
 rare donec ossa durescant: hoc est in senectute, ac si ante hæc tēpora subsideāt,
 & supprimantur. (sic ego interpretor sequentia verba) laboribus octimestriū,
 & primipararū germana succrescunt accidentia. Tēpus porrò durationis mē-
 sium, seu dies, quos purgatio ipsa occupat, perdiscere quoq; vtilissimum duxi-
 mus: nam in hoc quidem plurium morborum rationem sitam esse comperio.
 Quod apertē docet Arist. lib. 7. de Histor. anim. c. 2. & 3. allērens quibusdā
 breui tempore, hoc est biduo, vel triduo profluere. Quod fœlicius existimat
 esse, quā si diuinis purgatio protrahatur: nam aliquibus sex, septemve
 dierum spatio occupare solet. Quæ verò ab his deficit purgatio, aut ean-
 dem excedit, morbosa est: nam fœminæ maiori sanguinis copia luxuriantes,
 ad quoque septemve dies protrahunt purgationem. Quæ autem sangui-
 nem crassum, copiosumque habent, & venas exiles, adhuc ad plures. Quod
 proprio

A proprio c. latius sum probaturus. Atq; hæc de temporibus purgationis dixisse sit satis. Institutum secundò fuit differere qualis sit natura, & cōditio sanguinis, quem ad menstruam purgationem in fœminis colligit singulis mensibus natura. De qua re veteres, & neoterici varia protulerunt: quorū multi existimarunt, menstruum sanguinem, omnino perniciosū, & inimicā substantiā constare. Qui in suæ opinionis cōfirmationem frequens experimentum adducunt, quo faciliè probari potest, fœminas, & tpe menstruationis ab agitatione fœdissimi sanguinis, & dum menstrua supprimuntur, grauissima pati accidentia, & varia. Quæ rationi putant esse consonum, ex vitio sanguinis illius præter naturæ instituti retenti. Quibus etiam astipulatur Plin. qui lib. 28. c. 7. mille monstra contingere ex menstrua purgatione profectur: tantum deniq; deterrimam esse menstruum substantiam docet, ut dum prorumpunt, maris concubitus perniciosum efficiant, segetes marcore perdant vermiculos, erucas, scarabæos, & alia noxia animalcula interficiant. Apes item fugari, tenellas plantas ex toto deuastari, ac flores quoq; arescere menstruantis fœminæ contactu fatetur. Item lina, cum coquuntur nigrescere, accidereq; innumera alia mala, quæ lib. 7. c. 15 idem autor refert. Mustum etiam ex fœminæ menstruantis adhæsu acescit, steriles fiunt tactu fruges, fructus arborum ocysimè decidunt, exuruntur hortorum plantæ, moriuntur inserta, hebetatur etiam speculorum fulgor, & eboris nitore, æs quoque, & ferrum rubigine protinus corripuntur. Sed quid opus est multis, quandoquidem ipsæmet fœminas, à quibus is sanguis profluit, innumeris, & grauissimis malis frequenter corripitur? Quibus veluti firmissimo argumento probari potest quantum veneni obtineat huiusmodi purgatio. Quod etiā probatum reperies ex Columella lib. 11. Rei rusticæ c. 3. ex Solino quoq; in Polyhistore c. 4. & Aeliano lib. Historiæ animalium, c. 8. quo loco de campe vermiculo loquitur. Et autor ille Geoponicon lib. 10. c. 77. auctoritate Democriti: atq; iterum lib. 12. c. 20. auctoritate doctissimorum Medicorū. Illud tantum dixerim, quod ex legibus Zabrorum, mulier, qui menses fluxerunt, præcipiebatur sola domi manere, cremabanturq; loca, in quibus pedem suum posuerat: neq; is tantum pollutus erat, qui cum ea loquebatur, sed si ventus ex ea super mundum quempiam transisset, is quoq; polluebatur: quod etiam ex Moses Aegyptij de creto testatum reperio. Plures item sunt peritissimos Medicos, qui licet non negent, aliquando menstruam purgationem esse perniciosam, cum hoc tamen asserunt, multorum morborum remedium eidem inesse sanguini. Referunt namq; podagras, strumias, & parotidas, panos, sacros ignes, furunculos tractatu menstruantium mulierum liniri: sicut ex gestatione portiuncula vestis ita infectæ, tertianas, quartanasve febre curati: comitiales etiam morbos, ac rabientes sanare illitu. Vitiosum quoq; sensisse Arist. multò ante, constat lib. 3. de Hist. an. ca. 19. referens eum, qui statis circuitibus profunditur, genus esse quoddam sanguinis vitiatum, & quasi ægrotans: est. n. repurgatum à puriore sanguine naturæ beneficio, præsertim decrescēte aut silente Luna secretum. Ob idq; decretū est Medicis, mēstruo suppresso tot mala fœminis succrescere necessum esse. Cui sententiæ astipulatur Gal. lib. de Tumor. præter naturam verbis expressissimis. Medicorum tamen maior pars existimat, sanguinem menstruum esse quantitate solum, & copia vitiosum. Cuius sententiæ Gal. fuisse creditur. Ac si quis etiā

B Hippo.

Hipp. legat lib. 1. de Morbis mulierum reperiet, menstruum sanguinem his ver-
 bis depingere. Sanguis mēstruus exit interuallis, victima iugulata sanguini si-
 milis, rubens. Ego autem multis rationibus asserere cogor, sanguinē mēstruū
 esse ex propria natura partem sanguinis puriorem ea, quam seminarum altio-
 ni seiungit ipsa, aut saltem ei æqualem. Nam quemadmodum alterum nostræ
 generationis principium, semen nimirum, ex reliquijs vltimi, & optimi alimē-
 ti ipsa elegit, & adseruat: ita profectò oportebat, alterum, nimirum sanguinem
 menstruum, purissimum quoq; seligere. Ratio etenim euidenter id conuincit, si
 quidem fœtus in utero, & iam editi infantes certo quodam vitæ spatio eò plus
 caloris innati, & purissimi, ac humidi substantifici, & laudabilioris substantiæ
 habent, quo magis principijs generationis proximi sunt. Si igitur hoc verū est,
 vt Hipp. & Gal. ac omnium medicorum decreto euidenter constat: rationi con-
 sonū uidetur, nostræ generationis principia, pura, sincera, laudabiliora, & opti-
 ma substantiæ esse. Nequit. n. quod imperfectioris naturæ est, materiam præsta-
 re perfectiori. At generationis principia, constat esse semen, & sanguinem mē-
 struum; ergo esse naturæ perfectissimæ credibile erit. Præterea ob id decreuit
 natura provida, lac ex menstruali sanguine conficere, vt simile esset alimentum
 fœtus principijs, quibus constat. Quapropter feminis lactantibus denegauit
 menstruam purgationem, vt fœtui idoneum subesset alimētum: sed lac esse pu-
 rissimam substantiam, & ex simili factam inficiabitur nemo. Quod his verbis
 probauerat Gal. lib. de Venæ sectione aduersus Erasistr. una si quidem, & lactis
 & menstruorum substantia est, amborumq; (ut quispiam dixerit) riuorum fon-
 tes communes venæ sunt. Quod profectò euidenter constabit, si fœtum crassio-
 re alimēto alas: nam protinus marcescere, aut deterius se habere cōperies. Itaq;
 si euidenti, & quotidiana demonstratione constat, infantes puerulos præstatio-
 ris, laudabiliorisq; substantiæ, & caloris, quam matris substantia sit, oriri: cur ē
 credibile non erit, alimentum intra utrū sumpsisse ex purioris sanguinis par-
 te? Sed eadem est substantia, & natura illius alimenti, ac mēstrui sanguinis; er-
 go perfectissimam esse, rationi consonum videtur. Nec valet in contrarium ad-
 ducta ratio de malis, quæ ex menstrua purgatione feminis ipsis, & plerisq; alijs
 rebus accidere videntur. Nam si quis rem diligentius, & penitus consideret, ob
 id profectò maiore in sanguine menstruo perfectionē arguet. Rō huius rei est,
 quia prædicta accidentia ex menstrui sanguinis natura succrescere credendū
 nō est, sed ex cōcepta putredine: quia quod res aliqua purioris, & pfectioris est
 naturæ, & substantiæ, eò, dū putrescit, & corrūpitur, grauiore cōcipit putredinē,
 & maius vitium. Quod in semine corrupto in eisdē feminis haud rarò solet acci-
 dere. Præterq; id euidenter constat in corporibus hominū, & aliorū animan-
 tiū, dū corrūpuntur: nā quod perfectior est hoīs natura, eò grauius putrescit, &
 fœtore, ac vitio ingenti conspurcatur. Quod et latius probabo c. de Hystericis
 affectibus. Itaq; vitiosum esse sanguinē mēstruū, & veluti veneni naturā sape-
 re, aliunde prouenire non pōt, q̃ ex præstantia, & puritate sanguinis; quē, cū pri-
 mū à natura separatur, corrumpi necesse est. Nam cū subitò, & affatim neq; sepa-
 rari à reliquo sanguine, neq; excerni possit: sed paulatim, & sensim in uteri ve-
 nis ad statutum à natura terminū congregetur: fit facilè, vt ibidē per integrum
 mēstris spatiū citra corruptionē esse non possit. Tenuissimam nāq; & syncerissi-
 mam

A mam substantiā facillimē alterari erat opus, ita ut qđ in dies aggregatur, in dies quoq; uitii contrahatur: ac dū menstruationis tpe prorumpit, uitiosum quoque fiat, & accidentia, quae retulimus, mille modis pariat. Nec ob id profectō credē dū est hmoi sanguinē semp, & in oībus uitari, sed in ijs tm, in quibus diu immoratur, & improbē expurgari contingit. Plus. n. afficitur dum una die vltra mēse regulari, & adseruari aliquo mō coniectandum est. Sic profectō neque oēs feminae, ēt si menstruantes sint, segetes urunt, neque uermiculos interficiunt, aut speculum frangunt uel maculant: sed haec mala ex solū feminae faciunt; quibus, aut improspere procedunt mēses, aut deterrimum inest temperamētū, uel morbus aliquis, in quibus sanē uenenum fieri, & sibi, & alijs mirum non est. In reliquis uerō purus, & integer sanguis in uteri uasis adseruatur ad praegnationis tēpus, si forte acciderit praegnautes fieri. Qua proculdubio rōne constat feminas maiori ex parte concipere mox purgatione pergressas: nā sanguis, qui ante purgationē in utero colligit, praeter quā quod genuit, uitiat, inepuissimus qui dē est, ut alimentū possit fētui praestare, aut fetum reddat imbecillum, & morbis obnoxium. Quocirca mox à purgatione ex sanguine denuō collecto, anteq̃ uitium contrahit, feminas concipere aut plurimum contingit. Nec ex eo putandū est alterius esse naturae sanguinē menstruum, & alterius eum, quo fētus alitur, ut Fernelius arbitratus est: nā utrumq; eiusdem esse sortis, facillē probari potest. Primō, quia per easdem fere uias natura in uterum transmittit sanguinem menstruum, per quas fētui alimentū subministrat. Quo fit ut credendum non sit: aliū sanguinē transmittere ad purgationem, & alium ad alitionē. Praeterq̃ qđ huic uisui excogitauit natura, in feminis maiorem fabrefacere sanguinis copiam, nimirum, ut superesset fētui conueniens alimentum, quem sanguinem dum usui necessarius non est, singulis mensibus natura expellit. Ex quo rationi uidetur consonum eiusdem esse conditionis, licet uitio ob moram contracto dissideant. Secundō, quia nō est ueritati consonum, quod natura unius finis gratia preparat, esse diuersae naturae, & rōnis. Si igitur, & menstrualem sanguinem, conceptui, (si forte acciderit) parat; & eum, qui ad fētus alimoniam in utero iam colligit, unius finis gratia in eum locum mittit: credibile esse uidetur non differre conditione, & natura. Tertiō id etiā confirmatur, quia lac, & sanguinem menstruum eiusdem esse sortis, & naturae scimus, & correspondentiā adinuicē habere; ergo utrumque esse alimenti materiam erit uerum, atq; ex consequenti eiusdem rōnis, & naturae. Argumento quoque est, neque praegnautes, neque lactantes menstrua purgatione sedari; quia in utrisq; conuertitur in fētus alimentum: unde constabit eiusdē esse naturae. Sed expendant quoque alterius opinionis fautores, menstrua purgationē non posse sola quantitate peccare, sed qualitate ēt & uitio maximo: idq; ob rationes à me adductas. Censeo tamen illud uerbum, sola quantitate peccare (quod aliquod Gal. refert) non esse intelligendum, de eo sanguine, qui singulis mensibus per uterum excernitur, quippe cum nitari mille rationes, & argumenta probant, sed de ea sanguinis portione, quā natura singulis diebus ab uniuerso sanguine separat, ut paulatim in utero collecta menstrua efficiat purgationem. Qui porrō sanguis nullo uitio conspurcatus, sed sola copia exuberans in uterum à natura transmittitur, fētui alimentum

futurus, aut in ijs, quæ vtero non gerunt, sanguis menstruus. Itaq; sanguis, quæ A natura ad vterum transmittit ex propria conditione purus est, laudabilis, sola copia exuberans: verò, qui singulis mensibus per vterum excernitur, ob moram, quam ibidem contrahit, & ob tenuitatem, & puritatem substantiæ cœcissimè vitiatum qualitate, & copia alienus prodit adhuc in feminis optimè temperatis.

Tertium propositum fuit docere, quæ fuerit potissima causa periodicationis huius menstrui sanguinis in mulieribus. Menstruam purgationem ideo appellati hanc euacuationem opinor, quæ frequentius singulis mensibus fluat. Sunt et qui flores eandem purgationem vocant, quia antecedit fructum factus in vtero gestaturi, sicut flos in arboribus fructum præcedit. Multi rursus appellarunt tēpora, eo quod statis temporibus prodeant. Qualis verò fuerit ratio huius periodicationis ordinisq; non satis apertum est, propterea quod autores non constāt in vni- ca eademq; sententia, neq; certè (si verum fateri velim) lex vna, neq; vna ratio signari potest, quæ naturam cogat statuto tempore id moliri. Nam etsi quæ legē B semel statuerit natura ipsa, peruertit nunquam nisi alterata, aut mutata: cū hoc tamen, licet in feminis decretum sit naturam semper in vterum certam quandam purissimi sanguinis portionem transfundere, neq; viæ sunt æquali semper modo expeditæ, neq; rursus sanguis ipse, qui colligitur, eiusdem naturæ est, neq; in eadem copia, ut statuto tempore fluere teneatur. Quapropter etiamsi natura semper sanguinem congreget: non tamen ob viarum, & sanguinis vitium, menstrua legem semper seruare potest. Vnde constat frequentius singulis mensibus hunc sanguinem profluere; aliquñ, tertio quoq; mense, & in alijs alia seruata varietate pro indiuiduæ conditionis ratione. Ex quo, illud Arist. li. 7. de Hist. ani. c. 2. figmentum esse censeo, videlicet, ob id sexum femininum esse Luna tributum, quod ipsa crescente, huiusmodi sanguis in eis colligitur, & decre- scente imminuitur, & purgatur: nam id aliter fieri euidenter compertimus. nam si verum esset, omnibus feminis eodem ferè tempore menses prorumperent. Luna nimirum decrescere. Ego autem hac in re arbitror legem esse naturæ im- positam, ut semper sanguinem illum in vtero adseruet, donec ex onere, aut alio C irritamento ipsa ad expulsionem gliscat. Verum quoniam id, quod quotidie accrescit, neq; eiusdem est naturæ, & rationis, neq; viæ semper æqualiter expeditæ existunt: ideo mirum non est, si præter legem naturæ inditam, citra ordinē conetur ipsa illum sanguinem expellere; & aliquñ anteuertat, aut remoretur, ob ea, quæ sanguini inesse diximus vitia. Nam tenuior aliquando est, nonnunquā crassior, sæpe syncerus, sæpissimè alijs humoribus permixtus, ita ut iuxta rationem confortij aliorum humorum menstrualis sanguis tempus lego naturæ statutum euertat. Argumento quoque est, menstruam purgationem non semper æquali tempore in omnibus feminis durare: quippe inæquale est durationis tempus, prout feminæ habitus, rarior, densiorve fuerit, aut sanguis crassior, vel aquosior, ut latius paulò inferius docebo.

Quartū verò, & vltimum propositum est monstrare per quas vias sanguis in vterum dilabatur, & per quas etiam ab eo prorumpere soleat; nam multis profluere modis, viris doctis, & peritis compertum esse censeo. Dubitatum hac in re est, an sanguinis menstrui separatio, ac disiectio à reliqua ipsius sanguinis co- pia

A pia sit lux tribuenda. Cui diximus, vniuersā huius rei rōnē pendere ex natura lege, & instituto, q̄ vsum propagandæ speciei non ignorās sanguinē separat optimū, idq̄, perpetua diligentia curat, quē per venā cauiam descendente peculiari bus eiusdem tamis huic operi dicatis, in diuersas vteri partes transmittit. Nam partim ad vteri collū seu ceruicem, partim ad ipsius corpus, & capacitātē: in quorū partiū venis immoratur, donec tempus purgationi aptū instet, aut fœtui gignendo alimentum præstari possit. In quo sanē opere silētiū prætermittēre nolui, vterū nullam edere peculiarem actionē, sed vsum tantummodō suscepiōni cōmodum præstare non. n. trahit menstruum sanguinem, cū ab eō alimonia satīpere nō possit ob idq̄ natura semp̄ illuc transmittere sedula diligētia curat. Neq̄ oportebat vterū trahere, ne qd sanguinis fœminæ esset utile, & necessarium, etiā allicere: sat. n. est q̄ huiusmodi menstruum sanguinē natura ipsa ex abundantia vtero, aut fœtui largiat. Quod sanē opus trahenti potentie committi, erat periculosum: sed abundantia, & vbertati totū negotiū reseruauit, vt natura nimia copia luxurians quod superest vñ transmittat; parsimonia verō affecta, sui gratia id totum adseruet. Ex quibus euidenter cōstat, sanguinem in vtero non colligi vi facultatis tractoriæ, sed natura quod inundat transmittēte: alioq̄ neque conueniens neq̄ ad tempus expulsio fieret. Verum si quis dixerit, vterū in grauidis fœtus alendi gratia sanguinē allicere: intelligat vellim, tractionem illā non esse vteri munus, sed fœtus. Nam quicūq̄ ex orificijs, q̄ vteri acetabula dicuntur, seu venarū ora, semen vtero conceptum attigerit; statim alimētū per eadem ad se trahit. Vt apertē Gal. docet lib. de Semine cap. 4. & 7. Dilabiturque sanguis in vteri cauitatē, vt singulis mentibus expurgari possit, per varios, & diuersos canales in diuersis ipsius vteri partibus dilato. Nam ex caua uena descendente, quæ in venarum innumeras propagines dissecatur, duplices in uterum conductus inferuntur, quidā, ex ultimis eius diuisionibus, ex quibus, & vesica & rectum intestinum, & partes his vicinæ alimentū susceptant. Qui postea in ipsius vteri ceruicem seu collum, in parte nimirū eius interiori desinunt, sāguinemq̄; menstruum in virginibus ac pregnantibus fœminis profundunt: etiā si alijs quoque per easdem partes prorumpere possit: Nam cū vtrisque vteri os clausum summopere sit, aliunde menstruam purgationem prouenire rarō contingit. Quidam præterea ex altiori vena, quæ truncō proueniunt uenarum ductus, qui in vteri corpus inferri, in eius cauitatē desinūt, præstaturi fœtui alimentum, & fœminis ferd̄ oībus sanguinem mensurum. Ex ramo namque illo vena caua, quæ deorsum perreptat, vt testibus, vesicæ, vtero, & plerisque vicinarum partium alimentum impartiat, due disseminātur propagines: quarū alteram Siluius ep̄ḡ istriam appellat: quæ rursus sursum ascendit, & alteri, quæ in mammas inferitur, occurrat altera uerō propago ceruici vuluæ inferit. Quæ deductione constat consensus vteri cum mammis. Quamuis aliter, iudicio nostro, intelligenda sit huiusmodi uenarum communio, vt alibi exposuimus. Ad hac igitur posteriori propagine interdum fluit crassior sanguis, non aliter q̄ p̄ hæmorrhoides. Quæ de causa multi, eam purgationem, quæ per has venas sit, ad vteri hæmorrhoides referunt; alij verō, ad veram mensurui sanguinis purgationem; per quas virginēs, & grauidas purgari aliquando contingit: Quod in grauidis necessarium videt ob arctissimam iliam colli vteri ascriptionē, fœtus

B 3 conti-


*De maribus
si mensura
prodeant
ex uenis
uicis uen
prodeant.*
 continendi gratia, à natura instructa. Ex quo profectò naturæ artificio euiden- **A**
 ter constat non protinus abortire grauidas, quibus ex utero gestationis tēpore
 sanguis profilit: nam si ab exterioribus (quas primo loco retulimus) prodeat,
 innoxie frequenter profluit; si uerò ex interioribus, ut q̄ & foetui adherent, &
 illi alimentū præstant (cui non oēs, sed quæ in lateribus uteri sunt, ut optimè ad-
 uertit Vesalius) raro foetus statuto tēpore in lucē editur. Est itaq; uerò similis in-
 ijs, quibus sanguis fluit, & non abortiunt, sanguinem per uteri cervicis uasa ex-
 cerni, potius q̄ per acetabula dicta, hoc est, per ora uenarum, quæ in uteri cavi-
 tatem desinunt: per quæ sanè, & alimentum trahitur, & foetus in uolucra fiunt.
 Quod Gal. li. 1. de Semine, c. 6. rectè explicuit, dicens: statim in uolucra fieri, so-
 lasq; eas partes superesse perforatas, per quas sanguis, & spiritus à uenis, arterijs
 quæ maternis transmissio fieri possit: ob idq; profectò iudubitatum est abortus
 præfanguium, dum ab his uenis sanguis prorumpit. Cuius contrarium euenisse
 millies constat ijs, in quibus menses toto ferè gestationis tempore fluunt: quia
 menses ueri non erumpunt, sed à foetu in uterum trahuntur. Sanguis tamen p
 cervicis uenas innoxie, dum redundat, excernitur. Ut optimè etiam aduertit **B**
 Moses Aegyptius particula 16. 19. quod etiam sanguine fluente ex aliquibus
 interiorum (ex eis nimirum, uenis quæ in utero vacuæ, & immunes à foetus mi-
 nisterio supersunt) feminae non semper abortiant, uerissimum est: sicut in eisdē
 menses quoq; diu per eas partes profluere. Ut suo loco latius probabo. At vir-
 ginibus conueniebat non expurgari per uteri interiores uenas: periclitarentur
*simili modo
virginibus*
 enim ex concreto sanguine non penetrante hymenem membranam intra uteri
 sinus dirumpi, uel grauissima accidentia, uel mortem perpeti. Quocirca raro
 accidit non purgari uirgines per uteri cervicis uenas. Quam differētiā, eiusq;
 rationem paulò inferius latius sum probaturus.

Præterea consultò in hac parte longius disputare, ac docere menstruæ pur-
 gationis mensuram: nam uanum esse omnino existimo, incertam esse cōiectu-
 ram, quæ illi regulam, & mensuram certam assignare uelit, cum differat corpus
 à corpore, & natura à natura: sicut & inter se uitæ institutiones, tam eæ, quæ ad
 victus modum, q̄ quæ ad exercitia pertinent. Quamobrem purgationis quanti-
 tatem cuiq; proficiam ex conferentia, & tolerantia potius metiri oportet, quā **C**
 omnibus, & singulis à iquam communem, & propriam præscribere. Quamq;
 non latet me Hip. depinxisse li. 1. de morb. mul. moderati menstrui quantitatē.
 Inquit. n. Moderati uerò sunt menses prodeuntes in omni muliere, si sana sit, ut
 duarum heminarum Atticarum mensura secedant, aut paulò plures, uel pau-
 ciores, atq; hæc, aut duos, aut tres dies. Verum ut conslet meæ sententiæ ueritas
 quoad incertitudinem mensuræ, subdit paulò inferius. Longus autem tempus
 aut breuius, morbosum, & sterile est. Coniectare porrò oportet, mulieris cor-
 pus inspicendo, & interrogare collatione facta ad priora, an semper morboſa
 uiuat, aut non. Si enim plures, paucioresue dies, quam solent, prodeant; aut ipsi
 plures, aut pauciores fuerint, morboſi sunt, nisi natura ipsa morboſa, & sterilis
 fuerit. Si uerò hoc fuerit, & ad salubriorem statum transmutetur, melius est.
 Quibus uerbis constare arbitror, ad cōtitudinem quantitatis, antiquam cōſue-
 tudinem, & propriam cuiusque naturam considerandas potius esse, quam men-
 struorum copiam.

De

A

De feminis, quibus menses nunquam fluxerunt. Cap. 5.



ON pauca inter feminas sunt, quibus (etiam si iam conseruerint) menses tamen fluxere nunquam: quarum nonnullae uisae sunt concipere; aliae uero steriles omnino perinascere. Verum, modo hoc, modo illud accadat, quasdam ex eis conspiciamus, & prospera, & inculcata ualitudine frui; plurimas uero mille affectionibus premi, omnes tamen, ablatam ex toto obtinere uteri actionem, quatenus ipse dicatus est his excrementis excernendis. Expendere autem seorsum unumquodque horum membrorum, causasque ad vnguem exequi: uile, & multis usibus necessarium fore duxi. Primo igitur loco subeat in examen, qui fieri possit feminam non menstruantem non concipere. Cuius dubitationis ratio in promptu est: nam si menstruae purgationis potissima causa in fetus uisum, & gratiam a natura dirigitur, constat, dum deficit, conceptum fieri non posse, quoniam caret natura, ea sanguinis redundantia, qua praestatura est foetui alimentum. Cui dubitationi respondemus in medium adducta Aristot. sententia 7. de Histor. anim. cap. 2. quae se habet in hunc modum. Nonnullae etiam dum profluunt menses, concipiunt, postea concipere nequeunt, quibus uulua statim a purgatione comprimitur. Et postmodum inquit, Conceptus mulieribus a profluvio menstruum sua natura contingit, & quae his carent, steriles magna ex parte consistunt. Verum fieri potest, ut aliquae etiam sine eorum affluuio concipiant, uidelicet, quibus tantum humoris colligitur, quantum his, quae purgantur, restare solet post purgationem: quamquam non tanta copia est, ut foras possit effluere. Alibi etiam hoc idem asserit, dicens. Impossibile est concipere sine menstruum excremento, quod aut redundans foras profluxerit, aut intus satis sit. Ex quibus locis constat quam difficile sit credere feminam utero posse gerere menstruis carentem: licet aliquando contingat. Sed, ut clarius doctrina euadat, dicimus etiam menstruum defectum duobus modis posse considerari, uno quidem, dum femina natu grandior facta, omnino mensibus caret: quam proculdubio concipere contingit raro, etiam si tantum sanguinis eidem insit, quantum alijs, quae concipiunt, post menstruum purgationem superest: eo quod natura non solum ad feturam progignendam praerequirat sufficientem in femineo corpore sanguinis copiam, sed etiam exposcat eiusdem debitam quantitatem in uteri uasculis, requiratque ora uasorum, quae in ipsum uterum degenerant, patentia, ut ab eisdem instillet id sanguinis in uterum, quod in uolucris efformandis sufficiat, ac etiam peruia, & libera uia ad alimenti delationem. Quibus omnibus, quae proficua, & necessaria sunt foetus formationi, carere huiusmodi feminas necesse est: praeterquam, quod raro contrarium accidere constet, & Galeni principis non uidetur admodum consonum. Secundo modo feminam menstruis carere, & posse concipere existimamus, dum ante debitum menstruationis tempus viro concumbit. Quod aliquando contingere uidimus. Nam etsi semel natura menstruum sanguinem in mense excernat, saepius tamen, ac diu eundem in utero, & uenis ei proximis congregat, ita ut mirum non sit, si ante tempus menstruis dicatum, femina ex adseruato huic

B 4 vlu

vſui ſanguine concipere poſſit. Omitto breuitati cōſulens plures fēminas, quas **A**
dum nouem, decem, vndecim, duodecimve eſſent annorum, concepiſſe men-
ſtruis nōdum incipientibus, viris deſtis, & grauiſſimis compertum eſſe video.
Quod proſecto haud innoxie fuiſſe factum credendum eſt: nam ſtatutū habet
natura huic miniſterio tempus, quod quæ anteuerit, nō citra damnum faciet.
*femina quæ
do viro ma-
tura*
Quandoquidem menſtruorum profuſio, certiffimum, & euident ſignum eſt, fē-
minam eſſe viro maturam. Vt ex Gal. apertiffimē conſtat lib. de diſſectione vul-
uæ; qua parte ex intempeſtiuo viri acceſſu ſterilitatem, & varia mala ſuccreſce-
re docet: etiamſi, ut dictum eſt, aliquando huiusmodi fēminas concepiſſe viſū
ſit. Secundo diligenter expendiſſe oportet quæ ſit potiffima cauſa, propter q̃
plures fēminas innoxie viuere citra menſtruorum affluxum cōſpiciamus. Cu-
ius difficultatis gratia credendum eſt, duplicem eſſe in genere defectus men-
ſtruorum cauſam: alteram toti corpori communem, alteram uerò ſoli utero pe-
culiarem. Illa quidem ijs fēminis; quæ inculpate degunt, propria eſt; hæc autē
ijs, quæ laborioſe viuunt, peculiaris. Prima ſanē eſt naturalis totius corporis tē-
peries, & ſubſtantia, partiumq; omnium configuratio. Quæ omnia cum alicui
fēminæ inſunt æqualia, ita ut cuiq; membro pro dignitate, & natura, habito re-
ſpectu ad totum corpus, inſit ea configuratio, ſubſtantia, & temperies, quæ cum
alijs membris conueniat iuxta corporis, cuius ſunt partes, naturam, & condi-
tionem: neceſſum proſecto erit quoduis membrum trahere, conficere, & expel-
lere quod ſibi proficuum forte noſcit. Ex quo inferitur, fēminas huiusmodi ha-
bitu præditas ſuperabundante hoc ſanguine ex natua ſorte carere, præſertim ſi
ſolidæ ſint carnis, exercitio dedite, & calere abundantiores; quas viragines nū-
cupare, haud ab re fuerit. Atq; cum ex communi corporis temperie, & cuiusq;
membri propria conſtet parum, aut nihil in corpore redundare, idq; facile per-
inſenſilem halitum vi caloris digeri, & vterum et robusta cōſtare natura, ita vt
nihil ſuperflui admittat: ſit quidem facile, vt cum neq; corpus tranſmittat, neq;
vterus ſuſceptet, fēminas menſtruis carentes innoxie viuere cōſpiciamus, eſſi
quibusdam ſenectute adueniente uifum ſit, articulares affectus & paraplexias,
aliaq; accidentia eueniſſe. Quod ſi compoſitio hæc, & temperies fēminæ cui
ineſt, optima ſit, & ſana: cum hoc tñ ſexui, & ſpeciei morboſa, & præter naturam
inſtitutum exiſtit: & ob id, utcuq; menſes nō fluant, morboſum eſſe exiſtimo. **C**
Quibus accedunt hæc fēminæ, quas Aetius recēſet li. 4. c. 51. Refert. n. pingues
à natura fēminas magis eſſe reliquis exangues, minimasq; obtinere uenulas:
quod ſit, vt ſanguinis nihil ſuperſit præterquam, quod ſi quid eius abūdet, ocuſſi-
mē in pinguedinem concreſcit. Inquit. n. idem autor. Quo modo ergo purga-
buntur, quæ neque ſanguinem, neque venas amplas habent. Annumerat etiā
graciles fēminas, in quibus nihil penitus abundat ob gracilitatem, quæ ex diu-
turno affectu contracta nihil ſuperflui habet. Quod intelligendum eſt de graci-
litate, quæ ex morbo facta, connaturalis reddita eſt: nam aliter menſtrua ſolū
ad tempus ſupprimunt, non ſemper. Secunda verò cauſa, quam ſoli utero conue-
nire diximus, ob id morboſa eſt, quia etiamſi naturalis ſit, diſſidet tamen mul-
tū ob eam uterus ab alijs corporis partibus temperie, cōformatione, aut ſitu:
ita vt licet corpus ſanguine menſtruali abundet, vterus tamen ex natura impro-
bè conſtitutus ſuſcipere ipſum, aut expurgare nequeat. Accidit. n. frequenter
vterum

*quæ fēmi-
nae ubi
menſtruorum
affluxum
innoxie ui-
uant.*

A utrum ex natua constitutione ex temperie, aut figura vel situ esse efformatum, ut officio proprio uti minimè valeat: quò fit, ut redundans ille humor multarum etiarum antor existat. Neque hinc damno obstat vitia esse naturalia nam ex eò id mali etiam præstat, nimirum ut curari minimè possit. Est profectò hæc differentia inter vitia naturalia toti corpori communia, & ea, quæ alicui parti propria existunt, quòd illa salubritatem impedire minimè possunt, hæc verò nequeunt nisi in salubria existere. Exemplo est corpus proportionale infra mediocrem paruum, aut supra id magnum: nam neutrum dum proportio inter omnia membra adseruatur, erit morbosum, aut deformè, etiam si parui, aut magni sit. At verò corpus quoduis, cui aliquod membrum magnitudine, aut paruitate ab aliis nulla seruata proportionis lege, dissidet, morbosum censi iure optimo debet, licet cetera membra innoxia sincerus enim alterum, quod alterum excedit, brachium, aut oculum, actionibus efficere est necessum. Sic uterus (etiam si ex natua constitutione id vitium contrahat) dum disparti temperie ab eà, quæ pro corporis ratione illi erat proficua, afficiuntur, aut figura immoderatione uel à reliquo corpore dissidet, menstruorum morbosam retentionem, ac periculosissimam proculdubio efficit. Atque hi sunt modi, quibus disparti sorte femina mensuris carentes afficiuntur.

Est igitur morbose mensurorum priuationis causa multiplex (ut dictum est) cuius contemplationem præmittere oportet, si recta medendi ratione uti velimus. *Causa.* Prima est uteri temperies nimis calida, quæ se perassatum ibidem sanguinem, ineptum fluxui reddit: quem eadem in parte immorantem in uteri scirrhum, cancerum, aut alios tumores præter naturam degenerare haud raro conspiciunt. Deinde cum uterus plus sanguinis suscipere nequeat, fit facillè, ut per uniuersum corporis habitum inundet, ac vitiosus factus, in varios affectus degeneret iuxta corporis apparatus, & natuam conditionem: quippe in aliquibus degenerat in cutis fistulas, in alijs in grauissimos articulorum dolores, plerisque autem in uarias, & multigenas epileptice species, quibusdam uerò in grauissimos capitis dolores, aut uitium aliquod cordi, aut uentriculo infensum. Prociſciunt quidem hoc intemperamentum aliquando ex natua conditione, nonnunquam uerò ex grauissimo aliquo morbo, quem femina in pueritia perpelli fuerit. Quod quidem malum alijs ex siccitate enenit, alijs quidem ex praua uteri figura, ut inferius latius sum monstraturus.

Signa. Dignoscitur autem causa hæc ex frequentissimis, & grauissimis uteri doloribus, quales feruidus sanguis aliquo loco inclusus efficere solet, ex totius uentris ardore, ex purgamentis uteri, quæ simillima sunt colliquationi rubræ, fetide, item ex substantia aeris, & erodentis humoris: quibus frequenter uteri os, & pudenda exulcerati contingit. Quippe in his feminis non ex toto uterus clauditur, ut nihil percolari possit sed citra ordinem, & menstruam periodum huiusmodi purgamenta non quidem innoxie exeunt. Dignoscitur id etiam ex partium genitalium ardore, aut squallore, & gracilitate, ac ueluti tensione, & durtie. Quibus item partibus inest pilorum crassorum, & nigrorum maxima copia: necnon, & grauis odor ueluti carnis adustæ. Quod profectò uitium frequentissime in cancerum degenerat, & in maligna ipsius uteri ulcera.

Curandi

Curatio. Curandi verò methodus, & ratio, duplex est, altera, quæ vterum præcaueat A
ab his malis: nam cum iam dictorum aliquod præest, peculiarem requirit curandi rationem, quam reperiēs proprio c. lib. sequenti de vteri affectionibus: altera rursus quæ superabundantem sanguinem minuat, & in utero iam contentum sensim, & leniter discutiat, & attemperet, quod præmittere in hac curatione necessum esse censeo. Victus primò huiusmodi fœminis is optimus erit, qui frigidus cum sit, parcus etiam, aut saltem quantitate modicus existat: hoc quidē ut avarior facta vniuersi corporis natura, minus aut nihil in uterum transmittat: illud verò, ut & sanguis frigidior factus vstioni sit ineptior, & sensim, ac paulatim uteri temperiem mutare possit. Ob id pullorum carnibus, arietis, aut vituli uti est opus, & ex oleribus quæ frigida sunt admiscere, & eisdem scorsum uti, ac malis granatis, arancijs, & quæ consimilis fuerint naturæ. Bibant aquam radicibus scorchi onere, aut hordeo, aut saccharo decoctam. Somnus sit aut moderatus, aut moderato paulò breuior: Exercitium sit partium tantum superiorum, quale fœminis uitam agētibz sedentariam proprium est. Iræ, & animi perturbationes arceant, & frequentem deambulationem. Locus habitationis sit temperatus, aut temperato frigidior, irroratus semper frigidis asperginibus, & olfactui gratis. Verum licet in huiusmodi fœminis raro, aut nunquam menstrua mouere tentandum sit, saltem medicamentis id ualentibus, ne maior fiat, aut sanguinis ad uterum attractio, aut effluuiescentia, & vstio: erunt tamen huic vsui apta phar maca omnia, calidæ naturæ. Cum hoc tamen sanguine nullo per convenientē regionem, nimirum per tali uenas bis terve in anno menstruum euocare est necessarium, tum ut uterus nitatur successione eius, quoad euacuatur, aliquid etiam expellere: tum verò, ut si quid nimium obinet, sanguine detracto ad meliorem statum reducatur, hac. n. ratione uentilatis illis partibus minus exute, ut sanguis ibidem contentus. Quod si dissuescere naturam ab utero uoluerimus, vtilissimum fore censeo ex dextra, aut sinistra saluatela, vel ex vtraq; semel, aut vis sanguinē interposito eodem modo tpe, extrahere. Atqui cum in his corporibus rōni consonum sit, plurimum fœculenti, & adusti sanguinis redundare, idq; propè vteri partes: vtilissimum esse censeo ineuntibus vere, & autumnio hæmorrhoides excitare, sanguinemq; per eas effundere. Quod si adhuc spurcissimum, aut plurimum sanguinem per corpus inundare cognouerimus: mollioribus frictionibus (præsertim superiorum partium) & frequentioribus aquæ dulcis temperatè calidè balneis uti necessum erit: tum ut ad vterum transmittere natura dissuescat euocata ad partes cutis extimas: tum verò ut ibidē redundans sensim, & placidè per halitum digeratur: tum et ut uteri ardor mitior factus vrere sanguinem deinceps desinat, & si quid eius continet, insensibiliter pellat. Præstabit quoq; nō mediocri cōmodum apozematum frigidorum vsus, qualia sunt quæ conficiuntur ex aquis stillatitijs frigidis, aut decoctis cum syrupo rosarū, portulacæ, borraginis, & cichorij: quæ et gratiam epithymata hepatis adhibita præstare solent. At vteri maxima habenda est prouidentia, ne eius vitium in aliquod grauius degeneret: ob id curandum est humidis, reperiatis, & lenissimis, medicamentis eiusdem vias dilatare, referareq; uasorum oscula, ut liberè sanguinis aliquid exire possit, aut saltem eius calor attemperari, & in meliorem habitum, si natiū fuerit vitium, mutari. Quapropter primò vterem inunges in ima eius parte oleo viola-
ceo

Adeo septies aqua rosacea loto, & lacte muliebri admixto: idem præstabit oleum amygdalarum dulcium aqua est hordei elotum, & oleum cucurbitæ, ac rosæ.

Quod si compositis uti volueris, facile erit ex prædictis oleis unguenta, aut linimenta conficere, adiectionis axungia anatis, lacte caprilo, butyro vaccino, cum succis portulacæ, ramentis cucurbitæ viridis, aut foliorum violarum cum modica cera. Præstat item ceratum ex eisdem rebus conficere, cui formina alluescat, quod tanquam peculiare præsidium, & minus importunum probo. Ex usu quoque sunt foci ex dulci aqua mediocriter calida, aut temperata, præsertim si in ea feruerint lactucæ, portulacæ, & violarum folia, necnon & papaveris folia, & cucurbitarum ramenta, ac lenticula palustris. Eundem et usum præstant infusiones, & evaporationes, quas ex temperatiori aqua prædictis rebus decocta fieri necessum est. Quod si uelis simul attemperare, utrum & eius vasa reserare, commodum quoque erit, decoctis prædictis addere capillorum ueneris comam, aut mercurialis pugillum, uel artemisiæ modicum, præmunito tamen prædictis euacuationibus prius corpore. Confert non minus clysterium refrigerantium usus, præsertim cum formina ita dormitum: nam hæc optimè uteri intemperiem citra ullum incommodum corrigere nata sunt. Cuius census plura reperies lib. nostro de auxiliorum indicatione.

B Siccitatem, si ex diuturnis pueritiæ febribus, aut obstructionibus contraxerit uterus, ita ut collapsis, aut corrugatis meatibus sanguis profluere non possit, cognoscens haud difficulter ex præcedentibus affectionibus, ex totius corporis macie, ex partium externarum gracilitate, ex pudendis partibus gracilibus: quas in uirginibus crassas, prominentes, & carnosas esse compertum est. Item quia huiusmodi feminae ne minimum quid per uterum excernunt, imbecilles sunt, languidæ, & leuissimis laboribus defessæ. Item procedente morbo partes externæ crassiores redduntur, ueluti quodam malo habitu affectæ, utero nihil suscipiente ex partibus nequeuntibus uitiosum illum sanguinem conficere.

C Curabis hanc siccitatem, & menstruam purgationem fortasse prouocabis humectiori facto utero, sanguineque ad ipsum euocato. Illud quidem efficies non solum cibis, & potibus humectioribus, & optimi nutrimenti, sed balneis frequentibus ex dulci aqua confectis, inunctionibus ex oleo niolaceo, amygdalarum dulcium, sesamino sepius lotis, & resumptiuo unguento, & ex eo etiam quod conficitur ex prædictis oleis, ex mucilaginis psyllij, seminis citoniorum, limaciarum cum modico oleo liliorum alborum, aut cerato ex eisdem confecto. Prodest etiam clysterem ex prædictis oleis injicere, aut iuribus pingnibus, præsertim si fiat ex extremitatibus hædi, capreoli, aut ex decocto colearum. Item ex butyro, ex lacte, ex decocto altheæ, maluarum, & ex succo portulacæ cum oleo amygdalarum dulcium, aut sesamino. Sanguinem fortasse uocabis ad uterum frequentibus deambulationibus, eis tamen, quæ lassitudinem non afferant: item frictionibus moderatis supra uteri regionem factis, nam ijs auxilijs calor moderatus in eadem parte excitatur, quibus partes collapsæ dilatantur, ut alimentum, & sanguis menstruus eodem etiam colore, & frictione euocatus, facile subire uasa possit, & in uterum deinceps prolabi. Vacuationes omnino in hoc affectu fugere oportet, alienæ quippe sunt à corpore siccitate laborante.

Men-

Deprauata figura Menstruis frequentius feminae carent ob vteri deprauatā figurā: praesertim si ex natua conformatione proficiat. Vt Gal. aduerit lib. 3. de causis sympt. c. 4. Nam qua ratione monstruosam conformationem in membris exterioribus factam frequenter conspiciamus: eadem prorsus in interioribus idem accidere solet. Sic vterus deprauatam si sortiatur figuram, mirum non est, si proprijs munijs probè fungi non possit, praecipuè si, aut vasculis, aut foraminibus careat, aut perperam, ea habeat figurata, aut à debito loco auersa, aut vteunque contorta, ita vt sanguis, quem natura in uterum defert, prorumpere minimè queat. Quod non raro ex diuturna obstructione, ex casu, ex ictu, aut alio quouis accidenti euenire quoque potest. Cuius affectionis causas nosse difficile non est, si quis primò expendat priuationem praedictarum causarum: nam si nullum earum signum attulerit, rationi cōsonum videtur vitium omne in partium deprauata figura situm esse: praesertim si femina in ceteris sana appareat, optimi coloris, & boni habitus, & cum hoc accidentibus infestetur grauissimis, venteris tumore, dolore, tensione, & grauitate. Quod si figuræ vitium ex antiqua, & inueterata obstructione, ac ferè natua facta prodierit, facilius adhuc id posse dignoscere sperabis: nam viscerum obstructorum propria, & peculiaria existunt signa. Quorum meminero cap. proprio de vteri obstructione.

Curatio. Hanc autē cām, diuersam à praedictis exposcere curationem notissimum est. Nam in eadem nullis medicamentis vterum tractare oportet, neque ullam eius habere prouidentiam, eò qd sit ex ijs, quæ ex natuo vitio alioqui irreparabili, prodit. Sed omni ingenio curandum est, redundantem sanguinem aliò transferre vel imminuere, antequam, aut in vitiosum degeneret, aut in morbum aliquem prorumpat. Ob idq; tutissimum in his feminis est, ter quaterve sanguinē, singulis annis extrahere ex brachijs quidem maiori ex parte, aliquando uerò ex talo, uidelicet cum vterus ex vitiatō, aut copioso sanguine ibidem redūdante, affectum contrahit aliquē. Atque ea ratione cauendum semper est, ne in vterum irruat sanguis, eodem (ut dictum est) extracto, & retracto per brachiorum uenas. Quòd si femina (licet sanguine abundet) viribus careat, ita ut nequeat harum vacationem frequentia proferre, curandum profecto est, alijs auxilijs copiam minuere, nimirum uictus parsimonia, ac frequentioribus exercitijs, quibus parum sanguinis generetur & si modicum quid redūdat, exercitij viribus euanescat. Auertere etiam sanguinem à partibus internis ad extimas proficuum esse, ipsa rei natura docet. cui vsui molliter vniuersum corpus perficere oportet, praesertim summo manē, singulisq; diebus: nā praeter id, qd frictio mollis ad extimas partes humores allicit, discutit etiam eorum non minimā partē. Idem quoque beneficium praestare cognoscimus aquarū dulciū balnea modicè calida, aut tepērata: quibus fortasse maiore redundantiam humorum resolutionem moliri poterimus: quæ quidē auxilia in feminis, quæ viro vtiuntur, prodesse, mihi non est dubiū: praestat et non paruum vacationem viti accessus. Verū in virginibus, & castis ac pudicis viduis ea sufficere non posse experientia comperimus. Quamobrem praedictis auxilijs addere oportebit ea, quæ virtutem habeant sanguinem aliò trāsferendi, vt natura ab vtero dissuecat, & copia quodā modo minuat. Cumq; in sanguine ad vterum transmittendo semper innitatur natura ex insita sibi lege, necessum profecto erit per partes vicinas deriuationem

A uationem moliri, ne dum ad distantissimas retrahere conamur, tantum vterus suscipiat, quantum generandis alijs morbis sat sit. Quocirca in naturalibus vacuationibus suppressis, antequam in morbum aliquem degenerent, citius, & ceteris erit praesidium, per vicina deriuarentur quod ex naturae lege ibide transmittitur, per proximum regionem excernatur. Sic in huiusmodi feminis, aut haemorrhoides excitare, aut fongiculas cruribus aperire, indubitatum extitit semper auxilium, milleq; experimentis comprobatum.

Ceterum si ex inueterata obstructione, & ferè natua facta malum oritur, non erit ab re praeter auxilia, quae nuper diximus, aliqua vterò adhibere ex ijs, quae obstructionibus auferendis proficua sunt. Quod item obseruare fas est in ijs feminis, quibus instante, aut incipiente primis mēstruo, ex graui aliquo symptomate, aut animi pathemate in totum suppressum fuit. Quorum omnium latius meminero cap. de vteri obstructione.

B Verum quia raro Medicus accersitur, nisi dum à praedictis causis iam aliquod graue accidens suboritur, qualia sunt, quae frequentissime accidere solent: necessum est nosse eadem mitigare. In qua re duo potissimum animaduertat lector, primum nullam esse aliam potiore subueniendi rationem, quam ad causae principium deuenire, eidemque semper innitentiam cessante mēstruo purgationis redundantia, aut vitio, protinus mala ab his proficiscentia subdebunt. Secundum quod licet necessum sit aliquando posthabita causa ob imminens periculum, eadem accidentia mitigare, & alijs auxilijs uti, quae longè sunt à praedictis diuersa, iuxta accidentia naturam, & varietatem: cum hoc tamè ab optima scribendi ratione alienum mihi videtur, eorum haec in parte meminisse. Praesertim cum institutum sit, unicuique seorsum proprium caput dicare; ut paulò inferius reperies.

De ijs, quae clausa habent genitalia, & vterum.
Cap. 6.

ALIO quoq; vitio (etsi raro) affici feminas conspicimus: quippe nonnulla genitalia, & os etiam vteri perforata non habent, sed omnino, aut maiori ex parte clausa: qui affectus grecis phimosis dicitur, & quae huiusmodi affectum patiuntur feminae Attritae appellantur, etiam à Gal. lib. 3. de cau. symptom. cap. 4. Albucasis verò lib. 2. Methodi, barbara lingua Alratia nuncupauit. Aetius autem peculiare caput huic malo dicauit, de vtero non perforato inscriptum. Quod sanè vitium cum vniuersum ferè feminae vsum auferat, peculiarem praerequirat diligentiam, praesertim cum praeter vsus incommoditatem, quam interdicit, grauissimorum morborum soboles existat. Cuius affectus natura in deprauata membri configuratione sita est, in ea specie, quae ad occlusos meatus refertur. Fateamur quidem Graeci, & Arabes omnes quotquot huius mali meminerunt, femi-

nas

nas tribus modis posse claudi, vno quidem in pudendi alis, siue labijs: altero vero in ipso pudendi sunt: tertio denique circa vteri ipsius osculum. Sic enim inquit Auic. 2. 1. 3. tract. 1. cap. 4. Clausura est, cum per os matricis eius descendit aliquid, quod prohibet coitum ex re addita lacertosa, aut panniculosa forti, aut est illic incarnatio ab ulcere, aut creatione, aut illud quod est inter os vuluæ, aut os matricis est secundum unum, & eundem horum modorum, aut est super os matricis eius, quod prohibet impregnationem, & exitum menstruorum ex panniculo, aut incarnatione ulceris, aut quod est eis simile, aut meatus non est inuentus in creatione, ut accadat uirgini, cum incipit menstruari, ut non inueniant menstruorum meatus propter aliquam harum causarum. Ac postquam has omnes differentias adduxit, subdit præsagium, & inquit. Quare accidunt ei dolores, & ægritudo magna. Si ergo non ingenitur ei, redit sanguis, & denigratur mulier, & præfocatur, & moritur. Refert etiam paulò inferius curationem non contemnendam.

Causa.

Hoc profectò vitium, cuius parti insit, ab altera duarum causarum proficisci comperimus, aut ab exulceratione, utcumque fiat, si in eadem parte præcessit, cuius labra coaluerunt, uel callo obducto induruerunt, aut à tumore aliquo in scirrhi naturam indurato, aut carne aliqua in eadem parte superexcrecente: quibus aut partes illas coalescere, aut coniungi, & foramen, seu meatus naturalem occludi est necessum, ut ex Auicenna paulò ante retulimus. Secundo autem ex naturæ defectu, & monstruosa conformatione proficiscitur, quod aut materiæ ubertate, aut naturæ uitio in prima fœtus formatione effingitur, ad nascēte prædictis partibus carnosa, uel membranosa aliqua substantia, aut factis ex toto occlusis, & citra foraminis aliquod uestigium, aut si uestigium existat, addita tamen membranosa aliqua tunica, qua uniuersum foramen protegitur. Quæ quidē membranulā fert Sauonarola aliquā ex panniculo femur cooperiente fieri. Sed longè distinctius Paul. li. 6. c. 72. causas & rationem huius mali exequitur, dicens. Genitales mulierum partes clauduntur interim ex natura interim ex accessorio morbo quodam præcedente, aliàs in imò, aliàs in alis, sæpe etiam in medio spatij, idque aut secundum naturam, aut ex obstructione. Quod autem foramen intersepit intercluditque, vel caro, vel membrana est, sed specialius causas recenset libro tertio, cap. 73. Quo etiam in loco præsagium, & dignoscendi rationem adfert, ac lenem quandam curationem, quam ego etiam suo loco referam.

Dignoscio

Dignoscendi verò ratio, præter affectus notitiā, quæ manifesta est ex mensium perpetuò defectu, quo dissidere à mensium suppressione cognoscimus, & ex tumore & dolore partium pudendarum ad vterum mensuruis confluentibus, & ibidem detentis (quo à deficientibus mensibus distare scimus) non vnica est: nam primum docere oportet qualis naturæ sit causa, deinceps quo in loco ex ijs, quæ retulimus, existat. Causam igitur fuisse solutam unitatem (cuius extrema coaluerunt, aut callum contraxerunt) præcedens vulneris occasio haud obscure monstrat, veluti ictus, casus, vel ab aliqua re scindente, cõtundente uel percussio. Tumore præter naturam, aut carnem superexcrecentem facillè ostendit sensus partis: necessum enim est, si quid interciderit inter ea, quæ naturalia sunt, & cõtigua esse tenentur, protinus sentiri, tanquā quid extraneum, & à natura alienum partibus super-

A Superadditum. Scirrhum, & induratum tumorem cognosces etiam, ex præcedente inflammatione, ac dolore, & ex partis duritie. Verum si natuum fuerit vitium, ex priuatione prædictorum signorum perdiscere promptè poteris: nam his deficientibus rationi consentaneum videtur, ex natua sorte vitium proficisci. At non ita facile distingues qualis sit affecta particula, videlicet, qua illarum trium partium (quas superius retulimus) clausa sit. Quod in virginibus, & feminis, quæ viro orbatæ sunt, aliter quam per visum speculo immisso perdiscere minime poteris: in alijs tamen, quæ viro accedunt, affecta sedes facile dignoscitur, ex defectu nimirum alicuius actionum, quas, & pudendum, & uteri collum præstare habent. Præbent namq; hæc partes hos vsus, videlicet, viam ad conceptum, coitum, & sanguinis menstrui exitum: quare, ea femina, cui pudendi labra tunica intercluduntur, prædictis munijis destituta est. Nam cum coire non possit, neq; item concipere, neq; menstrua purgare. Verum si viro uti possit, cum hoc tamen menstruum purgationem non pellat, sed ocysimè semen à viro ejaculatum decidat, haud leue est argumentum pudendi sinum clausum esse. Quod si in ipso uteri ostiolo femina idem vitium patiatur, concipere neutiquam poterit, bene tamen menstruum suadere purgationem: quoniam, ut superius probatum est, in virginibus, & prægnantibus menses profluere per venas, quæ in uteri collum deimunt, optime possunt. Itaque non inconuenit feminam esse clausam, & viro vti, ac menstruis probè purgari, dum in uteri osculo vitium præfuerit: sed concipiendo apta minime quidem erit. Atque sunt signa, quibus clausas feminas nosse, haud difficile erit, & quibus clausiōis locum distinguere promptè poterimus.

Cum propria huic affectui curandi ratio chirurgis magis quam medicis vsu veniat, non est mihi in animo, in eadem plurimum immorari: sat erit medendi rationem in genere cuiq; causarum propriam docere. Si prius dixerò Paulum, lib. 6. c. 72. ad ascessionem reduxisse uniuersam eius curationem. Sed lib. 3. c. 73. specialius hæc scripsit. Loci muliebres circa ipsorum os clauduntur uel ex præcedente exulceratione, uel in scirrhum durata inflammatione. Curabuntur infessibus, qui emolliant ex hydraleo, & scænuæ decocto, consimilibusq; cataplasmatis, & pessulis. Porro inquit, Si malum inueterauerit, sufflantis, vaporibusq; ijs, qui ex aromatibus conficiuntur, utendum erit. Iam verò soluit hoc vitium, cum nil aliud sit, quam vuluæ ostioli astrictio, pessulus ex hyssopo, nitro, resina, & terebenthina. Sed ad medendi methodum iam accedo. Præcedens igitur vlcus, cuius ratione partes callum contraxerunt, aut coaluerunt, nouare iterum oportebit, ut separatis partibus, quæ coaluerunt, adhibita deinceps maiore diligentia, antequam partes congrua cicatrice obducantur, separatè coalescant; quod fit in strumento quodam ad uirilis membri similitudinem efformato: confecto quidem ex lineis filamentis, inspersis verò puluisculis, & medicamentis, quibus inducendæ cicatricis uis insit: qualia diximus lib. 2. de Indicatione præsidiorum. Verum si callum partes vlceris contraxerint, abscindi scalpello callosam substantiam medendi ratio postulat. Deinde, eisdem medicamentis lenem cicatricem inducere, quæ nulli partis officio impedimento sit. Quod si uteri aliqua pars ex ijs, quas retulimus, in tumorem inducuerit, mollibus medicamentis rem agere primò oportebit, quibus, & tumor mollior factus, faciliùs per insensibile halitus

ope

opere soluentium axiliorum euanescat, partiumque meatus subinde referentur, dilatenturque partes ipsæ, quantum proprijs ministerijs opus fuerit. Præmittenda tamen sunt cataplasmata, & encatismata emollientia, quæ parantur hydræleo, & fœnugræci elixatione. Cui etiam vsui deferuiunt pelli, suffitus, lotiones, & pleraque alia, quæ cap. de vteri scirrho, & inflammatione docebo. Solent etiam melicerides, & atheromata, & steatomata in ipsis partibus adnasci, & prædictas clausuras ferè efficere. Quæ omnia dum cognouerimus, facile prædicta methodo curari possunt. Fœminis verò, quibus ex prima conformatione hæc vitia insunt, nullum aliud inuenies tutius, & vtilius præsidium, quàm scalpello tunicam, quæ foraminibus antestatur, per medium scindere. Cuius operis rationem docuit optimè Arabis Albucasis: in cuius foramen immitti iussit instrumentum illud virili membro persimile, quod ibidem diu immorari permisit, donec cicatrice inducta, partes non amplius coalituras cognoueris. Docent autem paulò latius huiusmodi curationem autores non pauci: nā Theodorus Priscianus peculiari diligentia id conatur docere. Sed diligentius adhuc Moschion medicus quidam græcus. Quod etiam docuisse visus est Aetius libro quarto, Sermon. 4. ca. p. 96. quò poteris adire; si pluribus verbis opus habeas. Curandum quoque est in quauis causa, ne quid menstrui sanguinis, si forè in vterum decedit, cui via præ occlusionem non erat, vel paucillum quidem temporis ibidem maneat: nam dum concreuit, grauissima solet accidentia inferre. Et ob id maxima diligentia vterum abluere sequenti die ab vteri apertione conuenient.

De mensstruis per locum non naturalem erumpentibus.

Cap. 7.



VSTISSIMAM meritò, Hippocratem appellasse naturam cenfeo, eamque eruditam esse, quamvis nondum aliquid addiderit, ratum: nam quis naturæ maiestatem, & diligentiam non mirabitur, si attento, peruigiliq; animo eius opera intueatur? Quæ profectò non solum in efformandis corporibus augendis reficiendisq; sedula diligentia innititur, sed incredibili etiam sollicitudine ea præcauet, curatque, ne quid mali, quantum in se est, ipsis accidat? Quod sanè opus, vt consequatur, quæ non tentat? bone Deus, quibus nō innititur? quæ non consequitur aduersus omnem expectationem? Eius proculdubio dignitatis, & efficacix sunt naturæ opera, vt eandem meritò artem diuinam appellauerit Plato. Atqui (vt interim alia, breuitati studens subtexcam) quantam illi menstruorum purgatio curam impenderit, admiratione dignum esse arbitror. Quam si iamiam instantem cognouerit, præcauens grauissima mala, sollicitè expellere curat. Quòd si loci naturalis oblita, aut fortasse impedimento alio præpedita, onus excrementi persentit, citra ullam moram, locum, per quem sese ab onere liberet, querit, & qualiscunque sit, sibi efficit naturalem, ei que assuescit. Ac licet ex eo fœminas steriles efficiat, præcauens maius periculum, id patienter fert. Contigisse id naturæ beneficium (ne dicam vitium) fœminis, non rarò conspiciamus: nam dum errabunda onera

A da onere pressa natura menses pelleret conatur, si aut scopo aberret, aut illi naturalis locus obstaculo quouis sit denegatus: in quibusdā per nares copiosissimo sepe sanguine effuso, menses agit, in alijs verò per eos. Nec mirū profectò id esse debet, siquidem Hip. 3. apho. 32. refert. Mulieri sanguinem vomenti mēstruis erumpentibus solutio. Ex qua sinia infero haud esse difficile naturam turgentem, & err abundant per consimiles regiones menstruum purgationē pelleret: quippe facile deferretur menstruus sanguis ad os, aut ab ore in vterū. Per cauiam. n. in stelechiā, & ex ea per venas Meserei, si multus sit, in duodenum, ac ieiunum, ex eis in pilorū, & per ventriculum vomitu rejicitur. Sed quod maiore infert admirationē, id sanē est, quod nos iam ter vidimus, videlicet, per minimum manns digitum, & per anularē sinistrae manus singulis mensibus sanguinē profundū, non copiosum, in religiosa quadā fēmina, cui natura menstrua purgationem per vterum denegauerat. Alteri quoq; ceterò accidisse scio, rubore quodā factō in altera maxillarum singulis mensibus naturam purgationem menstrua denegasse. Cognouimus et aliam, cui vnoquoq; mense sanguis licet modicus, per maiorem osculi sinistri angulum fluebat. Plures item sunt, quae per sanguinis sputum à menstrua purgatione natura immunes fecit. Ac ne videar tempus in historijs conterere, certum est huiusmodi affectionem esse symptomata in genere excretorum praeter naturam consistens, idq; quatenus ad particulam à toto genere huic vacuationi alienam, pertinet. Quamobrem id vitium reuerendum est in facultatem excernentem, cuius munus in corpore est, aliena pelleret: quam porro facultatem totius corporis intelligere oportet, non vteri, etiam si huic operi dicatus à natura fuerit. Quod profectò symptoma non raro contigisse arbitror ex eiusdem facultatis robore, & prouidentia: nā cum ob aliquod vteri vitium, aut venarum, quae in ipsum desinunt, ora caeca esse natura cognouerit, gnara huius ministerij, aliam quaerit regionem, qua inuenta, incolumem tuetur feminae sanitatem, quam alioqui ocysimè casuram cognoscit. Hanc nosse Medicus praeter omnibus tenetur distinctionē, ne fortē causam ignorans, curationem ubi opus non sit, teneret, aut eam praetermitteret, quam consequi non esset difficile. Quocirca primò nosse & diligentia distinguere oportet, an natura errans id accidens efficiat, an melioris gratia coacta id molietur: nā hoc profectò, aut impedire, aut pervertere, aut vitare nefas est: illud verò sensim, & leniter permutare vtile & necessarium.

C Dignosces aut, hoc an illud sit ex feminae habitu, ex cōferentia, ex symptomatis, q̄ natura in utroq; casu mouet: nam dum id melioris vsus gratia molietur accidentia, q̄ maximè inferant molestiam, mouet, & boni habitus praestest femina: quinimò vacuatione pmissa, si quid mali antea perpessa fuerat, libera euadit, tandem optima fruitur sanitate. Ad quod et non leuem coniecturā praestat vterum singulis mensibus quodammodo turbari, signum profectò euidēs, quo monstratur naturam vterum aggredi, vt per ipsum, menstruum excernat: quem cum impedimento aliquo ineptum perferit, deserit, & vt valens ad consuetum locum regreditur. Quod eū Medicus cognouerit, auxiliares manus adhibere non curet. At in alijs feminis, in quibus errans natura vidiosam hanc purgationē molitur, inquirendum est quali sint habitu praeditae, qua fruuntur sanitate, quibus praemantur accidentibus, quoue tempore. Nam si valetudinaria femina

*minimū
manu dig
anularem
singulis me
sibus san
guinem po
stulasse &
tatur
item ex o
culi angulo*

Dignosco

C

mina

mina fuerit, si frequenter conqueratur, praesertim dum purgationis instattem pus, quo praterire leuari minimè conspicimus nulli dubium esse arbitror, erroneam esse illarum naturæ actionem. Cuius causas inquirere deinceps oportebit, & iuxta earum rationem cuiq; curationem ascribere.

Causa.

Solet sapientissimè natura hæc vitia mouere vehementissimo aliquo animi pathemate, aut mentis turbatione, distracta, irritataue potentia, praesertim instantibus, aut fluentibus mensibus: quæ etiam occasione perturbata, & erronea quoque efficit munia. Nam quantum possint animæ passiones nemo ignorat: sunt enim qui inortem inferre posse fateantur: quod etiam malum ab externa aliqua occasione proficisci comperimus. Prodit item id vitium à vehementissimis partium superiorum doloribus, uel earundem grauissimis malis, quibus naturam euocari per easdem partes, dum superflui aliquid obtinet, mirum non est. Item, id malum saepe efficit partium superiorum imbecillitas uteri, & partium inferiorum robur, quo renunt superflui quicquam recipere: quapropter coguntur partes supernæ, & iecur per aliam partem id expellere. Quod si per hamorrhoides, aut per urinam naturam menstruum purget, minusve sanè vitiosum existit, ceterum conceptui obstat.

Dignotio

Primas causas dignoscere faciliè ex ijs, quæ præcesserunt, fideli à laborante accepta relatione, præcesserit ne aliqua prædictarum causarum, uelut ingens timor, aut alia mentis vehemens turbatio, uel quæuis alia externa causa, quæ ualidam in mulieris corpore turbationem efficere possit. Quod non minus causare poterit intempestiuus frigida potus, qui clausis infernis meatibus supernam regionem petere naturam cogat. Sic crurum, aut capitis lauatio instantibus mensibus, sic etiam esus, aut usus aceti. Quarum omnium nouitiam diligens medicus faciliè à fœmina accipere poterit. Quod si nihil ex his præfuerit, interrogare oportet, doluerint ne uehementer, aut diutius quondam partes superiores, aut graui aliquo malo affectæ fuerint. Quæ sanè omnia diligenter examinata præuidere oportet, & ex eis, quæ præcesserunt, uel tunc affuerint, habita certa coniectura, iuxta id, quod potissimam mali causam esse cognouerimus, medendi rationem instituire oportebit.

Cura.

Si qua in re facta diligenti prouidentia curationem aggredi oportet, in ea profectò est, in qua aduersus naturæ motum est pugnandum, etiam si motus à lege naturæ absit. Nam, & naturam cogere contrarium institutum efficere, & humorem aliud euocare, & præter naturali uacuationi disponere, magni momenti rem esse dubitabit certè nemo. Atque cum hæc sint opera, quæ necessariò Medicus exequi tenentur, ut quid utile efficere possit: necesseum proculdubio est diligenter, qd agere, aut præmittere in curatione hac opus sit, prius considerare. Quò obre huiusmodi fœminas curandas suscipere formidandum est, nisi dum grauius periculum speratur ex accidentibus, quæ quotidie crescunt, quàm ex uiolentià in naturam illata. Erit igitur primum curandi principium redundantem sanguinem demere, eundem euocando ad imas partes, factis ex talo uacuationibus, adhibitis cucurbitulis fœmoribus, & suris, & coxis etiam, quandoq; scarificatis.

In quo pfectò opere, eo tpe magis initi oportet, i quo accidèntis alicuius gratia eo

Atia eo utitur: utrunq; tamen vsus præstabit sanguinis euocatio, & extractio per hæmorrhoides. Nam dum in animo est solum ad uterum euocare sanguinem, oportebit potius supernas partes quodammodo refrigerare, ac desiccare: infimas uerò calfacere, & humectare, ac aperire. Verum quoniam illud fieri commodè nequit (nisi aut per brachiorum frigida lauacra, capitis etiam & faciei, aut per priuationem exercij earundem partium: quapropter interdiceret oportet in huiusmodi feminis tantum) tentandum quidem frequentius est frictionibus, deambulatione lauacris, balneis naturalibus, aut calidis arte paratis, inunctionibus, fomentis, infusionibus, pessarijs, clysteribus uterinis, quorum capit. de prouocatione menstruum meminero. Vnum tamen habet tanquam peculiare præsidium hoc mali genus, nimirum, frequentium balneorum naturalium usum, eorum præcipuè, quæ sulphurea sunt; in quæ femina summo manè ingreditur, ibidemque debito tempore immoretur, dummodo balnei aqua tantum uteri, & iecoris regionem pertingat; quo tempore eiusdem femine superiores partes (ne calidissimo aeris balneo etiam dilatentur) flabellare, attemperareq; commoto leuiter aere oportebit. Cetera uerò, quæ hic desiderantur, reperies cap. citato, & lib. nostro de indicat. præsidiorum capit. de prouocandis suppressis fluxionibus.

*De mensuris superfluis.**Cap. 8.*

QUANTAM Hip. in artifice ad affectuum curationem prærequirit diligentiā, nullius eorum, qui eius scripta curiosè euoluerint, ignorabit inquit. n. lib. de Morbis (docens quæ sunt perito Medico, ne in curatione aberret, expendenda. Primum quidem, à quibus omnes morbi hominibus fiunt, deinde uerò, qui morbi necessarii, ubi facti fuerint, aut longi sunt, aut breues, aut lethales, aut non lethales, aut aliquam corporis partem mutilent, aut non mutilent, & qui postquam orti sunt, dubij sint: an mala ab ipsis sint euentura, an bona; & à quibus morbis ad quales transitus fiant; & quæ per fortuitum successum Medici ægrotos curantes faciunt, & quæ bona, aut mala ægrotantes in morbis perpetiuntur, & quæ importunè, aut dicuntur, aut fiunt à Medico ad ægrotum, aut ab ægrotato ad Medicum, & quæ exacte fiunt, aut dicuntur in arte, & quæ recta in ipsa, & quæ non recta, & quod ipsius principium, & finis, aut medium, aut aliud quid eius modi demonstratū; quod rectè habet, ut in ipsa sit, aut non sit; & quæ parua, & magna, & multa, & pauca; & quæ oë in ipsa vnum est, & omnia quæ vnum; & quæ fieri possunt, intelligereq; ac dicere, & si opus sit, neq; intelligere, neq; dicere, neq; facere; & quod facilitas in ipsa sit, & quod difficultas; & quod opportunitas, & quod intempestiuitas; & quibus alijs artibus similis sit; & de corpore quod calidum sit, aut frigidum, aut siccum, aut humidum; & quod forte, aut debile, aut densum, aut rarum, & quæ multa pauca fiunt, aut in melius, aut in peius; & quod honestè, aut turpiter, aut tardè, aut citò, aut rectè, aut non rectè; & quod malum supra malum fieri necessum est. Optimum esse duxi ad verbum transcribere.

re Hipp. dictum, ut quisque intelligat, quod sit difficile curationem quamuis aggre-
di, quando hac omnia diligenter nosse, necessarium esse aperte fatetur. Quibus
si adhuc addideris sexus differentiam, clarius proculdubio cernes tam esse dif-
ficile in feminis curationem optime moliri, quam esse Medicum. Quippe ut Hipp.
fatetur lib. 6. Popul. par. 7. diuersi in feminis reperiuntur morbi, & diuersa, ob
id necessaria illis est curandi ratio. Hoc sane diximus, ne quis illotis (quod aiunt)
manibus existimet feminatum affectus curari posse: sed cautior, & diligentior
ex rei difficultate factus, facilius quae difficultia sunt, consequi possit.

Ad institutum igitur accedendo, optime Hipp. dixisse constat lib. 5. Aphor.
text. 57. Si menstrua plura sunt, accidunt morbi; & si non sunt, ex utero morbo
contingunt. Nam frequentissime conspiciamus feminas ex fluxu mensium ad
tantam peruenire immoderantiam, ut uel pereant, uel in grauissimum aliud ma-
lum prompte affectus degeneret. Quod etiam lib. 1. de Morb. mul. Hipp. hac ver-
borum serie dixerat. Si menses plures quam oportet, prodeant, & crassiores, nimirum
corpore natura fluído, & osculo uterorum prope pudendum sito, & ad haec
multo cum uiro coitu utatur, & conuiuetur semel, aliquando multi descenden-
tes, & affatim prodeuntes os uterorum impetu suo magis dilatant; & si ad haec
non incidat vasorum euacuatio, sed rursus multus accesserit calor, & os amplius
faciunt, & corpus, utpote muliere conuinante, & voluptatem consuetudinem-
que viri consecrante facili fluxu ad utrum etiam calor deferretur, & decolor e-
rit, quandiu sic habuerit. Subdit quoque idem autor multo plura, quibus com-
prehendit vniuersam ferè huius morbi rationem. Verum quia, ut Hipp. refert,
grauis est affectio haec, & quae plures alias asciscere solet (ut etiam Moysen Ae-
gyptium particula 16. text. 18. dixisse constat) ob id necessum est, eius naturam
& causas admissum expendere.

*affectus
menstrua.*

Est igitur menstruum fluor, ut Gal. docet lib. 6. Popul. parte 1. com. 7. quan-
do menses plures, aut copiosiores fuerint, quam solent. Multi uerò definiunt,
esse quando ultra consuetum tempus purgationis magna copia effluerit. Alij
autem aliter definiunt: nimirum, cum fluunt immodice, & praeter modum,
peculiaris naturae, aetatis, aut uiuendi institutum, aut praeter statas periodos,
hoc est, si bis in mense repetat. Nec credendum est, adductam Hippocr. men-
suram libr. de morb. mul. omnino veram esse, & certam. Inquit enim, Men-
struam purgationem moderatam esse, quando per biduum, aut triduum ex-
cernuntur sanguinis ferè duae heminae atticae: verum hoc verum fuisse arbitror
illis temporibus quando, & victus ratio temperata seruabatur neque ita otio,
erant debita mulieres. At nostris temporibus quum plurima in illis reperia-
tur diuersitas (siquidem aliae ad quinque vel sex usque dies purgantur, aliae ad
octo etiam, & aliae copiosissime atque aliae partius) naturarum, & consuetudi-
nis quoque diuersitatem inspicere opus erit. Sed ut rem paucis complectar, exi-
stimo cuiusque feminae naturam, aut statum quoquo tempore fuerit, conside-
randum esse, ut ab his sumpta ratione, facile metiamur quantum sit immodicum,
quantumve modicum. Nam ea verè dicitur menstruum redundantia, cum
purgatio naturalem modum excedit: at is modus existimandus est penes feminae
consuetum fluxum, aut penes sanguinis conditionem, aut iuxta id, quod in abortu
excerni solet, si femina abortierit, aut si pepererit, iuxta debitam partus naturalis
copiam.

A copiam. Quod si medicamento alicuius ora venarum aperientis occasione sanguis profluat, vires quoque medicamento extirpare oportet, & quantum ipsas fluxio superauerit, tantum ipsam esse immodicam conijciendum est. Quibus etiam adiungere oportet, quod Gal. docet lib. de diff. sympt. videlicet, si praedicta vacuatio fiat ad animalis commodum, aut incommodum. Quod si vsui proficua non fuerit, immodica & inutilis existimanda est, praesertim in praegnantibus, quibus raro, aut nunquam utilis existit.

Est quoque necessarium expendere de cuiusmodi sortis sit haec affectio, quam censeo reducenda esse ad symptomatum genus, quod in se complectitur ea, quae immodice excernuntur. Atqui licet quibusdam (vel ex Gal. mente) visum sit, hanc solam vacuationem ex sanguinolentis non esse toto genere praeter naturam, quia menstrualis purgatio ab hac lege excipitur: ego quidem existimo menstrua purgationem dum naturae modum non excedit, excipiendam esse ab istis excretionibus, quae ex sanguine factae toto genere praeter naturam dicuntur: sed quoniam naturae modum excedit, ita ut immodica fiat, mihi non est dubium, quin et toto genere praeter naturam sit, quemadmodum & ceterae omnes. Nam si loci commoditas, & naturae consuetudo, ac vsus eam vacuationem, naturalem efficiant, haec quidem non possunt immodicam sanguinis excretionem secludere, quin toto genere praeter naturam sit: quemadmodum fluxus sanguinis natum, si quidem per utramque partem id, quod vsui naturae necessarium erat, praeter cunctis humoribus, libere excernit. Vtunque tamen sit, ab eo morborum genere profici censemus, quod in mala figura, seu parvis conformatione situm est: nam ex meatuum naturalium praeter naturali amplitudine vitium id proculdubio prodit, nisi ex soluta unitate aliquando accedat. Itaque necessum est, figuram retentioni sanguinis idoneam viciatam esse in eo affectus genere, quod ampliores, quam par sit, meatus in se complectatur. Fieri autem tales meatus non uno modo contingit, sed plurimis nam aut vasa, quibus incumbit sanguinem continere rumpuntur a re solvente, & dilaceranteve continuum, aut aperiuntur per propria foramina, & extremitates, aut exeduntur ab humorum malitia, & acrimonia. Dum vero vasa aperiuntur, si magna sint Anastomosis affectio appellatur: profluit. n. in his multum sanguinis, & confertim. Verum si parua sint, appellatur Diapedesis, in qua fertur per resudationem sanguinem proflire, sicut etiam in utroque vasorum genere contingit, profliliquoque sanguis sensim & paulatim. Cum autem vasa exeduntur, Diuresis nuncupatur.

Occasionem & symptomati, & morbo plurimae praebent causas: quas a plerisque, *Causa*. autorum varie traditas reperies. Ego tamen eas omnes trimemari quadam diuisione hac in parte complectar: praeter causas externas, seu euidentes velut est ictus, casus immodicum exercitium, calor immodicus, vehemens animi perturbatio, balneorum inordinatus vsus, praesertim crurum, aut frequentes ligaturae, frictionesve, vteri quoque rhagadia, aut vlcus, vel virilis membri excedens magnitudo, laboriosus partus, aut abortus, vel ipsius vteri haemorrhoides immodice fluentes: quae omnia peculiarem requirunt medicum diligentiam, & nos paulo inferius eorum curationem docebimus. Sunt igitur in genere, internae causae numero tres; quarum prima, ad vteri & corporis vires refertur: secunda, ad humorem, seu sanguinem fluentem; tertia vero, ad vterum ipsum. Prima rursus causa subdividitur, nam sanguis profluit ex naturae, robore, & efficacia, quibus corpus a nocuis humo-

ribus immune reddit. Cuius meminit Gal. li. 6. de loc. aff. his verbis. Sed accidit
interdum feminis muliebri vocatum profluuiū, vel vtero haudquaquam affe- A
cto, cum videlicet, vniuersum corpus per ipsum expurgatur, quemadmodum
interdum per renes quoque euacuatur. Ac docet et eadem parte, qua lege curari
debeant. Contingit item fluor ab ipsius impotentia & languore, ita ut huiusmodi
sibi commissum continere non possit, vel hiantibus uteris, ut expressē docuit
Hip. li. 2. de morb. mul. his verbis. Si uteri præter naturam hiant, menses plu-
res prodeunt, & viscosi, & frequenter, & genitura intus non manet. Et paulo in-
ferius subdit. Si os uterorum hiant amplius quam in mensibus solet, menses ita fiunt
plures, & deteriores omnes, & liquidiores, & per longius tempus. Patitur autē (in-
quit) hæc maximè, si quid in ipsa corruptum computruerit, compactum fue-
rit; quædam verò et ex partu patiuntur, alia etiam aliter. Quibus sententijs eorū
stat facultatem uterorum concentricam, cui munus est uterum contrahere, & co-
primere, languidam quandoque esse, & ob id officio continendi minime posse
fungi. Secunda quoque causa alias duas sub se complectitur, siquidem humor, aut
ut quantitate peccans, tanquam graue onus deponitur à natura (cuius mali me- B
minit Hip. li. 1. de morb. mul. his verbis. Quibus corpus plenum fuerit, huius-
modi menses plures prodeunt. Scimus non raro plerique contingere iecore nimium san-
guinis progignente, sequi per uterum exonerante citra aliquod damnum fieri, etiam
si nimium fluat) aut ut qualitate ab eadem alienus rejicitur, velut tenuis, mor-
dax, calidus, acris, salis, puridus, venenosus, frigidior mixtione feri factus, &
alijs huius census vitijs conspurcatus. Sed tenuioris meminit. 6. pop. par. 1. tex.
6. dicens. Muliebria aquosis mulieribus plurimum notantur, cum aut non celeri-
ter eant, intumescunt, immorari. n. intelligere oportet, diu durare. Haud dissimi-
li ratione tertia causa in plures alias degenerat, nam uteris retentioni ineptus effici-
tur, quia rarus, mollis, laxus, patentiorve factus, vel asperitatem aliquam in se co-
tinens, quæ nequeat undique claudi, & foramina coercere. Ad quod et causam uterū
hanc in reducere oportet saltem quatenus pertinet ad eius figuram, non ad po-
tentiam, quæ in primo causarum genere sita est. Sic. n. dixit Hip. li. de natu. mul.
Si uteri præter naturam hiant, & menses plures, quam oportet, prodeunt. Quod C
etiam lib. inquit. Si leuigati fuerint uteri, & menses plures fiunt, & deteriores,
& humidiores, ac frequentiores.

Quibus præmissis expendendum est, quæ nam ratione, quævis causarum aliquæ ex
predictis morbis efficere in utero habeat, aut ipsum in corpore succrescere. Ape-
riuntur quidem meatus, laxiores facti, aut vi aperti, aut exesi, disruptave vasorum
substantia. Laxiores porro fiunt, & imbecilla redditur contentiæ facultas ex ea
distemperies, quæ cum calida, & humidi nimis sit, robur & firmitudinem uteri dei-
cit: quod et ex frigidityte, & nimia humiditate inundante fieri frequenter con-
tingit. Aperiuntur. n. uteri oscula vi & impetu facultatis expellentis, quæ turgens
præ nimio pondere irruit in parte sibi huic muneri à natura dicatam, & per co-
suetum locum in consueto more onus deponit, iuuante totius corporis firmitu-
dine, aut præstante vberissima sanguinis copia iecore: quod ita contingit esse ca-
lidum, & sanguificū, ut citra ullam legem in uteri venas sese exoneret præcauens
maiora mala. Cui et operi principium frequenter præstat sedentaria, otiosaque vita
& crapulis dedita. Exeuntur, disrumpunturve vasa remordenti, & acri, mo-
do

Ado in corpore praesit, ut est humor huius naturae in corpore genitus, modo extrinsecus occurrat, ut pessarium acre, vel quoduis medicamentum causticum, aut acre, cui insit exedendi potentia: id quod contingit ab ijs, quae disrumpendi vires habent, qualia esse creduntur, quae mox retulimus. Vitiosus item humor est si uteri uasa non admodum à propria natura dissideant, excernitur irritata facultate praeter mordicationem, & acrimoniam, aut ipse egreditur, quia tenuior factus sua sponte profluit non reluctantibus vasorum oculis per Diapedesim in minoribus vasculis, aut per Anastomosim in eisdem, & maioribus; vel exesa parte, per quam liberè possint profluere. Vterus quoque vitiosus efficitur praeter laxitatem, molliem, aut apertione ab inundante humiditate: qua quidem occasione etiam si sanguinis vitiosus non sit, sanguinem multum, & inordinate profluere haud raro contingit. Dignoscet autem, & morbum, & occasionem, si primitiuas causas primò ex relatione expendetis: quippe laboriosus partus, & abortus, ictus, calusve, aut medicamentum exedens, vel quid aliud ex ijs, quae superius retulimus signis proculdubio non egent. Pari quoque ratione vacuationem aliam ex ijs, quae ex sanguine fiunt, suppressam fuisse, femina ipsa patiens narrabit, si diligenter quaesieris. Primò tamen siue interna, siue externa causa, sit disquires quæ morbum efficiat: nam si per Diapedesim sanguis profluat, eum sensim paulatimque instillare cõperies, ac tenuiorem, & aquosiozem, qualem ad resudationem necessarium esse oportebat. In Anastomosi verò, uberior prorumpit sanguis, ita ut ex copia facile distinguere possis per maiorum vasorum oscula, aut per plura ex minoribus sanguinem profluere. Cui et adiungitur sensus quidam doloris, aut levis mordicationis. Diuersim quidem cognoscet, si ex procatartica fiat causa, ex repentino copiosoque fluxu praecedentibus causis cõtinuum soluere, dilacerare, aut rumpere ualentibus. Quod si ex humorum acrimia, exedentium, & mordacium erosione fiat: id euidenter constabit ex dolore fluxui adiuncto, qui levis profectò est, sed molestus. Costabit et ex sanie, ex uirulenta excretionem, & grauiter olente, quæ sanguini admixta profilit. Ex lento et motu in principio, ex maiore tamen praecedente exesione, & aperto foramine. Cui accedit aliquando concreta sanguinem suppressi, ac de nouo paulo post profluere. Dignoscitur quoque ex labiorum, & gingivarum scissura à vaporibus inde ascendentibus facta. Sanguinis maximam copiam, & uirtutis robur monstrant conferentia, & tolerantia, & corporis ipsius cõsistentia, & habitudo. Nam uiuidior, coloratiorque reddit femina, ac praesentit ab alijs affectionibus leuamen, neque et si multus fluat sanguis, uirum iacturam degustat: quæ etiam ostendit rubens sanguis, qui profluit. Verum si ex suppressa aliqua uacuatione profiliat, res ipsa se ipsam indicabit. At si iecoris robore, & sanguificandi efficacia profluat, pari quoque ratione cõferentia, & tolerantia monstrabunt: quippe hepaticam dysenteriam ex praedicta causa feminis saepe proficiam toto iuuentutis tempore perstantem haud raro cõspeximus. Quod si uteri imbecillitate, aut nimia apertione, laxitateue sanguis profluat, feminae ipsius habitus, ac dispositio monstrabunt facile, nam, & decolor & marcidus, fastidians, contracta, & imbecilla protinus reddet, ex quibus haud multò post, non ieiunia subsequetur mala. At si humorum vitio haec affectio contigerit, totius corporis habitum inspicere oportet: nam similis efflorescit in cute color ijs humoribus, qui in corpore uagantur. Item excrementa, & sanguinem ipsum inspicere oportet, nam & color, & calor, frigiditas cõsistentia, odor, substantia, & ea, quæ sibi admixta

*Dignoscitur
sica signa.*

C 4 sanguis

sanguis deuehit, facile cuius humoris redūdātia sublit, monstrabūt. Et cuius sen A
 seris prēdominium, eum iudicabis cām fluxui prēstare: nā si sanguinem linteo
 exceptum inspexeris, discēs in medio rubram apparere maculam, & in circui-
 tu eius humores qui redundant notos esse. Hoc tamen vnum velim animaduer-
 ti, quod si humor vt acris, & mordax irritata natura pellitur, citra dolorem, &
 molestiam circa lumbos, & vterum, aut pudendum ipsam expelli usquam po-
 terit. Si verò solum ut quid alienum, & inutile natura reiiciat, citra molestiam
 subsequetur fluxus. Præterq̃ quod à rebus leduntur adstringētibus, & si fluxio
 supprimatur venter intumescit, quasi in vtero habeat mulier, & membra fiunt
 laxa, & mollia, & fœmina velut deiecta, & mille effectiōibus plena. Reperies
 etiam legem, & rationem cognoscendi idem cuiusq̃ humoris in nostra metho-
 do, q̃ gratia dignoscendorum affectuum conscripsimus. Quod si vlcus mali cau-
 sam præstiterit, cognosces id ex pure, ex sanie, ex fœtore, ex dolore, & alijs ēt, B
 quæ vlcus ostendere nata sunt. Atq; cum medendi rationem nonnihil euariet
 sanguinis fluor per ceruicis uteri uenas, aut eiusdem membri internas: ob id no-
 scendi rationem docere quoq; decreui. Quam sanè distinctionem nosces, eo q̃
 si ex uteri penitioribus partibus prodeat, sanguis prosilit niger graueolentior,
 & grumosior; ex ceruice verò rubicundior, & fluidior, & mali quoq; odoris, li-
 cēt non quantum ex abdiūori loco.

*Præsa-
gium.*

Sperabis ab hoc affectu, nisi diligenter præcaueris, grauissima, & irreparabi-
 lia mala: nam succedunt huic fluxu morbi, & sunt tabes ab exsiccatione, hydro-
 pos ex frigidityte. Quæ mala præter Hipp. retulit etiam Gale. lib. quinto de lo-
 cis pa. & 5. Aphor. 57. quibus etiam addidit, & vīatam coctionem, & inappe-
 tentiam, syncopin, & fœdum colorem. Veretur quidem Gale. fluxuum præser-
 tim ex vtero consuetudinem adeo, vt id ex toto præcauere lib. 5. de locis affe. cō-
 sulat; quod quīvis fluxus firmatus plurium morborum causa sitinam vtraq; il-
 lius immoderantia dum perstat, grauis est, & periculosa, siue plurimum, seu pa-
 rum effundatur; consueta quippe in totum supprimi per difficile est. Itaque ex
 hac in modica vacuatione corpus frigidius, siccus, & mille accidentibus vexa-
 tum sapissimè euadit. Quod si per Solis aut Lunæ eclipsim menses profluant, ra-
 rō curationem admittunt, teste Apuleio Platónico, quia oscula uasorum occal-
 uisse iam constat. Cū hoc tamen credendum est, minūs hæc omnia accidere, C
 quam in hæmorrhoidum fluore.

*Cura-
ditatio.*

Nec temerè quemuis fluxum supprimere oportet, sed primò huic negotio le-
 gem exquires aptam lib. 1. nostro de Auxiliorum Indicatione. Sed interim eos
 fluxus ex ijs, quos retulimus compescere teneris, qui aut à procacitica oriun-
 tur causa, aut ab humorum vitio, aut vteri morbo aliquo, vel eiusdem impoten-
 tia, aut magnitudinem, dispendij uitalis spiritus minantur: ceterum non pari le-
 ge, aut diligentia. Nā qui ex abortu, aut partu supersunt, peculiare prærequirūt
 sistendi rōnem, q̃ sanè reperies proprijs. c. de Partu aut Abortu laboriosis. Qui
 verò prodeunt ictu, casu, aut medicamento, exedenti, uel calore, aut frigore im-
 moderatis, uel alia cā, q̃ rumpendi vel dilacerandi venarum ora vires obtineat,
 ocysimè supprimendus est; nulla alia facta diligentia, q̃ sanguine misso ex bra-
 chio, q̃ tum fact sit reuulsioni efficiendæ: à qua ijs, quæ astringuntur, aut aggluti-
 nant, vtere, iuxta partis disruptæ situm, & naturam; frictionibus ēt, ac ligaturis
 super-

A supernis partibus factis, victu quoq; parcissimo, ac quiete imperatis. Verum si aut ex iecoris vbertate, vel sanguinis maxima copia sanguis fluat, cauendū est, ne natura, legitimū morum præpediamus, sed parcissimo refrigeratūq; victu præmissō, totum negotium est naturæ committendum, nī timueris ex vberima vacuatione maiorem spirituum resolutionem, q̄ par est, subsequaturam. Quo quidem tpe ne immodico impetu natura ruat, sanguinem mittere, & vtrūq; immodicam copiam imminuere; necessū erit, perspectis semper viribus, ne labantur adeo, vt vacuationem deinceps perferre non possint; sic. n. omni arte sanguinem minues, & habitum dissipabis, cauens ne balneis vtaris, quamuis autores consulant, suspecti. n. in hac affectiōe mihi videntur. Quod si aut vteri laxitate impotentiaue, aut humorum aliena qualitate sanguis immodicē fluat, maturo opus est consilio, ne plus minusve comprimās, q̄ rei natura exposcere videatur. Quapropter cuiusq; harum partium scorsum meminisse oportet, ut res magis innotescat. Huius autem fluxionis curationem orditer Hipp. lib. 1. de Morbo. mul. inordinatē, sed cum hoc remedia aliqua consulit non omnino cōtemnenda: quæ si quis expendat, frugī esse comperiet. Sed ad curandi methodū me confero. Quare diligenter legat illud caput, qui in hunc locum inciderit.

B Si verò ex feruido, & æstuante sanguine fluxus concitetur, primò uictū institues refrigerantem, qualis ex pullorum carnibus assis parari solet, aut elixis lactuca, scariola, cucurbita, & agrestia: quibus etiam in cœna uti erit necessū, citra carnis vsum, cuius vice amygdalato, aut amylo uti poteris. Potus sit aqua chalybeata, aut ordeo decocta, vel mastiche suffumigata. Exercitium omnino interdicitur. Somnus sit moderatissimus. Aer maiori ex parte ad frigidum vergēs. Quo quidem in affectu vsui erit proficuum bis, semelue sanguinem extrahere ex basilica, aut saluatela dextræ manus, præsertim per frequentia interualla, & paulatim, vt minori virium dispendio distractio fluentis sanguinis fiat. Prodest quoq; cucurbita iecori, & aliqn spleni affixa, qua maior fiat ad superna reuulsio. Serapijs etiam, & apozematis frigidis utendum est. Cui negotio utilitatem præstat syrupus granatorum, rosarum, acetosæ, rosarum siccarum, borraginis, & papaueris cum aquis plantaginis, capitem rosarum, uel acetosæ. Quæ itē præstat usum aqua chalybeata, aut ex eisdem herbis decocta, uel mastiche suffumigata. Poteris et in femina boni habitus, & mediocris roboris, frigida potū porrigere, aut dilutioribus syrupis solito frigidioribus vtī. Quod si diu his præmissis affectus perstiterit, coniectandum profecto est, feruorē, & calorē sanguinis tueri biliosum aliquem humorem, quē fieri ex diuturna sanguinis effervescencia, credibile est, et si à principio non apparuerit. Quē protinus rhabarbaro infuso, aut myrobolanis cum aqua borraginis, aut plantaginis purgabis, uel cassia cum modico rhabarbaro, aut syrupo ex infusionibus rosarū rubearū cum prædicto rhabarbaro. A purgatione tñ porriges hordei decoctum cū saccharo, aut aquam chalybeatam cum saccharo rosaceo. In quo sanè casu, raro purgatione est vtendū, & per maiora interualla: nā tenues humores faciliē ad maiorem feruorē excitantur. Partes uerò circa uterum, neq; vterum ipsum, vllō medicamentō tractandas esse arbitror, ne quod feruidū est, ui astringentium ibidē p̄ter naturā institutum immoretur, & grauioris affectiōis causa existat. Corpori. n. & sanguini solūm prouidendum est, non vijs per quas fluxio fit. Hoc tamen vnū in hu-

in huius mali curatione prouidere oportet, uidelicet, ne extimata parti prope
 utrum frigida auxilia frequenter adhibeantur: nam sapissimè maiorem solent
 concitare fluxionem. Argumento sunt menstruantēs fēminæ, quibus in subu-
 culis, quas recentes, & mundas induunt, vberior sanguinis copia prorumpit:
 quippe illis protinus fluūt denuò menses, etiam si cessasse videantur. Quocirca
 & in hoc casu, & in plerisq; similibus, id obseruare plurimum oportet. Quod
 et de ijs, quæ frigida toti corpori ex multorum consilio adhibentur, intelligi p-
 cipue velim: nam hæc sunt, quæ facta in uterum reuulsione, maiorem concitāt
 fluxum; illa uerò, quæ prope uterum compressis humoribus, tumorem efficiūt.
 Quod si ex seroso, tenui, fluxili, & aquoso sanguine affectus concitetur, curabis
 diligenter exquirere sit ne ob iecoris languidam potentiam, an q sanguis non
 satis expurgatus sit à renibus. Et reducto prius iecoris temperamento, in me-
 lius, aut renibus deobstruētis, uel purgatis ea lege quam nos docuimus lib. de
 praesid. Indic. c. de sistendis fluxionibus, & lib. 2. ca. de aperientibus, quo facto;
 quia in hoc affectu (adiuncta saepe est Anastomosis, aut Diapedesis, crassius quo
 dammodo porriges alimentum, optimæ tñ substantiæ, ut est gallinarum caro cu
 niculi, perdicum, arietis, & uituli. Prosunt quoq; gallinarum, aut caponum he-
 pata, & extremitates, præsertim in cēna, amyllum, & oua sorbilia, & quæ consi-
 milem obtinent naturam. Potus is optimus est, quæ in prædicta causa diximus:
 vinum tñ interdices omnino, nisi humor pituitosa, aquosa, frigida ve exūterit
 naturæ, aut vires deiectæ: quo tpe vinum ipsum nigrum, & astringens proficiū
 est, præsertim si chalybeatum sit, & prædictis aquis summe dilutum. Parcior tñ,
 & moderatior potus is indulgēdius est, ne aquosior factus sanguis vberius fluat.
 Nec alienum est ab affectionis natura, aquam mastiche suffumigare, aut leuiter
 incoquere, aut infundere, aut aquam pluuialem porrigere. Sic etiam affectis
 longiorem consules somnium, moderatum exercitium per intervalla quidem
 finaliter nullum. Frequentiores per uniuersum corpus imperabis frictions, &
 ligaturas. In qua sanè re Paulus, & Aetius consulunt, eas femoribus esse adhi-
 bendas: quas omnino timere iubeo, nam promptius menses euocare habent, q
 sistere. Quorum loco, Hipp. consi. 5. Aphorismo. 50. vtendum est, nimirum, cu-
 curbitas mammarum radicibus affigere: quæ si non profuerint, proderit saltem
 fluxum sanguinis natium excitare. Quod vñ rationi esse consonum, & ab Hip.
 etiam non alienum. Aerem quoq; huiusmodi fēminæ semper habitent tempe-
 ratum, ut corpus, & humeres ad mediocritatē facile perducas. In quibus raro,
 aut nunquam sanguinem detrahes nisi per cucurbitarū scarificationes sub alis,
 & in scapulis, quæ serosos humores euocant, & rursus (vt experientia docuit)
 efficacius diuertunt: quod est et Aetij consiliū. Deniq; vtendum est omni diuer-
 sionis genere, pterq in femoribus, ut Auic. consulit fem. 2. tract. 3. lect. 3. Licet
 ipse consulat ibidē cucurbitulas apponere in loco, qui est inter vtraq; (ut eius
 verbis vtar) anchas. Quod sanè consiliū non est oīno aspernandum. Purgare
 aut in hoc affectu contracto ex prædictis humoribus, frequētius ex usu esse cō-
 perimus: nam cum tota ratio fluxus dependeat ex tenuis; & serosi humoris mi-
 scella cū sanguine, ex usu tibi erit eūdē ab huiusmodi uitio expurgare; q postea natu-
 ralis factus, ipse sua spē subsidet. Quos qdē humores nullo alio medicamētō
 securi, & cōmodius purgari cōseo, q frequētū rhabarbari vsu, aut diluto, aut in
 puluerem

A puluerem redacto, aut leuiter torrefacto cum corticibus myrobalanorum, & modico agarico; quem aqua lactis dilues, aut saccharo rosaceo admiscebis. Verum si facta per debita intervalla purgatione, adhuc fluxio non quieuerit; iterum ad ea, quae diuertendi vires habent, te conferes: inter quae potissimum est remedium, sepius ante prandium uomitum ciere, ceterum vomendum non est, sed solum id tentandum. Sic etiam non minus diuertunt sudores, quos mouere consiliiuit Auicenna cum decocto asari, apij, & ruber. Ego autem cum radice Chirae tutilis eos moueri existimo. Vtunque tamen sit, cautè id efficere oportet, & per intervalla.

Cum autem huiusmodi humores comitem ut plurimum sibi habeant Diapedesim, aut Anastomosim praemissis quae mox diximus; quorum vis est humores alio transferre, aut minuere: omni arte curandum est uenarum oscula recludere, & humores crassiores, motuique ineptiores reddere. Fit hoc per epota, per deuorata, per apposita vtero, aut vicinis partibus, aut per ea, quae in ipsum immixta idè beneficium praestant. Quae potius sumpta prosunt, varia sanè reperies: eligam tamen ex eis, quae mihi selectiora, & vsui utiliora esse videntur. Vtuntur quidem sepe omnes Medici in hoc affectu, posca (iudicio nostro) licentiosius quam par sit: quippe cum particula, quae in hoc affectu praecipue efficitur vterus sit, isque membranosus, nervosus, & omnino aceto inimicus existat, facile constat id citra dandum fieri nequaquam polle; etiam si aceti potum consuluerit Auicenna li. 3. Fen. 21. Tract. 3. cap. 4. Ratio desumpta censeo, & mihi semper pertimescendum visum fuit. Quamobrem nisi in biliosissimis feminis, & in ijs, quae nullam ex aceto perferunt noxam, hoc ego praesidio libenter non utetur, si quidem ad manum semper est quo vi possis, praemissis, ante omne auxilium, quae modicè siccant, quemadmodum Haliabas consuluit; etsi mihi magis arrideat haec eadè alijs admiscere. Sunt autem haec, cuminum torrefactum, spica, squinantum, thus, & similia. Verum in principio per se, aut praedictis admixta, praebere ex vsu est decoctum ex aqua chalybeata, aut pluuiali, confectum ex poligono, lenticisco, myrto, pyro, pruno, ulmo, quercu, tubo, aut ex fructibus omnium: ex radicibus etiam nymphae, symphiti maioris virentis, aut exsiccati. quibus addere poteris santhalam omnis generis, malichorium, balauitium, rosas, flores cydoniorum, aut cydonia, pyra acerba, & austera, dactylos, nuces cupressi, gallam immaturam, glandes cum canaliculis, rhu, ribes, oxyacantham, vitam omphacitidè, semen vuarum, & plantaginem siccam. Ex quibus pro feminae conditione, & promptitudine ad ea quae offeruntur, facile eligere poteris quae utiliora, & gustui gratiora sint. Verum utunque decoctum confeceris, adde saporis, & utilitatis gratia, ex syrupis eundem usum praestantibus, quem volueris. Sunt autem hi, syrupus myrtilorum, de rosas siccis, de cydonijs, cum alijs, quos ex succis praedictorum simplicium cum saccharo facile conficies, si diligenter rem tractare voles. Quibus sanè addere non nihil poteris ex puluere margaritarum, ex bolo armeno, terra sigillata, cornu cerui, santhali, malliche, thure, tragacantho, gummi, succino, lapide hematites, corallo, congulo leporis, hedij, vel cerui, & cunctis vltis, & ex arboribus, aut fructibus supradictis etiam aliquid. Quippe ob id vberiorè siluam scripsit, ut facile ubique possis parare, ac ne tibi usquam materia huic rei necessaria deficiat. Praeter quae omnia, consiliiuit Auicenna loco paulò super-

superius citato, potū lactis porrigere, in quo vel infundat scoria ferri, vel ferrū **A**
 ignitū sepius extingatur. Quod et Rasiū & Arabes alij consuluissē videntur.
 Cauendum tñ est ab hoc præsidio, vbi humoris vitiosi aliquid redundare co-
 gnouerimus, vel malignam febrem subesse. Portiones verò, quas huic vsui pro-
 bas apud probatos autores reperio, scribere non recusauī, & eas etiam, quas
 fidelissima obseruatione proficuas habeo. Prima sanè recipit boli armeni 3.ij. co-
 quito in aqua chalybeata, & facta colatura, laboranti porrige 3.ij. Secunda reci-
 pit scorix ferri crematæ, & in aceto extinctæ, & subtiliter puluerizatæ, lapidis
 hæmatitæ triti. ana. 3. f. Syrupi myrtillorū, & rosarum. ana. 3. f. aquæ plantaginis
 3. iij. fiat potio. Tertia recipit trochiscorum de carabe. 3. j. dissoluatur in modico
 vino, & copiosa aqua plantaginis, ac potui detur. Sed præter hæc, & alia nō pau-
 ca, quæ passim reperies, probatū præsidiū est. 3. j. gummi Arabici, aqua planta-
 ginis dissoluere, & additis guttulis vini austeri potui præbere. Est quoque pe-
 culiare præsidium, puluis, qui ex corticibus radicū mori conficitur, cum astringe-
 genti vino, aut aqua chalybeata exhibitus. Verū licet hæc omnia, & pleraq;
 alia quæ breuitati consulens præmitto, sint suapte natura huic malo proficua: **B**
 non sunt oībus sceminis æquē gustui grata; quod non solet esse minoris momē-
 ti in mulieribus curandis, quā quoduis aliud consilium. Ob id profectio vsui
 esse vtilius, & gustui gratius censui semper, & experimento confirmatum repe-
 ri, ex prædictis decoctis, ex succis (qui prælo exprimi faciliē possunt, & simplici-
 bus, quæ nuper retulimus) ex potionibus, & ex oīum ferē astringentium sylua
 stillatitias aquas depromere, quibus auxilium promptius exequimur citra vē-
 triculi, aut partis alterius offendiculum. Quapropter tanquam peculiare sub-
 sidio huiusmodi stillatitijs aquis uti consulo, q̄ & citius permeant, & promptius
 sese in uniuersum corpus, & humores inserunt, & insinuant. Ego autem tāquā
 præstantissimum auxilium maximē probo stillatitiū hunc liquorem: quem sic
 extrahere poteris. Confice panem ex farina hordei, orizæ, & ex amylo, quē pro-
 bē confectum ac recenter coctū projice in libris septē aquæ chalybeatæ, qui-
 bus adde rosarum rubearum siccarum. p. iij. succi plantaginis lib. i. consolidæ
 maioris virentis, & conquassatæ. 3. iij. caudæ equinæ. m. j. carnis pyrorum agre-
 stium, & citoniorum. an. 3. ij. portulacæ. m. ij. boli Armenti. 3. j. balustiarum, **C**
 & santhalarium omniū. ana. 3. f. Quæ omnia per alembicum instillantur, & in
 stillationis hunc. 3. j. & f. cui adde syrupi portulacæ, aut rosarum. 3. f. & laboran-
 ti summo mane porrige.

*Quæ de-
notant.*

Facessit frequenter tñ negotium hæc sanguinis fluxio, ut nō solum quæ pos-
 sumus, sed quæ non possumus laborantes, & assistentes expostulent. Quapro-
 pter si quæ potant non prosunt, uti quoq; ijs, quæ denorantur, frequenter cogi-
 mur: quæ sanè non indistinctè, & vtcunque administrabis, sed cum maiore dā-
 ni partem in maiori humorum parte, ac in iecore ipso, & partibus prope ipsum
 existere, compertum sit. In quibus necessarium est diu immorari medicamen-
 tum, si aliquid est effecturum. Sunt quidem huic vsui non pauca medicamen-
 ta, eligam tñ quæ mihi probatiora videntur. Primum sanè conficere poteris ex
 saccharo rosaceo uenustiori, quem iterum dissolues in aqua plantaginis cū bo-
 lo Armeno, aut margaritis præparatis, vel puluere succini, aut corallorum, &
 bolum conficies. Itē ex eadem conferua conditum parabis hac forma. Recip.
 confer-

A conferuæ virentis, rosarum. ʒ. ij. seminis plantaginis. ʒ. ij. coralli rubei, pulueris corallina. an. ʒ. j. lapidis hematites, & gummi Arabici, an. ʒ. f. misce, & fiat cōditum, cum frustulis auri: scoria item ferri tenuissimè trita, & aqua rosarū unius diei spatio macerata, igne deinde siccata, pondere ʒ. j. exhibita, sterilibus, aut religiosis mire opitularur. Confert aliud medicamentum, qđ recipit ouorum recentiu adestorum, thuris, mastichis an. ʒ. j. margaritarum, coralli rubri preparati, carabe, an. ʒ. ij. lapidis hematitæ, & smaragdi preparati. an. ʒ. f. farina ordei sine fursura p. ij. albumina quatuor ouorū, aqua chalybeate qđ sufficiat, vsiant duo panes, donec in puluerem possint redigi: cuius pulueris porrigere poteris vsq; ad ʒ. f. Parabis et aliud, quod recipit carnis citeniorum vino rubro decoctæ. ʒ. iij. pulueris spodij, sanguinis draconis, cornu cerui vsti, thuris, acaciar, & guttmi tragacanthi. an. ʒ. f. lapidis hematite preparati. ʒ. f. misce, & summo mane porriges vsq; ad ʒ. ij. ac mox succi poligoni. ʒ. f. aqua pluuialis. ʒ. j. Nec sunt etiā minoris momēti trochisci de carabe, de spodio, de terra lemnia, & alia etiā, quæ superius retulimus. Ego tñ dum humores sunt scorli, & plurimum tenues, præmissis quæ sanguinem ab eorum spurcitia vindicent, conditum hoc conficere, quod recipit, Pelliculorum interiorum, quæ adherent nucleis auellanarū siluestrium. ʒ. ij. terræ sigillata, trochiscorum de carabe, pulueris leporis vsti, & conchularum vstarum, thuris, mastichis. an. ʒ. f. succi mille folij. q. f. vt fiant pillule, quarum tres numero mane adhibeto. Quod si succum mille folij cum saccharo adhibueris, non minùs prodesse poteris, quam præstito quouis præstantissimo auxilio. Idē facit succus radices philipendulæ, aut caro eiusdem radices, pondere. ʒ. j. Sed inter omnia auxilia id tibi fidissimum reperies, adhuc in desperatis sanguinis fluxionibus nimirum. ʒ. j. pulueris corticis radices mori singulis diebus vetriculo ieiuno cum vino nigro epota. Item puluis ex corticibus granatorum acrium, & ex auribus leporis combustis cum saccharo. Sunt et quæ coagulum leporis proficuum alioqui auxilium, porrigunt, quo tamen consulo ne vtaris, nisi prius correxeris absinthio, mentha, aut myrtho: nam alioqui plus damni inferes. Inter hæc autem medicamenta ex vsu esse solent narcotica, quæ non vtunque, & in cautè administrabis, sed cū plurimum necessitas præpollet, & alia non proficere. Inter ea verò quæ sumuntur, confert requies, magna, deinde athanasia, demum philonium maius, aut romanum, nisi facultas imbecilla extiterit: quorum vsu eo tempore proculdubio interdices.

C Cum præter sanguinis vitium et ex vteri anastomosi, aut diapedefi sanguis profluit, non sat est, quæ hucusque diximus administrare, ni peculiarem vteri pui dentia habeamus ijs, quæ uenarum oscula, & poros recludere possint. Nam frequenter cōtingit, etiamsi sanguinis uitium arte, & diligētia compescuerimus, impetu delationis, & loci cōmoditate, & nimia apertione, crassū adhuc, & naturale sanguinē profluere. Atque etiamsi pessarijs, & multis alijs ingenijs medicorum nonnulli hoc vitium corrigere nitantur, ego tamen, innitēs deci eus prisco rum in hac re, parū pessarijs fiderem, mō ab vteri ceruice, modò ab vtero ipso sanguis profluat: vis. n. pessariorum alstringens, rarò ad aperta vasorum oscula peruenire poterit. Quamobrē per vterina clysteria, ac per suffitus hoc vitium corrigere hac in parte conabor. Cū hoc tñ, quia alijs etiā præmissis, pessaria, aliquid cōducere possunt, melioris, & copiosioris doctrinæ gratia nō erit ab re

ex ijs

Quæ in
veterum
infun-
duntur

ex ijs quæ superius diximus pessaria cōficere. Immittere primo in uterum per A
metranchitā (uterinum appellatum clystere) poteris uinum dulce cum cortice
malignanati decoctum, succum et sanguinariæ, plantaginis, consolidæ maioris
aut aliquid ex supra dictis decoctis cū pulueribus boli armeni, sanguinis dra-
conis, & aliorū, q̄ mox retulimus. Succum quoq; stercoreis asinini, & sumptum
& in utrum immissum plurimum prodesse fertur. Cui consimilem uirtutem
præstat succus burse pastoris deuoratus, aut in uterū iniectus. Maiori uerò effi-
cacia (ut ex Gal. lib. experimentorum constat) sanguinem sistit, si in uterum in-
fundas hoc præsidium, quod recipit, mucilaginis ex gummi Arabico, & tragacā-
tho cum aqua plantaginis. ʒ. iij. succi plantaginis. ʒ. ij. cuius et partē potui p̄be-
re poteris. Sed inter alia pleraq; quæ in uterū immitti possunt, unum mihi ha-
beo peculiare subsidium, quod recipit, succi polygoni. ʒ. iij. mucilaginis gummi
cōis extractæ in prædicto succo quantum sufficiat, ut citra impedimentum in-
fundi possit, aquæ capitum rosarū sapius chalybeatæ. ʒ. iij. amyli. ʒ. j. misce & in-
funde. Ad ea et quæ in uterum immitti possunt, reduces faciliè suffumigia, quæ B
mille modis parare poteris. Caterum quæ magis probo, conficiuntur ex masti-
che, pice, thure, ladano, ranis cōbustis, ungula mulæ, ungula odorata, coriario-
rum segmentis, galis per infundibulum euaporantibus, rosis, uuarum passariū
acinis, & ex alijs, quæ haud faciliè his similia inuenies. Ferunt etiam nō medio-
eris autoritatis uiri, saluæ suffitum menses immoderatè fluentes, & oē mulie-
bre profluium sisti, licet bibita, & apposita ipsos enocet.

*Vtuo ad
mouen-
da.*

Vnguenta quoq; cerata, & emplastra huic usui non parum proficua parari
solent, q̄n cætera auxilia mali uehementiam frenare nequeunt: dummodo eis,
si frigida fuerint, plurimum non innitaris, nisi calidorū aliquid permiscueris,
p̄ interualla quidē, ac repetito exhibita. Primò itaq; id conficies, & uteri regio-
ni parti sui anticē, & posticē applicabis, quod paratur ex porci stercore additis
pulueribus rosarū, & farina uolatili, donec ad formam cataplasmatidis reduce-
ris. Aliud aut conficitur ex oleo myrrhæ, nenupharis, citoniorum, an. ʒ. ij. succi
plantaginis, linguæ passariæ, & caudæ aquinæ: an. ʒ. j. coquantur ad consum-
ptionē succorū, quibus adde coralli rubei, seminis plantaginis, myrtillorū, ce-
rusæ, boli armeni, & pulueri concularū, q̄ portantur ex B. lacobi & de, an. ʒ. ij. ce- C
re. q. s. ut fieri possit unguentum. Aliud pubi, & luminis apponendū, recipit ex
ciuinis, ex gala, hypocistide, bolo armeno, stercore caprino, an partes æquales:
ex colla, q̄ fit ex pellib. bouis dissoluta in posca. ʒ. j. olei citoniorū, & myrtillo-
rū, ana. ʒ. j. & lento igne fiat emplastrū molle. Poteris et aliud conficere cata-
plasma ex uitellis ouorū cōquassatis, ex gypso, puluerib. thuris, mastichis, aca-
tiæ balaustiorū quantum sit satis, ut efformet cataplasma. Nec minoris momenti
est emplastrū, quod conficitur ex carne citoniorū, & pyrurum agrestium, quæ
uino rubro austero satis ferbuerit cum pulueribus prædictarū conchularū, cor-
nu cerui usti, boli armeni, gummi arabici, & farina oryza. Verum quia sepe
malū eo miseriæ deuenire solet, ut ne maiora quidē prodesse uideantur, nō est
ab re alio uti præsidio, in quo maior insit cōprimendi efficacia: hoc aut recipit,
boli armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis, an. ʒ. ij. thuris, mastichis, myrrhæ,
an. ʒ. j. pilorum leporis combustorum. ʒ. ij. acaciæ, hypocistidos, ana ʒ. j. seminis
acetosæ, seminis plantaginis, seminis portulacæ, citoniorum, ana ʒ. j. quibus
adde

A adde omphacini, & succi plantaginis. an. ʒ. vj. bulliant lento igne ad succi cōsumptionem, ac mox adde ceram quod sufficiat, vt fiat cerotum. Huic quoque praesidi-
diorum generi reduci facile possunt encathismata seu infusis, quae parati faci-
lia sunt, aliquo ex supradictis decoctis, aut succis leuiter calfactis. Aq; haec de
Anastomosi seu Diapedesi ex tenui, & fluxili humore procedunt, dixisse sit satis.

Necesse proculdubio est in hac curatione interim dum haec administratur, *Humo-
rum & cor-
poris pro-
unditate
De fla-
uabile.*
per interualla, & statas periodos corpori, & humorū motui prouidere, partim
purgationibus repetitis, partim frequentibus distractionibus, ea lege, quam in
prima huius capitis parte adduximus: quorum etiam medicamentorum me-
minisse hac in parte, utilissimum fore censeo. Verum si flamma bilis, quae praemi-
nio calore, atque mediocri acrimonia, quae naturam ad motum excitare ha-
beat fluxus concitetur iuuante vasorum raritate, & anastomosi, prouidendum,
statim est, post victus institutionem, quae nimis frigida non sit, ne ventriculus,
& cetera viscera, quae ocysimè affici in hoc affectu, ac labefactari solent, frigi-
ditate nimia ledantur: ob id moderatione vtendum est, & aliquando ad frigi-
dum inclinandum, subsistendum tamen. Aerem frigidiorē reddere oportet,
somnum conciliare omni arte, quietem, & animi etiam tranquillitatem. A qui-
bus quam celerrimè flauā bilem purgare oportet, & vniuersum sanguinis im-
petum alio transferre, ac bilis ipsius calorem, & acrimoniam compescere, cras-
sioremq; & motui ineptiorem reddere, & meatus angustiores, & fluxui minis
paratos efficere. Purgabis verò flauam bilem accepta prius leui occasione attē-
perandi eius calorem, & acrimoniam syrupo rosaceo, borraginis, acetosae; de
agresta, & similibus infuso rhabbari, decoctione tamarindorum cum cortici-
bus myrobalanorum, & syrupo solutino rosarum, idque non semel, sed bis de-
bito interposito spatio, ea lege, quam superius adduximus, ne eadem sepius
repetere videar. Quibus praemisilis vacationibus, aut inter vnam, & aliam q̄
rectius esse arbitror, ex altera, aut vtraque saluatela sanguinem detrahes, pen-
tis tñ prius laborantis feminae natura & habitu. Quo facto ex re erit, per inter-
ualla pulueris rhabbari. ʒ. scum saccharo rosaceo, mane, bis, terve citra die-
rū intermissionem praebere: quod esse praestantissimum auxilium frequenti ex-
perimento constat, & vacuandae flauae bilis nō nihil gratia, & causa comprimē-
di, roborandive partes internas, & viscera oīa, ne promptè sanguinem defluere
permittant. Quo sanè auxilio iterato, interpositis aliquibus diebus, vti erit ne-
cessum, si rem ex voto cedere desideras. Quatenus verò ad sanguinis diuersionē
pertinet, eisdem poteris ingenijs uti, quae in praecedenti causa didicisti, hoc uno
addito, quod si diu fluxus perstiterit, derinationis gratia haemorrhoides hirudi-
nibus aperire erit proficuum. Nam coniectabile est, feculenti etiam sanguinis
aliquid superesse, quod alterius mali principium praestet, & praexistēti robur
addat. Verum praecipue hoc praesidio vti oportebit deriuationis gratia, & vltē-
tero fluxu excitato, faciliè praexistens subsistat.

At fluentē flauam bilem, & motos etiam ad vterum humores frenare nō erit
difficile, si quis exactè expenderit, qualia medicamēta huic vsui pficua existāt: *Quae po-
tius flauā
bilem fre-
nent.*
non. n. quouis astringentium indiscriminatim vti poteris, sed solum eo, quod
cum hoc q̄ astringat, refrigeret quoque, & attemperet, admixtis etiam alijs, q̄
leniendi, & acrimoniam, ac mordacitatem obtundēdi vires habeant, ne flauabile
intem-

intempestiuè impedita, ac detenta, maius faceſſat malum. Quamobrem potui
 datam proficiam eſſe cenſeo ſtillatitiam aquam, in qua hamaites confricetur,
 donec ipſa aqua rubefcat: lac etiam aſinæ, cremor eondri, aut ptiſanæ, ſyrupus
 de agreſta, & roſarum uiridium, ac ſiccarum; ſyrupus borraginis, bugloſſæ, de
 ſucco acetofæ, de papauere, cum decoctis ordeï, plantaginis, lactucæ, ſolani, ſi-
 deritis, poligoni, ſimphiti, roſarum, papaueris, aut cū aqua, q̄ pluries extinxerit
 ignitū aurū: ex quibus, & alijs eiufdē naturæ, ſtilloticas aquas cōficere poteris,
 & varias parare potus differentias. Qua ſanè auxiliij forma frequētius vti in hoc
 affectu neceſſum eſt, potius q̄ ſolida, aut ex ſiccis pulueribus conſectæ: renuet. n.
 hæc, & fortallē exacerbatitur magis id genus medicamenti natura peccantis
 humoris, etiamſi dum fluxus indicatio virgentior eſt, ea, q̄ ab humore p̄ſtat in-
 dicatione, neceſſum ſit aliquid eorum medicamentorum, q̄ ſuperiūs retulimus
 his potibus admicere. Quæ omnia frigida adhibenda ſunt: nā, & frigida potus
 proficius etiam eſt, quippe qui ſolus hemorrhagiā omnem ſilere habet. Qui-
 bus ē potationibus addere poteris (dum prædicta indicatio præualuerit) aliqd
 quod uorando ingeratur, & eundem uſum præſtet, uelut eſt opiātum, qd̄ reci-
 pit, conſeruæ roſarum antiquæ. ʒ. j. conſeruæ ſimphiti. ʒ. ſ. trochiſcorū de cara-
 be. ʒ. j. boli armeni. ʒ. ij. ſanguinis draconis. ʒ. ſ. ſyrupi de roſis ſiccis, vel myrtillo-
 rum qd̄ ſufficiat, ut fiat opiata. Eandē quoq; gratiā p̄ſtat illud, qd̄ recipit, ſimphi-
 ti, & carnis cydoniorū ſaccharo conditorum. an. ʒ. ſ. conſeruæ roſarū antiquæ.
 ʒ. j. trochiſcorum de ſpodio, & de terra ſigillata. an. ʒ. j. pulueris diamargaritonis
 frigidi, & diapapaueris albi. an. ʒ. j. ſyrupi cydoniorū quod ſufficiat, ut fiat opi-
 ata. Cuius q̄titas exhibenda eſt magnitudinem fabæ cum aqua plantaginis. Item
 aliud conſicies, quod recipit. conſeruæ roſarum, ʒ. ij. pulueris coralli rubei. ʒ. j.
 pulueris electuarij de gemmis ſine ſpeciebus, aut margaritarum. ʒ. ij. cum aqua
 roſacea fiat conditum. Præter quæ ē vſui proficua eſſe experimento conſtat ca-
 taputia Meſues de bdellio, trochiſci oxiacanthæ, ſigillum lemnium, trochiſci
 de vulgari electro, de ſpodio, corallus ſumptus cum ſucco granatorum, philo-
 nium item perſicum, pondere. ʒ. j.

*Qua in
 uterum
 miſſum
 ſlauabi-
 lem com-
 peſcunt.*

Quæ in uterum huic uſui immittenda ſunt præter aſtriſtionem, ut de epotis
 retulimus: frigida quoq; eſſe conuenit, cum hoc quod lenem, & mulcebrē ſub
 ſtantiā naſta ſint. Huius cenſus ſunt clyſteria, quæ ex lacte aſinino, & modico
 plantaginis ſucco parari à multis ſolet; & ea etiam, q̄ ex cremore eondri, aut pti-
 ſanæ; ex aqua decoctionis ordeï, & orizæ torrefactorum, & ex ſanguinaria, &
 conſolida maiori cum roſis, & ſyrupis roſarum, aut myrtillosum. Poſſunt etiam
 huic uſui adhiberi aliqua ex ijs, quæ in præcedenti cauſa diximus, uelut eſt il-
 lud, qd̄ recipit mucillaginis ex gummi arabico, & tragacantho cū aqua planta-
 ginis chalybeata, aut aqua ex ordeo decocto, y per inſtillationē detracta. ʒ. iij.
 ſucci plantaginis. ʒ. iij. Id quoq; beneficium præſtat peſſarium (incredibili qua
 dam efficacia) conſectum ex lythargiro, bolo armeno, & albumine oui. Verum
 quia in huiusmodi cauſa concitari ſæpe ſolent grauiffimi dolores, ob id cogi-
 mur frequenter ad narcotica cōfugere, ut ſuperiūs diximus: in quē uſum cōfi-
 cimus uterina clyſteria ex aqua uel ſucco portulacæ, ſanguinariæ, plantaginis,
 & ſolani cū modico philonio perſico, aut (qd̄ magis probo, ni dolor, aut fluxus
 vehemētior ex uteri ſenſibilitate factus fuerit) ex collirio albo Rasis appellato:
 quibus

A quibus addere poteris trochiscos de carabe, spodio, & de terra sigillata; quibus prudente uti convenit, ne aut sterilis fiat mulier, aut aliud vitium contrahat, præsertim si imbecilla facta fuerit. Cui est prædictorū generi adiungere par est suffusione esse diximus. Verum suffusus biliosa causa prædominante non debent fieri ex re plurimum cremata, sed vehementer calfacta; ita ut aliquid ex ea citra ustionē euaporat. In qua sanē causa placent magis encatasmata, quæ fieri possunt ex astringentibus aqua chalybeata elixis, cum his quæ modicè leniant.

Exterius autem miscenda quoque est bilis actimonia, & calor medicamentis, quæ præter astringentem, refrigerandi etiam idonea sint, ueluti est unguentum, quod recipit olei myrtini, nenupharis, & citoniorū, ana. ʒ. ij. succi plantaginis, uel lingue passerinæ, aut semperniui. ʒ. j. coquantur ad consumptionē succorū, quibus adde coralli rubei, seminis plantaginis, myrtillorū, cerusæ, & boli armeni, ana. ʒ. j. cere quod sit satis, ut fiat unguentū, quo renes, & prope os pubis femina inungatur. Vtile quoque huic usui erit illud, quod recipit, succi lentice palustris, consolidæ maioris, & agrestis, ana. ʒ. j. olei citoniorū, nenupharis, & rosarum, ana. ʒ. ij. coquantur ad consumptionē succorū, & adde sanguinis draconis, trochiscorum de carabe. ana. ʒ. j. aceti cocleare unum, & cere quod sit satis. Vel inungere etiam prædictas partes non erit ab re unguento rosaceo, aut refrigeranti Galeni, præsertim si eis miscueris nonnihil terre sigillatæ, pulueris cornu cerui usti, coralli, rosarum, myrtillorum, seminis plantaginis, aut acetosæ, & aliarum rerum quarum superius abundè meminimus.

Quæ exterius adhibenda sunt.

Monitū tamen uelim hac in parte lectorem, ne interim dum hæc adhibet, omnino à purgantibus pharmacis, aut leui aliqua sanguinis detractio, uel diuersione, & ab alijs auxilijs, quæ superius præmittenda esse diximus, subsistat, sed prout vires tolerare visum fuerit, aut morbum exposcere hoc, illove præsidio uti erit necessum, cauentes tamen ne nimia auxiliorum copia, & naturæ opus præpediamus, & tedium, ac molestiam feminis inferamus.

C Vltima porro causa ex ijs, quas huic malo principium præstare diximus proculdubio est ipse uteri affectus, qualis est uenarum exesio, aut disruptio à te solvente continuū facta, uel ab humore mordaci exedente, & acri excavata. Quo tempore considerandum est, an urgeat magis fluxionis impetus, quàm affectionis natura, nam quum uera curatio sit per causæ ablationem, tunc in hoc malo ea curatione utendum est, cum fluxio nimis non urgeat, quod in menstruis non urget, donec ut Auic. refert vires, quod modo concidere uideantur, ac si id acciderit causa post habita fluxui intendendū est, sin aliter uera curatione utendum, quæ sit per morbi uenarū, aut uteri ablationē. Sic profectò ubi ex intrinseca uiolentiæ ualis disruptio acciderit, aut ex subita, & magna animi passione (nam à laborioso partu, uel abortu proficiscentis suo loco latius meminero) instituta parca uictus ratione, quiete, sanguine missio semel, aut bis, uel ter, si mulier boni habitus fuerit: exterius quidē ac per uterum adhibenda sunt, quæ agglutinandi vires habent. Cui usui in uterum immittere oportet albumen oui fortiter agitatū p

Ex diuisione uase.

D sc

se solū, uel cum pulueribus gummi arabici, & tragacanthi, amyli, aut plantagi-
 nis. Præstat idem beneficium succus sanguinariæ, uel succu radicis philipendu-
 læ, puluis quoque earum radicum, & rhu, balauſtiorum, & consimilium in præ-
 dicto oui candido, aut decocto, uel succo aliquo ex prædictis in uterū immif-
 fus. Quod si disruptio uenis ceruicis uteri accidat, aut ex hæmorrhoidibus uteri
 profluat, pessarijs ex prædictis rebus confectis, & bolo, aut farina uolatili, uel
 terra lemnia rem agere oportet. Sed maiori efficacia confert pessus, quod reci-
 pit triseræ, miclotæ, athanasia, an. ʒ. ʒ. hypocyſtidos, acatiæ, boli armeni, sangui-
 nis draconis, radicum consolidæ maioris, arnoglōssæ, gallarum, an. ʒ. ʒ. mixtis
 fiat pessus, ad cuius pensum ex supradictis simplicibus, & ijs, quæ paulò infe-
 rius referam, facile cuius, uel mediocriter exercitato erit, plura alia huic usui
 proficua effingere. Sic & iniectiones profunt ex decocto fragariæ, cumini, bur-
 sæ pastoris, cornu cerui, lysimachia, myrrhi, nymphæ, glandis corticum balau-
 stiorum, uuis passis, additis pulueribus mastichis, thuris, myrtillorum. Sed ma-
 ximè in hac causa prodest iniectione, quæ recipit foliorum plantaginis, poligo-
 ni, agrimoni, scolopendrij, quod cetrach officina uocant, myrrhi, lentisci, uel
 summitatum rubi, an. m. ʒ. decoquantur ex aqua ferrata, aut in qua plumbum
 feruens extinctum fuerit, & decocti excipe. ʒ. ʒ. ʒ. syrupi de rosis siccis, uel rosa-
 rum. ʒ. ʒ. ʒ. olei rosacei omphacini. ʒ. ʒ. ʒ. misce: & proijce. Quod etiam præsidium pa-
 rabis ex stillonica aqua ex sero, & prædictis herbis, ac pyro syluestri, & uiridib.
 lentibus cum saccharo, aut syrupo rosaceo, si postea candens ferrum in ea sepe
 extingatur. Partes quoque supernas frequenter perfricere oportet, uinculisq;
 ligare, item syrupis, & apozematis uti, quæ & sanguinem densent, & motū co-
 hibeant, quorum materiam abundè dixisse censeo.

Sed multa quidè sunt, quæ deuorata, aut exterius adhibita peculiari quadā
 efficacia sanguinè ex aliqua harum causarum proficiente sistunt, uelut sunt
 trochisci de terra sigillata, de carabe, seu acatia, hypocyſtidos, cornu cerui, pro-
 dest & bolus armenus, corallum puluerizatum, puluis cōsolidæ maioris, florū
 citoniorum margaritarū, mumia, & myrtillorum cuiuslibet. ʒ. ʒ. cum uino, uel
 aqua ferrata, uel decoctione corticum granatorū, radicum nenupharis, uel suc-
 co sanguinariæ, plantaginis, uel portulacæ. Verū si sanguinis profusio ulterius
 pergat, aliquo ex prædictis liquoribus dissolues athanasia. ʒ. ʒ. ʒ. Præstat & puluis
 picis naualis, uel peonia, aut cinis corticum ouorum quantitate. ʒ. ʒ. ʒ. item cinis
 stercoris caprini. ʒ. ʒ. cum aqua pluuiali. Cōfert syrupi myrtini. ʒ. ʒ. aquæ planta-
 ginis. ʒ. ʒ. ʒ. succi stercoris asinini. ʒ. ʒ. ʒ. Præstat et non minorem gratiā id medica-
 mentum, quod recipit conseruæ rosarum. ʒ. ʒ. ʒ. syrupi papaueris. ʒ. ʒ. ʒ. pulueris co-
 ralli. ʒ. ʒ. margaritarū, & trochiscorum de carabe, an. ʒ. ʒ. ʒ. terræ lemnia. ʒ. ʒ. ʒ. mi-
 sce, & fiant boli deaurati. Ex quibus non pauca poteris conficere, quæ non so-
 lum huic causæ, uerū & reliquis, causa semota prodesse poterunt. Exterius ue-
 rò cataplasmata adhibenda sunt, qualia conficiuntur ex albuminibus ouorum
 cū pulueribus rosarū, myrtillorū, thuris, & mastichis, cū gypso et subtiliter in
 puluerem redacto, & alijs plerisq; quorum uberrimam copiam reperies facilè
 lib. 2. nostro de indicatione præsidiorum. Cæterum peculiariter utero sic affe-
 cto conferunt uaria auxilia, quæ hucusque retulimus, sed peculiariter fœtus, q
 paratur ex decocto caudæ equinæ, lentisci, foliorū myrti, pyrorum, prunorū,
 sym-

A symphiti, corticum interiorum quercus, rosarū, virgæ pastoris, bistortæ, & gallarum cum aqua pluuiali, uel feriata; cuius est per infundibulum euaporationes prodesse possunt, sicut suffumigia hoc modo parata. Excipe colosoniæ. ʒ. ʒ. spodij, boli armeni, papaueris nigri, hioscyami. an. ʒ. ʒ. conuascentur, & super prunas posita suffumigium excipiat. Ungere est uteri regionem antè, & retrò utilissimum est, unguento quod recipiat, olei myrtini. ʒ. ʒ. ʒ. olei mastichini, succi plantaginis. an. ʒ. ʒ. sumach, myrtillorū, hypocistidos, terræ sigillatæ, boli armeni an. ʒ. ʒ. spodij, rosarū. an. ʒ. ʒ. ordeï vlti. ʒ. ʒ. ceræ quantum sit satis. Est autè aliud unguentum huic vsu pretiosum, nonnullis tanq̃ secretū habitum, quod recipit corticum medianorum castanearum, & est arboris glandium, myrtillorum, gallarum, corticum fabarum, corylorum, vuarum immaturarum, glandiū sorbarum siccarum, mespilorum immaturorum, radicum chelidonis, foliorū pruni sylvestris. an. partes æquales, contusa coquantur in aqua plantaginis, & post colaturam accipe olei myrthini quantum uis, in quo conueniente ceræ quantatem dissolue, postea in prædicta decoctione laua sæpius innouata coctione, uel ex decocto accepta ad vnā lotionem sufficiente quantitate, & factis sufficientibus lotionibus accipe corticum castanearum, quercus, & arborum gallarū, partē. j. cineris ossiū cruris bouis, seminis myrtillorum, corylorum, vuarum immaturarum. an. partem mediam, fiat puluis subtilissimus, cuius accipe partes duas, trochiscorum de carabe partem. j. & fiat unguentum cum oleo, & cera super prædictis. Conficies est aliud non minoris momenti, quod recipit acatiæ, hypocistidos, terræ sigillatæ, trochiscorū de carabe, colosoniæ. an. ʒ. ʒ. fiat puluis, quē succo plantaginis admiscæ addito modico aceto, & fiat emplastrū. Aliud parare poteris, q̃ recipit pulueris cornu cerui usti, papiri combustæ, limaturæ ferri præparatæ. an. ʒ. ʒ. pulueris corticū glandiū. ʒ. ʒ. ʒ. misce, & cum albuminibus ouorū, & modico aceto cōfice emplastrum. Vel sic aliud cōfice, excipe mastichis, olibani, mumie, sanguinis draconis. an. ʒ. ʒ. facto puluere, efforma cataplasma cū albumine oui, succo artemisiæ, & caudæ equinæ. Præstat nō minus emplastrū ex lūbricis terræ, thure, & albumine oui factum. Item succus urticæ græcæ in bombace ventri appositus. Expendat tamen hac in parte lector; duplici motū ratione tot astringentia auxilia me adduxisse, quamuis certum sit, ijs fluxibus, qui ex diruptione fiunt, propria esse, quæ agglutinandi potentiam habent pharmaca, tum ut aliis fluxionibus astringentium subsit vberima copia, & ex hac parte medicus exquirat: tum verò, quia maius sæpe facessit negotium fluxio, q̃ continui soluta vnitas, & ob id astringentibus præstò esse oportet, ne ex nimia profusione maius aliquod damnum subsequatur, præterquam q̃ fluente sanguine agglutinari vlcus non potest, & ob id necesse est primo fluentē sanguinem compescere.

Quod si fluxio ab exesa vena proficiatur, longè diuersa rōne curandi methodum instituire oportet. Proficiscit̃ etenim hoc malum ab exedenti, vitioso, & acri humore, qui sensim abrais vasorum tunicis viam foramenq̃, quo proficiat, sibi parat. Quapropter triplex erit in vniuersum curandi ratio, prima, quæ cacochemiā, seu vitiiū humorum respiciat: secunda, quæ factam exesionē curet: tertia verò, quæ fluxui prouideat. Iuxta primam indicationem victum ea lege primò instituire oportet, qui sufficiens sit vitiosum humorem attemperare, &

Ex vena
exesa.


meliorem deinceps conficere. Cuius rei gratia alimentū optimi nutrimenti, & **A**
 glutinosae substantiae eligere oportet, quo paulatim, ac frequētius vti erit neces-
 sū. Est aut huius naturae autū domesticarū caro, iuscula, amyliū, panatela ex iure
 aut lacte amygdalarū confecta. Itē ex oleribus, lactuca, portulaca, borrago, &
 scariola. Praestat quoq; eundē vsum ius, aut caro extremitatum capreoli, arietis,
 porcellorū, aut agni. Cui et vli is potus eligendus est, q̄ parat ex aqua, in qua
 saepius aurum extinguat vel ex decoctione radicū buglossae, vel admixta stil-
 laticia ex portulaca. Curandū itaque, vt is humor in corpore ex alimentis suc-
 crescat, q̄ praexistētī sit omnino contrarius, tum vt ceteros corrigat, tū verò ut
 vlceri curando ac renutriendo, lentore, & bonitate sit idoneus. Corrigimus quo-
 que p̄existētē humorē syrupis, & apozeinatis, non quidem astringentibus pri-
 mo morbi accessu, ut in p̄dictis causis, ne partibus fixius adhæreat humor, vehe-
 mētiusq; erodat; sed ijs sanē, qui attemperandi leniendi, & mitescendi humo-
 rū acrimoniā, nim habeant. Cuius modi est syrupus buglossae, borraginis, rosa-
 rū, granatorū, portulacae, & papaueris. Inter quos peculiari quadā dote p̄po-
 leris, q̄ ex portulaca conficit, & ijoēs, qui parant ex macilaginibus, & creino-
 re ordeī, & alij consimilis naturae. Sistit quoq; fluxū, & humores mirē corrigit **B**
 mucilago cytoniorū dissoluta aqua capitū rosarū uel plantaginis, aut ablutio-
 nis, boli armeni. Confert itē aqua ex ablutione amyli, boli, aut terrae sigillatē cū
 cōserua rosarū. Quibus, p̄culdubio frenatū humorē leuibus medicamentis, sed
 electorij per epicrasim purgare oportet, tū ne cōserta vacuatione intestina dy-
 senteria periclitent, tū verò q̄a huius conditionis humores hac purgatione gau-
 dēt magis, ut rursus paulatim corpus mīoribus renutriatur. Purgabis igit cha-
 barbari infuso, infusis ē corticibus myrobalanorū in succo granatorū, aut in a-
 qua lactis, uel succo portulacae. Itē proficua erit huic vsui manna, casia, syrupus
 infusionum ē rosīs hispanis. Confert item succus rosarū extractus cū aqua infu-
 sionis rhabbari ad formā largioris syrupi cū saccharo redactus. Renuit et fe-
 rē oīa huiusmodi femininarum corpora sanguinis detractionē, tū quia affectio
 suapte natura id interdicit, tū quia huic humorū initio, & corruptioni semper
 uires adiungunt debiles. Quocirca (vt consuluit secunda huius affectus indica-
 tio) diuersionibus ad distantes partes factis, vitiosum sanguinē ab affecto lo-
 co distrahere oportebit superiorū partiū frictionibus, & vinculis, & cucurbi- **C**
 tis et frequēter scapulis adhibitis citra vllam scarificationem. Quibus omnibus
 primitus factis, licebit syrupis, & potionibus ex ijs, quae modicē astringunt quā-
 tum sit satis, ut humores firmiores, fluxuique ineptiores reddantur, admiscere:
 quae quidem ex eis, quae superius diximus, facillē colliges. Consulit verò tertia
 huius mali indicatio, ulceri seu exesioni venarum providere: primo ijs medica-
 mentis, q̄ foramen obstruendi uires habeant, qualia sunt emplastica oīa, sola,
 aut cum agglutinantibus admixta. Quem vsum praestant bolus armenus, terra
 sigillata, pulvis farinae volatilis, amylium, mucilagines omnes, & gummi, vel
 succus portulacae: quae omnia aqua chalybeata plantaginis, aut capitum rosa-
 rum dissoluta in vterum id immissa summopere profunt. Quippe eisdem ob-
 turato foramine, natura (cui id munus incumbit) ex optimo sanguine, carnem
 citra fluxus impedimentum conficere potest, partemque renutrire. Id
 etiam p̄dicta pharmaca praestāt beneficium, vt si quis adhuc humor acris, &
 mordax

A mordax ad affectum locum confluerit, minùs possit exesionem efficere: nam & impediunt suo lentore, quominus fiat, & humoris vitium corrigunt: certum etiam est, & fidissimum experimentum, radicis philipendule. 3. j. singulis diebus in ovo soruili sumpta incredibili efficacia sanguinem omnem sistere, sed maxime ex vtero. Sed efficacius presidium facies, si serapium cum saccharo ex succo eiusdem radicis confeceris, cuius laborans cum dormitura est. 3. j. sumat. Partibus item externis, ex predictis medicamentis varia confici possunt. Sed vsui probatum magis mihi est id, quod conficitur, ex albumine oui fortiter, agitato, & pulueribus gummi, tragacanthi, aut arabici, boli armeni, & sanguinis draconis. Item aliud conficitur ex succo bursæ pastoris, & farina tritici, vel amylo, igne leuiter spissatis. Aliud quoque facile, & vtile parabis, ex farina volatili, modico gummi, & albumine oui: necnon, & emplastrum, diaphœnicon appellatum. Ex quibus omnibus additis, quæ modicè alstringunt (præsertim si vitium humoris iam correxeris) non erit difficile varias pharmacorum effingere formas huic vsui proficuas. Verùm omni causæ prævalenti ferunt prodesse succum chelidonie mammiis appositum: de quo creditur vteri sanguinem vehementer sistere. Quod etiam referunt de moro, & eius fructu. Sicut succus oleæ vuluæ in panno admotus. Quibus præmissis, si nihil profuisse cõpertum sit (quanis existente causâ) narcoticis uti oportebit, & quæ somnum concilient: qualia reperies abundè lib. nostro. 2. de auxiliorum indicatione, cap. de anodynis. Quibus in hoc casu cautè est vtendum: nam suspicari oportet frigidiorẽ esse fœminam, quàm vt possit narcotica tuto ferre.

Quòd si fluxus ex suppressa aliqua vacuatione suboriat, præter prouocationem antiquioris fluxus, eisdem omnino præsidijs iuxta morbi, & humoris rationem uti liberè poteris, sicut, & alijs plerisque, quæ apud barbaros experta habentur: quorum magnam siluam reperies apud Sauonarolam.

De mēstruorum suppressione.

Cap. 9.

C  MMVNES esse à menstrua purgatione fœminas, multis modis cõtingere posse, est cõpertum: quippe, aut ætatem nondum nactæ sunt cõuenientem, aut senectute iam contabuerunt, si quidem statutum habent menstruationis principium, & sp̄c̄ita vt nec antenertere, nec tardare salubriter alicui fœminarum datum sit. Item alijs, vt dictum est, menses deficiunt ex natua quadam structura huic vacuationi omnino inepta, licet familiaris, & genuina: plurimis, quia grauidæ factæ sunt, aut laboribus, ac ruralibus exercitijs deditæ, cõuenientem & superabundantem sanguinem conterunt, & consumunt. Alijs quidem menses supprimuntur morbois alicuius causæ interuentu, quæ morbo prius excitato in hoc symptoma prorumpit, à quo postmodum mille alia suboriri comperimus. Sed antequam ad peculiarem affectum huic capiti dicatum, descendam, opere prætium duxi docere, menstruam purgationem cum actio sit alicuius potentie, & partis, tot posse pati lesionum differentias, quot quæuis alia corporis pars. Nam aut ex toto aufertur uel diminuitur, aut

D 3 mille

A verò, cū vitiosum potius, & excrementosum sit, q̄ in quantò peccans, transmittere non laborat. Quò fit vt menstrua huiusmodi feminis omnino deficient. Alijs quoque non efflorescunt, si menstruis minantibus, aut erumpentibus, laborioso alicui totius corporis exercitio, vel alicuius partis se dederint. Veluti cantharicibus frequenti experimēto contigisse conspiciamus euocato ad superiores partes sanguine. Sicut alijs repulso, frigidi alicuius accessu, vt contingit ijs, quæ incauta viuēdi rōne seductæ erutum lanacris prædictis temporibus vtunt, aut se se pedibus manibusq; in aquā immergunt, vt sæpe mulierculis seruituti additis accidisse visum est. Quod etiam fieri ex timore, mæsticia; & alijs animi perturbationibus mihi non est dubium. Sicuti sanguinolentæ vacuationis interuentu, mō per hæmorrhoides, per nares, aut per os fiat. Idem quoq; efficit sūdor largus, aer calidus, & repentinus frigida potus, labor, & ea omnia; quæ vtcunque liccandi vel comprimendi corpus vim habent, velut febres, aut morbi alij acuti, sanguine densato, resolutio, vel nimis vsto efficiunt: pari rōnes res se habet in virginibus robustis exercitatis, & nimis calidis feminis in quibus, & superabundis, & vtilis ēt conterit sanguis. Sanguinis ēt fluxuri vitio suppressionē fieri, nemini dubiū arbitror. Fit aut huic purgationi ineptus dum crassus lentus, copiosus, aut paucior iusto efficitur. Præ crassitie. n. consueta vasa, ac foramina permeare nequit. Præ lentore moueri non potest, quia partibus, & venarum tunicis atq; oculis adhærens expultrici vel vehementer operanti resistit. Sic dum copia abundat, se ipsum impedit, vialq; præ plenitudine ad vasa recludit. Quò fit, vt permeare libere minime possit. Dū verò parce in uteri vasa congeritur, et si in toto corpore redundet (nā hic non loquimur de paucitate, quæ in toto corpore inest, sed de ea tñ, quæ in vtero reperitur) cū naturam non grauet; minime ad excretionē accingitur. Vt frequentissime contingit in splenis, iecoris, aut meserei obstructionibus, à quibus menses supprimuntur. Et ob id totum corpus pletoricum efficitur, etiam si præ sanguinis paucitate in vtero, menses ab eo non prosuant. Morbi quoq; qui vtero ipsi accidere solent, frequentissime mensium suppressioni causam præstāt. Quippe aut morbus fit in propria uteri substantia, aut ob eius intemperamentum, aut fit in vasis vteri per quæ sanguis purgatur. Quoad primum huius diuisionis membrum, constat Gal. 3. de sympt. cau. c. 8. & 5. Aphor. 28. optimè dixisse, cum referat difficulter purgari feminas quæ uteros habent densos, & duros, mō id à natura, mō ex casu proueniat. Sic temperatura frigida, aut sicca, vel ex his composita, facile in id vitium feminam defert: quod probauerat Hippo. li. de locis aqua, & aere. Pari prorsus ratione vteri vasa id vitium moluntur, dum aut nimis arcta sunt natura, vel aliqua occasione angustantur. Itaq; quæuis prædictarum causarum vterum disponere nata est propria vi, vt vel non suscipere, vel non transmittere possit. Non suscipit quidē ob venarum affectionē, modò ex frigore densentur prædictæ venæ: modo siccitate excaleant, & contrahantur. Vtcunq; in hæc cause operentur, ad meatus ipsos obstructos, aut compressos reducere, proculdubio æquum est: quos quidē inflammatio vteri, vel partium vicinarum comprimere nata est, obstruere vero, vel immodica sanguinis copia ibidē congesta, vel sanguis ipse crassius, aut humor alius viscidus, & crassus etiam osculis, & tunicis venarum adhærens, vt ex Gale. colligitur facile comm. 2. in lib. de Humoribus, & lib. 3. de sympt. cau.

c.4.& lib.de Differ.sym.c.vlumo,& lib.6.de lo.paten.c.4. Vteri verò inflammationem dupliciter hac in parte intelligere oportet, eam nimirum, quam mox diximus, tumorem videlicet durum, dolentem: aut inflammationem, hoc est, incensionem. Cuius latè meminit Hipp. lib. de natu. mulie. his verbis. Si uteri inflammati fuerint, menses omnino non prodeunt, aut prauis, & paucis; & cum ieiunia est, vomitus ipsam corripit, ubi uerò quid ederit, uomit cibos, & dolor inum ventrem, ac lumbos habet, & animi deliquium inuadit. Venter aut aliquando rit plenitudo illa, uacua fit. Quibus verbis, & alijs, quæ sequuntur, euidenter constat huius inflammationis Hipp. meminisse, non tumoris præter naturam. Præterea eandem suppressionem molitur uteri retractio, aut contorsio; uel deprauatus situs, qui aut ex morbo, aut partu superest, ut et ex Hipp. lib. de nat. mul. constare uidetur, & lib. de mor. mul. per hæc verba. Postquam igitur mulieri, quæ non peperit, occultati fuerint menses, & uiam foras reperire non potuerint, morbus fit. Hoc autem contingit, si uterorum os conclusum fuerit, aut distortum, aut aliqua pudendi pars contracta. Et paulò inferius subdens harum affectionum rationem, inquit. Fit autem hic morbus ijs maximè, quæ angustos uteros habet, aut ceruicem ultra pudendum sitam. Si. n. horum alterum fuerit, & mulier viro non miscetur, & venter magis quam oportet euacuetur, ab hac affectione uteri obtorquentur: nec. n. humidi in se ipsis sunt, utpote muliere non coeunte, & amplitudo ipsis spatiosa est, utpote cum venter magis uacuuus existat. Item addit paulò inferius. Hæc igitur causa est, ut ipsi sint conclusi, nimirum, à venere abstinente muliere. Quibus sanè causis altera accedit, uteri nimirum frigiditas, quæ ipsum & sanguinem spissum reddit, & expellentem facultatem languidam, & sui muneris oblitam. Dimitto consultò hac in parte idem uitiu[m] posse efficere induratas cicatrices, uteri pinguedinem, carnem supercrescentem, & pleraque alia, quæ Hipp. recenset lib. de nat. mul. & alibi sæpe.

Signa

Cum passim in feminis, quæ uiro utuntur, menses dum grauidè sunt, supprimantur quoque; diligenti cura expendendum est num uterus coeperit, an ex causis morbosis menses cohibiti existant, ne nobis usquam decipi turpiter accedat. Nec par est dignoscendi ratio in uirginibus, ac in reliquis: quippe in uirginibus suppressus sanguis per uenas errabundus uagatur, & eò magis obstructiones, febres, & coloris mutationes molitur. At in corruptis, in uterum frequentius irruit, quò fit, ut hydropes, & alia uterina mala, quæ paulò inferius recensebo suboriantur. Ex quo et prodiit prægnantes in cibi fastidium, nauseam, uomitum, picam, & reliquas uentris affectiones prolabi. Virgines uerò, licet eis menses supprimantur, minimè, aut rarò hæc patiuntur. Ratio proculdubio est, quia maior existit consensus ab utero ubi sanguis ille colligitur, ad uentriculum, cui propriè prædicta symptomata comperunt, quam ex uenoso genere, in quod irruit in uirginibus suppressus sanguis ad uentriculum ipsum. Et ob id prægnantibus illa accidunt, uirginibus uerò minimè. Sunt id monstrantia generalia signa non pauca: quorum primum docet Hipp. 5. Apho. 39. dicens. Si mulier, quæ neque concepit, neque peperit, lac habet, menses ei deficiunt. Cui coniecturæ accedit insolita corporis grauitas sine lacte in mammis, cibi fastidium, & horror inæqualis, dolor lumborum, colli, sincipitis ad oculum radices, præcipue si diu

A si diu suppressæ sint: febres et aliqñ lentæ, & tumores in utilibus inflammatorijs
 vrina quoque agrè redditur quibusdam, alijs omnino supprimitur, urinæ etiā
 nigricantes cum rubra sanie tanquam fuligini mixta, cum lotura carniū re-
 cens mactatarum. Quibus accidit lac in mammis frequenter repertum, iuxta
 Hipp. decretū. Ostendit adhuc clariū idem autor signa quædam lib. 1. de mul.
 morb. quibus certiores facti, possimus suppressionem ueram ab uteri gestatio-
 ne distinguere, & rursus prælagire quæ mala hac rōne ijs fæminis succrescere
 possint, inquit. n. Tertio mense incipit suffocationē sentire, & horrores, & lum-
 borum dolores qñq; etiam febrem. Quod si suppressio perseveret, præter hæc,
 obdurescit uenter, urina copiosior mingitur, cibi fastidium, & uigilia aduenit,
 ut et strideat dentibus. Et si adhuc retineatur, quinto mense his omnibus, & ma-
 ximè doloribus urgetur grauius. Sed sexto mense insanabilis morbus red di-
 tur, qui antea curari poterat. Et cum hoc anxia sit, & animo linq̃uitur, pituitam
 vomit, siti magna uexabitur, dolebunt partes uentris, & pectinis, febris accedet
 supprimenturq; excrementa alui, atq; uelicæ; spina dorsi dolore uexabitur, &
 quasi balbutiet. Post hæc aut intumescunt crura, pedes, venter, & urina minuit̃
 rubra, sanguineaq; & dolor totum occupat corpus, maximè collum, spinam, &
 inguina, atq; sic moriuntur, scilicet ex hydrope. Quam sanè sniam si quis sedula
 diligentia intueatur, multa perdisceat, quibus facillè conceptum à mensium sup-
 pressionem distinguet. Cum hoc tñ experimento frequentissimo nobis est cōper-
 tū, plures fæminas ex ijs, q̃ utero gerunt, oīno his simillima accidentia perpeti,
 ita ut q̃tūmuis diligens sit Medicus, id distinguere nequeat, præsertim si mulier
 ex ijs sit, quibus menstrua prædeunt feculenta, fetida, aut alia quauis deterriora
 qualitate sedata. Quod profecto rōni, & obseruationi innitentes haud rarò di-
 stinximus. Nā licet finitima sint utriusq; affectus accidentia, in ijs tñ, q̃ utero ge-
 runt, color uiuidus, qualè ipe sanitatis obtinere solebant, perseverat, hilares su-
 persunt fæminæ, & nihilo, aut q̃ parcellimè in animi conditionibus mutata. Cu-
 ius contrarium omnino in mensiū suppressione reperit̃. Itē dū fæmina utero ge-
 rit, ex prauis accidentibus ea, q̃ superueniunt, primis tñ mensibus durant, cre-
 scente verò fetu subsident omnia, & res apertius conspicitur. At in uera mensiū
 suppressione è contrario: nam primis mensibus nulla, aut q̃ leuissima acciden-
 tia insunt, procedente verò suppressione in immedicabile affectū (ut loco cita-
 to Hipp. testatur) & mortē sepe degenerat. In qua sanè suppressione præterea, q̃
 passim succrescere uisuntur mala, uerendū est ne id, qd lib. 1. de mor. mul. Hip.
 præfagit, aliqñ accidat. Inquit. n. Quibusdam suppurati sunt menses, ubi per
 duos, aut tres menses moram cōtraxerint. Hoc aut maximè fit, si à febre fuerint
 combusti: & subdit. Signa uerò sunt, si suppurati fuerint, dolores. n. incidunt in
 pectinē, & pulsationes fortes, & contactum non substinent. Qua sanè in re dixe-
 rat paulò superius, menstrua sex mensibus retenta curari non posse. Cognita igit̃
 tur suppressione, causas ad unguē nouisse tenemur, si recta medendi rōne uti
 uelimus. Sic primò uniuersum corpus huic affectioni consentire dignosces ex
 signis plenitudinis, quibus corpulentior, pulchrior, rubicundiorq; fæmina ap-
 parerit: si obesior iusto facta fuerit, uel si morbū diutinā perpeffa, uel in mediā:
 nā id ex interrogatione facillè innotescet. Malū quoq; corporis habitū uel solo
 intuitu cognosces, ut cōijcias sāguinis optimi defectū, suppressionis fuisse cau-
 sam.

*Causa-
rum di-
gnosco.*

sam. Externam frigiditatem, ex potu aquæ aut lauacris, vel frigido aere eadem A
 lege perdisces: sicut præcessisse copiam sanguinis vacuationem, sudorem, labo-
 rem, vel quamuis animi affectionem. Sanguinem esse crassum haud difficulter
 cognosces, si temporibus, quibus scēmina purgari assueuerat, labores, ac dolo-
 res in lumbis, ac partibus prope uterum persentiebat, cum hoc tamen parū ex-
 purgabatur. Aderit et corporis mollities, somnus grauis, & profundus, color cor-
 poris albicans cum uenis eminentibus, & uiridus, ac subnigris, præsertim quæ
 crura pertingunt. Pulsus is erit rarus, vrina aliquā multa, & tpe mēstruationis,
 aut pauca, aut suppressa, sæpe tenuissima. Aliquā colliquantur ex utero humi-
 ditates quædam crassæ, mucoribus per similes, præsertim, si tenacis humoris ali-
 quid sanguini adiungatur. Pituitosum uerò, melancholicum, uel alterius depraua-
 tæ conditionis humorē eò dignosces, quod pituitoso redundante, frigus ad
 fundum uteri ab ipsa percipitur, stupor, tardus mensium, & eorum albicantiū
 descensus, uenus neq; appetitur, neq; delectat. Cōmunia quoq; sunt melācho-
 lia signa, p̄ter fluore pituitæ: cōtraria uerò melācholiæ ex bilis uestione crassa-
 tæ: nā aderit ueneris appetentia, & celeris seminis excretio, labra sicca, ac sæpe B
 scissa, & mensiū fluor cum morfu, & erosione. Sanguis quoq; dum fluebat, aut
 secta nunc uena exceptus linteo, aut arena umbra siccatus, colore albedo pitui-
 tam, flauo bilē, fusco melācholicū humor significat. Quorū est sētia Hip. Mulie-
 ri menses decolores, neq; per idē sæpe tps uenientes purgationem indicāt esse
 necessariā. Cuius quidem rei si quis plura signa exquirat, reperiet facilē lib. nō-
 stro de præsidiorum indicatione in methodo dignoscendi. Multum tñ sangui-
 nis superesse cognosces extensione, dolore, totius uentris grauitate, ac lumborū
 quæ oīa euidenter attestantur, uterū multum sanguinis suscepisse, ita ut præ di-
 stensione, & grauitate cōprimi ad expulsionē non possit: potissimū si accedat si-
 tis, capitis, dolor grauius, splendore rubentes iuxta oculos, & sanguinis spō-
 ranei uomitus, aut fluxus per nares, quibus eadē affectio sæpe uel Hipp. testimo-
 nio lib. 5. Aphor. 32. subsistit, & monstrat. Parum sanguinis uterum susceperat
 multa sanē docet, primū, nulla uentris grauitas adest, neq; dolor, aut tumor, ita
 ut scēminæ nil in ea regione se persentire referant. est tñ totū corpus decolor, ie-
 cur obstructū, mētereon, uel splen, quorū uitio nihil in uterū cōfluit, qđ excerni C
 possit. Aderunt et in partibus superioribus uitiosæ plenitudinis signa, ut col-
 lor pallidus, subniger, uel alicuius humoris cū sanguine redundans specimē
 referens. Uterū esse cicatrice, aut carne aliqua supercrecente oclusum, uel cō-
 tortū, aut alia morbosa figura affectū, qđ præcesserunt ulcera, aut laboriosis par-
 tus, uel tumor aliquis præter naturā, qui præfuit, aut adhuc induratus uiget, euī-
 denter, facta interrogatione, monstrant. Obstructionē uel cōpressionē uasorū
 uteri haud difficulter cognosces ex defectu signorum, quæ hucusq; retulimus.
 Præsertim si tpe, quo natura assueuit menstrua promouere, dolores molesti, in-
 quietudines, & uterina alia accidentia succrescant. Quibus accedit leuiss. fabri-
 cula, à iunioribus alba appellata, capitis infestissimus dolor, præsertim prope
 sinciput, totius corporis contractio, & ueluti impotentia ad motū, ac si moueri
 scēminæ cogant, protinus lassitudine maxima corripuntur, dolet inter frys ca-
 put, & ipsa uehemēter pulsan, cibi fastidiū illis accedit, & animo frequētissimē
 delinquit. Verū quia uasa, quæ in uterū ocludi possunt, uaria sunt, uariūq;
 si tem

A situm obtinent, eius diuersitatis quoq; providentiam ediscere conuenit, ut tutior, certiorq; euadat curatio. In qua quidem rescito, si uasorum menstruis seruiendum obstructio sit, praedictis signis facile dignosci, uerum si obstructio uasa etiam spermatica attingat, uteri suffocationem sibi comitem habere mēstruorum retentionem. Si uero in orificijs cotylidonium minus damni utero eueniet, nili dum femina conceptura est. Nam vel non concipiet, vel facillimē alimenti defectu abortiet.

Ex quibus sit proculdubio, qd si hęc purgatio prater naturę institutū suppri- *Præsa-*
matur, mulieribus innumera accidentia, & grauissima mala succrescāt, ut Hip. *gium.*
testimonio probari potest lib. 5. Aphor. 57. cum scribit. Si menstrua plura fiant, accidunt morbi, & si nō fiant, ex utero morbi contingunt. Quorū malū qdā utero propria existunt, & pleraq; vniuerso corpori communia. Nā primō sterilis efficitur femina, itē uteri strangulatione vexatur, scirrhusō tumore ēt, canceris, erysipelate, & aquositate repletur, ac flatibus, & ulceribus prauis gtacliescunt
B prter modum. Item mulieres nonnullas in uiros degenerasse historijs esse proditū reperio. Cuius ēt Gal. meminit. lib. 3. 1. op. 29. Adde, partes, quę in cōsensum veniunt, caput primū, ut ex Hipp. constat. 6. Popu. 1. & oculi, & uentriculus, demū iecur, unde hydrops aliquando sequitur, & innumera alia mala, q nullis plerūq; auxilijs cedere uisuntur. Ut uteri suffocatio, nunc in latus, nunc ad superna ipsius peruersio, sēpissimē cum diutina est, indicat frigidā corporis cachexiam, q calorē extinguat. Hinc difficiles respirationes, tussēs, oculorum, capitis, & aliarum partium dolores, & in virginibus febris alba, & varię obstructionem sortes prodeunt. Praterca hanc affectionē esse curatu difficilem, cui dēti ratione constat, vel ex eo, qd uterū sanguinem menstruum ad se non trahat, quia sic mille rationibus prouidit natura. Atq; cum suscipere (cum vniuersum animantis corpus, vel eo abundat, vel nōscit profuturum esse, ac necessarium) tantum teneatur, deficit natura ab uteri ipsius ministerio, opere alioqui in omnibus actionibus necessario, quod praecedit oēm naturalem vacuationē. Et cum vacuare, quod suppressum est, in animo sit, deficiente uirtute tractoria mirum
C non est, si vacuationem difficulter moueamus, quia naturam non habemus ad miuiculantem, qd non trahat humorē, quem extrahere medicamentis nitimur. Nec credendum est oīno uerum esse Hipp. testimonium lib. de morb. mul. quo refert suppressionem ultra sex menses perstantem incurabilem esse. Nā id difficulter fieri potius quam impossibiliter est credendum, cum idem Hip. li. 4. pop. scripserit fuisse ancillam cui per septennium fuerant suppressa menstrua, tandem redeuntibus ipsis, ad pristinum statum restituta fuit.

Haud temerē huius effectus curationē aggredi oportet, nā sēpe tanti est momenti id ediscere, ut incautis mille in laborantibus succrescat accidentia, qd potius manufacta, qd ui morbi oborta esse credendum sit. Sic profectō ijs, quę laborant etiam si menses habeant suppressos, minimē auxiliares manus porriges. Nec ijs, quibus laboriosa uitę ratio innata est, quia ex suppressione nihil mali sentiunt: non tenetur uiuentibus: pinguib; a morbo diuturno confectis, neq; adhuc ijs, quibus enenit ante solitum tempus, quo natura ad excretionem sese componere afflucuit, neque uiraginibus, & alijs eiusdem census. Tūc uerō
prouo-

*Cura-
di ratio.*

prouocant potissimū, cū grauiā incidunt incōmoda, aut minant accidentia, qđ A
 lipothymia videlicet, vertigo, deiecta appetentia, tabes, fēdi colores, hydrops,
 difficilis respiratio, dorsi & lumborū dolorifica grauitas, articulorū cruciatus,
 nephritis, ventris tormina, & id genus alia ostēdunt. Quōd si iā curare tētaueris
 nō vt rudis plebecula, aperiētib. & incidētib. vt fors tulerit, aut vtcunq; ex talo
 sanguine misso, id obsecro facies, sed p causā, & morbi, quē excitant, dignitate
 & ratione: nam sic mihi non est dubium, quin optimē curationem moliaris.

*Si vitio
 totius cor
 poris.*

Primò quidē si ex corpore vniuerso vitium hoc oriri conspexeris, mox in me-
 moriā reuocabis obesas scēminas macrefacere, si velis menstrua prouocare, ex
 tenuatas impinguare, & optima viuendi rōne moderari; victu nimirum vberio-
 ri & optimi nutrimenti; sicut eas quoq; q̄ malo corporis habitu laborāt, in me-
 liorem commutare. Quā verò ex nimio exercitio hoc inalo affecta sunt fēmi-
 nae, quiete & otio ad munus naturae consuetum reuocandae sunt, tēperandae ve-
 rō, q̄ ex calore resolutae, & squalidae supersunt, aut frigidum & spissum habitū
 contraxerunt. Quo ēr attemperamento languidam expultricem in pristinū sta-
 tum reduces. Quōd si ex dolore auerti sanguinem ab vteri vijs contingat, protin-
 us ipsum mitigare opus est, ac si id non profuerit, vtere Hipp. consilio, qui lib.
 de nat. mul. haec refert verba. Si menses omnino non fiant, si quidem praē dolo-
 re id contingat, primum ventrē infra purgato, deinde medicamentū, à quo san-
 guis ex vteris purgatur, apponito. Postea intermissa die vna, aut altera, rursus
 id à quo sanguis purgatur, apponito. Reliquo verò tpe corticē crethimi in vino
 tritum bibat. At purgationem ex mercuriali esse summe proficiam, vt ex eius-
 dem testimonio constat, cenſeo. Verū si auersione ex repulſu à frigiditate am-
 bientis, vel retrocessu ex aliquo vehemēti animi affectu malum suboriat, om-
 ni ingenio menstruum sanguinē ad inferas sedes euocare oportet, frictionibus
 nimirum, vinctulis, lauacris, cucurbitulis; balneis, deambulationib. quibus po-
 tissimum vti conuenit dum sanguis vomitu, aut per nares excernitur, p̄sertimq;
 sanguine frequenter, sed in paruissima quantitate extracto p venarū tali sectio-
 nes, aut p scarificatas cucurbitulas. Quo casu localia vtero adhibere poteris, qua-
 lia paulō inferius recensēbo, q̄ & partes dilatent, & sanguinem ad vterū euo-
 cent, nisi ad anum fluxio sanguinis conuertat: eo. n. tpe, neq; trahentia, neq; topi-
 ca tutō adhibebis; oīa. n. non minus ad intestina, q̄ ad vterum trahere nata sunt.
 At si immodica sanguinis copia communes vias laedat, quominus liberē ad in-
 feras sedes permeare possit, sola sanguinis detractio sine alterius auxiliij ad-
 miniculo, menstruum ex hac causa suppressum euocabis: non quidem, ut vul-
 gariter fit, uenis tali protinus incis: nā ē duobus malis alterum faciliē subsequi
 est cōpertum, nimirū sanguine copiosius euocato, immodicam mensiū fluxio-
 nē; q̄ cohibere deinceps difficulter poteris, corpore ad partē scissā pellente to-
 tā plenitudinē, excitabis; aut maiorem obstructionē sistere subito sanguine ad
 obstructa uasa. Quamobrem consilium Gal. in mensium p̄uocatione prolatum
 quo praecipit uenas tali incidendas esse, non est intelligēdum p̄stante totius
 plenitudine. Cuius profectō rōne Aetiū dixisse cenſeo, internā cubiti uenā esse
 secandam in mensium prouocatione. Quam etiam sententiā Matthaeus de Gra-
 di protulerat. Itaque redundante in toto corpore sanguine, vt obstructionem

in

A in vtero, aut vicinis partibus efficiat, à distantissimis partibus ab ea, q̄ affecta est, aut obstructa, sanguinem reuellere, & euocare oportebit, vt Actij est consiliū. Verum redan tante sanguine in vtero ipso, aut in toto corpore pp vteri ipsius obstructionē, à venis tali sanguinē commodius extrahes, vt Gale. docuisse constat: quod sanē facies tribus quatuorve diebus ante prefinitum mēstruationis tēpus. At uerò sanguine sufficienter missō, & victu tenui instituto quātum sat sit, consule, fœminam modico vti exercitio, lenibus, sed longiusculis frictionibus vinculis, & alijs externis p̄sidijs, q̄ sanguinem ad inferas sedes euocare habent velut est viri etiā accessus, in nuptis. Docebo tñ paulò inferius nonnulla auxilia, q̄ huic vsui proficua erūt, qualis cucurbitula est, suris, femoribus, & coxis affixa, & scarificata. Maximè in albis, & crassioribus fœminis, in quibus vt Gal.

*Leur. ut. p. Sc.
mis. c. xi*

consultit promptius euocantur menses suris scarificatis, quam venis scillis. Quodd si sanguinis fluxuri vitio suppressio fiat, quale sit vitium primò distinguere oportet: nā si ad vterū non confluxerit, id profectò erit, vel quia aliò transfertur, vel quia corpus sanguine caret: vtrunque tñ corrigere antea docuimus.

*Si fiat
sanguis
nis vitio.*

B Verum superest in hoc caularū genere, plurimum sanguinis in vtero congregatū considerare, qui sanē p̄copia vterū ita distendit, vt comprimi ad expulsionē minimè possit. Qua qdē cū existente, nullum aliud utilius, neque tutius p̄sidiū adinuenies, q̄ copiosum sanguinem extrahere apertis malleolorum uenis. Memini me legisse apud Gal. curandam suscepisse fœminam, cui mēstrua iam diu defecerant, & nihil p̄stantibus alijs auxilijs, sanguine ex vena tali copiosè profuso sanitati restituisse, etiamsi ex carnis, & contabefacta primo accessu apparet. Quamobrē in huiusmodi fœminis sanguine, & per tali scissionē, & p scarificationē in femoribus, ac suris, extracto, mēstrua medicamentis prouocare, tutum & utile sepe existimaui esse p̄sidiū, dummodò calfacientia ualida nō sint, in hac uel in quouis crasso humore, nē nimis excoctus ac resiccatus humor fluxui ineptior reddatur. Quibus p̄missis, frictionibus, lanactis, frequentioribus balneis, & vinculis, ac motibus, sanguinem ad consuetū locū mouere oportebit. Pellarijs itē, & infersionibus vti tutò poteris, & modicis inunctionibus, ex oleo liliorum, alborum de semine lini, & amygdalarum dulciū. Ex quibus et tepentibus cum decocto mercurialis, matricariæ, & pulegij fomentum parare poteris, quod vtero adhibens, idem beneficium prestabis, p̄sertim si ex eadem decoctione euaporationē quoq; susceperit fœmina, quantum sat sit, ne vterus maiorem calorem moderato persentiat. Fugiendum porrò in hac cā est ab ijs medicamentis, q̄ menses vehementer mouere nata sunt: nam hæc plus sanguinis ad plenum uterum trahent, quā quodd ex eò qui ibidem continentur, excernant. Verum si rei ipsius necessitate ad id deuenire cogaris, vacuabis primò sufficienter, & vterum ipsum, & vniuersum corpus, ne eisdem medicamentis maior humorum copia ad vterum confluat, & pressius ipsum comprimat, quā par sit. Quod frequenter vsu venire solet.

C Verum. n. verò si sanguis tam is, qui in venis vtero proximis, q̄ qui in toto corporis ambitu cōtinetur, crassior, tenaciorq; factus fuerit, aut quouis alio vitio conspurcatus, ita ut fluxui ineptus fiat, ei qdē prouidendū est. Damnauerat, quippe Hipp. menses decolores. 5. Aphor. 36. dicens. Mulieri mēses decolores, neq; semper secundū idem tēpus venientes, purgatione indigere significat. Ex

*Si ex hu
more pi
tuitoso.*

qua

qua sententia sic infero rationem. Si menses, qui decolores fiunt ex adhaesu vel A
 miscella pituita, melancholia, aut flaua bilis crassioris, in hac suppressionis spe
 cie curari necessario debent expurganti medicamento, multò profectò rectius
 eandem erit curandi ratio, ubi ob eorundem humorum admixtionem suppri-
 muntur, siquidem eadem ferè est vtriusq; affectionis natura, saltem quatenus
 ad humoris conditionem pertinet. coq; ab eadem medendi methodo auspicari
 curationem opus erit. Quamobrem peculiarem oportet instituire curandi rō-
 nem iuxta ideam humoris, quem cum sanguine redundare cognouerimus. Sic
 pituitosus humor viscidus, & crassus existens, sanguini admixtus, cum eundem
 reddat fluxui ineptum, videndum profectò est, qualem in artifice requirat dili-
 gentiā, anteq̃ ad obstructionis curationem accedat. Inquit. n. Hipp. li. i. de mor-
 mul. Si uerò omnino nō procedunt prae morbo, aut crassi, & viscosi, aut gluti-
 nosi fiunt: primū igitur, ventrem purgare oportet sursum, ac deorsum, deinde
 vteros subductitio medicamento, à quo sanguis purgatur, atq; ita quiescere, &
 potandum dare pharmacum, à quo sanguis prodeat. Qua porrò methodo prae-
 habita, initium curationis sumere oportet. Primò igitur fœminae institues cali-
 dum, extenuantē, & incidentē victū, non plurimi nutrimenti: quē sumere, nus-
 quam fœminae concedatur prius, q̃ sese exercitio dederit. Utatur porrò auiū car-
 ne, praesertim montanarū, q̃ tenerā habeant substantiam, iusculis itē, calidis spe-
 ciebus, & aromatibus conditis. Bibat uinum odoratum, tenue, & sufficienter di-
 lutum aqua cinnamomi, corticum citri, capillorum ueneris, anisi, fœniculi, vel
 Indicæ saxifragiæ, aut ex radice chinæ decocta. Somno utatur parcissimo, exer-
 citio copiosiori. A cibo otiosa sit, ne quid crudum in maiora uasa transmittat.
 Quòd si huic causæ, totius quoq; frigiditas accesserit, à purgatione leui vniuer-
 sum corpus semel in die frictionibus concalfacies: à quibus in lecto quiescat, vel
 parū dormiat. Humore quoq; pituitosum (pmissis melle rosaceo, oxymelite,
 syrupo de radicibus sine aceto, uel cū ipso, si fœminæ uterus permiserit, de menta,
 de artemisia, de hyssopo, de pulegio, de origano, de calamintha, & id gen^o alijs,
 cum decoctis matricariæ, pulegij, fœniculi, apij, graminis, oreoselinij, asparagi,
 rusci, & rubi; quibus aliquid odoratum uel ex diacalamēto adijcere poteris.)
 purgabis primò, medulla casæ fistulæ dissoluta decocto chamædryos, glycyrrhize,
 vuarum passarum, polipodij, & adiati, pōdere. ʒ. j. Cui adde syrapi de ra-
 dicibus cū aceto. ʒ. j. Ex vsu ēt est agarici. ʒ. ij. zingiberis. ʒ. ij. Salis gēme. ʒ. ʒ. diluā-
 tur sero caprilo addita oxymelitis simplicis. ʒ. j. quibus p linteū mediocris cras-
 situdinis percolatis uti, ieiuno vētriculo poteris, exhibitis ex colatura. ʒ. iiij. & si
 iuris gallinæ. ʒ. iiij. uti ēt poteris vulgaribus medicamētis, ut agarico, turpeto, ele-
 ctario indo maiori, diaphenicone, & alijs huius cēsus, q̃ robustioribus fœminis,
 esse pficua cōperies. Ex pulpa casæ fistulæ, & ʒ. iiij. agarici, bolū vtiliter cōficiēs:
 quibus aliqñ nō citra maximā vtilitatē hieræ simplicis Gal. ʒ. ʒ. addere expediet.
 Eūdē vsū pstat pilulæ ex ʒ. iiij. agarici, & p̃dictæ hieræ. ʒ. j. cōfectæ. Quòd si vali-
 dioribus idigeas, fœtidis, de sagapeno, aggregatiuis, ac de agarico utaris, si fœmi-
 næ robur permiserit, aut suspicio de visceris alicuius calore nō adsit. Ad eūdem
 sanē vsū cōficere poteris tabellas, q̃ recipiūt rosarū rubearū, zingiberis, cinna-
 momi, an. ʒ. ij. santhalorū alborū, & rubeorū. an. ʒ. j. hermodactylorū. ʒ. iiij. turpe-
 ti. ʒ. iiij. & ʒ. diagridij, ʒ. j. masticis. ʒ. ʒ. sacchari li. j. dissoluāt oīa ī liquore stillatio-
 artē-

A artemisi r, & confice p̄dicto usui tabellas, quorum. 3. iij. summo manē porrigere poteris. Immunis facta sanguinis massa (ut aiunt) ab humoribus crassis, & uiscidis, tentandum est sensim, & paulatim ex uenis tali sanguinem extrahere, aut scarificatis cruribus, femoribusve. Quo facto, summa diligentia curandum est, residuum humoris paulatim in scindere, & extenuare, ut sanguis fluxibilior factus ad uterum descendat, per ipsumq; prolabatur: quod sanē ante purgationē & sanguinis detractionem, nefas esset. Parantur aut huiusmodi auxilia ex hydromelite confecto ex decocto cinnamomi, corticis cassie fistularis, croci, aristolochiae rotundae, calami odorati, corticis radicum capparorum, costi, dictamini, radicum tormentillae, radicum eringij, foliorum lauri, origani, polij, zingiberis, calamenti, thymi smirni, seminum rute syluestris, dauci, masturti, hyssopi, nigellae, anisi, & baccarū lauri, uel q̄ utilius uideatur ex aliquibus ex his. Ferunt quoq; brassica decoctum cum dulci uino haustū mulieribus menses ducere, & semen hortenlis apij cum uino albo potui datum, ac cepa cōmanducata cum uino, itē & raphanus cum melle comestus, idēq; fertur de satyria, feniculo, thymo, uel eius seminis decocto, & de rore et marino, & florum aridorū leucorij, decoctū mirū in modum prodelle ferunt, idēq; de decocto bellis hortenlis, & de semine urticae. Placuit hae oīa scribere, ut faciliē eligere possis, quae iuxta affecti corporis conditionem magis proficua esse cognoueris. Præter quae omnia (corpore purgato, & ante diamidium mensis) utilissimum est, uomitum aliquando mouere, maximē si uentriculus pituitae copiam praestiterit.

Quibus p̄missis rōni consonum est conijcere, uteri uasa ex p̄dicto humore obstructa esse, q̄ p̄fecto maiorem in artifice requirunt diligentia, ut qd̄ frequentius accidat, & difficilior curet. Primò itaq; p̄uidendū est in obstructione ex crasso, uel ex quouis alio humore aborta, sanguinis plenitudinē, q̄ in ijs subesse necessum est deponere iuxta eā, q̄ cognouerimus plenitudinē, apertis maleolorū uenis, qd̄ fieri p̄ partitas uices tutius, & cōmodius esse, q̄ semel, & confertim existimo. Sed docere hac in parte mihi est in animo, qua nā rōne sectiones p̄dictarum uenarum menses euocent, si quidem li. 2. ad Glau. c. 2. Galen. ab utero deriuare refert. Quā rationē securus li. 1. 3. meth. in uteri inflammatione eadē secare iubet. Sunt etenim diuersa deriuare ab utero, & p̄ ipsum purgare. Si quidē nihil aliud est, menses mouere, q̄ sanguinem ad uterum euocare, & repleri uteri uenas. At deriuare, tantū est inanire repletas uteri uenas, non p̄ iterum ipsum, sed per scissam uenam. Quae sanē opera, cum inter se contraria sint, harum uenarum sectiones efficere nequeunt. Ratio proculdubio stat in hoc, q̄ negari non pōt, quin uenae tali sectae sanguinē a supernis ad inferiores partes alliciant, qui non magis ad uterum, q̄ ad ani uenas dilabitur. Quo fit, ut et Gal. docuerit lib. de sanguinis missione, uenas crurium secare, si haemorrhoides, puocare uelimus. Quamobrē euocari ad inferas sedes sanguinem p̄ huiusmodi uenarum sectiones cōperies, quemadmodum utero existente pleno, ab eodē deriuare, ac saepe dum parum sanguinis, aut in utero, aut in corpore abundat, menses ipsos incipientes suppressere. Verū dū copiosior est, uel ibidē impactus, nō deriuat quidē, sed ad uterū reliquum sanguinē allicit, & praexistente mouet. Qui sanē motus nulli dubium est, quin per consuetā loca prorumpat, & menses appareant: nam inflammationes, in utero, uel in aliis uasculis, quae menstruationi

tionem destinata non sunt, uel in eisdem, sed summè plenis, fieri contingit. Et ob id talo scisso potius deriuationes, quàm mèsium prouocationes fiunt: licet modo dicto vtrumque fieri possit, seruata tamen præhabita lege.

*De ijs
quæ vic
rum pur
gant.*

Præterea hoc auxilio facto, ad repetitas purgationes te conferes; quas per epigrammā appellant, ex minori q̄tate eorum medicamentorum factas; q̄ superius retulimus. Præter quæ, eum vsū frequenter mihi præstiterūt pilulæ ex rubea tinctorum in puluerē redacta cum modico agarico, ita ut ex .3. j. agarici, & altera prædicti pulueris, formetur octo pilulæ: quarū singulis diebus duas porrigere oportebit. Alias item conficies ex chalybe præparato, & diacurcuma cum agarico, & pulueribus calamenti, thymi, & dauci, aut ex solo agarico, myrrha, & diacurcuma cum pulueribus aristolochiæ, corticis casia, & calami odorati. Quæ et vsū præstant confectæ ex eodē chalybe, & rubea tinctorū cū modico succo artemisiæ. Profunt quoq; mastichinæ cū pauco turpeto, ita ut ex .3. j. pilularū de mastiche, & 3. s. turpeti fiant sex pilulæ; additis puluisculis supradictis: quarum unā singulis diebus summo manè laborans denoret. Secundò poteris singulis diebus, tertio, uel quarto quoq; die, bolū huic vsui maximè proficuum præbere, qui conficitur ex diacartamo, diacurcuma, pōdere. 3. s. pulueris rubiæ. 3. ij. pulueris squinanti, nigellæ, & cinnamomi. an. 3. s. & cū modico syrupo de artemisia, conficiatur duo boli: quorū alter summo manè, alter verò sequenti die eadē hora sumatur, ac desuper bibat femina. 3. s. aquæ artemisiæ, uel graminis. 3. j. Consimilem medicamenti formā conficies ex cōserua rosarū persicarū cum modico agarici, uel ex theriaca, & modica cōserua, aut ex fermento, & saccharo; qđ probatum multis est. Item ex pulueribus sape dictis, & 3. ij. electarij diapheniconis, aut indi maioris, aut ex chalybe pparato, melle rosaceo, & p̄dictis pulueribus ad formā boli redactis. Probatissimi. n. commodi, & efficacis sunt pilulæ, q̄ cōficiuntur hac lege. Recip. aloes. 3. iij. cū succo sabinae forment pilulæ, xx. Ex quibus iij. immediatè ante prandium tertio quoque die porrigito. Quod si solidius medicamentum parare uelis, tabellas faciliè ex eisdē medicamentis, & alijs, quæ paulo inferiùs recensebo, cōficies cū aqua artemisiæ, & saccharo, q̄tū sit satis: post q̄ oīa exercitio utēdū est, quippe sola hac lege, prodesse poterunt citiùs. Sed utiliora, p̄iosioraq; multò, conficies pharmaca potui idonea: nā hæc, ut q̄ minùs in uētre immorentur, citiùs in affectū locū eunt, & p̄optiùs vsū p̄stant. Primū inter omnia obtinet locū agarici dilutum, tertio quoq; die exhibitū, factūq; ex aqua cinnamomi, rubiæ, & pimpinellæ cū modico croci. Nec minoris est usus is, qui conficitur ex hydromelite pparato ex aqua origani, calamenti, pulegij, & artemisiæ: q̄ postea bulliat cum. 3. j. & s. optimi turpeti: cuius, facta colatura, sumat. 3. iij. Eiusdē est efficacis decoctum radicū diureticarum, in quo, anteq̄ refrigeretur, maduerit per diē integrū radicis ireos uiridis. 3. j. cui facta colatura, adde pulueris sabinae, cinnamomi, squinanti, & betonicæ. an. 3. j. bulliant iterū oīa lento igne, & colentur. Cuius decocti summo manè. 3. ij. cū saccharo aut melle porriges. Cōficies faciliè aliā chimica arte p̄ instillationē in balneo mariæ extractā, ex pari uini, & aquæ q̄tate, q̄ lib. iij. cōpleat; quibus adde agaraci trochiscatū, turpeti optimi, & cartami. an. 3. iij. theriacē magnæ. 3. ij. artemisiā uirētis, & pimpinellā. an. m. j. radicū ireos, & ebuli. an. 3. j. radicū diureticarū. an. 3. vj. pulueris cinnamomi. 3. ij. cōtūdatur oīa, & per balneū mariæ

A maris instillatione: cuius instillationis cum iure pulli potriges. 3. j. aut. 3. j. & l. His itaq; medicamentis, & alijs, quæ passim reperies, & si prudens sis, effingere poteris, crassos viscidosq; humores, vel ex parte adhuc obstructa educere paulatim poteris. Quibus uti oportet per interualla, & repetitas vices, ne aut naturâ plus iusto defariges, aut eam medicamentis assuescere nimium cogas. Quod si & sanguinis missione, & his purgationibus usus fueris, nihilq; cum hoc prosis per pharmaca mentes ducentia, per lauacta, balnea, infusiones, suffitus, & pessaria tentandum est inceptum opus perficere. Quorum omnium seorsum meminisse, vtilissimum, & claritatis gratia necessarium esse duxi.

Itaq; inter vnâ, & aliam purgationem ex ijs, quas modò retulimus, pmissis ut aliquot (donec superflui humoris tum in uniuerso corporis ambitu, q̄ in ipso, utero contenti, aliquid excreuisse compertum habeamus) alijs auxilijs utendū esse consulit rei ratio, ut & humores expulsionem præparètur, & ad inferas sedes deuehantur, & meatus occlusi aperiant, laxentq; partes & huic ministerio propiores fiant. In quo sanè opere efficiendo nil commodius, q̄ ea medicamenta, q̄ mentes mouet comperies. Quorum vsus haud cuiq; cognitu facilis est. Licet enim mentes mouentia nuncupentur; non ob id credendum est, omnibus causis suppressionem efficientibus proficua esse, sed tñ, aut crasso sanguini, aut obstructo ob eandem causam utero. Et ob id Gal. inter medicamenta mentes mouentia retulit multa, quæ valenter siccant, ac vrinas mouent, non q̄ ea huic vsui sint proficua, sed quod obstructionibus auferendis sint idonea. Menses. n. mouentia calida, sed non valenter sicca esse oportet, ut Gal. refert. 5. Simpl. c. 21. & ideo omnibus alijs affectionibus nulli dubium est, quin maximum damnum sint allatura. Sed nequis intrepidè, & utcuq; adhuc cognita causa eis vtatur (nā multa sunt, q̄ cū ualde vrinas moueant, potius menses auertere adhuc fluentes, quā suppressos euocare nata sunt) nosse oportet, tres esse medicamentorum menses mouentium sortes oēs tñ mensibus mouendis idoneas; nō quidē eodē modo, neq; oēs omnibus suppressionibus, licet oīa essentia tenuitate, & calore magis fluxile sanguinem reddant, & uenarum oscula in uterum, & eius ceruicē delinientia patentiora efficiant, atq; expultricē ualorū uim ad consuetum munus lacessant, p̄terq̄ q̄ substantiæ quadam proprietate utero amica, & familiaria existunt. Inter quæ sanè mitiora quedam medicamenta reperiuntur, quæ vsui proficua tūc existunt, cū affectus minimè urget, ac fortasse quia plenius est corpus, & eo minus admittet ualentiora, q̄ & uentrem subuertunt, & febres excitant, exulcerantur uterum, si ipsi adhibeantur. Quo tpe, si plurimum necessitas urserit, umbilico, aut utero commodè abhibebis. Quamobrem, q̄ clementia sunt sola, & per se primo adhibebis. Quod si non sufficiant, ex ualentioribus addendū esse aliquid cōsulit medēdi ratio. Primi igitur generis medicamēta, q̄ clemēter menses mouere diximus, sunt ficus passæ, amygdalæ amaræ, ciccor rubrū, semē orobi, lupini, phascoli p̄cipuè rubri, lens, radix, graminis, & semen rusci, asparagi, pentaphili, adianthi utriusq; phyllitis, cichori, intybi, & omne rumicis genus, eupatoriū, brassica, malua, lactuca agrestis, hyperici folia, flores, semina, & oleū qd̄ ex his conficitur. Scdm̄ verò genus ea cōplectitur medicamenta, q̄ mediocriter menses mouet: qualia sunt radix, folia, flores, semina raphani, raphanitis, apij chere folij, porri, cæpe, cruce, nasturtij, gallitici, ocymi, alij, peoniæ utriusque

E

meli-

*Medicamenta
cuius men
ses mouentia*

*quæ mediocriter
mouent*

melisophili, petroselini, anethi, anisi, ameos, carui, dauci, feniculi, leuistici, lescos, saxifragie, betonica, mentha, leucioioru, capparis, radix ireos, rubie, aristolochie, geticane, enule, asphodeli, ervngii, absinthii, ite abrotonu, artemisia, calamintha, poliu, organu, pulegiu, pliu, asaru, satureia, hyllop, serpyllu maiorana stachis, coniza, seliordiū, marrubiū, cham edris, cham epitys, mercurialis, anemone, vrtica, tlaphi, ruta sicca flores sambuci, chamemelli, cariophylli, styphas, et crocus. Cuius et naturae sunt semina predictorum, & lythospermi, lolij, melanthij, lauri, & iuniperi. Itē iuncus odorat, calam aromatic, anisomū, cinnamomū, cardamomū, casia, xylobal samū, spica nardi, costus, cypēus, asaru, zingiber, galaga, nux muscata, piper, cubeba, moschus, ambra, castoreum, vnguis odoratus, & egyptis, bitumē, sul, nitrū, sulphur, aloes, & ex ipsa hiera Russi. myrrha, & ex ea trochisci: styrax, cetaurū, opopanax, ammoniacū, sagapenū galbanū. Quorū minore dosē, q̄ Aetius propinat, adhibenda esse cenfeo: nam praeberet ferē. 5. j. Cuius et census sunt pillulae montagnanae, quae recipiūt seminis apij, casiae lignae. an. 3. f. musci. gr. xv. trochiscorum de myrrha. 3. j. & scum succo apij formentur pillulae. Tertium, & vltimum genus horum pharmacōrū (quorum. 3. j. cum cyatho B vno aquae pimpinellae, vel alterius, exhibenda est) ea complectitur, quae valēter mouere menses nata sunt, ut est elleborus vterq; (cuius non. 3. sed minimum, & non ex substantia exhibendum est) pyretrum, brionia, ciclamini radix, atq; cum cumis agrestis, turbith, staphys, agira, sinapis, siliquastrū, colocynthis, thymelea, thymalorū genera, scammonium, eupatorium, cantharides, fella. Eiusdē quoque naturae est theriaca, & trisera magna sine opio, & diacalamynthes. Verum cauere oportet, ne eorum 3. illam indistinctē porrigamus, sed vel in maxima aquae quantitate projectā, cuius aquae pusillū exhibeatur, vel eorū minori do si primò exhibita. Ferunt etiā alijs cum oleo de spica tritis, & in raram linteolū oblongi facili mō conformatum intrusis, ac in vuluam profundē pulsīs, & dū licebit exclusis, menses cessantes moueri poterūt, & vterū mira voluptatē refici, ac repurgari, adeo ut hinc facta sit vis nonnullis ad conceptum longo tēpore desperatū. Ex quibus varias medicamentorum formas faciliē eligere poteris admixtis tenuioribus, si crassus fuerit humor, & calidioribus, si frigidus, aut e contra, si fors tulerit. Quae oīa recipiuntur per os, aut per collum vteri, per os quidē epota, deuorata, aut in puluerē redacta: per vteri collum, glande, pessō, metrachita, suffitu. Quae porro noctu non sunt in vtero dimittenda, aut in ipsius collo, ne phlegmonein, aut febrem excitent, vel exulcerent partem ipsam.

Redeūtes igitur ad pensū, dū materia frigida est, crassa, atq; obstuēs, primo à predictis euacuationibus, apozemata porrigere oportet, q̄ huic vsui hac lege cōficiēs, ex aqua nimirū mulla, ex decocto rubiae tinctorū, aut calaminthae cum syrupō de artemisia cōposito. Itē confert syrupis idē cum decocto dictami alari, & pulegij. Praestat quoq; apozema, qd recipit calaminthae, artemisiae, pulegij, thymi, an. m. f. acori. f. croci. 3. j. bulliat in lib. vj. aquae ad consumptionem tertiae partis, residuū colet, cui addē mellis. 3. iij. & rursus bulliat, donec totā euomuerit spumam, cuius decocti bibat. 3. vj. cōfert itē myrrhae. 3. j. cum aqua mulla, aut castorei. 3. f. cū aqua origani, & pulegij. Itē decoctum sabine cum melle, ceterum in parua copia asari, & an aut iridis decoctū. Sumito deinceps, si plura perdiscere volueris, ex ijs, q̄ in primo genere menses mouere diximus, q̄ magis

calentes
menses mouen
tia

Apoze
mata.

gis placuerint, coquito secundū artē, & facta colatura cum leui expressione, ad de ex aromatis, quod sat fuerit, & iterū cum modico melle, & saccharo syrupū solūtū dilutionē cōficiēs. Et eadē methodo, si diuturnior fuerit suppressio, parabis ex ijs, q̄ in secundo, aut tertio genere cōtineri diximus: quibus addere poteris ex syrupis supradictis aliquē. Cuius census multa pharmaca reperies apud probatissimos auctores, veluti est illud, qd recipit instillationis ex raphano, folijs eius, & pimpinellæ. ʒ. iij. cassiæ lignæ subtiliter puluerizata. ʒ. j. croci g. iij. sacchari. ʒ. j. Decoctum itē ligni Indici cum dictamo. Quod si eadē vino maccetur, & reliqua quæ diximus, non minoris supererit res cōmodi. Sic decoctum modicæ sabinae cū artemisia, & pimpinella, & modico cinnamomo. Vinum ē Hippocratiæ appellatum p̄stat ex vino albo, vel fuluo cōfectum, dilutum in aqua graminis, vel asparagi, apij, petroselini, aut decocto eryngiorum. Præter quos potus, alter ē paratū eo artificio, quo citius, & tutius possint menses moveri. Recipit autē radicū diureticarum in aceto prius tēperatum, an. ʒ. j. radicis rubicū unctorum. ʒ. iij. sabinae, nepetæ. ʒ. iij. pulegij, artemisiæ, an. m. l. petroselini, feniculi, apij, an. ʒ. j. seminis endiuie, portulacæ, cucutbite, melonum, an. ʒ. j. & filiorum cordialium, genistæ, anthos, ana. p. l. decoquant ad lib. j. & colaturæ adde mellis, aut sacchari, si biliosa sit fœmina, quantum sit satis, vt fiat zupapum. Itē succus raphani sylvestris extractus cum vino infusionis asari menses mouere fert. Sicut syrupus, q̄ recipit rubiæ tinctorū sabinae. ʒ. iij. artemisiæ. m. l. radicū feniculi, & acori, nu. iij. schinanthi, anisi, & pulegij, an. ʒ. j. gariophyllorū, mellissæ, buglossæ, an. ʒ. iij. cyperi, galangæ, calami aromatici, & feniculi, an. ʒ. iij. mellis passularum. ʒ. iij. cinnamomi. ʒ. j. fiat secundū artē decoctio, & cum melle, & saccharo potui det. P̄nefacit ē decoctum apij, acori, spicæ nardi, iunci odorati, mercurialis, carpesiarum cum saccharo sumptū. Itē acori decoctum cū vino albo veteri, vel decoctū cumini, feniculi, oreoselini, dauci, amii, & ciccrum. Verū q̄a eo sepe deuenire solet huius affectionis renitentia, & p̄uacacitas, vt ne validissima quidē auxilia sufficere queant: necessum subinde est aliquot excogitare, q̄ extra semina dānum maius beneficium prestare possint. Cuius fortis esse credunt chimi cæ instillationes, quas gustui esse gratiores, & ceteris longē vtilioris existimo. Atq; inter plurimas, q̄ ex viridib. herbis, aut siccis, sed decocto aliquo infusis melle addito fieri possunt, q̄ maximē mihi p̄batissima cēset, ea est, quæ ex pane ferē ad fermenti naturā redactō, & mediocriter cocto, & calido cōcitur: cui ablato cortice, mellis. ʒ. xij. addantur, pulueris seminis vrticæ, dauci, ameos, anisi, & feniculi. an. ʒ. j. trochiscorū galliæ muscatæ, myrrhæ, rubiæ an. ʒ. j. cotulæ setidæ. ʒ. i. Quæ oīa infundes in lib. iij. infra scriptæ decoctionis q̄ recipit phascolorum rubrorū, ciccrum rubrorū, an. p. l. seminis iuniperi. ʒ. j. radicū rubiæ, ruscij, raphani sylvestris, asparagi, apij, & oreoselini, an. ʒ. iij. chamædreos recentis. m. j. ameos, anisi, feniculi, an. ʒ. iij. Coquito oīa secundum artē) deinceps in balneo mariæ stillatium liquorem extrahes: cuius ʒ. ij. summo manē laboranti porriges, addito syrupi capillorum veneris, & acetosi de duab. radicib. vel sine aceto, vel violarum, an. ʒ. i. Quod profectō p̄sidium maximi momenti esse censco, præsertim si fœmina parum ante sese exercitio dederit: quo medicamento sumpto lenta etiā deambulatione vtatur, & sequenti die maiorem ingerat quantitatem, si ventriculus alterari non persenserit.

E 2 Verūm

*Trochi-
sci pul-
ueres, &
electaria*

Verum ne eisdem medicamentis tedium foeminis parare videaris, & ne etiā
vni remodiorum generi natura assuescat, ac ideo contemnat, immutare eadem
opportunitum apud viros in hac repositos est consilium, Quapropter ex pulue-
ribus, ac electarijs trochiscos, & bolos conficere poteris: quæ, & æquæ utilia, &
minus gustui ingrata sæpe existunt. Inter quæ sanè medicamenta probatū repe-
ries præsidium ex trochiscis de gallia muscata cum aliquo ex supradictis pulue-
ribus. 3. j. Item. 3. j. trochiscorum de myrrha cum aliquo ex prædictis potibus,
aut aqua pimpinellæ. Consimilem obtinet vim fermentū magnitudine autella-
næ singulis diebus sumptum: q̄ cū saccharo adhibendū esse cenſeo, addito mo-
dico croco, aut quouis alio ex p̄dictis pulueribus. Itē. 3. j. & scakuninte tenuissi-
mæ cū mellis despumati coelearijs tribus. Idem beneficium præstant trochisci
ex rubia, ex corula foetida, ex sagapeno, de rasura eboris, cornu cerui, & alijs, q̄
ex prædictis simplicibus confici possunt. Itē vti poteris trisera magna sine opio
cū modico vino, theriaca magna, & mithridato. Placentulas quoq; cōficies, aut
rotulas ex supradictis pulueribus, aquis, & saccharo. Præterea incredibili qua-
dā efficacia prodest hieræ simplicis Galeni. 3. sex qua formentur duæ pillulæ, B
q̄ cum decocto sabinae, vel pimpinellæ tertio aut quarto quoq; die sumatur. Cō-
fert & mel, quod ex electarijs de corticibus arantiorum exprimitur eū puluere
cinnamomi, vel cassiæ fistularis, calami aromatici, laccæ, eringij, vel smyrnij. Pro-
batā ēt apud viros doctos reperies mixturā, q̄ recipit myrrhæ, calamenti mōta-
ni. an. 3. iij. medullæ fistularum. 3. ij. rutæ viridis. 3. ij. sabinae. 3. f. ex omnibus cō-
tulis cum sufficiente mellis q̄tate fiet confectio, cuius dosis sit 3. l. cū aqua pim-
pinellæ. Cui quoq; vsui pillulas conficere poteris, q̄ valenter menses mouere
nate sunt, & recipiunt, musci, myrrhæ, an. 3. ij. stachados, rubæ tinctorum, pu-
legij, corticū citri, piperis longi, corticis cassiæ lignæ, granorū peoniae, calami
aromatici. an. 3. iij. spicæ nardi. 3. j. cū aqua artemisiæ fiant pillulæ. ii. vij. p̄ drach-
mate, cui⁹ q̄tatis sit hebdomada. 3. j. vel tertio quoq; die. 3. j. Præstat ēt opopana-
cis, aut sagapeni, myrrhæ, aut castorei. 3. j. Cui⁹ ego q̄tate, p̄ferū castorei mi-
nuere, & cū succo rosaceo efformato bolo, p̄bere. Præter q̄ omnia reperies, à vi-
ris doctis pastillos huic vsui probatos, qui recipiunt seminis feniçoli, danci, fe-
selij. an. 3. j. cinnamomi, acaciæ. an. 3. l. feninum melonē, aut eucumeris. 3. f. si sac-
chari dissoluti in aqua mellisophilæ, aut capillorum ueneris, q̄tum sat sit, vt for-
mentur pestilli, quibus foemina utatur eū aqua multa. Ad q̄ ēt medicamentorū
fortem reducit electarium, q̄ ex chalybē præparato conficitur, tanq̄ peculiare
huius affectus beneficium. Est ēt non minoris momenti, si pastinacē cōditur
cum melle addito pipere, zinzibere, & gariophyllis: ex quo mel e accipiat labo-
rans. 3. ij. cum. 3. j. pulueris cinnamomi. Maturo equidē consilio opus est ad vten-
dum ijs, & prædictis p̄ harniacis, nam primò fugiendum est à sudoris prouoca-
tione, qui haud d̄fficultè hui⁹ auxilijs moueri solet. Distrahes. n. eò magis san-
guinem, & menstrua forasse supprimes potius q̄ euocabis. Itē hæc eadem phar-
maca dum indistinctè adhiberi cōtingit, frequentissimè in maiores affectus, q̄
fit mensium suppressio, foeminas conijcere solent. Calida nanq; sunt omnia, &
sicca: ob idq; potibus uti potius, q̄ siccis, & solidis semper arrisit mihi magis.

*Fomen-
ta, & in
señones*

Verum, quia non sat est medicamenta ea adhibere, quæ aduersus causam af-
fectus pugnent, nisi affectum ipsum oppugnauerimus, & corpus ēt, vterq; flu-
xui,

A xui, quem intendimus, præparatum habeamus: ob id profectò necessum esse duximus ea remedia excogitare, quæ præterquam quod vsui sunt communia, causam quoque elidunt, & corpus peculiari ratione præparant. Qua in re primum obtinent locū fomenta, & infusiones, quæ manè ventriculo ieiunio adhibenda sunt: ac præsertim circiter dies octo ante tempus purgationi statutum. Primum igitur utile est, si infideat femina vsque ad vmbilicum in decocto artemisiæ, polij, pulegij, & origani. Item partes illas aqua tepida fauere oportet, vel decocto maluarum, & liliorum, & aliarum rerum, quæ vim habent dissoluendi, & extenuandi crassâ, venasque dilatandi, velut est decoctum chamæmali, artemisiæ, mentastri, sabina, origani, calamenthi, apiastri, pulegij, mercurialis, oeymi, & foliorum sambuci. Quod quidem decoctum conficies sumptis singulorum. m. j. artemisiæ. m. ii. radice valerianæ lib. i. Quibus cōtullis (dempta artemisiâ, quæ seorsum in sacculo includatur) & ex arte coctis, fomentum varijs modis parabis, modò ex spongia, modò ex vesica, aut sacculo aliquo ex eisdem rebus confecto, & in prædicto decocto madefacto, vinoque irrorato, atque vter regioni, necnon pudendo adhibito. Cuius etiam decocti vaporem suscipere per infundibulum poterit femina, vel decoctionis sabina, ruberæ, acori, & calamethi. Cui et vsui vel fomentum, vel enaporationes cōficere licebit aqua calida spōte ex sulphure nascēti, quæ in hac re maximi esse momēti censeo. Foudus quoq; uterus est odoratis fōmētis, maiorana nimirum, serpyllo, calaminta, chamæmelo, pulegio, artemisiâ, radice iridis, & similibus in olla decoctis. Confert itē pedes aqua calida immergere, quippe quæ sanguinem deorsum trahit, & ora vasorum aperit, & corpus totum doctissimorum sententia emollefcit.

Si qñ vsū aliquem aromatum suffitus in prouocandis mensibus habet, in ea potissimū habet causa, de qua modò disserimus, nimirū vbi ex obstructione vel nimia humorū crassorum redundantia uterus non purgatur: quippe in alijs aut nocet, aut nihil prodest. Qua propter cognita, quā prædiximus causæ, capite a suffitus contactu satis præmunito, eū suscipere oportet; nam, & vias referat, & crassos ac viscidos, & tenaces humores attenuat, atq; fundit. Quæ sanè opera suffitus posse efficere, ex Hipp. 5. Apho. 28. euidenter cōstare vñ. Tria nanq; comoda ex aromatum suffitu annumerat in commentario Gal. Attenuant quidem crassâ, & dissēcant lentâ, ex quibus sūt obstructiones, & aperiunt oscula venarum. Calidum enim cū dissoluat, manifestum est, quomodo attenuet crassâ: sic cum verò cum diuidat, apparet quomodo lentâ extenuet atq; inscindat. Aperit tñ ore venarum, primò excitando ad motū sanguinem; nam feruescens cum impetu fertur, & dū in vapores sanguinē vertit, vapor ipse penetrat, & aperit. Sed & opus id magis facit, quoniâ oscula illa bifariam cōeunt, & sponte nimirū, & vi ipsa continente glutine quodam, & sic calor trifariam aperit ora venarū, virtutem laxando, & liquando gluten, contrahendoq; substantiâ venarū, quæ breuior facta cogitur diuelli, vt sic septē in vniuersum modis calida venarum ora aperiant, & sanguinem fluere faciant. Quodd si cū his adsit acere aliquod medicamentum, vno quidē modo imminuta substantia, altero, excitato impetu facultatis, maiores sūt effectus. Probauit autē Hipp. hanc sententiam, & expressit qualia sint huic vsui aromata lib. de nat. mul. Ea verò triplici genere continentur, quædā enim sunt, quæ bene olent, suffita non olent, vt violæ, de quibus Hipp.

*Idē bene
ficiū præ
stat: si pa
rū ante
aut post
femina
ligatus se
iunxit
se mori
bus aut
poplitib.
incedat.
Aromatu
suffitus.*

E 3 non

non intelligit p̄dicta sn̄a. Alia suffita olēt, nō suffita ē t nō oleūt, vt succinū. Quē A
dā rursus vtroq; modo, vt lignum aloes. Quorum omniū confusa oratione me-
minit Hipp. loco nuper citato. Inter quā recensentur thymbra, aristolochia, ca-
storeum, adiantum, dracontium, peucedanū, apij, & sū nīculi semen, rutę folia,
& semen. Alibi tñ annumerat cyperum, iuncum rotundum, odoratum, calamū
aromaticum, nigellam, lisy mbriū, anisum, & cinnamomum. Quibus addi pos-
sunt myrrha, styrax, galbanū, thus, bdelliū, radix aristolochiæ, artemisia gario-
phyllus, ciberū, moschus, trochiscus de gallia muscata, de opopanace, de sagape-
no, de myrrha, & de sabina. Ex quorum omniū sylua facile tibi erit vel simplex
aliquod medicamentū huic vsui proficiū eligere, vel ex varijs conficere sum-
ptis pulueribus cum gummi, myrrha, styrace, aut alio tenaciori pharmaco: ex
quibus pilas cōficiēs, quarū vna super prunas iniecta, suffumigium præstabit.

*Pess., &
miscellio-
nes.*

Quod si neq; his omnibus debita ratione, & occasione factis, affectio cedere
videatur, accedendū est tunc ad pessaria, & metrachitis: quibus sanē maxima
cum cautione vtī oportebit, nā, & ex ulcerationes in vtero, & validas distempe-
ries, & alia non contemnenda mala passim inferre solent. Conficiuntur autē pes-
saria duobus modis, quā videlicet tantū os vuluæ attingant, nascalia appella-
ta, & quā sese penitus inserant. Nascalia præsidium virginibus est vtile, & ne-
cessariū, nā illā reliquū abhorrent. Paratur verō nascalia puluere aliquo ex ijs,
quos mox referā, bombace excepto, & osculo pudendi adhibito. Pessus porrō
est medicamenti genus, quod in collū matricis inditum suppressos menses mo-
uere natū est. Constat quidem figura terete, longitudine .iij. digitorum, & crassi-
tie digiti vnus, plus minusve prout prudētī medico visū fuerit, est sanē nuptis
vtile præsidium. Fit autē multis modis: primo, ex liquore aliquo glandis forma,
melle aut cera coactū. Fieri quoq; possūt, si receperis mellis cocti. 3. j. cui circū
adde hieræ picræ. 3. ij. euphorbij in puluerem redacti. g. iij. misce, & fiat pessus.
Ex radice quoq; rubrę probē cōficitur iniūcto melle, aut felle, & sparsis nigellę
puluisculis. Quibus oib. aliquid odoratum velut galliæ, musci vel ambre adde-
re oportet. Cōficiēs quoque, ex melle, aut cera additis pulueribus radicis, ireos,
acori, asphodeli, cyperi, caparrorū, aristolochiæ, rubiæ, foliorū abrotoni, arte-
misiæ, absinthij, calaminthę, hyssopi, prasij, sabina, nigellę, baccarū lauri, semi-
nis anisi, vrticæ, & trochiscorū de myrrha. Quę quoque vsum præstant pessī, &
medulla ceruina inuoluta linteo mundo, & apposita: vel ex mercuriali, & tere-
benthina cū modico agarico. Prodest, & succus ciclamini vētri illitus. Fieri ē
possūt hęc auxilia ex styrace, laudano, galbano, sagapeno, ammoniaco, bdellio,
& similib. Quib⁹, vt valētiora fiāt, addi ēt pōt. 3. j. aut. g. x. pulpæ colocintidis, scā
monei, aut radicis vrticæ. Alios itē pessōs, quos maximi esse momēti scio, confi-
ciēs, si receperis fellis hirci, aut vaccæ. 3. j. asari, agaria, cinnamomi an. 5. j. succi
mercurialis. 3. j. coquat succus cū pauco melle, & simul incorporata reducantur
in formā vnguētī, ex quo pessū cōfice. Itē alios cōficiēs, p̄sertim pituita reduā-
te, ex triferā magna sine opio, ex theriaca, castoreo cū prædictis pulueribus, aut
alijs eiusdē farinæ, addito pipere, terebintha, vel resina. Quos pessōs, filio liga-
bis, neque per integrā horā ibidē morari fines, ne aliquod ex suprā dictis ma-
lis fortē accadat. Fiet identidē pessus admodum vtilis ex modico mercurialis tri-
tæ, & hiera simplici, & mithridato, cum granis aliquot moschi. Conficiēs tamē
alium

B

C

A Alium pessum hoc mō, recipe radicis ireos, ciclaminis, an. ʒ. j. mirrhæ electæ, castorei, an. ʒ. j. seminis rutæ, melanthij, an. ʒ. i. ex quibus fiat puluis, q̄ terebenthina exceptus, in pessum degeneret. Ex radicibus et̄ tapfi, maluæ, althææ, iridis, apij, enulæ, feniculi, & alijs cōsimilē habētibus virtutē purgatis a superficie, & illitis oleo liliorū, iasminorū, costino, euphorbij, uel cui incoctæ sint res menstrua mouentes, addito vino, & additis et̄ pulueribus nuper dictis, pessos parare poteris, radices aut̄ primò modicè calfacito, vt emollescant. Ex quibus oib̄s pessū, q̄ tutiores sunt linteo quod ī tenui indui debēt, vteris vires medicamenti suscipiat, acrimoniā tñ, ac mordacitatē minimè degustet. Sed vsui, pficuos quoq; parabis hac lege, resinæ, ʒ. i. myrrhæ, ʒ. j. croci, ʒ. i. styracis, & galbani, vtriusq; ʒ. i. mellis, ʒ. j. scū coto, aut lana carpta fit pessū. Vel fiat ex melle, myrrhæ, & succo absinthij, belzoino, & oleo irino. Possunt tñ parari faciliores ex ficu arida ad formā digiti extensa, iniuncta, madida, aut mixta aliquo ex p̄dictis medicamentis, uel ex felle, aut succo aliquo. Velim tñ huius loci lectores monitos, ne indistinctē ijs, q̄ diximus, vtant medicamentis: nā cūm vteri natura sua sponte facillè ob loci calorē, & excrementa, distēperie cōtrahat, exulcerationes, & alia mala necessū est subsequant̄. Cuius gratia summa rei erit mucilagine, aut succo aliquo tēperatos in vterū immittere, ut eorū uis, & acrimonia aliquo mō frenet̄. Nā quātū calida medicamēta mucilaginis, & blandis medicamētis retundūtur, tñ eadē mucilagine vterus emollit̄, p̄paraturq; & oculi nē, & mitiori adhibito medicamēto facilius cedat, laxeturq; aut ad expellendū irriter̄. Modus tñ vtendi his pessulis est, à leuioribus initiū sumere, q̄ fiunt ex anserino, seu gallinaceo adipe, saccharo ruheo, & pauco croco. Post modū deuenies ad eos, q̄ fiāt ex mercuriali, seu artemisia, ex pullegio, ex maiorana, ex ruta, & sabina. Quibus p̄missis, si vltus poposcrit, ad aciores puenire poteris sensim, & gradatim. Nascalia uerò ex eisde parari possunt medicamētis, gollipio, lana, cera, resina, aut ficu aliqua exceptis, & pudendi osculo adhibitis. At vterinos clysteres degustare virgines fas nō est: caue re. n. oportet eas ab huiusmodi p̄sidio, verum in alijs sex minis mille modis parari possunt. Primò, ex succo mercurialis depurato, uel ex decocto rubiæ tinctorū, origani, uel radicum aperitiuarū, saluæ, murticariæ, nepetæ, quātitate, ii. ʒ. addita, ʒ. i. pulueris melanthij. Itē parari pōt ex oleo liiaceo, chamæmelino, laurino, cū decocto calaminthæ, & origani, additis myrrhæ, & croco, cū oleo de styrace. Cui vsui cōsimiles parare poteris factō decocto ex ijs, q̄ sepius hucusque memorauimus. Ceterum hoc p̄ oculis habeto in ijs, q̄ in vterū infundant̄, ne diu ibidē immorent̄: sed pessū post vnam, aut duas aut̄ t̄r horas, iniectiones verò, post duas, aut t̄res. Mox verò vterum diluere oportet aqua graminis, uel apij, asparagi, petroselinij, aut decocto eryngiorum. Mhi tñ arisit magis maluarum decoctum: nam cum ardor vteri collo, aut uterō ipsi facillè concitetur ex acrim medicamentorū adh̄ esu, mitigare id procul dubio teneris butyro recenti infuso, oleo rosaceo, aut cetario refrigerante Gal. vel lacte, aut hordei cremore, uel aqua hordei mediocriter calida editis maluis. Profunt, & idonea existūt mēlibus mouēdis vterina clysteria, q̄ hac forma uel simili cōficiet̄. Re. roris marini, thymi, valerianæ, sabine an. m. j. sampluchi, smyrnij, feniculi, an. m. dimidiū, fiat decoctū, cuius sume ʒ. i. iij. styracis ʒ. j. catholici, ʒ. i. dissolue, & p̄pe somnū infundito. Vel si magis placuerit, recipe radicū aperie-

tium, rubæ maioris. an. 3. j. radiciſ eringij, cyclaminis. an. 3. ſ. mercurialis. m. j. ſa-
binæ parum, ſpicæ vtriuſq; aſſeri. an. 3. ij. ſeminis melanthij. 3. ij. ſ. facta coctio-
ne infunde in vterum cum modico vino. 7. iij. Quod ſi abſtergere volueris, hiſ
addes lupinorum vel fabarum. an. 3. ij.

*Externis
anſuſio-
nes.*

Verum quia hiſ oĩbus adhibitis renititur adhuc rebellis affectio: vltimam ei
adhibere manum oportet inunctionibus, & vnguentis, q̃ exterius adhibita præ-
dictis auxilijs opitulentur. Inunctiones quidẽ facito ex oleo liliorum, de caſto-
reo, ex ſucco angelicæ, ex oleo anethi, baccarum lauri, de croco, de vitellis ouo-
rũ, de capparibus. Ex quibus cũ cera, croco, & aliquo ex prædictis pulueribus,
vel theriaca, facilẽ poſſunt vnguenta confici, q̃ huic vſui proficua eſſe comperi-
mus: quibus oĩbus vtile proculdubio eſt mucilagines admiſcere. Conficies ta-
men vnguentũ, quod recipiat olei liliacei, & irini. an. 3. j. olei amygdalarũ ama-
rarũ, & capparorũ. an. 3. ſ. ſucci rutæ, aut ſabinæ, & artemiſiæ. an. 3. iij. ladanij, &
ceræ qđ ſufficiat, vt fiat vnguentũ. Ex ſucco et mercurialis, rubiæ, & ſummitatũ,
ſambuci cũ oleo capparorũ, & de lilio, addito modico croco, & cera, mirabile
paratur vnguẽtũ, ſi interim dum conficit, modicũ vini addatur. Illiniant etiam
imus vëter, & lûbi, oleo de ſtyrace, vel zoino, laurino, & anethino, addita myr-
rha, & galbano. Cæterum poteris alia effingere ex ijs, quæ nos lib. 2. de indica-
tione auxiliorũ, capite de aperientibus abũdẽ adduximus. Atq; hæc dicta ſuffi-
ciat de ea obſtructione, q̃ ex craſſis, & pituitofis humoribus ortum ducit. Circa
quã mirari nõ debes, ſi pluſculũ immoratus fuerim. Nã cũ frequẽtius mēſtruo-
rum ſuppreſſio ex ea prodeat, cogimur diligentius eam expendere, & curare.

*De atra
bile redũ-
dante.*

Si atra bilis redũdauerit, & ex copia, aut craſſitie, & ſoliditate, ſanguinẽ craſ-
ſiorẽ, & fluxui ineptiorẽ reddiderit, aut meatus occluſerit, materiã eo tempore
preſidiũ mutare oportebit, & in eam, quæ è directo atra biliſo humori rñdere
poſſit, commutare, ſeruata tñ vniuerſali medendi rōne, & victu et humidiori, &
optimi nutrimenti inſtituto: ſicut frictionibus, ynculis, & alijs, q̃ ſuperius di-
xiſmus cõi lege adminiſtrauiſ. Primò itaq; ea cã cognita ex corporis hiſtuto ha-
bitu, ex inſolita mæſtica, & reliquis, quæ prædictum humorem atteſtari dixi-
mus, ſanguinem mittere, ceterum in minori copia, & per longius interuallum,
vis terre oportebit. Idq; ex venis tali, præſertim ſiniſtri cruris, niſi affectio ſit in-
eunte vere. In quo melancholiam cum maſſa ſanguinaria redundare neceſſum
eſt: ſiquidẽ crescente ſanguine, melancholiam quoq; eius fecẽ creſcere rōni eſt
conſonum. Ego tñ circa hoc præſidium magnifeci ſemper in mēſiũ ſuppreſſio-
ne ex hac cã concitata, per hirudines ab hæmorrhoidibus ſanguinẽ extrahere:
nã in eis venis melancholicũ ſanguinẽ redundare magis, quã in reliquo cor-
pore compertũ eſt. Ob idq; ſatiũ erit, ab ea parte, vbi copioſius viget melãcho-
lia, eã extrahere: præterq̃ q̃ promptiũ eundem ſanguinem per proximas ve-
nas ab obſtruẽto, aut pleno vtero extrahere, q̃ per diſtantes. Cui etiam rōni ac-
cedit, in ſanguinis detractiõne ex alijs partibus, pluſ ſanguinis eſſe extrahẽdũ,
ſi vtero profuturum eſt, q̃ exigat melancholiam corpus, in quo vereri ſemper
oportet plurimum ſanguinis extrahere. Et ob id eas venas inſcindere, quæ ci-
tius, & tutius à parte affecta craſſiorẽ ſanguinẽ euocent, quales hæmorrhoides,
eſſe cenſeo, rationabiliũ vř. Verum ſi ſplenem, aut ipſius obſtructionem, cau-
ſam ſuppreſſioni mēſium præſtitiffe cognouerimus, ſaluatela ſiniſtræ manus
tundere,

*Sanguis
deſtra
ſiſto.*

A ttere, commodissimum esse inficiabitur nemo. Hoc tamen in hac re expendas velim, præmissa aliqua melancholice purgatione, satius esse sanguinem mittere, quam ante ipsam. Nam decolores feminas purgatione sanari magis dixerat Hipp. 5. aphor. 36.

Purgatione aut redundante melancholia institues semel, aut bis confertim: Purgatio.

preparatis tñ sufficiēter corpore, & humore. Quo factō rarius, & paulatim purgatione utaris opus est: maiori nimirū facta in pparatione diligentia, q̄ in pituitoso humore, vehemētiōribus adhuc medicamētis, in minōri tñ quantitate exhibitis, ut capite de expurgatione lib. i. indicationum diximus. Quam legem si seruaueris, censeo te parū posse ab scopo aberrare. Parabis quidem humore syrupo de pomis, de succo borraginis, de epithymo, aut fumariæ: quem dilutiore facies (nā talia oportet esse quæ melancholiam preparant) decocto prunorum, passularum, florum violarū, radicū scorchiōnæ, & buglosæ, seminis maluæ, petroselinæ, & cinnamomi, demū epithymi, ac senæ decocto. Quibus p plures dies exhibitis, corpus confertim purgabis, nō validissimis medicamētis, sed mitioribus in maiori tñ quantitate. Cuius census sunt cassia fistula in prædicto decocto dissoluta pondere ʒ. ss. vel efformatis ex ea bolis cū puluere foliorū senæ, & saccharo. Prodest ʒ. j. diacatholici, vel cōfectionis hamec (abiectis scāmoneo, & colocintide) in aqua lactis, vel p̄dicto decocto dissoluta, aut formatis ex eadē bolis cū puluere foliorū senæ, & saccharo: quibus oībus agarici aliquid addere non erit ab re. Prostant itē cortices myrobalanorū indorum ponderē ʒ. ss. flu

B teorū. ʒ. ij. diluant horis duodecim in sero caprilo, & facta colatura, ac expressione adde manne electe. ʒ. j. & l. aut. ij. epithymi. ʒ. ij. mellis rosacei. ʒ. j. & fiat potio. Facta hac pleniori purgatione, maiori q̄ potueris diligentia curabis, menses ex hac cā detentos euocare: nam ex ea facile in grauissima symptomata dilabuntur feminae. Ob id anteq̄ in aliquod prorumpat suppressio preparare, & purgare per epycrasim, seu paulatim humore melancholicum oportebit. Cui vsui præmissis syrupis, & decoctis, q̄ nuper diximus, apozematibus alijs utaris necessum est, quæ conficies ex p̄dictis rebus, additis, quæ aduersus melancholiam à viris doctis excogitantur. Cuius gratia hoc decoctū parabis, quod recipit adia

C u, florum utriusq; buglosi, violarum, stēchados, chamædryos, & lupulorum. an. m. ss. polipodij. ʒ. iij. glycyrrhizæ, vuarum passarum. an. ʒ. ss. terantur parū, & coquantur in sufficiens aqua, & in fine decoctionis adde epithymi. ʒ. ss. coletur, & adde sacchari quantum sit satis ad cōciliandam dulcedinem: cuius. ʒ. iij. aut. v. porriges. Poteris etiam facile alios porus excogitare eadem seruata methodo: sed præstat decoctum florum violarum, & adianti, cum passulis sine acinis, & foliorum senæ facta forti expressione: quibus, & rebellem humorem temperabis, preparabisque, & paulatim expurgabis. Nam licet dictum à me sæpe sit, inuitas melancholice purgationes necessum esse validis fieri medicamentis: id præceptum rarò vsu uenit in feminis. in quibus vel a leuissimo medicamento ob sanguinem retentum grauissima exacerbantur accidentia: Cum hoc tamen si p̄dictis dilutis modicum ex valentioribus addideris, facta purgatione per longiora interualla, nihil nocebis. Ob id quidem proderit turpeti parum per noctem infundere, aut agarici, vel fortioris. Quod, cum maxima cautione aggrrediendum esse consulo, propter superius adductam à me rationem.

Pulueres

*Pulve-
res, &
placenta* Pulveres quoq; & placentulas, ac electaria facili tibi erit cuiq; femina parare, si rebus, quas superius pituitosis corporibus dicauimus, addideris aliquid ex ijs, quæ melancholiam respiciunt, quæ immodicum illorum medicamento rum calorem temperare habeant: siquidem in omnibus ad melancholicos phar macis ea semper sunt adhibenda, quæ modicè calfaciant, & plurimum hume- tēt: Quamobrem cauendum esse censeo à rebus aridis. Ob id profectò ex prædictis pulueribus, & ijs, quæ melancholiam respiciunt, non nihil sumere oportet, & conseruis florum borraginis, buglossæ, aut violarum admiscere. Ex quibus placentas, & holos cum aqua lupulorum, borraginis, buglossæ, scor chioneræ, vel lactis, & similium parare poteris. Theriacam quoq; plurima a. qua dilutam, aut confectionem alchermes, vel de hyacintho potui dare licebit. Item radices buglossæ, cardus sancti, & similium herbarum saccharo condita- rum. Sic crithinum marinum, vel lupulorum summitates, aut capparorum ca- pita cum saccharo, aut melle, cum modico aceto, & sale condita, incredibilia efficacia prodesse, fertur.

*Balnea:
& infu-
siones.* Ex eisdem herbis, quas in pituitosa causa parare docuimus, probè instituere balnea poteris, additis maluarum foliis, althææ radicibus, & seminibus vtriusq; floribus etiam violarum, borraginis, & buglossæ, item fenugræco, semine lini, & psyllio, & alijs, quæ humori melancholico occurrere dictum est. Ex quibus, & balnea, & infusiones parari faciliè possunt.

Suffitus rarò melancholia existente causa prodesse possunt: exiccant. n. po- tius, indurantque siccum sua natura humorem. Ob idque suffituum loco euap- orationes esse frequentius suscipiendas, mihi semper arrisit magis, tum quia halitus ille, & vapor facilius humoris duritiem euincit emollitque tum verò, quia partes facilius dilatantur, & aperiuntur, tum vltimò, quia confici possunt euaporationes ex ijs rebus, quæ melancholicæ naturæ aduersari magis possunt, quales sunt, quas nuper retulimus.

*Pessus, et
metran-
chita.* Pessus, & uterini clysteres ex ijs rebus, quas superius diximus, confici pos- sunt, cauentes semper eas, quæ sicciorē habent naturam, & additis, quæ mul- cebrem, & leniorem obtinuerint. Sic prædictis mucilaginēs addere poteris, & portulacæ, vel borraginis succos, vt & pelli, vel clysteres simul humorem me- lancholicum irritent, & mulcebre, ac mansuetiorem reddant.

*Inunctio-
nes.* Inunctiones eadem lege parabis addito semper oleo amygdalarum dulciū, sesamino, mucilaginibus, & succis, qui vires habeant humoris duritiem frenā di, ac emolliendi. Sic axungia ex vsu est, vel, si femina vterus pertulerit, addito modico aceto.

*De fla-
uabile re-
dundan-
te.* Arbitror quidem feminis nusquam posse menstrua, vi caloris, aut calidioris humoris supprimi, nisi aut bile crassiori ob adustionem facta, aut calore in- crassante reliquam humoris massam resoluta ab ea tenuiori parte, id quod fa- cile discēs ex pallido faciei & totius calore, ex uris amarore, & siti, ex corporis proritu, & inquietudine, & alijs quæ id quoque doceant. Quamobrem hac causa prævalente auxilia omnia, aut frigida, aut moderata esse oportet, & humida: ideoque victus rationem instituere oportet his conditionibus prædi- cam, ac potus paulò largiores, aerem frigidum, & reliqua his consentientia. Quibus institutis ex basilica dextri lateris rationi videtur cōsonum primò san- gui-

A guinem mittere ventilationis præstandæ gratia, ac mox ex talo, vltimo tamē ex saluatela dextræ manus, cuius incisio maiorem iecori præstat refrigerationē. In quo sanè casu plus sanguinis, quàm pituita aut melancholia redundantibus educere oportet minns tamen quàm plenitudine prævalente, cum ob ventilationem omni suppressioni necessaria, tum verò ob refrigerationem. Nam calore aut bile redundante id præstat potissimum sanguinis detractio.

Quod si calor cum bilis fluxu crassioris accessu causam suppressioni præstiterit, refrigeratione maiori opus est, quàm si solus in affectum prorumpat. Quo tempore raro, aut nunquam expurgantibus vti medicamentis licebit, frequentius tamen alterantibus, ijsq; efficacioribus erit necessum. Nam & potius aque, & alia, quæ consimilem corporis calido teporem inducant, frequenter menses mouille competimus. Verum si bilis redundantiam cognouerimus, non erit, ab re mox a sanguinis detractioe eam minuere pharmaco seligenti exhibitio. Quam tamen prius præparabis syrupo cichorij, buglosse, rosarum, & violarum, cum aquis stillatitijs, vel decoctis ex ordeo, violis, cichorio, acetosa, & radicibus scorcionera, adianthi, florum vtriusque buglossi, eupatorij, & quatuor seminibus refrigerantibus. Quibus & alijs potibus humore frenato, ac reddito expulsionem idoneo, vti poteris expurganti pharmaco, veluti casia, manna rhabarbaro, corticibus myrobalanorum, citrinorum, & pilulis de aloë lota, ac syrupo de infusionibus rosarum: factaque semel, aut uis pleniori purgatione, ex vsu cetero esse, paulatim quoque purgare rhabarbari diluto, tertio aut quarto quoque die in aqua lactis copiosiori facto. Interim tamen ipsam lactis aquam cum saccharo manè porriges cum syrupo violarum, aut quouis alio ex prædictis. Nec ob id cessandum est à vinculis, frictionibus, cucurbitulis, crurium lauacris, & alijs, quæ supra diximus. Quibus accedit cōsiliū Hipp. lib. 1. de morb. mulie. hæc verba proferentis. At verò biliosi si menses prodeant, pusillanimitas incidit, & cibi fastidium, aliàs atque aliàs, & anxietas, ac vigilia, & eructat frequenter, & non vult deambulare, & tristis est, & non videre sibi videtur, timet, & si curetur ex his, sana erit: Si verò tempus processerit, adhuc magis dolebit. Optimè vero cum ea agatur, si uomitus biliosus succedat, aut venter turbetur non fortiter, & subeant biliosa, & fluxus succedat ipsi non fortis. Si enim quid ex his forte inciderit in corpus afflictum, periclitabitur. Si verò leniter depurgetur aliquid biliosi, aut totum id, quod molestum est, sana fiet. Qua quidem sententia, & prælagandi, & curandi rationem appositissimè docuisse videtur: quā qui insequatur, & ad vnguem expenderit, reperiet facillè per supernam, & præcipuè per infernam aluum, & qua lege tuto purgari possint fœminæ hoc affectu laborantes: quo facto ad topica confugies.

Qua in re conferua violarum, vel rosarum, aut borraginis vti erit necessum cum decocto aliquo, aut stillatitia aqua ex ijs herbis, quæ menses mouere naturæ sunt dum remissioris sint caloris, admixtis in instillatione rosis, violis, cichorio, acetosa, ordeo, & similibus: ex quibus cum ijs pulueribus, quos menses mouere posse superius diximus, placentas cum saccharo, & aqua rosacea effingere pfacile est. Quibus manè sumptis cū largioribus ac frigidioribus potibus, agrotas iuuari experimèto comperimus. Cui etiam vsui parare oportet pastillos ex frigidis seminibus cum saccharo.

Purgatio
110.

Electa-
ris, &
planta.

Bal-

Balnea, Balnea item ex dulci aqua, aut temperatori facta ex decocto supradictatum **A**
herbarum, herbarum, hac quoq; causa praevalente maximè sunt ex vsu. Cui balneum hac
ius. methodo conficies, althææ cum radicibus. m. iij. artemisiæ. m. ij. foliorum sambu-
 ci, foliorum salicis, foliorum violarum, polytrici. an. m. j. valerianæ sesquilibra,
 fenugræci lib. j. seminis lini lib. s. artemisia in linteo excepta cum seminibus fiat
 decoctum. Ex quo etiam infusus parari possunt, aut ex prædictis rebus fieri sac-
 culi, qui nuper dicto decocto madidi, calentes, & expressi pudendo adhiberi
 possunt. Aliter quoque hæc eadem auxilia conficies, ex decocto nimirum mal-
 uarum, althææ, foliorum violarum, & chamæmali florum. Quod vsui esse pro-
 ficuum summopere censeo. A balneo verò, aut infusu scæmina sumat pastillum
 aliquem cum cremore seminum melonum, vel cucumeris, addita aqua hordei,
 vel capillorum veneris, aut glycyrrhizæ.

Pess, Cui sanè causæ prædominanti cautè adhiberis pessos, & metran-
chita. chitas, ob ra-
 tiones à me paulò superiùs adductas. Pessos tamen conficies ex contusis malua-
 rum, & althææ radicibus, saccharo rubeo, adipe anseris, vel gallinæ cum modico
 hordeo decoctis, omnibus tamen contusis ac simul mixtis, & serico linteo **B**
 inuolutis ad pelli formam redactis: quem ante quam in vterum immittas, oleo
 amygdalarum dulcium, aut sesamino inunges, lacte, aut emulsione seminis me-
 lonum, supersparso aloes puluere. Item metranchitam parare tantum oportebit
 ex rebus, quæ modicè attemperant, & quodammodo menses moueant, veluti
 ex lacte seminum frigidorum maiorum, ex hordei decocto, maluarum, & vio-
 larum cū modico saccharo: ex lacte etiam, ac alijs consimiles vires habentibus.
 Nam calidioribus vti periculo non vacat. Ferunt etiam radicem lilij hortensis
 sub prunis coctam, & oleo subactam, vteroque per linteolum immittam menses
 trahere, vterum emollire, & vuluam, ita vt certum sit semen eius vino albo
 tritum ac epotum, celerrimè fetum mortuum educere.

Inunctio- Inunctiones circa pubem, & inguina quoque adhibebis ex oleo amygdala-
nes. rum dulcium, violarum, sesamino, & de cucurbita cum mucilagibus seminis
 citoniorum, & psyllij. Itè ex vnguento rosaceo, & refrigerante Galeno ascripto,
 addito oleo liliorum, & mucilagine radicis althææ, vel maluæ, facta harum ra-
 d' cum sufficienti coctione. Ex quibus cum modica cera, & pauco croco, aut ci- **C**
 tra ipsum, varias poteris effingere inunctionum formas. Ea tamen a viris doctis
 probata est, quæ recipit olei, amygdalarum dulcium, & amararum, ac de cucur-
 bita. an. 3. j. adipis anseris, & butyri recentis. an. 3. iij. ce. æ albæ, & ladani, an. 3. j. f.
 fiat vnguentum.

Quòd si neque his omnibus affectio cedere videatur, eisdem addere tutum,
 & necessarium est aliquid eorum, quæ menses monere diximus, paulatim a mi-
 noribus sumpto initio, prout scæminam ferre posse citra caloris exacerbatione
 cognouerimus.

De sup- Frequenti experimento constat, scæminis menses supprimi ex vteri distortionem,
pressionem vel retractione ad alienam partem, & extraneam regionem, ita vt vasorum oscula,
mensiu vel ocludantur, vel peruersa eorum figura inepta consueto fluxui efficiantur. Quam
ex alijs sanè affectionem curare perdifficile est: nosce tamen poteris ex laborioso partu præ-
uteri vi- cedente, ex ictu, percussioneve, aut casu, vel conuulsione, quæ dū affuerint, mini-
sis. me sunt cognitu difficilia, id vitiū aliquādo proficisci. Quorum omnium memi-
 nerat

A nerat Hipp. lib. de nat. mul. dicens. Si uteri ad coxam decurrerint, & menses nō prodeunt, & dolor ad intum ventrem accedit, & ad lateris mollitiem. Quia parte iuber sic affectas multa calida lauare: & inter aliqua, quæ ibidem recentet, fomenta quoq; parti adhibere, præsertim post purgationem. Conficit quidem fomentum ex feniculo, & abstinatio; a quibus iuber digitis uterum ad antiquum suum retorquere, & mercuriali purgare: quæ omnia fieri docet, donec menses fluere incipiant. Eis quoq; medebetur frequenti exercitio, equitationibus, balneis, aut diuersis corporis uestionibus, vel saltu, vel quouis alio laborioso motu. Alia quippe adhibere præsidia frustra est, & non tutum, præterquam cataplasmata dorso adhibita, quæ uterum ipsum facta prius per digitos emulsione, ad antiquum locum reuocent, & reuocatum firmiter teneant, vt vulgariter obstetrices efficere solent.

Item si uteri osculum, aut uterus ipse ex frigidityte externu durior factus fuerit, aut spissior, & ob id corrugator, ita ut minimè possint menstrua profluere, ex relatione habito cognitionis principio, curationem institues calorificis præsijs, suffitijs nimirum, euaporationibus, balneis, inunctionibus, & alijs auxilijs, quæ citra vllam euacuationem calfaciendi tantum vires habeant.

Ex frigidityte externa.

B Verum si uterus ex cicatrice, aut callo aliquo adnascente ita durus factus sit, solidus, ac foraminibus destitutus, ut minimè possit sanguinem fundere, quæ leniter emolliant sunt adhibenda, donec callus emolleat. Interim tamen non erit ab re sanguinem mittere, ne superabundans in aliquod maius malum promittat. Qualia autem debeant esse hæc præsidia, reperies c. de emollientibus lib. secundo nostro de præsidiorum indicatione.

Ex cicatrice.

Pari quoque ratione carnem supererectentem excedere est necessum, cum menstruum impedit purgationem, ut lib. secundo paulò antè citato capite de cicatricem inducentibus, reperies. Item si membrana aliqua antesteterit in uteri osculo, vel clausa fuerit femina, qua lege debeat dirumpi capite de feminis clausis facillè ediscies.

Ex supererectie carne.

C Quòd si ex tumore aliquo præter naturam uteri ipsius, vel partis alicuius vicinæ menstruum suppressio fiat: fugiendum est ab ijs, quæ menses euocant. Sed primitus tumorem ipsum curare oportebit sanguine sufficienter misso, & adhibitis auxilijs, quæ inflammationem ab utero arcant: qualia reperies proprio c. paulò inferius vel tumore quouis duro prius curato, ut proprijs capitibus scriptum est.

Ex tumore.

De mensuræ diminutis, ac de mensium stillicidio. Cap. 10.



AVD secus, quàm in vesica, cum vitiosè excernit urinam. contingunt in mensium suppressione vitia, & symptomata. Nā si cur ischuriam (urinæ quidem cohibitionem) omnino refert mensium suppressio. Sic diabeticam æmulatur passionē mensium diminutus fluor, & pari quoq; ratione dysuriam redolet difficilis mensium profusio (præsertim si dolor, & labor ei adiungantur, cuius meminero sequenti c.) nimirum cum menses guttatim, & per lon-

Aff. diabetici.

per longius tēpus prorumpant, affectio quidē, q̄ eis reduci habet symptomatis. **A**
 q̄ in uitiosa, seu corrupta actione facultatis, cui munus illud incumbit, cōsistit.
 Morbum sanē cum habet auctorē, qui ad malā partis figurā pertinere creditur, li-
 cet aliquā figura non sit suapte natura uitiosa, sed respectu humoris tenuioris iu-
 sto, aut alterius causae, cui excernendo figura naturalis proficua non sit, et si nō
 rarō ex mala temperie prodeat, seu humoris acrimonia, quae dolore, ac morsu
 facultatem laceſſat ad frequentem excretionem, ut seq. c. docebo.

*Differen-
tia.*

Contingere huiusmodi affectionē uno ē duob. modis probatum apud uiros
 doctos, p̄sertim apud Aetium reperio. Nā aut stillatim profluunt menses indolē-
 ter, & citra aliquod aliud accidens, praterq̄ q̄ & diu, aut parum durant, & mi-
 nutē prodeunt, aut cū accidentibus & grauissimis symptomatis: his quidē pecu-
 liariter mihi est in animo caput dicere, illis uerō hac in parte sermo instituet.
 Grauis porrō est affectio, & q̄ multarū calamitatum in fœminis soboles existit,
 nā & nris ingratas reddit, steriles, & aliis plerisq; affectionibus obnoxias. Ob
 idq; diligenter oportebit praeuidere, quominus mala hae ipsis accidant.

Causa.

Si quis Aetium legat lib. 4. serm. 4. c. 63. huius mali causas ad unguem exp̄s- **B**
 fas reperiet: quas quinque esse species diuersas fatetur: meatuum nimirum an-
 gustia una est, tamen diuersimodē contingens, uirium debilitas altera: sangui-
 nis multitudo tertia: sanguis ē pituitosus quarta, & ultima sanguis fœculētus,
 quibus non erit ab re sextam addere, nimirum sanguinis acrimoniā, & tenuita-
 tem, quae uel facultatem perpetuo laceſſit, uel ipsa nolente defluit, q̄ sanē rem
 paulō diligentius expendere est necesse, ut quae frequenter accidat, & diffi-
 culter curetur. Primō meatuum angustia diuersimodē contingens, à prædicto
 auctore non sine magna rōne refertur. Nā ea meathum angustia, quae totalis est
 & in oībus meatibus, hae omnimodā efficit mensium suppressionē, & licet ex
 diuersis proficiscatur causis, non quidem stillicidium, sed suppressionē efficere
 nata est. Verum dum ex toto meatus non recluduntur, neq; oēs, sed aliqui, hos
 quidē uarijs figuris gaudere nulli esse dubium arbitror. Quippe magis mi-
 nusue recludi, non paruā efficit in affectu differentiam. At qui cum ex totum
 meatus non recludantur, neq; multum sanguinis defluere posse, neq; ex toto
 cohiberi par est. Ex quo constat fluere quidē, cæterum paulatim, sensim, & diu. **C**
 Sed ut mea fert sūa, simplex plenitudo, & utcumq; existens nō præstat huius ma-
 lo causam. Nam ea proculdubio o minimodā efficit obstructionem. Verum si
 aliquā hoc uitium nata est efficere parua plenitudo id quidē parit, quia ex hu-
 morum in æqualitate proficiscitur, dum ipsi non sint unius naturae, & conditio-
 nis, sed quasdam habeant partes alijs crassiores, & tenaciores: ac ob id nihil mi-
 rum, si minori existente plenitudine hoc uitium suboritur propter humorū
 obstructiui in æqualitatem, quam sanē ego censeo huius affectionis esse po-
 tissimam causam. Præterea nuper dictis altera accedit, nam in omnimoda uirium
 debilitate nihil prorsus excernitur, quia cum id munus sit facultatis opus, ipsa
 deficiente necessum profectō est, & actus quoq; cessare. Verum dum aliquid
 potest, idq; parum, ac debilitate, agit quidem, cæterum diminutē. Ex quo fit non
 nihil ab eadem excerni, parum tamen, ac diu excretum: parum, quia cōfertim,
 & subito, cum imbecillis sit, excernere nequit, diu uerō, & sæpe, quia multum
 sanguis superest, & ob id paulatim, & sensim excernere cogitur. Quod si ui-
 tium

A tium in retentrice reuertere velis; quia sensim defluere permittit quod illi commissum erat, ita ut indeterminatum habeat excernendi tempus, fit quidē, ut paulatim mēstruationes efficere cogatur, nisi sanguinis nimia multitudo huic quoque malo causam praestiterit. n. neque vniuersum sanguinē uenę capiunt, neque omnino ocluduntur. Quia propter instillat sanguis, ac ueluti colliquatur, & guttatim exit. Sanguis etiam pituitosus cum fluxui ineptus sit, dum abundat, fluit quidem: uerū tamen fluere nequit: ex quo constat, paulatim, ac sensim teneri fluere. Sic quoque feculentus sanguis dum praeter modum abundat, ex eo lata sanguinis tenuiori parte, hos mouet minutos menses: nam cum crassum defluere nequeat, neque tamen omnino detineri, fit facili, ut instillatim prodeat. Hoc dixerim, ut quis intelligat, qua via medendi rationem in grauissimo hoc affectu aggredi teneatur. Nam si ignoret modum, quo quaeuis harum causarum operari habet, per difficile profectō erit non errare.

B Signa uerō, quae affectum ipsum in genere monstrant, exquirere, inutile esse censo: siquidem fluendi modus id planē ostendit, ita ut facili sit cuius, quātumuis idiota existat, cum nolle. Cū hoc tñ scito menses, licet fluant, suppressos cense, si lac in māmīs appareat citra aliam cām, & ēt non reddi ad antiquum modum, & quantitatem, ni lac ē māmīs defuerit. Et ob id feminae, quae lac habent, interim dum habuerint, steriles censendae sunt, & omnino ad conceptum ineptae. Causarum autē dignotio haud ita facilis est, & ob id breui ratione, & manifestissimis signis eas monstrare curabo. Plenitudinem dignosces ex feminae habitu, ex totius corporis grauitate, & lassitudine, lumborum, ac renū graui dolore, praesertim instantibus mensibus. Ac si qñ plus solito excernatur, leuamen persentiunt. Capite dolent, potissimum parte eius superiore torpent manus, & frequenter cru. a stupore corripuntur. Sanguis tñ qui excernitur, purus est, & ab omni vitio immunis, tenuis quidem, sed ruber. Facultatem secernentem esse imbecillam, ostendit excretio citra molestiam guttatim facta. Item ab exercitio frictionibus, & caloricis auxilijs maior sanguinis profusio, argumentū planē euidentis impotentiae ipsius, siquidem adiuta calore, ad apertis uis, & commoto humore ab exercitio sanguis uerius profluit. Sanguinem esse pituitosum euidenter ostendit color ipsius fluentis, nam albicans est crassius, mucosus, & lente mobilis, praeterq, q femina mollis est carne, alba, & uita sedentaria, ac crapulis dedita. Quibus adiungitur in huiusmodi feminis pudendū semper esse muroribus, & superfluis humiditatibus foedatum, praeterq, q pigre sunt ad motū, quis aliam actionem, somnolentae, tediosae, & alijs ingratas conditionibus praeditae. Feculentum esse sanguinem ex eo cognosces, quia crassius admodum profluit, inaequalis tamen, ex crassis, ac tenuibus partibus cōstans, colore niger, aut alio tetro insignitus femina hirsuta est, subnigra, prauis alimentis dedita, mœsta, cogitabunda, malè morigerata, & ultimo si quid sanguinis profluit id certē est, dum per alium excrementum excernere nititur. Nam conati illo, quem natura in expellendis excrementis apponit licet crassius, & feculentus sanguis existat: cum hoc tamen aliquid excernitur, alio qui uerō nequaquam. Inaequalem esse uasorum figuram ex priuatione praedictorum signorum coniectura facta, venari poteris. Tenuem aut acrem sanguinem nosces ex mordicatione, & ex ipsius consistentia, ac ex dolore, & exulceratione pudendarum partium.

Neque

Signa.

*Præ-
sugm.*

Neq; fide dum est huic affectioni plurimum, nam & deterri-
mum monstrat, & deteriore prædicit. Humoribus quidem abundare, & cõsue-
ta vacuatione carere, graue profectò existit, & periculo plenum, quia necessũ
subinde e. it, corpus in deterius decidere. Ideoq; dixit Hipp. bonum habitũ sta-
tim soluere, expedire. Ex quo inferitur longè grauius esse, plenitudinem esse vi-
tiosam, & non solui, præsertim per naturalem, & consuetam vacuationem. Item
dum facultatum impotentia malum oritur, longè grauius est, quia eadem pau-
latim succrescit plenitudo, & corpus minus potens in dies ad propellendũ effi-
citur, & rursus ad resistendũ eis malis, quæ ex hac causa oriri assolent. Præterea
pituitosam cacochimiam redundare, & expurgari non posse, nemo non veret.
Nam si sanguis sola copia peccans, tantorum malorũ causa existit: quantò maio-
ri ratione pituitosa redundantia, ex qua, & malus corporis habitus, & hydro-
pes, & diuturnæ febres, importuni etiam, & graues capitis dolores, distillatio-
nēs, & alia huius sortis vitia fiunt. Quòd si sanguis fœculentus fuerit, dubiũ nõ
est, quin hæc, & maiora mala succrescant. Veluti ciborum inappetentia, depræ-
uati appetitus, pustulæ per totum corpus, melancholici affectus, ac sæpe, si hu-
mor exalciat, furores. Vereri demiq; oportet, quauis harum causarum præua-
lente ne ex toto menses supprimantur. Vtunq; tamen sit, steriles reddit feminas.
*Curandi
ratio.* Eadem omnino ratione mihi visum est, curationem aggredi, ac distinctionem
Causarum. Quippe viarum angustiam corrigere nemo poterit, nisi cognita cau-
sa cõprimente, & coarctante vias ipsas. Sic dum inflàmatio est, peculiare prære-
quirat diligentia, vt c. proprio reperies. Si compressio ex aliquo mēbro disloca-
to, redditus ad pristinũ statũ remedium est: & sic de singulis causis pro cuiusq;
natura. Sed earum, quæ huic uitio communiores, & frequentiores sunt, curatio-
nem scribã, initio sumpto ab ea plenitudine, q̃ ob id hoc malum efficere dictũ
est, q̃ inæqualis existat; dixerim, q̃ ex inæquali constat humorum uitio: ex quo
efficitur fluere quod tenue est, idq; ob crassum obstruens paulatim, & sensim,
ac diu. Quamobrem potissimam curandi rōnem, eam existimo, quæ a sanguinis
missione incipit. Verum neq; tm̃, neq; confertim extrahere conuenit, q̃tum ple-
nitude exposcere uidetur, nisi plenitudo grandior extiterit, quo tẽpore copio-
sius extrahes, sed minus, idq; ob crassas partes alteram constituenter plenitudi-
nis partem. Ex quo optima ratione medendi ductus infero, necessum esse à san-
guinis missione inscindentibus, & attenuantibus potibus crebrius esse uten-
dũ: fugiendumq; ab omni arido medicamento, ne quod in redundantia cras-
sum est, crassius, & durius fiat. Verum potius huic vsui aptos vel nullo negotio
reperies: cui sanè fore proficuum censeo, si feminæ uterus id perferre uideatur,
acetosi alicuius syrupi, aut acetii ipsius, uel oximellitidis modicũ alijs potibus adij-
cere. Quibus et admiscere non erit præter institutũ aliquid ex lenibus pharma-
cis, ueluti syrupum uiolarum, borraginis, de portulaca, & alios consimiles. In-
terim tm̃, & frequenter pillulis de aloe uariis oportet, vel alijs ex ijs, quas præce-
denti c. diximus. A quibus, balneis, & in sersionibus rem agere oportebit. Nam
huic affectioni, si usquã alicui summè prodesse possunt: quippe quod crassum
est, funditur, & quod clausum, aperitur. Præstat itẽ pessarijs ex aloe uti, nã incre-
dibili quadã efficacia sanguinẽ fundũt, & vias reserãt. Qd si ne adhuc quidẽ his
oibus q̃cũq; p̃fueris: ea parabis auxilia, q̃ crassos humores eligẽdo extrahãt. Ve-
rũ

Arum inter omnia, quæ huic vsui aliquid prodesse possunt, nullum penè reperies aliud tutius, aut vilius, quàm hirudinum vsus, quippe quæ, & copiam demunt & quod crassius sæculentiusq; est, mirè eligunt, & extrahunt. Ob id perfectò neq; crurum lauacra, neq; cucurbitulas, neq; scarificationes sæminis sic affectis adhiberem, eo quod tantum habeant distrahere, aut extrahere quod tenue est, crassis humoribus superstitibus manentibus. Vterinos etiam clysteres immittere, maximi esse momenti existimo, præsertim si receperint quæ attenuandi, & extergendi vires habeant. Quorum abunde meminimus c. præcedenti. Sed inter omnia præsidia huic affectioni apta, id semper expertus sum proficuum, quod ex inunctionibus paratur. Inter quas, eas eliges ex ijs, quas superius diximus, quæ vterum emolliant, & humores ibidem contentos attenuent. Veluti quæ ex oleo sesamino, de semine cucurbitæ, liliorum alborum, de croco, & uino albo ferue factis ad consumptionem vini paratur. Alia item conficitur ex prædictis oleis, vel de vitellis ouorum, & theriacæ: quo censu aliàs conficere inunctiones facile est: nec erit perfectò ab re in hoc malo chalibis antidotum præbere.

B Verùm si ex facultatis impotentia mensium stillicidium prodeat, curandum est omni arte, aut facultatem irritare, aut eius motum supplere. Irritabitur porro facultas clysteribus uero immixtis paulo acrioribus, ut recipiant fermenti dissoluti in succo mercurialis cum modico, aloë. .j. Idem etiam fit pessarijs, quæ consimilem facultatem obtineant, qualia præcedenti abunde docuimus. Cauendum tamen est omnino in hac causâ à sanguinis detractione, aut frequentî purgatione: sed perpetuo utendum est ijs, quæ ualenter menses mouere nata sunt, tam per os sumpta, quàm per suffitus, & infusiones, & fomenta. Quæ si feceris, scito te uera medendi ratione vsurum.

Lentam, & crassam pituitâ (quæ sanguinem efficit crassum) si huic malo causam præstare cognoueris: facile quibus extenuare, atq; corrigere, & totam rem agere, ex ijs, quæ præcedenti c. diximus, colliges. Habet tamen id peculiare, dū non obstruit, sed fluxui ineptum reddit sanguinem, ut uerè in scindentia, & attenuantia pharmaca desideret, præter victus institutionem, quam eiusdem conditionis quoq; expostulat. In quo sanè casu præmissis, quæ diximus, medicamentis, & calorificis, atq; alijs, quæ aduersus pituitosum sanguinem, & ad coctionem & alia munia exequenda valere omnibus sunt nouissima, libere uteris, aut ijs, quæ urinam mouent, vel sudoribus ex ligno guayaco, uel sparta parrela, aut radice chinæ prouocatis: aut saltè dilutiori decocto ex his facto cum modico oximellite, quod tui esse proficuum scio. Quod si neque his affectio quieuerit, ad sulphurea balnea confugiendum est, quæ miram habent in hac re efficaciam. Vltimo tamè existimo dum affectio plurimum inueterascit, fontanellam in aliquo crurum apertam maximi fore momenti: Tentare tamen ante hæc omnia, paulatinam, & frequentem purgationem oportet ex agarico, & aloë, aut pilulis mastichinis, & alijs huius naturæ. In quo sanè affectu hæc omnia ordine aggredi, tutum & utile esse censeo.

Sæculentum sanguinem, dum in hunc affectum prorumpit, nullo alio auxilio tutius corrigere poteris, quàm proba uictus ratione instituta modico exercitio, ac denique ea uite sorte, quæ omnino præcedenti quæ talem naturæ præstitit habitum, sit contraria. Verùm tutius huic affectioni medeberis sanguine

F misso,

misso, non ex uena scissas, sed per hirudines hæmorrhoidibus affixas. Quod præsidium in hac causa tanquam peculiare, & maximè proficuum summopere laudo. A quo purgationem instituere oportet ex casia, manna, syrupo ex infusionibus rosarum, aut violarum, ex confectioe hæmec sine scamnoneo, & colocintide, dissoluta in aqua lactis, vel in aqua lupulorum. Item maximi erit momenti decoctum foliorum sene singulis diebus, aut tertio quoque die laboranti exhibitum, præsertim si id feceris admixtis aliquibus ex ijs, quæ superius attenuandi virtutem obtinere diximus. Atque hac etiam causa prædominante inunctionibus, & mollissimis euaporationibus uti erit necessum: quale est decoctum florum violarum, borraginis, & buglossæ, & quod ex radicibus altheæ, ac mercuriali parari solet. Pessarijs quoque utendum in hoc affectu est, cæterum mitioribus ex mercuriali nimirum confectis, ex axungia, sicu pingui, & alijs quæ consimiles vires obtinent (quibus addere oportet aloes non nihil) nam uerendum est, ne vehementioribus sæculentus sanguis exasperetur, succedaturve, ac maiora succrescant mala: Talis enim est sæculenti sanguinis natura, ut faciliè in grauissimos affectus degenerare habeat vel leuissimo quodam nocte irritamenti principio. Quod si ex sanguinis acrimonia, & mordacitate affectio suboritur, haud secus curabis quàm vrinæ difficultas curari expostulat, purgato mordaci humore, & attemperato residuo eius, his quæ lenia sint, velut est maluarum, ac seminis earum decoctum, altheæ, & portulacæ: item succus seminis melonum, & cucurbitæ tandem mucilagines, syrumpus, & ex mucilagibus, quem lib. indicationum. 1. cap. de clysteribus scripsimus: sed valet plurimum stillatitia aqua ex maluis, semine earum, altheæ, & portulacæ, ac seminum melonum, & portulacæ, ac ex portulaca ipsa succo extracto, cum sacchato & aqua cucurbitæ, quibus in alembico addes semen lactucæ hyoscyami albi, & papaueris albi. ana. 3. s. corticum fauarum vridium. 3. viij. quæ omnia contundantur. Tandem alijs uti oportet quæ ad prædictam vrinæ difficultatem proficua sunt, & faciliè reperies capitu. de menstrui fluore.

De menstruis difficillimis, & cum grauissimis accidentibus. Cap. 11.

*Affectus
minuta.*



INTER diminutas, & stillatim factas sanguinis menstrui purgationes, nõ minus, sed fortassè maius facessit negotiũ ea, quæ præter hoc quod minutim, et inordinatè prorumpit, difficulter est & cum grauissimis accidentibus fit: affectio quidem oĩno per similis vrinæ difficultati. Non. n. quauis mensium minuta purgatio stillicidij nomen meretur, sed ea tantum, quæ cum accidentibus, dolore, ac molestia fit. Quæ sanè mala aliquando instante purgatione euenire scimus, aliquando verò, iam fluente: prioris memineral Hipp. lib. 2. popu. part. 1. tex. 13. dicens. Ex utero menses quæ iudicationum postridie, ut in lumbos an formur, hoc est, iusta veriorẽ illius loci interpretationem, & versionẽ (& si alij aliter sentiant) dolores lumborum, aut fæmoris postridie in menses desinunt. Nam coniectabile est crassum sanguinem per arctas vias citra ea mala, & maiora prorumpere minime posse, quippe venatum vteri, quæ cum his partibus

A partibus vitium habent consortio, certum est id fieri. Quæ sanè affectio de genere est earum, quæ ad diminutam actionem pertinent, præsertim si excreti humoris consideretur copia. Verum si exercendi modum intuearis, nihil mirum, si ad depravatam excernentis facultatis actionem reduxeris, idq; potissimum si consideres dolores, molestias, & alia accidentia, quæ huic affectioni adiungi frequentissimè solent. Morbus præterea, a quo hoc symptomatis genus prodit, neque vnus est, neq; vnicui habet actiones lædendi rationem. Nam aliquando morbus est in via, puta obstructio, aliquando soluta vnitas, q̄ aut ulcus est, aut erosio aliqua, nonnunquā verò vicini alicuius membri dolorosa affectio: quā ad distemperiem, vel ad solutam continuitatem reducere teneris. Prodeunt quidem feminis sic affectis, menses guttatim quoq; & stillatim, per intervalla frequentius, quàm continuè idq; magis citra ordinem, quàm ordinatè. Et utcunq; prorumpant sibi habent comites dolores, inquietudines totius corporis cōfractiones, & alia innumera accidentia, quæ difficulter numerari possunt. Nā quibusdam grauissimi accidunt capitis dolores, alijs animi deliquia, & oris ventriculi morsus, plerisq; ventris inferioris, & lumborum intolerabiles cruciatus, multis quidem conuulsiones: tandem quæuis suum patitur accidens, prout humor redundauerit, aut menses aliquod imbecille obtinuerit, ita vt facili ex commotione alterari menstruis, erumpentibus possit.

B Nacta est hæc affectio causas quodammodo similes eis, quæ in suppressione mensium reperiuntur, verum minus efficaces, minusque vehemētes, & adhuc minus in eis feminis, quæ pepererunt, quàm in sterilibus, & virginibus, ut Hipp. prodidisse scimus in iūo lib. de mor. mul. Cuius sanè affectionis ipsum meminisse constat, & cassas quoq; retulisse eodem loco per hæc verba, de vasorum obturatione, quam potissimam arbitratur huius mali causam. Si uerò menses mulieri prodeant, quidem, uerum pauciores, quam cōuenit, utpote osculo uterorum paululum à pudendo emoto, aut nuper concluso, ad hoc ut prodeant quidem, verum obturentur ab ipsis etiam transitus, per quos penetrant, ubi ad uteros descendunt. Moderati sanè paulatim prodeunt sanguine temper osculo perfectè incumbente. Et postquam dies præterierint, quibus purgari solet, & conclusus fuerit sanguis in utero relictus, & alijs menses sub descendentes nō expulerint conclusum sanguinem, sed semper paulatim grauant, & primis mensibus duobus, aut tribus non ualde prodeunt. Postquam autem præterierint plures menses, adhuc magis dolebit, & non habet in ventre. Quandiu sanè sic habuerit, & febris corripit ipsam debilis, & maximè in diebus, quibus purgari solet. Qua proculdubio sententia, Hipp. complexum fuisse huius affectionis principium, ac generationis modum nemo ambiget. Ego quidem censeo non esse, utcunq; obturata uasa, sed peculiare huius causas esse inæqualem uasorum uteri obstructionem: q̄ sanè inæqualitas pficiscitur ex sanguine aliquo densò, cōcreto, & coagulato, uel sæculento, cui adiungitur facultas excernens robusta, quæ cum plurimū excretioni innitatur, atq; cum uasa non possint capere crassum illud, & concenterū sanguinē, ut liberè profluat: fit facili, ut in extēsiōe uasorum, & parū sensibiliū, graues, concitentur dolores, & guttatim prodeat, sanguis ac fortasse aliquā grumosiū uel densus. Fit etiam ex crasso sanguine, a quo cum excretionis tempore moueat natura ipsum, flatus eleuantur crassi, caliginosi,

nos, ac densi, qui distendentes vterum, ac partes ei vicinas, cruciatus maximos
 & seuissimos dolores efficit. Quemadmodum intestinis ex flatu frequentissimè
 accidit. Habet quoq; aliam cām hæc affectio, quæ maioris sepe solet esse mo-
 menti, nimirum vlcus aliquod, seu tumore præ naturā dolorosum, vel humo-
 rū in factorum in vtero, aut ipsi vicinis partibus, copiam; quamobrem dū humor
 mouetur, eadē omnino accidentia succrescunt. Nō vlceras, colētes, aut tumo-
 re affectas partes si vel mediocriter tangas, haud parum lædes: exacerbantur. n.
 & maiorem molestiam contrahent: præterquam quod ex continuo dolore, ac
 molestia nihil mirum, si aliquid partes continuo trahant, quo mensium stillici-
 diū facile fiat. Vltima verò cā iudicio nostro est humorum acrimonia, & mor-
 dacitas q̄ viscidis quod imodo, & crassiusculis humoribus inheret. Quamobrem
 quā viscidi, difficulter profluunt, quā uerò acres, & exedentes vel plus iusto ca-
 lidi, dolores, & cruciatus nō leues inferunt. Præterquam, q̄ nō minus à tenui-
 bus, acribus, ac mordacibus citra crassitiem fieri id accidens potest, dū conti-
 nuò defluant, & pari quoq; rōne continuo facultatem lacessant ad expulsiōem:
 ex quo fieri menstruas purgationes minutas necesse est, quia frequentes, & gra-
 ues, ac dolorose fiunt. Præter has oēs causas, reddit Hippo. rōnē laborum, ac do-
 lorum in mēstruis purgationibus lib. 1. de morb. mulie. dicens: Qb carniū ra-
 ritatem plurimum trahere ventres in fœminis, quod si ab ip̄o non cessērit, car-
 nibus impletis (inquit) & calfactis dolor oboritur. Sed ex inequali hu norū sub-
 stantia haud raro comperies hanc fieri affectionem, profluit enim quod tenue
 fuerit, intus manente crasso, ac dolorem accidentia non leuia excitante.

Signa.

Affectus ipse sese ipsum adeo manifestat, ut nullo indigeat ad sui notitiam si-
 gna: nam stillatim menses fluere, & cum dolore, molestia, alijsq; accidentibus,
 is est affectus. Causas verò signis opus habere certum est. Sic profectò concre-
 tum, & in æqualem sanguinem, aut quenuis alium humorem facile ipse, qui
 purgatur, monstrabit, nam grumosus excernitur: quo excreto dolores antisper-
 leuatur, & postmodum iterum redeunt, & similiter excreto sanguine, aut alio
 in æquali humore iterum cessant. Item dolores multò ante excretionis tempus
 exacerbantur, quasi natura parturiente, nitenteque per angustas vias concretū
 illum sanguinem vi pellere. Quod Hip. dixisse constat lib. de nat. mulie. per hæc
 verba. Si sanguinis grumi in vtero coierint, os ipsorum velut eruo plenum fir,
 & si attigeris, ita habere deprehendes, & menses non fiunt. Verū si ex crasso
 sanguine flatus eleuentur, autores quidem doloris, & accidentium, ex tenui
 dolore prompte cognoscēs, & ex eo, qui per interna repetit, & ad tēpus pluri-
 mum exacerbatur, cessatq; flatu excreto, aut per infernam aluum, aut per os vte-
 ri. Præterea in his menses profluunt cum strepitu, & sonitu, ac murmurio ven-
 tris inferioris: dolores etiam neque alicubi præfunt, sed vndique vagantur, &
 aliquando lumbis, & ilibus incumbunt. Quod si vlcus mali causam præstiterit,
 præcessisse quæ vlcus nata sunt mouere, necessum erit, & præexistens cogno-
 scetur ex pure cum ipso sanguine excreto, vel sanie, cum dolore fixo, & unius
 tantum partis: & menses quidem diutius durabunt vlcere perpetuo lacescente
 & excreticæ facultatē, ad excretionē cogente. Humorū verò acrimoniā, & mor-
 dacitatē cognoscēs ex sanguinis excreti dolore, & natura, ex fœminæ habitu, ex
 præcedenti ac præfenti vitæ instituto, ex pruritu partiū genitaliū, & doloris natura,
 nam

A nam veluti vlcerosus est, qui maior, & acrior fit sanguine adhuc fluente, ex oris amaritudine, aut saluginis sensu. Vteri etiam osculum acri madore, ac mucilaginoso, saniosoq; plerunque abundat. Que profecto signa, alijs, quæ humorum vbiq; redundantium naturam monstrant, adiuncta, proculdubio patefaciēt huiusce affectiōis causas.

In hoc iustissimo affectu, & qui plures feminas plerumq; molestare hēt, duplex reperitur curandi ratio, altera quidem, quæ dolores, accidentia, & labores mitigare docet; altera verò, quæ causam ipsam respiciens illidit. Hanc ego qua potero diligentia prosequar: illā vero Actius optime exequitur lib. 4. ser. 4. c. 63. Dolores quidem (refert) & accidentia mitigaueris, si vnum hoc tantum respexeris, videlicet, viarum apertionem & vasorum laxitatem. Quod intelligas velim grumoso sanguine vel flatu causam præstante. Nam si vlcus, humorūq; acrimonia causam præstiterint, quæ sensum leniunt, vel stupefaciunt: aut acrimoniam retundunt, proficua sanè forent, ni fluxui impedimento essent: quib; ob rem quæ leniendi solum vires habent, administrare oportet. Sic vigente dolore

B ex flatu, vel inæquali plenitudine: primo Actij consilio vti oportet, qui pedum, ac manuum extremitates, fascijs ligere iubet. Sic, & foneri femora, ventrēq; inferiorem varijs calfactorijs, imposita lana succida vino, & rosaceo imbuta, aut vesica oleo calido semiplena, vel uas aliquod euaporatorium. Iubet præterea cubiti internam venam secare, si feminae habitus permittere videatur, & vena scissā cataplasma ventri adhibet ex semine lini, panæ, & aqua mullā paratum. Verū si his adhuc adhibitis dolor persistit, in sessionibus utemur ex altheæ, seminis lini, fenugræci, anethi, rutæ, ac artemisii decoctis, & spongijs ex eisdē expressis pudendū fouebimus. Hæc quidē, & alia non pauca apud Actium loco nuper citato reperies. Quæ huc transferre inutile mihi est viliū. Præterq; q̄ libro huius operis secundo de vteri doloribus integrum caput reperies. Hoc tñ vnum memoria semper in hac prima curationis parte habeto, vt lenientibus, laxantibus,

C ac modicè discutientibus uteri, modo cataplasmatibus, modò inunctionis, modò fomenti forma. Ego tñ concreto sanguini, vel flatui censeo proficiuū esse auxilium, umbilicum, & infernā eius regionem inungere oleo decroco, liliorū alborū, ac vitellis ouorū admixto modico amygdalarū dulcium, quibus addere tanq̄ peculiare præsidium censeo. 3. s. theriacæ, ex qua sola si parum ēt umbilico apposueris nō parū inueris, vel si inunxeris prædictas partes axungia gallinæ cū butyro, vel si adhibueris prædictis partibus decoctū aliq̄d ex herbis huic vsui dicat̄s, cum butyro, & aliquo ex prædictis olei, aut oleo de semine lini, uel sesami nouel si infernā aliū tractaueris succo angelicæ cū modico oleo capparorū, & cera, adiectis uini albi guttulis. Cuius sanè herbe decoctū, ac fomentū tutū, & vtile existit, præsertim ex eius semine, ex quo si sacculus paretur, quo femina crebrò ante menstruationis tps utatur, proficiuum persentiet. Item si tertio, aut quarto quoq; die, eiusdem seminis angelicæ decocto utatur, cū modico saccharo, aut miua pastinacæ melle confectæ. Cōferunt quoq; & mitigationis, & curationis gratia crurum lauacra, vel saltē pedes diutius calida aqua continere: cucurbitæ ēt suris, ac femoribus affixæ, & aliqñ scarificatæ. Item hirudines eisdē partibus infixæ, uel hæmorrhoidibus: quas cessante mēstruo, ac pstantibus doloribus adhibere oportebit: quippe deriuatione facta (si ante adhibeas) mēstruum interdi-

CNYAN-
di TALIO.curatio
nēs

cere, solēt. Qd si neq; prodesse videant hęc oīa, theriacā. ʒ. j. vel. 3. ʒ. cū aqua me
 lissā summo mane porrige e oportet, vel mithridati, aut theriacę smaragdorū
 tantū dē cū decocto portulacę, vel seminū ipsius, vel maluarū. At si vlcis vitio
 affectus oriat, dolorē mitigabis infusis in vterū, q̄ vlcis prouideant. Cui vsui
 aqua mulsā, vel, si caloris sensus adfuerit saccharata cū trochiscis albis Rafis, p̄
 ficua esse solent. Itē aqua aluminosa, quę incredibili quadā efficacia huic malo
 subuenit, vel decoctū ordeī cū syrupo rosaceo, aut aqua lactis cū saccharo, vel
 lac ipsū cū pari quantitate aquę extractę per lapideū mortariū, vel decoctū se-
 minis plātaginis, aut plātaginis ipsius. Vlcere tñ exiſtenti ab euaporationibus,
 & fomētis abstinēdū esse rōni ē cōsonū. Si verò acris, & erodens humor mali
 cām pręstiterit, fomentis, & infusis, ac inunctionibus blādiōribus utendū est.
 Cui vsui plurimū cōfert aqua tepida infusa, vel fomētis adhibita. Itē aqua por-
 tulacę, & lactucę. Emulsionēs ēt seminū frigidorū maiorū extractę aqua per-
 colata lapideo mortario, ac exhibitę tepentes potui. Inunctiones quoq; ex oleo
 amygdalarum dulcium, ex oleo violaceo, vel de semine melonum, aut cucur-
 bitarum. Quibus inspectis, facile erit viro diligenti plura alia excogitare non
 minus proficua velut est vnguentum rosaceum, aut resumptinum, & similia.

Secundā curādī rōnē, q̄ cām respicit, exequimur pugnantēs aduersus vnam-
 quanq; veluti si grumofus, cōcretusq; sanguis isq; plurimus fuerit, instituta
 prius victus parsimonia, moderato exercitio, p̄tinus sanguis demendus ex bra-
 chio est. Verū q̄a crassū illud, concretūq; remeare sursum sanguine misso ne
 quit: euocare id p̄ vteri oscuiū opus erit, fomētis nimirū, inunctionibus, & eu-
 aporationibus, itē femorib⁹, ac suris cucurbis scarificatis. Quod si parū, aut nihil
 fluere videat, hirudines quoq; hēmorrhoidib⁹ apponere, erit vtile, aliter verò
 nequaquā, ne naturę morū inturbet, ac p̄pedit. At sanguine sufficiēter mis-
 so, vel ad vterū euocato, p̄ter ea, q̄ capite p̄cedēti huic humori p̄dominanti pro-
 ficua esse diximus, theriacę. ʒ. j. vel. 3. ʒ. laborātī porriges cū copiosa aqua, vel de
 cocto ex p̄dictis. Quę sanē potio vires habet fundēdi qd cōcretū est, ac tenuādī
 crassum. Ceterū licet in ijs, qui ex denso, & cōcreto sanguine oriunt affectiōi-
 bus cōmune sit medicorū dogma, q̄ inscindūt pharmaca adhibere, quę acetosa
 p̄culdubio sunt maiori ex parte, vtero hac rōne affecto administrare, minimē
 licet. Ob id alijs rē aggredi oportet, qualia sunt q̄ ex leporino coagulo, & aqua
 graminis cōficiūtur. Decoctū itē chelidonię, cum melle, aut aqua graminis, uel
 capillorū veneris. Vel decoctū chelidonię, vel radicū diureticarū, liquitię, vel
 passularū, cui incoquere oportet coagulū leporis, & laborātī porrigere. ʒ. iij.
 cū modico syrupo capillorū veneris, violarū, aut de qnq; radicibus. Quib⁹ por-
 rō factis donec affectio subsideat, & mēstruę purgationis tēpus p̄tereat, curādū
 est reliquo tpe, ne sanguis crassus deinceps futurę mēstruationi pareat, victu ni-
 mirū extenuāte, modico, sed cōtinuo exercitio, moderatę uel tepidę aquę bal-
 neis: qbus quarto, aut quinto quoq; die vsq; ad umbilicū, aut paulo supra femina
 immoret, adhibito ēt senā decocto cū aqua lactis, diebus intermedijs. Cui vsui
 ēt p̄stant q̄ attenuandi, & inscindendi vires obtineant: qualia abundē diximus
 capite de mēstruę p̄uocatione. Qd si summo manē tertio quoq; die leniter vniuer-
 sū corpus fricueris, nihil nocebit. Verū si flatuosę potius materię copia, q̄ cras-
 sioris sanguinis affectio suboriat, mittere sanguinem minimē oportet, purgare
 tamen

A tñ, ut præced. c. dictũ est, frequentius cõuenit, quod intelligas uelim dũ ex imbecillitate flatus non prodeunt, quippe tpe discussorij magis, q̃ purgantib. uteris) sicut alijs auxilijs, quæ nuper retulimus: quibus admiscere cõuenit discussorium aliquod, ut proximo capite facile reperiẽs. Tempus aut purgationi idoneũ, id est, quod antestat purgationi mensiũ, octo autem decem dierũ spatio.

B Vlcer, si huic malo causam præstiterit, ocysimè curabis, ne in grauius malũ affectio degeneret, principio curationis sumpto à totius corporis purgatione, à qua primò prodest succus plantaginis iniectus, præferum si ualde sordidum ulcus non fuerit: nã si sordes adsint, extergentibus erit vtendum, uel uti succo apij cum melle, uel prasilij, uel brasicæ. Item administrabis aquã ordeĩ cum saccharo, uel lactis serum cum eodẽ saccharo, uel syrupo rosarum. Sed quod utilius uĩ, est aluminosæ aquæ usus, uel lactis uirginæ cum saccharo. Quod si dolor uehemens sit, & ardor et decoctum ioschiami, uel papaueris cum alijs admiscebimus. Et tandem opiatorum medicamentorum, aliquid immitemus cũ supra dictis succis. Alia quidem huius census reperiẽs prolicua capite huic rei dicato, libro seq. de uteri affect. Verum si acres, calidos, ac mordaces humores sanguini admixtos, id uitium excitare cognoueris, institutis uictu paulò frigidiori moderato, ac optimi nutrimenti, animi quiete, & omni tranquillitate, ex rhabarbaro, antequam menses insint, uis terue purgabis, manna, cassia, aut decocto ex myrobalanis, aut aqua lactis, uel stillonica ex maluis semine maluarũ, altheæ, & cichorio. Interim tñ uti erit necessum ijs, quæ sanguinem attēperent, humorum acrimoniam retundant, mordacitatem compescant, ac serosos humores alio transferant. Quorum abundè dictum est capite de immodico mensium fluere. Scio tñ proficuum esse in hoc malo alijs nihil præstantibus, fontanellam in crure aperire, dum nimia, & habitualis corruptorum, aut utcunque aliter uitiosorum humorum copia ad uterum confluit, corpore uniuerso illuc humores transmittente, aut membro aliquo prauè affecto.

De mensuris, quæ debitum tempus anteuertunt. Cap. 12.

C Requentissimo euentu cõfirmatũ est in plerisq; feminarũ menstruã purgationẽ, licet per interualla repetat, nullum tñ statutum tẽpus hĩre, nullãq; legẽ seruare, sed menstruari ordine peruerso, mō naturæ periodum anteuertere, modoq; ipsum remorari, siquidem q̃ secundum naturã sunt, ordine & unica rōne pcedunt, q̃ uerò pter naturã, uariè, & confusè, nisi causa præter naturam connaturalis, & stabilis quoque ac firma facta fuerit. Quod etiã Platonem in Conuiuio, & Gal. lib. de util. respi. dixisse constat. In qua sanè mutatione plerunq; inordinatè procedit natura, aliquando uerò statutis interuallis accelerat, aut remoratur præscriptum sibi institutum. Quam proculdubio affectiõnem (cuius etiã meminit Hipp. lib. de nat. mul. p. hæc uerba. Si menses constituto tempore nõ fiant, &c.) quia grauissimorum affectuum causam esse, experimento fit certissimum: paulò diligentius expendere in animo est: ac primò eã quæ debitum tẽpus anteuertit, hoc capite exponã. Est quidem affectio hæc de genere eorum symptomatũ, quæ in uitata actione *Qualis affectio.* sanctoris naturalis consistunt, eius nimirum, cuius munus est menstruum sanguinem in naturæ usum, & gratiam per statutas periodos adseruare. Quæ sanè

facultas modo ex proprio vitio, modo damno aliunde sibi illato, a proprio munere aberrans huiusmodi vitiatam actionem promouet, quæ sentio pertinere ad retinentem vteri facultatem, vel ad expellentem, quæ quidem ex eo morbo aberrandi in proprio munere originem sortiuntur, qui vel intemperamento partibus, cui incumbit, vel eisdem partis deformi figuræ innititur, & consistit, ita ut humorem defluere permittat, aut ut par est probe continere non possit, donec statutum ad sis excernendi tempus. Quibus etiam aliquando accedit soluta vnitas, ex acrimonia, aut mordacitate humorum, vel utcumque aliter facta, proueniente. Que non minorem huius mali partem prestare posse, mihi est compertum, vitio solo humore in vterum à toto corpore, vel ab aliquo membro transmissio, ita ut ante tempus institutum facultatem laceſcat. Cuius etiam affectionis Hip. meminit 5. Aphor. 36. dicens. Mulieri si menses decolores, neque secundum idem tempus semper euenientes, purgationem indicant esse necessariam.

Causa.

Porro lib. 3. de sympt. cau. ex epto sumpto ab alui excrementis Gal. causas omnes actionis, quæ debitum tempus anteuerit, trimembri quadam diuisione optime visus est comprehendisse. Nam ob materiam, facultatem, aut causam sine qua non, vitium hoc posse fieri, aperta satis oratione monstrat. Primam tamen causam in multo plures subdiuidit, in copiam nimirum, alienam substantiam, tenuitatem, humiditatem, calorem, acrimoniam, aut mordacitatem materiæ. Secundam verò reduxit ad facultatis retentricis impotentiam, vel ad expultricis robur, vel irritamentum, maximumve vteri calorem. Causam autem sine qua non, eam esse censeo, quam ad sensus acrimoniam, & perspicuitatem reducit. Sensus. n. exquisitior causa videtur esse sine qua huiusmodi actiones fieri minimè possunt: siquidem necessum est expultricem irritari, si suo munere fungi debeat, id quod tanto promptius facit, quanto ob exquisitiorem sensum citius afficitur causis, quæ sensum mutare habent naturalibus, vel præternaturalibus existentibus.

*Causa-
tini co-
gnita.*

Cum affectus sese ipsum notum faciat ea certitudine, ut demonstratore non indigeat: superest causarum tantum dignotionem docere: nam eas & varietatem non parua & principium curationi prestare certum est. Ob id dignoscas humorum plenitudinem ex grauitate totius corporis, & ad motum pigritia, ex ponderis sensu, ex feminae habitu plurimo sanguini gignendo idoneo, ex vita sedentaria, & otiosa ex crapula, ex suppressa alia vacuatione, vel diminuta, ex pulsu magno, cui accedit per intervalla et paruitas, ex vrina rubea, crassa, & multa, ex sanguine ipso sola copia peccante: præsertim si ab eo excreto leuamen subsequi accidat. Acrimonia, mordacitas, & denique reliqua humorum vitia, ex calore, ex erosione, ex dolore præsertim parum ante sanguinis excretionem, vel dum erumpit facile percipiuntur, adhibito in considerationem feminae vitioso habitu, neque non, & vita præcedenti, ac alimentis, quibus vni consueuerit. Id et ostendit sanguinis excretionis natura, si tenuis fuerit, dilutus, aquosus, decolor, aut colore aliquo præternaturæ affectus. Quod si horum nihil adfuerit, & impetu sanguis prurperit, necesse est expultricem facultatem fuisse irritatam, conijcere. Verum si vlcus, aut alia causa eam excitauerit, ex ijs, quæ cap. præced. diximus, scire poteris. At si nec hoc quidem accidat, sed citra aliquem læsionis sensum prorumpat, læsam esse retentricem facultatem conijcies. An verò extemperamento, an ex figuræ aliquo vitio id malum procedat, distingues ex distemperamenti sensu: qui si nullus fuerit, vitii figuræ esse colligito,

Aligito, & ex ijs, quæ præcesserunt, aut ad sunt. Nam & tumor præter naturam, & inducta cicatrix, vel euerſa naturalis vteri ſtructure ex ictu, caſu, aut laborioſo partu, vel quouis alio accidenti, haud difficulter cognoscuntur. Quorum oïum ediscere prouidentiam conuenit, quippe quæ non raro ſeminis accidere ſolêt; ex quibus laxiores facti meatus, & patentioreſ viæ, mirum non eſt, ſi ſanguinē ante debitum tempus profundant.

Curationē igitur menſium non debito tpe fluentium inſtituerat Hip. lib. de nat. mul. aliquo modo citra methodum, & rationē. Quam ſanē cōplet ex braſſica, ruta, & decocto paleæ ordeï, exhibetq; polypū, & piſces odoratoſ, id eſt, cū aromatibus conditoſ, vt leuiſ ſit cibus, & qui vteroſ purgare poſſit. Polypi autē conſerunt maxime vtero, & purgatio leuiſ ſit, & ſtatum pellens. Lib. tamen 2. de morb. mul. aliter huius affectuſ inſtituerat curationem. Cæterum quia in genere vtcunq; tempuſ debitum peruertat, harum affectiõnum curationem tractari neceſſum eſſe duxi, cuiuſq; ſcorſum meminiffe, vt quæ maximi ſit momēti affectio. Cum. n. frequentiffimē viſum ſit ex ea menſtruatione, quæ conſuetū præuenire tempuſ aſſueſcit, immodicum ſanguiniſ profluuium ſuecreſcere, curandū ob id eſt, mox à principio in hoc affectu id damnum vitare, præterq̃, quod fecunditati, & conceptui ſolet eſſe graue, & certiffimum inconueniens, q̃ ſi quas diximus cauſas, exactē tenueris, haud difficulter efficies. Nam cognita plenitudine, ſeminā pauco victu tractabiſ, maiori ēt ſolito exercitio, & moderato ſonno, & parciſſimo potu. Mox tñ à principio ſanguinem ex vtraq; baſilica, p̃ ſeminē viribuſ extraheſ. Idq; non inſtante menſtruationiſ tempore, ſed in medio menſe, aut parum antē. Verum ſi non profuiſſe videatur, dextræ manuſ ſalnatelam ſecabiſ, & inde ſanguiniſ, quantum vires ferre viſum fuerit, extraheſ. Corporiſ item ſupremam regionem molliter ſummo manē perfricabiſ. Quibuſ ſanē vteriſ, donec plenitudinem ſatiſ eſſe depoſitam intelligaſ. Atq; ſic affectuſ vinum in totum auferet, ſicut & coctas aquaſ, præſertim eaſ, quæ cū cinnamomū efferueſcunt, imperabiſq; chalybeatam, vel deauratam aquam bibere, aut crudam, ſed mica panis mediocriter toſti emendatam.

C Verum ſi ex humorum vitio, acrimonia, calore, aut mordacitate p̃dicta affectio ſuboriat̃ ſita vt ſanguis, vel præ tenuitate deſſuat, aut præ acrimonia facultatē adhuc ſecundū naturam exiſtentem irritet; hæc duo primo facieſ (præterq̃ q̃ ſenſum retundere, & facultatiſ expultriciſ acutiem hebetem reddere, vt paulò inferiùs docebo, teneriſ) primū humoreſ corriget ſyrupis apozematiſ, & alijs auxilijs, quæ cap. de menſium ſuppreſſione diximus (pudet me eadē ſepius repetere) iuxta humoris peccantiſ conditionem. Nam calidum refrigerabiſ, acré & erodentem retundet, ac mulcebrem, & manſuetiorem reddet ijs, quæ lenia, & mucilaginofa ſunt. Optimi quoq; nutrimenti cibariæ admixcebiſ, ea enim & præexiſtenteſ ſuccoſ corrigunt, & utilioreſ deinceps gignunt. Quamobrē eam uictuſ rōnem inſtituere conuenit, quæ optimuſ ſanguinem, & copioſiorē generet. Vtero ēt prouidere oportet molliibuſ, atq; attēperantibuſ enematiſ, qualia ſunt, q̃ recipiunt oleū violarum, roſarum, & nenuphariſ, decoctū ordeï, maluarum, & florum ſaccharum etiam & expreſſionem ſeminum frigidorū. Caue re tñ tanquam à maximo malo, in huius affectuſ curatione oportet, ne interim dum menſeſ ordinatiores reddere nitimur, ſuppreſſionem eorū moliamur. Nā
& plu-

Curadi
r. 1110.

& plurimum, & vitiosum sanguinem diu continere, præsertim aduersus naturam, quumuis irritatæ, impetum, grauissimum est, & maiorum affectionum causa. Ob id cautè procedendum esse censeo, ijs tñ remedijs adhibitis, quæ causam illidant, vteri uerò, aut sanguinis compressionem minimè efficiant. Secundum, quod humorum vitio prævalente proficuum existit, erit quidè corpus, & confertim, ut maior cachochimia pars deponatur, expurgare: & deinceps paulatim, ac sensim, hoc est, per epicrasim quod superest, ne corpus, aut vehementi purgatione lædatur, aut vires labantur, educere rhabbari infusso frequenter exhibito, nimirum bis, terve in hebdomata, aut infusso, & leui facta ebullitione myrobalanorum citrinorum: uel si adustum quid superesse visum fuerit, foliorum senæ. At si iecoris caliditatem huic malo causam præstare compertum sit, post hæc sanguinem ex saluatela extrahes. Sicut si uteri calida distemperies, causa fuerit, ex uenis tali. Quibus sanè auxilijs fit, ut humores superuacui, & qui mali existunt causa, ad aliam regionem distrahantur, & paulatim citra dysenteriae, aut alterius affectionis grauioris periculum, minuantur, vel generari (uentilatione facta in iecore) definant.

Quod si ex facultatis retentricis vitio, uel instrumentorum laxitate, uel uitiosa alia figura malum hoc prodeat (nam dum ex secernentis irritamento proficiscitur, ut dictum est modo curari debet) prouidendum est facultatum robori per ea auxilia, quæ aduersa sint distemperamento imbecillitatis auctori. Nam si immodicam frigiditatem cum humore adesse cognoueris, facta leui humorum frigidorum ex agarico, & syrupo ex infusionibus purgatione, uel ex catholico cum modico electario indo, uterum curabis calfacere, & roborare calidis, & modicè siccis auxilijs: qualia sunt quæ ex oleo liliorum alborum, chamæmelino, anethino, & ruta ceo conficiunt, præsertim cerati forma cum modico ladano, styrace, & velzoino. Sacelli ex rebus calidis, vel siccis, utiles et existunt, facti ex milio, furfure, chamæmalo: anetho, ruta, matricaria, pulegio, thymo, umbra, & similibus, præsertim ex radicibus, & folijs, ac semine angelicæ siccae. Itè prodest inunctio balsami, aut olei roris marini, uel de styrace, theriaca et emplastri forma umbilico, & inferiori uteri regioni adhibita, proculdubio utilissima existit. Itè cõia emplastra, quæ per matricem in officinis parant, eundem quoque usum præstare solent. Multa quidè alia sunt, quæ distemperie, ac imbecillitatem corrigere possent, sed vereri oportet, ne plus iusto menses remorentur, & ob id horum meminisse sat est: nam ad pensum eorum, quæ diximus, prudens medicus alia facillè excogitabit, huic et usui proficua. Verum si distemperies calida fuerit, ea ratione qua humores calidos esse corrigendos diximus, mitescenda est, excepto medicamentorum purgantium usu: sat nam est victu refrigerante instituto, quiete, otio, & animi tranquillitate, aereque temperationi facto, adhibitis et syrupsis: & apozematis, ac temperatis clysteribus caliditatem attemperare. Si tñ diutius perstiterit distemperies, coniectandum proculdubio est, aliquid calidi humoris, aut præesse, aut generatum esse. Quãobrem leuiter corpus eo tempore manna, aut cassia, vel similibus purgatione vacuare oportebit, & ea quæ modicè siccant, ac refrigerent, vtero ad corroborationem adhibere, facta inunctione, ex oleo melino, rosaceo vetustiori, vel ex rosis siccis confecto, & alijs, quæ citra vehementem astrictionem temperare, ac roborare uterum possint. Quorum latè meminimus, li. 2. de auxiliiorum indie. Reliqua uerò

figuræ

A figura vitia vel arte emendabis, vel alijs auxilijs eorum defectum supple. Nam vterq; debitum tempus sanguinem continere non possit vterus, id protinus corriges: quippe si diu duret, emendare perdifficile, & periculosum est: præterquam si ex tumore præter naturam affectio prodeat: nam aliter eo tempore curanda, vt capite de vteri inflammatione perleges.

B Ite si ex ita, casu vel laborioso partu partes vtero vicinæ, & vterus ipse laxiores factæ fuerint, cataplasmate reficere, ac ad pristina figuram reducere necessum erit. Fiunt quidem ex terebinthina, puluere sanguinis draconis, thuris, mastichis, & consolidæ maioris. Itæ sunt ex albumine ouorum (si femina calidiori prædita sit temperamento) cum pulueribus rosarum, myrtillorum, balaustriarum, mastichis, & cum farina volatili. Item ex melle, & pulueribus coralli, sanguinis draconis, rosarum, mastichis, myrtillorum, dragacathi, & similia. Quæ prædicta forma, uel cerati, vel emplastri cum ladano, & cera conficiuntur, & passim a mulierculis parantur: additis aromatis, & calidis medicamentis, vt si quid frigiditatis in parte receptum est, medelam suscipiat. At si ex immodico, exactiori; sensu ceteris existentibus secundum naturam (anteuertat debitum tempus purgatio, nihil aduersus causas ages: sed omni ingenio sensum curabis hebetiorem reddere, non stupefacta potentia, nam id verendum in feminis est sed retusa sensus acrimonia pinguibus enematis, vel ex lacte, aut oleo violarum lenissimis inunctionibus ex axungi s, oleo sesamino, violarum, & amygdalarum dulcium, sumptis etiam frequenter amylo, uel rebus mucilaginosi, ac pinguibus, & frequentiori potu, quippe alijs vt periculo non vacat.

De mensuris, quæ debitum tempus remorantur.

Cap. 13.

MENSTRUAE purgationes remorantur quidem, & ipsæ ipsam purgationem protrahunt, vel ætatis cā, cū iamā desinere nituntur, vel vitio aliquo peculiari vteri, aut corporis totius. Sed primum vitium curatore non indiget, sed præcantore, qui provideat quominus cōsuetus fluxus (et si secundum naturam supprimatur) in podagram, coxendicum dolorem, aliumve affectum, vt frequentissime solet, prorumpat. Facto quidem copiosiori exercitio, & instituto victu pariori, donec, ex toto nobis cōpertum sit naturā destituisse a sanguinis menstrui generatione, & congestione, vel annuatim, aut bis, terve in anno sanguine misso. Quo facto raro ex menstruorum suppressione pericula adueniunt. Secus autē seras habet, quo tpe natura suppressionē minare vī. Vltimum verò vitium, id nimium, qd ex totius corporis affectu suboritur, emendari, satis superq; discas ex c. de menstruorum retentione. Verum dum hec affectio aliquo vteri, aut humorum ad ipsum defluentium affectu prodit, peculiarē quoq; requirit diligentiam, & peculiarē et curationē. Est sanē tarda mēstrui expurgatio, affectio de genere corruptarū actionū. Qd si ad imminutā reducere velis, nihil inconueniet, dummodo intelligas, id malū pertinere ad scernentis facultatis impotentiam, munus suum perficere nequeuntis. Idq; quia languidior iusto facta, vel fortasse impedita ex cā aliqua id efficiente, et si ipsa secundum naturam existat. Cui profectō actionis dāno, causam præstat id morbi genus, qd aut in mala figura (siue ex crasso humore ob-

Qualis affectus,

re obstruente, siue ex alia quauis causa prodeat) aut in distempetie existat, modo sit sola modo cum materia a fluxu. A

Causa. Causas huius morbi easdem numero esse cum ijs, quas diximus præcedentes affectionis causas existere certum est, verum omnino contrarias. lib. 3. de causis sympt apud Gal. reperies. Quas quidē ad humorū vitia, quæ mox referā, aut ad expellentis facultatis impotentiam, aut vltimo ad sensum hebetem, pari numero facile quiuis reducere poterit. Humorū. n. vitia sunt ipsorum paucitas, crassities, acerbitas, & visciditas; quibus accedit siccitas, aut fœculentia. Inquit. n. Gal. lib. 5. Aphor. com. 36. Contingit. n. mulieribus, quæ prauos humores habent, nō modò decolores apparere purgationes menstruas, sed et tps periodi non seruari, siquidem crassiores fuerint humores, & difficilius fluentes ijs, qui secundū naturam se habent, morando, & longius tps expectando. Impotētia uerò facultatis, vel vitio proprii temperamenti, quo in actionibus obeundis fungitur ex frigore abortio, vel instrumenti, quo operatur, ineptitudine, contracta quidem ex figuræ vitio, modò obstructio sit (quod frequentius accidit) modò quoduis aliud figuræ damnū. At sensus hebetudo, q̄ ad cām sine qua non Gal. reducit, facile huic malo causam præstare habet. Nam neq; pondus, neq; acrimoniā (siue naturalis sit, siue ab ea recedens) donec nimia sit, & plurimum à naturali dissidens, persentiscit: siquidem, vt dictū est, oportet expultricem irritari, si suo munere fungi debeat. Id quod tantò promptius facit, quantò ob exquisitiore sensum citius afficitur, tardius uerò, q̄tò minus senserit quæ nōxia sunt. Ob id quidem hebetate existente partis sensu, nihil mirum est, si menses protrahi cōtingat. Cognosces haud difficulter quale sit humorum vitium ex ijs, quæ cum sanguine excernuntur, & ex sanguine ipso; nam præterq̄ quod visui albidior apparebit, erit quoq; crassius, aut viscidus, ita vt difficulter à partibus, quibus adhaerit, separari possit. Constabit quoq; id ex vita præcedenti sedentaria, ex forma vitii crassā quoq; & ex edulij pituitā redolentibus. Quæ proculdubio oīa, fœminæ laborantis habitus mollis, ac plerūq; obesus, colorē subalbidus, aut plūbeus facile monstrabūt. Sicut, & sanguis ipse, qui lentē prorūpit & mouetur, ac diu menstruæ purgationes durāt, delinuntq; sæpe in mucos quosdam, ac pituitosa purgamenta. Imbecillā uerò existere facultatem excernentem ex eo colliges, quod et si transacto menstruationis tpe, fœmina molestiam, aut grauitatē aliq̄ persentiat ex sanguine illo præter naturā institutum retento, cum hoc tñ nequit languida facultas ad motum sese accingere, sed diu permittit molestari, donec validiori facto irritamento, tandem in minutam q̄dam purgationē prorumpit. Quod sanè vitium solet et haud rarò contingere retentrice ad modum valente, neq; tpe stato humorem sibi cōmissum prætermittente. Instrumentum aliqd vitiatū esse ex ijs, q̄ p̄cesserūt, perdiscere poteris. Nā ex laborioso partu, ex tumore aliquo præter naturā præsentē, aut iam curato, ex prauē et confecta cicatrice, vel ex saltu, aut casu alio, haud difficile est membrum aliqd vtero vicinū, aut subseruiens, aut vterum ipsum dislocari, aut praua alia figura affici. Qd proculdubio in fœminis frequentissimè accidere solet. Sensum porrò esse habentē cognosces facile, quia et si menses diu remorentur, nullam fœminæ in vtero, aut partibus vicinis molestiam percipiunt. Signum sanè euidentē sensum esse obtusum: siquidem nec plenitudinis pondus per sentit, nec acrimoniæ molestiam.

Maximi

*Causarum de
gnatio.*

A Maximi, proculdubio momenti erit diligens huius vitij consideratio. Nā facil
 limū esse cōperitur, plus minusve in eius curatione, morbo, tribuere q̄ par sit. *Curādā
 ratio.* Et ob id sedula diligentia curandum est, ne quid horū vsquam curanti accidat.
 Quod profectō facies, si primō consideraueris humores crassos, viscidos, ac lē-
 tos mēstruā purgationē remorantes, exposcere imprimis victum extenuātem,
 maiusculū exercitiū, frequentiores totius corporis frictiones, ac vltimo extenuā-
 tes, calfacientesve potus: quales ex calamēto, cinnamomo, ferniculo, saxifragia,
 pimpinella, adianto, & alijs similibus parari solent. Post quæ cōsiderabis, à quo
 auxilio curationē auspicari oporteat. Nā si sanguinē detraxeris hac humorum
 idea redundante, haud parum offendes: si inscidentibus, & extenuatibus vtaris
 corpore existēte pleno, nō minus lādes: si uerō purgaues, nihil magis efficies
 sed fortasse deterius quid. Nam plenitudine in corpore iam collecta uerendas
 esse per pharmacum purgationes vnanimi Doctissimorū consensu cōstare arbi-
 tror. Quā pp, vt mea fert sētia, supposito his tribus auxiliorum generibus vtē-
 esse necessario: rectā medendi rōnem à tpe, quo vnumquodq; fieri debet, sumē-
 dum esse existimo. Quippe mox facta naturali mensium purgatione, q̄ plenitu-
 dinem deponat, ne opus sit sanguinis detractio, & viam suppeditet purgan-
 tibus, auxilijs, circa prædictum periculum curationis principium auspicari o-
 portet. Quo sanē tpe, vt pote corpore ex natura vacuato, quæ humore inscinde-
 re, extenuare, & abstergere possint, porrigere tutō poteris, quibus collecta men-
 strua purgatione, & instāte, vt non dat. Nam maiores, & pressiores proculdū-
 bio fient obstructions, ita vt saepe ex leui obstructione, aut humore non fluēte
 ob crassitiē, contingat fluere non posse pp integram obstructionem, vi medica-
 mentorū factam. Hūc consimilem curationem docuerat Gal. lib. 5. Aphor. cō.
 36. dicens. Possunt igitur, & menses tardi, hoc est, qui post consuetum veniunt
 circuitū purgationē indigere humoris pituitosi, ob quē, & decolores fiunt non
 tū egemus hac sola necessario. Nā & per extenuantem aliquando victum tales
 affectiones sanabimus. Et subdit. Suffitus insuper aromatum idem facit, & qui
 eandem vim habent pelli adhibiti, epotaq; medicamenta, q̄ inscindūt, & humo-
 rū crassitiē extenuant, quale est, quod ex calamento fit, quo nos assidue vtimur,
 quoddā; sepius tardantes mensiū purgationes ex ciuit. Nā initium sanationis in
 ipsis est, cū ora vasorū aperire, q̄ pertingunt ad vterum, tunc sanguinem exte-
 nuare. Ac sanē purgatio totius (vt dixi) q̄ crassi euacuātur humores, tales sanat
 affectiones. Quibus uerbis breuissimē visus est vniuersam huius mali curationē
 comprehendisse. Cui proculdubio, ut optimē fiat, tempus præstatut mox à mē-
 strua purgatione. A qua sanē ego curationem auspicarer, & mox medicamen-
 ta prædicta porrigerem. Post q̄ quidem purgantib. iterum vi pharmacis tutius
 & vtilius erit, autē (inquā) q̄ plurimum sanguinis in vtero, aut uicinis partibus
 succrescat. Cui vsui, agarico, electario indo, modico diaphenicone, uel pilulis
 mastichinis, aut de agarico vi proculdubio poteris. Quo facto (vt ordinē faciē
 dorū proponā) sex, aut octo dierum spacio ante menstruationis tēpus non erit
 ab re sanguinē ex talo mittere, & postmodū ipsum ad inferas sedes euocare cru-
 rū lauacris, frictionibus ligaturis, ac frequēti cucurbitillarū suris, ac femoribus
 appositione: quas rarō scarificare consulo. Nā crassus ille sanguis difficulter p-
 cutis scarificationes, spirauit, & ad euocationē sat sūt reliqua præsidia, qbus sic
 factis,

factis, si adhuc menstrua purgatione protrahi conspexeris, transacto purgationis tempore, utile citra dubium erit corpus per epicrasim purgare, & sanguinem à pituitosorum, crassorum, ac viscidorum humorum spurcitia liberare. Quod quidem facies sumpta pillula una ex agarico, aut ex mastiche, vel leui agarici, aut turpeti, vel cartami infuso aqua saxifragiae, graminis, pimpinellae, adiantis, cinnamomi, calamenti, feniculi, aut similium facto: quo tertio, aut quarto quoque die exhibito mirè profuisse comperimus. Sicut corpus exercitio mandare, aut fricare diebus intermedijs, sumpto èt aliquo ex medicamentis, quae menses mouere simul, & crassos humores attenuare nata sunt. Quorum syluam adduximus ca. de mensium suppressione. Quibus admiscere utile esse expertus sum, theriacae vel mithridati aliquid, sicut ventrem inferiorem inungere oleo caparorum, liliorum alborum, de anetho, ac de croco, vel de cinnamomo, si haberi potest, vel confecto ex angelica cuius miram censem esse efficaciam, adhibitis èt fomentis, uel clysteribus, aut in fœtionibus ex decocto fenugraeci, chamaemeli, anethi, meliloti, feniculi, petroselini, maticariae, dauci, & aliorum medicamentorum, quae praedictas vires obtineant. Cui quoque vsui ego proficuum esse censeo. Galenusque loco citato summo opere commendat, suffiibus aromaticum uti, quippe hi humores extenuant, & vias patentiores efficiunt.

At si ex impotentia expellentis facultatis menses ultra statutum tempus prorogentur: id primò efficies, ut distemperiem, cuius vitio facultas labefactari cognoueris, corrigas. Frequenter. n. ex caloris defectu id accidere conspiciamus, vel ex humido uteri madore, quo sensus obruitur, minimeque praesentit ex potere molestia. Quamobrem & calfacere ijs, quae nuper diximus, vterum oportebit, & praeparare exsiccare, ac corpus purgare, si humiditatem praesse cognouerimus, adhibentes primò cibum calfacientem, & modicè acrem, ac mordacem, ut irritato quodammodo sensu, ad expulsionem gliscat natura. Quem usum quoque praestant euporations ex decocto origani, pulegij, menthastris, siclae, thymi, nasturcij, & similium. Clysteres èt acres conficies, ex eisdem rebus, & alijs, quae modicè facultatem lacestant. Quem sanè vsum peculiari quodam dote praestant pessaria uteri osculo apposita, qualia sunt, quae cap. de mensium suppressione, menses mouere diximus. Verum si ex uitio alio figurae affectio suboriat, aut facultas inerior facta sit, cerati, emplastris, cataplasmatibus roboranda est, ijs nimirum, quae calfaciendi, & firmandi membrum vires obtinere capite praecedenti diximus.

De mensuris corruptis. Cap. 14.



NON solū in mensuris purgationibus vitium inest ex quantitate aucta, uel diminuta, aut ex improbo fluendi ordine: sed frequētissimè in ipsa excreta substantia uitium quoque comperimus, nimirum, ipso sanguine fluente, vitioso facto in propria substantia, uel ex miscella alicuius parui succi, cuius ratione menses decolores fiunt, hoc est rubrum, colorè, & naturalem non seruantes. Quod facillè comperimus, si pallidi fiunt, albicantes, linidi, nigri, virides, aut plurius simul colorum, id verò pro ratione humoris, qui sanguini admiscetur. Quorum recordatus Hip. lib. 5. Aphor. 36. dixisse opinor. Mulieri menses decolores, neque semper idem tempus semper euenientes, purgationem indicant esse necessariam.

Est

A Est proculdubio huius affectio de earum sorte, quæ ad exiens mutatum pertine- *Quali affectio.*
re vult, tertium quidæ symptomatum genus. Nam cum sanguis ruber, & naturalis exi-
re teneat, mutatum esse inficiabitur nemo, si cum prodire conspexerit decoloré, aut
præuio alio colore affectu. Proficiscitur porro, ut plurimum ex distemperie to-
tius corporis, vel alicuius membri præcipui, iecoris nimirum, aut ventriculi, ac non
nunquam vteri ipsius. Quo morbo prædictæ partes affectæ faciliè prædictos humores
reducere efficiunt, quæ ad vterum dilabentes huiusmodi concitant affectum, quo non raro steri-
les fiunt feminae morbose, & viris ingratae, aut mille alijs affectionibus pressæ.

Causæ verò, quæ id malum excitare habent, eæ sunt, quas mox reuolimus, ceterum *Causæ.*
specialius sunt expendendæ. Prauas, & paucas mensium purgationes, Hipp. lib. de
locis, aqua, & aere, refert prodire ob depravatam substantiam potus (& ut ego ad-
do, victus, aut ratione uitæ) inquit enim. Ex mulieribus verò primum quidæ mul-
te steriles fiunt præ quibus, quæ duræ sunt, crudæ, & frigide. Purgationes. n. men- *Aqua.*
sium non contingunt commodæ, sed paucæ, ac prauæ. Cuius sanè rei ratio est, quod
crudæ aquæ in feminis (& reliqua huius census cibaria, aut alia, quæ prauæ sunt
substantiæ) quæ calorem habent imbecilliorē, non coquantur, & ob id san-
B guis crassior efficitur. Quo fit, ut non fluat, aut parum fluat. Et quoniam non bene pur-
gatur, etiam corrumpitur sanguis, & menses non prodeunt quales debent. Di-
cuntur autem quales non debent prodire, cum substantia sunt nimis crassi, aut aquo-
si, colore albi, aut nigri, aut flauī, aut mixti, odore fetidi, qui sunt deteriores ni-
gris ac demum cum egrediuntur cum dolore. Quas omnes differentias adamussim
recenset iterum Hipp. lib. de nat. mul. dicens. Si vteri pituita impleti fuerint, status
oboritur, & menses albi, pituitosi superueniunt. Aliquæ et sanguis tenuis pellicu-
lis plenus, & præ humiditate cum viro coire non vult, & pallida, ac tenuis sit.
Flaua. n. uilis pallidos efficit menses. Quem sanè humorem proficisci ab exurē-
te iecoris caliditate nemo negabit, sicut albi ites reddere inundas pituita ex ven-
triculi, aut vteri frigido intemperamento. Ita quoque in nigrum coloré, sanguinē,
vertit melancholia ex iecoris siccitate, & splenis impotentia per vniuersum cor-
pus redundans, atque ad uterum delata. Pari et ratione liuidos, uirides, aut plurimum
colorum menses fieri conspiciamus, uel ex membrorum nutrimentalium diuersa,
C ualidaque intemperie, uel ex totius corporis uitioso temperamento, uario tamen in
diuersis eius partibus, præsertim ad caliditatem vergente cum totius imbecilli-
tate. Ex quibus constat, quales sint corruptorum mensium causæ. Præter quas aliæ
etiam addit Hipp. lib. 1. de mor. mul. nimirum, mensium trimensium suppressio-
nem, quæ menses efficit suppuratos, inquit. n. Signa uerò sunt, si suppurati fue-
rint, dolores in pectine, & pulsationes fortes, etiam inctum non sustinent. Et si
melius habitura est, menses ipsi erumpuntur in pudendum, & procedit pus, ac
sanguis, & procedit graue olens ad septimum, aut octauum, aut nonum diem.
Atque hæc in vniuersum sunt mensium deprauatorum causæ.

Docet Hipp. lib. de nat. mul. & 1. de mor. mul. ex colore, humorem peccantem in *Causa.*
mensibus cognoscere, primò. n. loco iubet, sanguinē menstruum super arenam spargi, *ru. & as.*
& exsiccare Sole, & si color euaserit pallidus, flauam bilē dominari refert, si uerò *secus di-*
sub albidus, pituitam: quæ noscere docet idem autor lib. de mor. mul. his verbis. Si *gnosis.*
mulier corpore male habuerit, & pituitosi menses præderint, cognosci aut possunt,
si pituitosi prædeant, pelliculosi. n. apparent, & uelut araneorum casses distendun-
tur,

tur, & subalbidi sunt. Hoc autem contingit, si corpus, & caput ipsi pituita repleta fuerint, & hæc non sit purgata neq; per nares, neq; per sedem, neq; per vrinæ meatum, sed in mensibus, & in turbatione sanguinis vnà cum purgatione foras exit. Licebit autem totam Hipp. dictionem subiungere. Nam ex eo sermone facile discēs, & causas, & affectus naturam, ac prælagandi rōnem. Multa. n. refert pericula fœminis sic affectis succrescere. Si mulier corpore malè habuerit, & menses biliosi prodierint: ex hoc probè cognosci possunt, si nigri sunt, qñq; verò nigri, aut splendidi, & paucissimi prodeunt, & citissimè congelant. Ac subdit paulò inferius. Et incipiente quidē morbo purgatur diebus, quibus solita fuit, non pluribus. Progredientibus autē mensibus, pluribus diebus purgatur, & menses pauciores singulis diebus apparent, & febres succedunt erroneæ, acutæ, cū horrore, & cibi fastidio aliàs atq; aliàs, & stomachi dolor, & dolebit magis vbi menses appropinquauerint. Postq̃ autē purgata fuerit, & ad modicum tps superiorū respectu melius habuerit: postea rursus ad idem perueniet. Dum autē curatur, citò sana fit. Si verò non curetur, & tps procedat: oīa prius relata valde ipsam affligent, & dolor corripit inam ventris partem infra vmbilicū, nunc inguina, nunc lumbos, & coxendicum ad sedis iunctarum, nunc collum, aliquñ verò strangulatio fortis accidit, & caligo ante oculos obuersabitur, & vertigo, vtpote purgatione sursum vergente, & accedente. Si in corpus male habuerit mulier, menses pauciores fiunt. Et quibus corpus plenum fuerit, his menses plures prodeunt. Et tandem subdit Hip. docens signa redundantis humoris. At verò biliosi si menses prodeant: pusillanimitas incidit, & cibi fastidium, & anxietas, & vigilia, & eructat frequenter, & non vult deambulare, & tristis est, & nō uidere sibi vī, & timet. Tandem paulò inferius inquit. Si. n. quid ex his fortè inciderit in corpus afflicto, periclitabitur. Si verò leniter, depurgetur aliquid biliosi, aut totū id, qđ molestum est, sana fiet. Si verò neq; curetur, neq; quicq̃ horū fiat, morietur mulier. Quibus verbis, & alijs, q̃ paulò inferius subdit, euidenter constat qualia sint accidentia, q̃ his fœminis ex hoc morbo succrescunt, vt facile in eius notitiā deuenire possimus. Nā si optimi medici diligentia fœminarū q̃remōias intuearis: proculdubio plerasq; mēstruorū corruptione affici conspicias, tā virgines, q̃ viduas, & eas et, q̃ viro vtuntur. A quibus interrogare iubet Hipp. lib. de nat. mul. (vt certiores nos humoris peccātis reddat) an qđ fluit, mordeat, & exulceret: & si non mordeat, pronuntiare à cerebro fluxum esse, si verò mordeat, à uētre. Sed pensatis Hipp. signis, ad alia nobis confugiendū est, si quidē menses ob pituitā, aut melancholiam, decolores longo tpe latent, & protrahuntur, biliosi verò festinanter prodeunt, & albi quoq; subinde festināt, modò serosi sint. Corruptos et esse menses vel ex eo discēs, q̃ eodē semp mō, neq; cunctantur, neq; anticipāt et si q̃ maximè semp eodē mō viuant, eo qđ tēperatura optima semp suo more constat, & parū certè huc, aut illuc mutatur. Intēperata verò lubrica est, & nūq̃ eodē statu pmanet, sed modò, huc mō illuc magis inclināt. Medium. n. certis quibusdā terminis circumscribit, extrema in vtranq; partē varijs modis insolescūt, & luxuriānt. Itabilis, prout est morosior, aut procacior, nūc plus, nūc minùs festinat. Et pituita quò est ignauior, eò magis cunctat. Præterq̃, q̃ ex acrimonia, calore, & exulceratione bilē flauā rimari et cōceditur, sicut pituita ex stupore, mucore, frigiditate, flatu, & uteri tensione. Quapp̃ pter sanguinis fluetis, colorē, vi-

tæ,

Ate institutum, corporis habitum, accidentia, quæ superueniunt, fluendi quoq; modum, & rationem intueri fas est, vt certiores facti, tutius grauissimi, & communissimi huius affectus curationem aggredi possimus.

Huius affectionis curandi rationem, ac methodum. §. Aphor. 36. & libris de morb. mul. & de nat. mul. adduxit Hip. veruntamen ita obscure, indistinctè, ac breuiter, vt omnino tyronum captum subterfugiat. Quamobré sumptis ab eodem Hipp. principijs, paulò clariùs hac in parte illam aggrediar. Iubet itaq; §. Aphor. fœminas, quibus menses decolores sunt, purgandas esse. Cuius opinionem in sequens Gal. in com. ita refert. Si verò menses decolores sint, multò magis purgatio sanabit ita se habentes mulieres. Verùm fœminas sic affectas triplici remediõrũ genere curare oportet. Primò præmissa humorũ cuiuslibet naturæ sint, præparatione, ea nimirum, quæ extenuatione perficitur, secundò purgatione p̄ vtrinq; alium pharmaco conuenienti facta, tertio medicamētis, q̄ vires habeant. conterendi, ac discutiendi, q̄ ex humoribus post purgationē superest. Extenuationi igitur humorum tantum innititur Gal. com. citato, vt tenues etiã

*Chrys. lib.
ratio.*

B humores, adhuc biliosos, extenuari iubeat, cum illud primò accessu non videatur ad modum necessarium, siquidem ipsi citra maiorem extenuationem p̄ vterum fluere assuescunt. Sed quòd pituita crassa, ac melancholia attenuatone indigeant, priùs quam possint alacriter educi, omnes fatentur. Idem etiã est de flauabile iudicium, etiã si sanguine tenuior, fluxibiliorq; existat. Quippe non eadem facilitate vilis per angustas hepatis vias à medicamento educetur, quæ à natura per manifesta uteri, aut hæmorrhoidũ ora expurgatur. Quamobré antequam illuc deuehat, attenuatone maiore indigebit, quam dum per vterum solum expurgare nitimur, siquidem flauabilis præcociter sanguinem mēstruum per vterum seducit sine extenuantis adminiculo. At dum aliò purgare ipsum humorem est in animo: vltèrius extenuare oportet. Idem est de melacholia. Cum hoc tamen pituitæ aliquando sola concoctio sufficit, quòd concoctũ, in bonum sanguinem sepe transmigret. Saltem attenuata sanguinem mēstruũ non impedit, & cum eo decedit. Verum cautè hic obseruare oportet, ne p̄ extenuantibus, vehementer mēstrua prouocantibus vtamur, nam subinde, & hic

*De humo-
moribus
extenua-
tione.*

C & alibi plus obsunt, quàm profint, vel quia id, quod serosius est, colliquant tantum, vel quia multa prouocatione multitudinem angustijs vasorum magis impingunt. Extenuantibus igitur paulatim, ac sensim primò veris, qualia sunt, quæ longo nobis vsu & ratione explorata existunt. Quæcunque enim olfactui, gustui, aut vtriq; simul acria, & mordacia, & calida apparent: ea facultatem habere attenuandi, atq; inscindendi certum est. Ad hæc, si quid olfactu odorem bonum inferens, aromatis speciem gustui repræsentet: id quoq; calidum viribus, esse oportet, & attenuans, quamuis non perinde, ac ea, quæ mordicant, & rodũt & insigniter calida sunt. Attenuant præterea, & inscindunt, q̄ saporem habent nitrosum, aut salsum. Nec minùs, quæ amara sunt. Item, q̄ acida, vt acetũ, & quæ ex eo cõsũt. Ex quo pater attenuantia omnia non calida modò, sed sicca et facultate esse, & tanto magis attenuandi vi pollere, quantò fuerint sicciora. Et ex ijs similiter, quæ sicca non sunt, maturiora alijs minus maturis, & quæ siccis locis proueniunt, & montibus, ijs, quæ in paludibus, & campis crescunt. Sunt tamen primi inter vt tenuantia ordinis, allium, cepa, nasturtium, & porrũ: quæ proxi-

*quæcunque.
acria
mordacia
& calida
attenuant
& inscindunt*

G mē

mè accedunt ijs, quæ menses ualenter mouent. Post illa aut smyrniū, pyrætrum, **A**
 organū, calamintha, sisymbrium, pulegium, satireia, thymus. Quibus ordine
 proxima sunt capparis, terebinthi fructus, crucea, sium, apium, petroselinū, ori-
 ganum, raphanus, brassica, & beta. Quibus (p̄sertim eis, q̄ calida sunt) decoctis,
 aut forma syruporum confectis uti in extenuandis huius affectus humorib. po-
 teris. Quippe calidiora corpore existente cacochimo, febres, fluxiones, & alios
 grauiorē affectus fœminis accersire mihi non est dubium. Acida uerò in eis ui-
 tanda quoq; esse consiluit utri conditio. Qualia autem sint, quæ menstrua ualē-
 ter euocent, cap. de prouocatione mensium dicta sunt. Ac si eorum aliqua hic
 reppereris, scito, mitioribus esse admiscenda, compescenda uero.

*De pur-
gatione.*

Facta sufficienter humorū extenuatione, maiore nimirū, aut minore, prout
 humoris cōditio exposcere uideat̄: biliosis nimirum, mitioribus, temperatori-
 busq; pharmacis adhibitis, pituitosis uerò, & melancholicis, paulò acriorib. Ad
 ministratis ēt potibus, & alimentis prædicto vsui idoneis, commodè eo tēpore **B**
 purgationem institues. Cuius initium sumes à pleniori aliqua purgatione, quæ
 fiat pituitoso humore redundante ex agarici infuso in aqua graminis, cū syru-
 po ex infusionibus rosarū persicarū. Item ex infusione turpeti, in qua dissoluan-
 tur electarii indi, uel diapheniconis. ʒ. iij. uel iij. aut diacatholiconis. ʒ. j. Ex bo-
 lis ēt ex agarico cum p̄dicto diacatholiconē, aut ex pilulis mastichinis, de aga-
 rico, elephanginis, aggregatiuis, & de hiera purgationē quoq; institues. Quod
 si humores biliosi p̄ualuerint; eisdē purgabis infuso rhabarbari, aut myroba-
 lanorum, aut utriusq; syrupo ēt ex infusionibus, manna, castia fistula, & simili-
 bus: quibus uel rhabarbari, uel myroba'anorum aliquid admiscere poteris, ut
 plenior fiat purgatio. Quā in robustioribus fœminis pleniorē efficies electa-
 rio rosarum Mesues diluto in aqua lactis, uel cichorii, aut pilulis aggregatiuis,
 uel de rhabarbaro in modica quantitate cum aloe. At si melancholicum succū
 redundare cognoueris: robustas fœminas cōfectione hamec purgabis, sed in
 maiori dosi, ex ea nimirum, quæ simplicissima conficitur sine scāmoneo, & co-
 locintide. Nam reliqua vsu venire solet rarò. Purgabis ēt casia, uel decocto se-
 næ, aut saccharo violarū, uel violis ipsis saccharo conditis. **C**
 Ceterum facta hac
 purgatione, curabis deinceps paulatim, ac sensim corpus à vitiosis humoribus
 expurgare, ita ut simul & humores extenuēs, & per epicrasim expurges. Nullā
 enim præstantiorem curandi rationem adinuenies in corporibus multo vitio-
 so succo abundantib. q̄ paulatim facta vitiosorum expurgatione, & ex laudabi-
 li nutrimento noua facta refectione. Quibus autem paulatim purgationē mo-
 liri possis præcedentib. capitibus abundē dictum est. Inter vnā tamen, & aliā
 purgationem concesserit extenuantibus uti, & modico exercitio, atq; clysterib.
 quæ & corpus, & uterum ipsum purgare possint. Quod si uentriculum causam
 esse redundantis pituitæ cognoueris: proficuum fore auxilium censeo, fœminā
 bis, semel uel ad uomitum cogere, ut quod in dies ibidem præter naturæ institu-
 tum aggregatur, statutis dieb. antequam uenas irruat, expurgari possit. Quod
 de biliosis etiam succis subaudiri, non displicebit.

*De abusu
medis
humoris
reliquis*

Verū si p̄missis pleniorē, & paulatinis vacuationibus, residui aliquid adhuc
 supererit: prouidendum est omni arte antequam in maiorem molē succrescat
 radi-

A radicitus extirpare. Ceterum quia id vel in utero, vel corpore reliquo, aut in v-
triusq; vagari compertum est: necesse quidem erit auxilijs per vtrāq; partem pu-
gnare. Sic ea, quæ in vniuerso corpore supersunt, optimè extirpant sudores vel
naturales, vel arte excitati ex decocto pentaphylli, sparte parellæ, radicis chi-
næ, aut cuiusvis alterius rei, quæ citra maximam totius corporis turbationem,
aut humorum efferuescentiam id efficere habeant. Verum quia flauabilis agrè
tolerat vim auxiliorum sudores mouentium: balneis aquæ dulcis temperatè ca-
lida rem agere oportet. Quod sanè auxilium melancholicis etiā humoris profi-
cium esse nemo negabit. Omnibus tñ vtilissima est totius corporis mollis, sed
largiuscula frictio. Vtrobū etiā adhibebis pessaria, & suffumigia, quæ præcedē-
ti c. duximus. Verum vtriusq; theriaca, mithridatum, aut angelicæ decoctum,
præsertim frigidis succis præualentibus opitulabitur. Quod si neq; his omni-
bus affectionem quiescere compertum fuerit: nihilo intius, aut citius huic ma-
lo opituleris, quàm aperta in altero, aut bombus erutibus fontanella. Nam
dum membri alicuius, aut totius corporis facto intemperamento, hi humores
in corpore propagantur, vt ex purgantium pharmacorum frequentia, & vsu
B plus læditur: ita hoc saluberrimo præsidio magis, quod in dies aggregatur, su-
sceptat beneficium. Nec displicebit membrum primò affectum corroborare, ac
iungere iusta distemperiei modum.

*De Albis vteri purgamentis.**Cap. 15.*

INTER plerasq; affectiones, quas feminæ ratione sexus mise-
rè perpetiuntur, ea profectò potissima est, q̄ in vteri purgamē-
tis (siue alba sint, siue ulterius coloris) sita, mille accidentibus
adiuncta feminas ipsas creberrimè torquet. Quippe cum co-
gnouisset natura, vterū non solū fuisse huic sexui concessum
propagandæ proli gratia, sed veluti sentina, vt toti et corpori
inferuieret, non modo secundum naturam in mensuris purgationibus, verum
renū more, dum aliquid modum naturæ exuperat, illius quoq; vacuationi sub-
seruit.

C Nam dum vterus, aut corpus vniuersum prauè afficiuntur, & affectui non
satis est menstrua purgatio, assuera per illam partem natura sese ab humorū in-
iurijs tuetur. Quod et mali persentiscit esse cām, præcauens maius malū, per vte-
rum quoq; excernere nititur, licet ab huiusmodi excretionē affectio hæc nō mi-
noris momenti suborietur. Cuius sanè mali Gal. meminit li. 3. de sympt. cau. c. 4.
Quod procul eubio, vteri purgamentum appellare libuit, licet vulgus (nec im-
merito quidē) albos flores appellet, sicut alij albas matricis supfluitates, & ple-
riq; et fluxum muliebri nuncupent. Est quidē diuturna, & nonnullis continua,
alijs per intervalla superueniens p vterum distillatio ferè indolens, vlcerato iā
vtero, dolorificè. Vt ex Gal. colligitur lib. 3. de cau. sympt. & 6. de lo. aff. Profluūt
autem ab utero purgamēta hac lege à menstrualī purgatione diuersa, q̄ in hac
sanguis ferè sincerus iusta mēsurā, & debito tpe prorumpat. At in muliebri flu-
xu, quod excernitur nunc rubrum, quod non sanguis, sed ipsius sanies existit.

G 2 At

At multi autumant. Vt Hip. testimonium est lib. 2. de morb. mul. quo hæc verba **A**
 refert. Ruber fluxus fuit talis, qualis sanguis victimæ recens mactatæ, & grumi
 pellucens. Cuius sententiam insequens Areteus lib. 2. de signis, & cau. diutur.
 c. 11. inquit. Fluor sanè ruber, aut albus est, ruber quidem si sanguis flauus ema
 net, & huius species, vel liuidus, vel niger, vel tenuis, vel crassus, & cœcretus, &
 grumi. Albus (inquit) ut aqua, aut flauus cum pallido mixtus, ut vilis: crassus ve
 rò, aut subtenuis, aut tenuis liquor, & malè olens: albus item ut pus, sed exquisi
 tè albus, ut album serum. Quin etiam gutta cruenta nonnunquam cum pure si
 mul effluit. Et subdit. Mille aliæ sunt secundum rationem maioris, aut minoris
 istorum met species. Sed ad pensum rediens censeo rubrum fluxum aliquando
 sanguinem posse esse, aliquando saniosum sanguinem; quorū nullus mēstruā
 purgationem complet, sed vterque vteri, aut corporis est purgamentum, citra
 naturæ ordinem, & rationem profluens. Aliquando verò id, quod ex vtero pro
 fluit, album est ac tenue, lactis sero, aut pituitæ cremori persimile, à pituitoso
 sanguine proueniens, quo corpus abundat, & sine dolore erūpit, ut ex adducta **B**
 Aretei sententia euidenter constat. Nunc etiam luteum, aut pallidum est, liqui
 dum quoque & aquosum, à seroso excremento proueniens: sæpe verò subniri
 de, quo fuliginis colorem imitans, adeoq; acre, & erodens, ut quamcunq; par
 tem attigerit, adurat, ac leuiter exulceret, vilis quidem amaræ, & eruginosæ so
 boles. Atq; id rursus tetri, grauisq; odoris, aliàs nullius est. Quas sanè fluxus dif
 ferentias multis modis barbari medici depinxerunt, & numerosa sobole mul
 tiplicarunt, iuxta Erasistrati sententiam, qui terdecim humorum differentias e
 numerauit. Quas ego potius ad diuersos putredinis, aut corruptionis modos re
 ducere, quàm ad humorum prædictam varietatem. Est tamen potissima om
 nium differentia, nimirum, quosdā fluere tenues, crassos alios, plures citra mor
 dicitatem, & qui nullum inferunt læsionis sensum, alios verò mordaces, & a
 cres, ita ut sæpe vteri collum erodant. Vnde purum sanguinem fluere contin
 git: quem à menstrua purgatione ex præcedenti dolore, erosione, sanie, ac inor
 dinato fluendi modo sciungere necessum est, ut Gal. 6. de loc. aff. docere vide
 tur. Cæterum si quis Hip. lib. 2. de morb. mul. attento animo legat, reperiet pro
 culdubio tot esse huius fluxus differentias, quot sunt humorum sortes, ac idæa, **C**
 qui fluere possunt. Et sic ex pituitæ crassitie differentias duas annumerat, ex san
 guine duas aliàs, ex bile tres. Quas quidem signis peculiaribus distinctas paulò
 inferius reperies.

Vtunque tñ sit, pertinere hanc affectionem ad id genus symptomatis certo
 scio, quod ea continet, q̄ immodicè excernuntur, vitiosa & præter naturā facta.
 Atqui licet vitii excretionis vtero reduci possit: dū verò id cōtingit ipso nequa
 quam affecto, toti corpori effecto communis existit, et si aliquando alicui singu
 lari particulæ morbus referri possit, ut iecori, spleni, capiti, aut ventriculo. Mor
 bus tñ à quo proficiscitur, nullus alius haberi potest, quàm aut totius corporis
 distemperies, quæ vitiato temperamento, id in excrementi, aut corrupti humo
 ris naturā cōmutat: aut alicuius membri particularis, cui conficiendi alimenta
 munus incumbit, quòd idem vitium humoribus præstet. A quibus excremētis,
 seu vitiatīs, humoribus lacessita natura huiusmodi molitur symptoma, ut se
 a maiori

A à maiori malo tueatur, ipsa in uterum, tanq̃ in emunctorium transmittente, & ipso se ab eis exonerante. Sicut frequentius utero male affecto cōtingit, quia nequeunte pbe cōficere proprium alimentum, quod redundat, pellit: uel corrumpeute sibi cōmissum, in multigenā naturā excernit. Quorum sanè fluxuū, albi seniorib. feminis magis pprii sunt, vt apertè Hip. refert li. ij. de mor. mu. in initio dicens. Fluxus albus in senioribus mulieribus magis fit, q̃ in iunioribus fluxus fuluus in utrisq; fluxus ruber in iuniorib. Licet aliqñ quarundam feminarum fors contrarium nō sine euidenti damno cōmonstret. Quippe iuuenulae alba distillatione saepe laborant, quæ si uirgines sint, uel contabescunt, & ingrati, ac morbosè degunt: si uerò nuptæ, steriles fiūt, & uiris insuauis, & ingratis. Ceterum ruber aliqñ senioribus accidere conspiciť non sine euidenti damno. Nā facili in malum corporis habitum, aut aliā ex frigore affectionem plābuntur, ut in p̃sagio docebo. Verum, ut rē concludā, causas p̃dictorum fluxuum nuper citato loco ut Hip. cōprehendisse dicens. Et ruber quidem fluxus fit in febre, magis aut ex abortu fit, & ex mensium interceptione, cum conclusi de repente eruperint, fit et̃ & ex partu, & febribus. Sed has causas paulo specialius expendere oportet, si prius dixero meminisse quoq; Hip. rubræ cuiusdā bilis, quam aliqñ fluxisse comperimus. Inquit enim lib. 5. Pop. referens huius bilis speciem. Bilem multam abunde coloretam uomuit ad tres dies, ac noctes, ualdeq; rubram. Quam ego censeo esse, quam luteam ex eiusdem mente inferius referam, per uterum aliquando fluere.

Cum à triplici fonte in feminis hos fluxus oriri, nobis cōpertū sit, ab utero nimirū, ab uniuerso corpore, & à mēto aliquo ex p̃cipuis: necessum sanè est oīum causas diligenter scrutari. Est igitur causa, utcunq; & à quauis parte otia; vitiosorum humorum copia, aut malitia, facultatem citra consuetas leges, modum, & institutū ad expulsionē lacessens, ut ipsa continere eos, cōplectiq; renuat, uel p̃æ impotentia nequeat. Ex quo prodit nonnunq̃ continuo fluore feminas affici, aliqñ uerò per internalla, nimirum aggregata humoris copia. quæ molestare, utcunq; potentiā nata sit, ac donec aggregatū existat, fluere desinunt purgamenta, postea uerò copiosius. Quod profectō non ita fit acri profluente materia. Nam et̃ si pusilla sit quantitas, semper irritat, & semper fluit. Quo fit, ut quibusdā quotidiē, alijs post mensium purgationem, nonnullis inter duas purgationes tantum eueniat. P̃cedit aut̃ p̃dictā causam alia non minoris momenti, nimirum p̃dictorum humorum generatio. Quā esse in triplici differētia cōperimus, quippe uterus dum solus causam huic malo p̃stat, id profectō efficit, uel quia proprium alimentum cōmutare non pōt, uel quia prauè cōficir. Ob id quidē tenuia, cruda, uel serosa recremēta excernit, aut pallida, putrida, fēculentia, uel alio deterrimo colore, odore uel affecta. Primū sanè uitii ex frigido distēperamento principiū nanciscit, atq; nō utcunq; sed ueluti connaturali iā ipsi utero facto, quo inconfectum relinquit alimentum. Quam sanè causam Areteum reuulisse constat, qui lib. 2. de signis, & cau. diutur. morb. c. 11. inquit. Est aut̃ uulue refrigeratio, quam obrem humorum tenax esse non pōt, quin etiā sanguinem in albidum colorem transmutat. Vim. n. ignis rubificam nō habet. Ex quo euidenter constat, uterum non posse ali. At qui cum uterus non alatur, trahere nunq̃ desinit, ac per consequens, neq; expellere. Et ob id duo sequi ui-

tia necessum profecto est, vnum, assiduam hanc expurgationem, alterum, totius
 corporis extenuationem. Secundum porro vteri vitium proficiscitur ex calida,
 vel putredinosa eiusdem distemperie, quæ loco optimæ coctionis purgamenta.
 Illa fæda, prauoq; colore affecta gignit, & expellit. Soler quoque & nō mino-
 ri efficacia vterus huic malo causam præstare, nimirum dum imbecillus factus
 ob vteri gestationem, partium contusionem, vel casuum exteriorum vim: ob
 contractam et erosionem, vlcusve ex inflammatione, vel abscessu relictū, vel ab
 erodenti humore aliunde transmissio, ibidem factum. Aut q̄ promptè totius cor-
 poris vitium alliciat dolore, calore, mordicatione, & morbosa sensibilitate ppe-
 tua. Quibus et causis accedit frequentissimus coitus. Contingit quoq; non raro
 singulis mēsisbus easdē humiditates excerni ex menstruis purgationibus, præter
 modum in vtero semimutatis, vel q̄ citius euocetur sanguis ad vterū, vel quod
 facilius quoq; post debitum tempus excernatur. Quò fit, vt in plerisq; feminis
 earum, quibus menstrua debitum tempus non adseruant, hæc purgamenta pro-
 deant pauco, & tenuiori sanguine admixta, modò ante sanguinis excretionē ir-
 ritata natura, modò paulò post, quia ante debitū coctioni tēpus menses mouet, B
 & sic q̄ reliquum est, crudum transmittit. At p̄dictorum humorū generatio, &
 redundātia frequentius à toto corpore profluit (cā alioqui huius mali secunda)
 quod uel ex alimento apto, ob deprauatū, & habituale vitium eos cōficiat, vel ab
 eisdē aliunde generatis sese per vterum exoneret. Contingit sanè id vitium cor-
 pore prauo temperamento affecto, prauisve cibarijs dedito: quippe his duabus
 de causis scatere prauis humoribus corpus contingit, à quibus natura totius ir-
 ritata, vel fortasse impotens ad retinendū facta, eosdē aut expellit, aut diffuere p
 vterū permittit, tanquam per cōmune corporis emunctorium. Nam qua ratio-
 ne id, quod ex optimo sanguine abundat, femina existente sana, per eā partem
 ex naturæ instituto expellitur: eadē prorsus quod vitiosum persentisci, per eandē
 partem ex consuetudine, & loci commoditate excernere conatur. Quod sanè
 fieri vel vitio expellentis facultatis irritata, vel retinētis languida nulli esse du-
 bium arbitror. Proficiscuntur aut hæc omnia vitia, vel ex vitioso temperamēto
 ob calorem, vel ex frigida, & humida distemperie, quæ retinentem facultatem
 laxet, ac emolliat. Sic quoq; hos humores redundare in vtero, vel in toto corpo-
 re cognoscimus, iecoris, splenis, ventriculi, vesicæ, aut capitis vitio (in q̄bus ter-
 tiā huius mali causam sitā esse arbitror) quæ sanè mēbra dum hoc modo affecta
 existunt, cū de munere habeant, humores toti corpori cōficere, aut purgare: fa-
 cile si præter naturā existant, vitiosos gignunt: quos aut toti corpori, aut utero
 mandant. Itaq; si quis sedula diligentia intueatur quæ mox diximus: reperiet
 humorū vitiosorum redundantiā esse huius affectus immediatam causam, ho-
 rum quidem vel ab vniuerso corpore, vel vtero, vel membro aliquo peculiare.
 At mēbra hæc esse affecta, vt hos humores gignant connaturales, efficere, ha-
 bituales ferè & factas distemperies nulli esse dubitatum reor, calidam quidē,
 quæ biliosa excrementa, frigidam, quæ pituitosa, tenuia, aut fluida efficiant, vel
 aliter deprauata putredinosa, quæ nitrosos, salios, acres, & quomodolibet vi-
 riatos humores gignere habeat, siue calida, siue frigida existat. Quibus in corpo-
 re redundantibus, rationi cōsonum videtur naturam gliscere ad expulsionem,
 aut omnino retentionem renuere. Quò fit, vt per consuetum emunctoriū trans-
 mittat,

A mittat, conciterq; huiusmodi fluxionem. Areteus tamen loco citato, eū fluxum ex prædictis, feminis esse deteriorem censet, qui liuidus est, cruentus, aut fætidus, q̄ pallidus, albus, & purulentus. Multa profectò sunt in hac affectiōe, quæ maiori, ac perspicaciori distinctiōe, q̄ vulgus existimet, opus habent. Quippe affectus natura, pars, quæ affectus præstat principium, ea item, quæ affectui in vtero consentiunt, & vterus, & eius collum seorsum affici solent: & morbus, à quo vitium principium sortitur, ac vltimò humoris profluentis conditio: diuersam inter se notitiæ rationem, & præstant, & requirunt. Affectus quidem ad veram medendi rationem, à principio instituendam sui notitiam exigit. Pars affecta ad auxiliij modum, mensuram, & adhibendi rationem. Morbus porro, vt qui vicem causæ (sine cuius ablatione symptoma auferri nequit) in symptomatum curatione gerat, si mitigandi ars non sufficit. Humoris verò conditio veram medicamentorum materiam, & auxiliorum ideam perscribit. Quamobrem horum omnium prouidentiam à principio ediscere conuenit. Docet quidem Hip. lib. de nat. mul. huius affectiōis conditionem per hæc verba. Cum fluxus albus obortus fuerit, velut vrina asinina apparet, & dolor inum vëtre habet, & lumbos, & lateris mollitudinem, & tumores sunt crurum, ac manuum, & cava eleuantur, & oculi humidi sunt, & color arquatus, & albus fit, & cum iter facit, anhelat. Item Areteus. lib. 2. de signis, & causis diutur. c. 11. hmōi fluxum à menstrualis distinguit, & nosse docet ex lege, ac mō periodicationis, cōmōstrās periodicationem habere triplicem, alteram, quæ statuto tempore reuertitur, cæterum diu durat, secundam, quæ certum diem reditus etiam si intermittat, non seruat, sed bis terve in mense regreditur, tertiam verò, quæ indefinens est, licet paulatim fiat defluxus. Sed anteq̄ vltra pergamus quibus affectus constet, mōstrabo. Primum itaq; cum dignoscas ex ipsis purgamentis, q̄ longè diuersa sunt ab ipsa mensum purgatione, colore, substantia, odore, & profluendi tpe, ac ordine, q̄ ita his conditionibus à menstruo dissident, vt nullus id ignorare possit. Quippe in mēstrua purgatione syncerus sanguis prodit, in hac vero fluxus corruptus apparet diuersorum tamen colorum pro humoris redundantis idea. Præterq̄ q̄ huiusmodi purgamenta imbecillitatem haud lenem feminis sic affectis inferre solent, decolorationem item, in appetentiam, maciem, implacatum mærorem, pedum tumorem, difficilem respirationē, vel leuissimo facto exercitio, & reliqua et, quæ ex Hip. mox retulimus. Aperit item hæc affectio os vteri, & laxat ita, vt frequenter ipsum excidere contingat. Redduntur quoque hmōi feminae hoc malo sibi, & viris ingratae, & implacidae: quibus accedit vterū exulcerari, vel admixta flauabile, vel seroso excremento, & alijs, quibus purgamenta acrimoniam acquirunt, ita vt dolorē, & molestiam, non parua inferāt. Quapropter quibusdam purgamenta hæc cum vteri vlcere accidunt, alijs verò circa ipsum qd̄ distingues ex consistentia excrementorū. Nam dum vlcus præest, pus excernitur crassius, fetidius, & magis album. A sanie etiam, ac dolore: quibus accedit, quod feminae, quæ vlcus in vtero habent, maximè si in collo sit, viri congressum non patiuntur, aut saltem ab eodem irritentur maximè, ac dolent, quod etiam licet ex quantitate excrementorum colligere. Maior etenim copia serosæ substantiæ emititur, quàm puris. Præterquam, q̄ duæ vlcus non habent, licet viri congressu non delectentur, minimè tñ offenduntur. Hæc pro-

G 4 culdubio

De di-
gnosce-
dis affe-
ctu, cau-
sa, &
parte.

culdubio sunt, quibus affectum in genere cuius facile innōtescet; si rem diligē- A
gentius pensitet.

Verūm dum ex totiūs corporis vitio eum proficisci cōtigat, vel ex eo cogno-
sces, quōd mox vniuersum corpus grauari persenties: præsertim si abundantia
causam præsiterit: quo tempore citra aliquem laborem fœminā grauatiua lassit-
tudine premi, & veluti confrangi videbis: à qua leuatur copia recrementorum
excreta: & rursus iterum grauari incipit, donec denuò aliquid expellat. Quod
etiam dignoscēs ex venarum plenitudine, & tēsiōe, ac ex pedum torpore, ma-
nuum, ac crurum. Præterea fœminæ, quibus ob humoris vitium, & acrimoniā
malum succrescit, vlcerosam persentiscunt lassitudinem, ac pruritum, & mor-
daciditatem non leuem in vniuerso corpore: à quibus similiter per aliquod tem-
pus leuamen susceperint excretis nimirum, per vterum purgamentis. Apparet
etiam in toto corpore calor, & accidenti quoque in eodem subsequuntur, qua-
lia hæc humoris natura producere solet. Quippe melancholica cacochimia me-
stitiam, terrores, taciturnitatem, & alia id genus inferre habet: bilis irasci pro-
nam, amarulentam, anxiam, sitibundam, & inquietam mille modis reddit fœ- B
minam: sicut somnolentam, & pigram, pituita. Quorum excrementorum ex-
cretionē, subsidebunt quodammodo prædicta accidentia, & coloratior, ala-
criorque euadet fœmina.

Quod si ex iecore, ventriculo, vel quouis alio viscere, affectio suboritur: pe-
culiaria cuiusvis membri symptomata, id facile mōstrabunt, & excrementa cui-
que propria: etenim iecoris dolor, calor, & tumor cum excrementis biliosis, ma-
ximè percepta in excretionē, & parum ante ipsa molestia, facile iecur esse affe-
ctum monstrabunt. Pituitosa item recrementa, in appetentia, aut aliquando in-
gens fames, frequens ciborum in ventre corruptio, acida præsertim, & rictus
crebri, certissima sunt ventriculi affecti indicia. Verūm si hæc omnia defuerint,
& lumborum, ac partium circa vesicam molestia, & leuē quendam doloris
modum, seu contractionem fœmina persenserit, & neque citra ipsam quicquā
leuata fuerit, signum proculdubio est, consensum ex vesica, & vicinis vtero par-
tibus demandari, præsertim si his signa accesserit vrina alba, aut crassa, vel mu-
coribus plena. Quod si caput grauari, dorsum dolere, & totum corpus contra- C
ctum esse contingat, præsertim cum suppressione eorum, quæ per os, & nares
excernuntur, certò conijcies, caput esse affectum, eo magis si his omnibus excre-
mentis, quæ per vterum excernuntur, accesserit spuma.

Vterum porrò esse affectum euidenter monstrabit prædictorum signorū de-
fectus, & eorum omnium, quæ præcesserunt, notitia, ac rursus peculiaria vteri
sympt. Item fœmina plerumq; boni apparet coloris, ac nihil aliud, præter leuē
quandam imbecillitatem persentit. Præcessit etiā difficilis partus, iectus, casus,
supra vterum, aut dorsum vel partes vicinas, vlcus, aut tumor præter naturam
in ipso vtero, medicamentum aliquod graue ex vterinis intus, aut extra adhibi-
tum. Adest quoq; sensus manifestus in temperamenti calidioris, aut frigidioris,
& rursus immodica suppressio, vel nimia menstruum profusio, aut alia vteri
na accidentia, quæ ipsum esse affectum euidenter monstrant.

Qualem verò humorē natura ab vtero, aut toto corpore, vel quouis eius pe-
culiari membro expurget, facile discēs, si exactè pensitaueris ea, quæ excernunt
frequen-

A frequentius serora esse, quandoq; bilis serum, & ichorem referre, aliquā pituitā & sepiissime sanguinis naturam emulari, rarō quidem melancholiam. Fului ē cuiusdam fluxus Hipp. meminisse constat lib. 2. de mor. mul. per hæc verba; Fluxus fuluus fluit, velut ex euo vitioso, multus, & graueolens. Quem sanē aliquā ad rubrum accedere comperimus, cuius signa adducens Hipp. eadem parte, inquit. Vteri inflammant, & dolor ex lumbis, & inguinibus emergit, & prodeuntia multa sunt. Et paulo inferius ait. Riger enim, & veluti à carnibus allatis humor defluit, & cum his simul febres fortes, ac rigores fiunt. Ex huiusmodi verò fluxibus multæ pereunt, & paucæ effugiunt. Cuius sane naturæ differentiā aliā annumerat quoq; idem Hipp. loco nuper citato, dicens. Purgatur velut ex ovo crudo luteū, subalbidū, & vlcerat pudendum, & tument pedes, ac tibiæ, & cavae oculorū partes obtumescunt, & oculi humidi, ac lacrymosi sunt: & iter faciat, an helatio ipsam corripit, & debilitas oboritur. Quia proculdubio snia constat, hmoi fluxum originem trahere ex ea vitellinæ bilis specie, q̄ Barbari fieri per bilis, & pituite admixtionem referunt; q̄ verè exprimunt sequentia auctoris verba. Si verò euaserit, morbus pituitosus fuerit, & si non purgata fuerit, febricitat, bile vehementer commota; & subdit. Cū sic habuerit, siquidem vehementer intumuerit, pharmacum deorsum purgans biuendum dato, qđ bilē, & pituitā purgat. Quibus verbis, & ijs, q̄ in contextus serie sequuntur, euidenter cōstare arbitror, hac in parte Hip. meminisse eius bilis speciei, q̄ nuper diximus. Quod euidentius adhuc constat, nā bilis vitellinæ per allationē genitæ apertè reminiscitur paulō inferius dicens. Fluit subluteū, velut ex ovo, & viscosum, & venter imus intumescit, ac durus fit, & si cōiungas, dolet, & dētibus stridet, & febris occupat, & dolor ad pubē, & ad pudenda, & ad imū ventrē, & ad lūbos irruit, et animi deliquiū, & anxietas, & perfrigerationes, & sudor multus, & pulsus ad manum accelerantes, debiles, deficientes, & statim pereunt. Quæ sanē omnia si quis attento animo consideret, conijcet faciliē hæc accidentia esse ex bile vitellina, cuius nuper meminimus. Refert præterea eadem parte, aliā biliosi fluxus speciei, dicēs. Purgatur à carnibus allatis humor, & pudendum exulcerat, & ad quicūq; corporis partē distillat, rigor & febris acuta, magna, & simul horror occupat. Dolores aut, quales in oībus fluxibus. Hec tota intumescit, & circa umbilicum, color fit morbi arquat: talis aut fluxus ex hoc fit. Postq̄ sanguis exhaustus subbiliosus factus fuerit, & non fuerit purgatus. Ex quibus constat, quales sint fluxuum biliosorum differentiæ, & quibus signis liceat eos distinguere, vt iuxta cuiusq; naturæ auxillorū materiā adhibere possim⁹. Quippe facile nosces cuius naturæ fluxus sit ex colore excrementi, ex corporis conditione, & nra p̄cedenti, nā oībus ex bile color flauus, & pallidus inest, in quibus persentit acrimonia, & alia accidentia subsunt, q̄ nuper ex Hip. mente retulimus. Quod si à pituita affectio suboriat, color efflorescit in corpore albus, & magna q̄ritas. p̄ vterū defluit, sed q̄ fluunt, minus acria existunt. Feminae et otiose sunt, pingues & desides. Albæ quoq; fluxionis meminit Hip. lib. 2. de mor. mul. dicēs. Fluxus albus fluit, veluti alba asini vrina, & in facie sunt tumores albi, & partes albæ sub oculis tument, & hydropiformes, ac non valde bona specie p̄diti sunt oculi, & splendor abest, & lacrymosi sunt oculi, ac hebetes, & color corporis exalbidus, ac pustulosus, & venter imus tumidus, & in maxillis pustulæ paulatim ruben-

rubentes, paruae, aquosae, ac malignae. Et in cruribus tumores laxi, & si presseris **A**
 digito, notae imprimuntur, uelut in fermento. Et eos saliuā impletur, & stomachi
 morsus percipiunt cum ieiunae fuerint, aut etiam vomuerint uelut acidam
 aquam: & si ad accliuem locum procedunt, anhelatio totius corripit, & strangu-
 latio, & crurum perfrigeratio, & genuum impotentia, & in ore ulcera fernida,
 ac superficialia: & uterus praeter rationem aperitur, & osculum procedit graue
 velut plumbum. Tandem alia multa recenset, quibus, & praedictis facile eius
 cognitionem, ac praesagium quis ediscere poterit. Alterius quoque albi fluxus
 speciei meminit eadem parte, dicens. Desluit multum uelut urina ouila, & sub
 dens signa, inquit. Color est albus, & tota intumescit, & in tibijs eminentiae la-
 xae, & rubicundae emergunt. Quibus constat, duplicem constituisse albarum flu-
 xionum differentiam. Cuius unamquamque speciem eadem parte curare distin-
 cta methodo aperte docet. Sanguine etiam in foeminis redundante, ipsi per simi-
 les profluunt purgationes: aliquando quidem foeminis utero generatibus per uteri
 ceruicis uenas instillans: nonnunquam uero mensibus suppressis: tunc etenim **B**
 frequenter natura loco mensium, seorsum excrementum reddit, quod plane ru-
 bescit, & tale est, qualis esset aqua pauco sanguini admixta. Cui consimile flu-
 xum adduxit Hip. li. 2. de mor. mul. & alios etiam plures dicens. Ruber fluxus
 fuit talis, qualis sanguis uictimae recens mactatae, & grumi pellucens: aliquan-
 do et rubrum fluxum emitit: ac subdens eius signa, & ut a menstrua purgatio-
 ne distinguat, inquit. Et uenter imus attollitur, & attenuatur, & impotens fit, &
 indurefcit, & ad contactum dolet uelut ulcere praesente, & febris habet, & don-
 tium fremitus, & dolor, ac ipsa pudenda, & pubem, & lateris mollitudinem, &
 lumbos, & tendinem, & uentrem, & pectus, & scapulas: refertque id malum pro-
 ficisci ex laborioso partu. Et paulo inferius rubri fluxus meminit longe diuer-
 sis uerbis a praecedentibus. Praeter quas omnes fluxus differentias, alias quoque
 aperta oratione Aetius monstrare uidetur li. 4. ser. 4. cap. 63. quo loco inquit. Si
 obscurum colorem habeant huiusmodi excrementa, causam ita scrutari oportet.
 Linteam co inquinatum arc factum simplici aqua eluimus, & inde a maculae
 colore redundantis humoris notionem capiemus. Quod censeo ab Hipp. accepisse
 li. de nat. mul. & li. j. de mor. mul. qui hac probatione certiores posse fieri **C**
 ex humore peccante apertissime profert.

Se se offert in ultima parte notitia signorum seminis profusi, quae affinis est pi-
 tuoso fluxui: quae proculdubio foeminas non raro sicut, & uiros exercere sci-
 mus, ut paulo inferius probabo. Est tamen foeminarum semen crudius, quod a uasis se-
 minarijs, non ab uteri sinu in eius ceruicem, citra ullam ueneris uoluptatem, pro-
 fluit: non tamen assidue, neque quotidie, ut in uteri fluore, sed per quaedam interual-
 la, citra illum etiam factorem, aut uirulentiam. Cui porro fluxionis sorti accedit
 uirulentum quoddam seminis profluuium, quod contagiosa, impuraque; uenis pro-
 gignit. In quo quidem semen crassius, interim album, interdum flauum, aut vi-
 ride, odore foetidum, acre, & erodens excernitur: non autem assidue, ut in uteri
 fluore, idque raro circa pudendarum partium ulcus infestare deprehenditur. Di-
 stinguatur maxime haec seminis profusio a mulieri profluuiio, quod ipsa non ab
 utero, ut hic, sed a seminarijs uasis prodeat: at haec dimanantibus adhuc men-
 sibus

Alibus non desinit, sed simul cum eis, & postea perseverat: muliebre autē profluuium cessat, quando menstrua feruntur, & breui interuallo post illa: præterquā q̄ prædicta seminis profusio semper sibi habet coniuncta morbi gallici signa, nisi in virginibus, si quando is fluxus accidat.

His habitis, quæ cognitioni affectus proficua sunt, memoria te quoq; tenere oportet, grauem esse, & periculo plenum huiusmodi affectum. Quippe qui ingratis viris efficit fœminas, tediolas, steriles, & vterum etiam exulcerat, proci dereque cogit, corpus contabefacit, iecur & membra nutritiæ talia deiicit, adeo ut sepe in hydropem degeneret: & tandem miserrimis accidentibus, melancholia, mæstitia & animi deliquo premat, ac mortem non raro afferat. Cōsideratio ne quoq; dignum est, hanc affectiōem omnibus fœminarum ætatibus accide re posse: virgines etenim corripit, sicut & eas, quæ virum iam gustarunt: licet Montanus contrarium videatur asserere, innitens Hippo. decreto lib. de morb. mulier. qui ex professo refert, eas quæ peperunt, esse huic affectiōi promptio res, & mox eas, quæ corruptæ sunt: cum hoc tamen non negat idem author vir ginibus posse accidere, sed rarius id esse propter venarum ineptitudinem, quæ in reliquis fœminis veluti cū causa huic fluxioni existit: qua quidem aptitudi ne incorruptæ carere videntur. Præterquam quod omnibus fœminis ex semine potest hic fluxus cōcitari, ut cap. de gonorrhea reperies. Quapropter hac in par te supersedeo, solū in memoriā reuocans, fœminas salaces huic morbo prōptio res existere, sicut eas, quibus præhumiditate vasa spermatica laxa fiunt, ac semē aquosius. Quibus vltimis citra salacē conditionē accidere optime potest: quin imo hæc neq; viris gaudent, neq; viri concubitum desiderant, neq; vllā persentiunt semine excreto delectationem. Præterea expēdendum est hac in parte id, quod Areteus lib. 2. de signis & causis morb. cap. 12. refert, existimans eum flu xum ex prædictis deteriorem esse fœminis, qui liuidus est, & eruentus, aut fœ tidus, quā qui pallidus steterit, albus, aut purulētus: inquit enim. Quinetiam ex ipsis minus noxij sunt vsitati, sed re vera, senioribus infestiores sunt rubri flu xus, minime autem puellis, quibus magis albi nocent albi enim si male oleant, pessimi sunt. Nec prætereundum est hac in parte, nō paucas esse fœminas senio iam cōfectas, quibus sanguis per vterū instillat: quæ sanē existimant, sibi adhuc mēstrua durare (ut ætatē simulent) quas velim intelligere rubra hæc purgamē ta potius esse ex vteri, vel totius corporis vitio, vel iecoris nimium sanguifici, quā ex naturali & consueta sanguinis copia. In summa vereri oportet ex diuturno fluxu marcorem malum corporis habitū, pessima, & diuturna vteri vlcera, mē stitiam, & pleraq; alia mala, quæ ex diuturnis fluxibus sublequi solent, & non raro sterilitatem, licet Hipp. lib. 4. pop. text. 51. referat, ex albo fluxu fœmelam, & ex rubro, filium fœminas peperisse: inquit enim. Alia libis fœmelam peperit, alia rubris ut par erat. Quamobrem diffidendum non est sic affectas concipere posse, etiam si quod dictum est, frequentius accidat.

Omnium sanē fluxionum hæc est peculiaris conditio, ut periculosam habeāt vtranq; immoderantiam, siue in ea plurimum, siue nihil effundatur. Si enim semē exire immoretur, non quosuis morbos oriri conspicias, sed difficillimos quidē & periculosissimos: quia ex separato excremento, quod natura ad fluxus locum destinarat, talia concitari solent: mixta etenim cū sanguine excremēta, mitiores

Præsa
gium.

Cura di
ratio.

& secu-

& secutiores pariunt effectus. Sic dum assuetudo fluxus acquiritur, habitū efficit morbis summè obnoxium. Est tamen hoc desiderium inter hæc duo affectionū genera, quod ex vacuatione immodica, frequentius morbos frigidi ac sicci intemperamenti oriri est necessum: vacuato namq; spiritu, quem necesse subinde est cū fluxu abire, refrigerat corpus & cōtabescit naturali humido & calore deficientibus, etiāsi aliquando tumeat, & humectetur ex accidenti, frustrata nimirum cōtione. Ex retentione verò, cōpositionis affectus, vt tumores, obstructions, & vlcera fieri proculdubio oportet. Præterquam quod ex vacuatione morbi prodeuntes, corpus perdunt: ex retentione quidem vterū primario infestant: quod Hippo. optime. 5. aphor. docuerat, dicens. Ex retentione, morbi vtero contingunt. Quapropter summa diligentia curandum est, ne aut fluere nimis, aut non fluere permittamus, plus minusue, quàm sit minima ex vsu sit. Præmittenda igitur in oī fluxu debita viuendi institutio est, quæ, vt Hippoc. refert lib. de natu. mulie. cibis constet quasi siccissimis, & tenuis, astringentisq; substantiæ. Fibata aquā ferratā per se, vel eam, in qua aurum sæpius ignitum extinguitur, aut cū syrupo citoniorū, granatorumve, & si vires imbecilles steterint, paucum vinum porriges, crassum & austerum. Edat item pyra austera, pruna, & cetera fluxui menstruo impetata. Qua etiam in re vitare oportet vinum tenue, & præcalidū, nisi virium gratia modicum aqua pluuiali nimis diluunt porrigere necessum fuerint. Qua victus institutione præmissa, triplex erit in hoc affectu curandi ratio: prima quidem, è toto corpore, vel a membro aliquo peculiari indicatione sumpta, si ab his malum originē traxerit. Secunda ab humoris seu recrementi fluentis natura. Tertia verò & vltima, ab vtero ipso, modo per primogeneam affectionem laboret, modo affectui alterius partis consentiat. Docet autem vniuersam medendi rationē huic effectui proficuum, Hipp. lib. 2. de morb. mul. in principio: q̄ sanè plurimum esse expēdendam arbitror: & ob id ad eius pensum hanc nostram conati summus ad instituere.

Si fluxus totū corpus cōsentiat. Corpori itaque vniuerso huic affectioni consentienti (vt latissime etiam lib. nostro de auxiliiorū indicatione diximus) providendū proculdubio est tribus modis. Vno quidē, euacuato humore, qui expuerat alio, distracto longe à parte, per quam assuescit fluere, tertio verò per ea auxilia, quæ residuum humoris conterat, & corpus roborent, ne amplius eos humores gignat, ac vterū quoq; ne eosdem deinceps recipiat. Quapropter in memoriam reuocare oportet quæ li. nuper citato diximus, & huc transferre: quippe prima indicatio docet humorem quo corpus supra modū abundat, imminuere, ne nobis accidat quod vxori Boeti Galen. lib. de præcognitione ad posthumū accidisse refert: cui adhibitis topicis auxilijs nulla habita corporis prouidentia, viscerū tumore succreuisse profert, ac ob id nihil profecisse auxilia. Quamobrē initio sumpto ab humorū redundantū vacuatione (ne exterius adhibita auxilia intro ad viscera vitiosos succos pellāt, & maioris fluxus, aut maioris mali causam præstent) primò expēdes toto aīo qualis sit humoris redundantis natura, vt antequam aliud moliaris opus, maiorē humorum partē educas, vena quidem scissā, si sanguinē redundare cognoueris. Quippe in rubro fluxu, vel si ex mensū suppressione accidat affectio, a sanguinis missione principiū curationis auspicari oportet: idq; ex venis brachiorū medijs, q̄tū feminā tollere posse cognoueris: vel si maior internā cubiti

A cubiti venam seca. Quod si Aetio credere velimus, secta frontis, aut narium, vel scapulis scarificatis maximum sit p̄sidium, ut longe à parte, per quam fluxus sit, sanguis distrahatur, qđ si vsu venerit, per partitas vices, & interualla id fieri tutius censeo. Dimitto consulto hac in parte eā Hippo. curuionem, quā li. de mor. mul. his fluxibus ascribit: nā suspecta mihi quodam modo v̄r, & diuersa quidē ab ea, quam in principio lib. 2. adduxisse diximus. Tandem sanguine missō, ea medicamenta adhibebis, quæ à serolis recrementis sanguinem expurgare nata sint, quippe hoc sanguis vitium censemus, non mediocre esse fluxionis causam. Quem sanē vsū præstat hiera Gal. & casia cum pulueribus myrobalanorum, citrinorum, uel rhabbarbaris: item serum lactis cum modico rhabbarbaro: confectio hamec sine scammeo, & colocintide cum eodem rhabbarbaro: syrupus etiam de rosīs hispanis ex nouem infusionibus confectus, additis in vltima infusione pro quaque eius libra. 3. iij. rhabbarbari. Cui consimilem vsū præstabit syrupus eichorij compositus cum sero lactis. Confert etiam modicum cōseruæ rosarum cum rhabbarbaro exhibitum, vel, si profusio fuerit maxima, eandem conseruam cum granis tribus, aut quatuor mastichis porriges.

B Quod si alterius sortis fluxus sit, insequens Hippo. præceptū, biliosis quæ bilem, pituitosi q̄ pituitam expurgent præbeto. Verū quia (vt superius dictum est) biliosi fluxus non vnica est species, sed multiplex: consideratione dignū esse existimo, medicamenta esse, aut miscēda, aut temperāda, aut aliter mitescenda, iuxta humoris fluentis ideā. Nam sic Hipp. loco sæpius citato de mor. mul. ad vitellinā bilē ex pituitæ permixtione pharmaca admixta ex ijs, quæ pituitā, & bilem purgant porrigit. Sic quo biliosior fuerit fluxus, eo magis oportet humore atēperare, ac diligenter p̄uidere, ne fluat, & si fluxerit, ne uterum mordeat, exulceretve, ac per cōsequens magis humores ad se alliciat: aliqñ per uteri nos clysteres ex mucilaginis ac lenientibus pharmacis confectos, id præcauēdo: adhibitis et alimentis, syrupis, & potionibus, quorū abunde meminimus cap. de menstruo flore. Tandē facta cuiusuis humoris purgatione, ut vires permittere uisum fuerit, paulatinis purgationibus humorū reliquias cōterere opus erit: nā dum corpus uniuersum alicui affectioni consenserit, difficile quidē erit tantam simul efficere purgationē, q̄ causæ magnitudini respondeat: nequit. n. id citra noxam humanum corpus perferre: ob id sensim, & paulatim quod è purgatione superest, consumere tutius est. Sic flauæ bilis reliquias conteres frequēter exhibitō rhabbarbari infuso, aut decocto largiori corticū myrobalanorū citrinorum: syrupo violarum ex infusionibus cū decocto foliorum senæ. Huic etiam vsui pilulas conficies, quas plurimū profuturas censeo, quæ recipiunt qđē rhabbarbari electi frequētissimē irrogati succo rosarum. 3. ij. myrobalanorū citrinorum, chebulorum, & indorū infusorum in succo rosarū. ana. 3. j. Mastichis. 3. j. spicæ. 3. l. cum syrupo ex infusionibus fiant pilulæ; quibus aliquando addi possunt myrrha, & crocus. Interim tñ dum hæc exhibes, & antequam purgationē moliaris, in interuallo nimirū, humores frenare oportet, ac apozematis eorum acrimoniam retundere. Verū si neq; his, neq; optima nictus institutione affectus, adhuc q̄euerit, studēdū est omni arte affectū p̄ defluxū humoris ad aliam partē curare, qđ promiserat secunda intentio; natura nempe affluxu dissueta, ac humoribus ipsis aliō euocatis. Qui etenim humores cū vitiosi sint, verēdum est, ne

est, ne quocunq; ierint, nisi excernantur, malum efficiant. Quapropter non solum A
 eis diuersionum generibus, quæ tantum humores alio transferant, erit contus:
 sed in eo opere diuersionem cum euacuatione coniunges, vt simul, & reliquias
 conteras, & fluxum alio transferas. Ob id facto diuersionis principio, à mollibus
 totius corporis frictionibus exercitio, vinculis, cucurbitulis paruis & frequen-
 tioribus, summo opere confert naturalium balneorum usus, præsertim sulphureorum.
 Quæ quoq; usum præstat sudoris, puocato, si humor biliosus, & acris fuerit, aqua
 tepida, sin aliter ex ligni guayaci, aut sparte parellæ decocto, vel radicis chinæ,
 quod vilius esse arbitror. Verum si femina sudare renuerit, incredibili efficacia pro-
 derit ex prædictis decoctis syrupus confectus, noctu ante somnum exhibitus. Prius
 tamen, quod id moliaris in rubro, & bilioso fluxu, & in alijs, qui mordaces existunt, po-
 tionibus vtendum est, quod humores retundant. Sunt proculdubio huic vsui, profi-
 cua, lac, pitisana, aqua hordei, aut portulacæ, & seminum frigidorum expressiones
 sed lac maioris est commodi, præsertim cum eius meminerit in gratiam huius af-
 fectus Hip. lib. 2. de mor. mul. iubens lac calidum de vacca sic affectis exhiberi.
 Præstat item eundem usum lac asinæ, & serum. In quo et affectu lactis usum com-
 mendat Hip. lib. de nat. mul. dicens. Postquam autem infra purgata fuerit, bubulum lac B
 bibat ad dies quadraginta si poterit meracum, sub diu per noctem expositum, quæ
 ta aquæ parte admixta, vespere verò, ubi ebibat, alicam forbeat: ubi autem decem
 dies fuerint transacti, lactis & aquæ decimam partem extrahito. Quantum autem detra-
 xeris, tamen tepidi recentis mulcti portionem additam bibat. Qua sententia constat, qua le-
 ge profit nostro vsui lac, ut Actium quoq; consuluissè legimus. Præterea ad vri-
 nas et humorē euocare Gal. præcipit, ac per easdem expurgare. Cui vsui propi-
 nat aquam, in qua asilurum, & apium sint decocta. Verum cum multa aquositas fre-
 quenter his purgamentis admisceatur, iure optimo usus est Gal. ijs quæ aquam du-
 cunt, qualia sunt decoctum cartami cum polipodio, & calametho: decoctum ite-
 sambuci, aut soldanellæ in parua copia cum modico turpeto, aut agarico. Atque
 licet alia sint his validiora, hæc mihi in feminis sufficere videtur: a quibus iterum
 ad ea, quæ paulatim per ventrem, & vrinas euocant, deuenies. Quippe bile redundante
 maximi esse momenti censeo summo mane sumere 3. iij. eius, decocti, quod re-
 cipit cichorii, scariolæ, lupulorum, fumaricæ, borraginis, an. m. j. passularum, & pru-
 norum, an. 3. j. & l. foliorum senæ, & medullæ cartami, an. 3. j. & l. florum cordialiū. C
 p. j. anisi. 3. j. quatuor seminum frigidorum maiorum, an. 3. j. & l. fiat decoctio in sero
 caprino, vel in aqua pluuiali: cui facta colatura adde succi rosarum lib. j. succi
 intibi. 3. iij. sacchari quod sufficiat, vt fiat apozema. Cui iterum adde santhalorum
 rubrorum. 3. j. quod si malueris coquere ad formam serapij, additis rhabarbari. 3. iij.
 maximi momenti medicamentum efficies. Monitum tamen hac in parte lectorem
 velim, ne intrepide his, quæ vrinam mouent, vti audeat, nisi & præmissis purga-
 tionibus, & rarius, quod omnia menses mouere nata sint, & ob id videatur huic flu-
 xioni quodammodo esse aduersa. Cum hoc tamen, vt ex Gale. constat, ea quæ pro-
 priè vrinas ducunt, mouere menses nequeunt: quinimo cohibent, quia sangui-
 nem siccant, & crassant. Quod si eis ad ducendos menses aliquando vtamur, hoc est,
 quia ex accidenti prosunt, quatenus obstructions, quæ menses remorantur, tol-
 lunt. Nec valet, si quis arguat, vrinas ducentia aquosum à sanguine separare, vt
 Gal. mens est, ob idque fiet, vt ad vterum quoque promptè illabatur, sicut ad re-
 nes.

A nes. Cui dicimus humorē illum aquosum non delabi ad renes sua sponte, ita ut periculū sit, ad uterū quoq; posse peruenire, sed potius vi maxima, & efficacia renū trahitur, & eo magis, quo liquidior sit ad uterum uerò neq; sponte it, neq; vi trahitur, & ob id facile diureticis medicamenti ad uring instrumenta euocari poterit. Quamobrem si quis vsum horū medicamentorū exactē discat, ut nos lib. de indic. docuimus, facile citra periculū, eis uti poterit. Interim tamē dum prædicta auxilia exhibemus, ijs, quæ roborent, & astringant, p̄ interualla vtendum est. Cui vsui multus probatum reperio hoc præsidium, quod cōstat ex nucleis granatorum acidorum siccatis, & in puluerem reductis, ac obsonijs respersis, uel incoctis. Sic & nucleorum inglandis cōbustorū cinis ex uino subter inditus, mirē purgationes has sistit. Reliqua uerò paulò inferius reperies.

Quod si pituitosum humorē, aquosum uerē redundare cōpereris, audacter prædictis, & calidiorib. auxilijs uti poteris, initio tñ factō à sufficienti purgatione, & p̄missis, quæ pituitam ipsam præparent, qualia sunt mel rosaceū, syrupus stœchadis, de artemisia cū oximelite, & aquis betonica, absinthij, hyslopi, aut decocto aliquo ex prædictis, aut consimilib. herbis: quorū abunde meminimus cap. de mensium suppressione. Purgabis tñ pituitam ex decocto largiori turpeti, agarici cartami, aut frequētib. pilulis ex hiera, & agarico, vel mastichinis, aut elephanginis, vel Mechoacano radice nuper ad nos ex India asportata. Proderit ēt decoctum ligni guayaci, vel radicis chinæ, vel in quo parum turpeti, aut agarici leuiter ferbuerit. Cui itē vsui serapium ex ligno guayaco conficies cum hermodactilis, rosas hispanis, & cartamo, ac folijs senæ. Profunt quoq; ad purgationē electarium indum, vel pilulæ aggregatiuæ, aut de sagapeno. In quem vsum optimē facies, si paraueris pilulas hac forma confectas. Excipe pilularum de hiera. 3. ij. agarici trochiscati. 3. j. & s. cum melle rosaceo fiant pilulæ: quarū summo manē tertio quoq; die laborans sex, vel septem sumat, postea uerò earū tres tantum quinto, aut sexto die. Quod si purgationem sermōina renuerit adeo crebram: necesse profectō erit tempus aliquod excretioni alienorum per uterū concedere, & interim victu vi tenui, & exiccanti. Item paulatinis vacationib. vtendum est, quæ minus molestæ, & ingratae sunt, ex agarico nimirum infuso, aut feruesfacto, ex cartamo, ex pilulis ab eisdem factis, & ex aliis huius census. Verū sine hæc quidē prodesse videantur, vomitibus ante cibum, aut ab ipso vtē dum est: quo sanē auxilio per plures hoc malo leuatas vidimus, facta in cōtrarium auersione, & pituitosorum, quæ redundabant, excretionē: ne tantum in uterum humorum, & crudorum maximē, defluat. Quo factō reliquiis pituitosorum recrementorum prouidendum est, concitata sudatione, frictionibus frequentioribus, ac durioribus, quàm in biliosa cacochimia, & exercitio, ac balneis aquæ saluginosæ, & aluminosæ, sulphureæ, aut bituminosæ: decoctionib. item sparte parellæ, ligni indici, ac præcipue decocto radicis chinæ, quod huic vsui maximē esse proficuum arbitror, cuius simplex aqua quotidiano potui exhibita, utilissima censetur. Per suffitus etiam aromatum, & per euaporationes ex decocto (in aqua pluuiali, aut ferrata factō) herbarum calentium, & aromaticarum, iniectis in balneo lapillis ignitis. Corpus quoq; inunges à balneo, aut sudore oleo, in quo incoxeris anulæ, piperis, aut pyretri parum, vel squinantū, chamæmalum, thymum, radicem angelicæ, aut eiusdem semen.

Utatur

*Cautela
mē id fa-
cies,
quia li-
cet auto-
res cōsu-
lāt, nuf-
quā mi-
hi arripit
dū reit-
corū u-
sus: nūro
fam. n.
Et mor-
dace red-
dit mate-
riam, Et
copiosius
euocat.*

Vtatur etiam femina diebus aliquot cornu cerui vsti, aut acacia, & diatraga
cantho ex vino, præstant loti ramenta, si Gal. credimus, & eiusdem corticis de-
coctum, sic corallum & semen vuar pondere. 3. vnus cum vino nigro: hædi ēt,
aut leporis coagulum ad erui magnitudinem in posca dilutum. In hac quoque
pitu itosa causa corpore satis purgato maximi esse momenti cōseo diuretica ad-
hibere medicamenta ea lege, quam paulò superius diximus, à quibus sanguis
præter extenuationem, quam suscipit, separationem quoq; crassarum partium
nanciscitur, ex quo seroso recremento renibus tracto sanguis purus euadit ci-
tra periculum prouocationis mensium. Huic etiam vsui, & ad reliquias humo-
ris conterendas theriacæ mediæ ætatis, vel mithridati. 3. vnā conferre scimus.
Idem pari lege facit conditum, quod recipit conseruæ anthos, stachados ana.
3. ij. conseruæ acori vulgaris. 3. j. pulueris diarrhodonis, aromatici rosati. 3. j. & f.
cornu cerui vsti, coralli rubei ana. 3. ij. & f. conchularum marinarum vstarum,
& lotarum in vino. 3. v. cum serapio de corticibus citri fiat opiata. Huic etiā vsui
scio proficuum fore, summo mane. 3. j. pulueris radices mori cum vino nigro su-
mere, quod tanquam peculiare beneficium obseruabis. Cui cōsimilem præstat
vsu puluis, qui recipit spongiæ prius diligentissimè lotæ, & post vstionem si-
militer lotæ aqua plantaginis, aut ferrata, vel rosarum. 3. ij. rasuræ eboris, & cor-
nu cerui ana. 3. j. & f. rosarum rubearum, corticum citri puluerizati ana. 3. j. gali-
trici, cyperi, sacchari rosati in tabellas confecti. 3. ij. misce, & fiat puluis, qui &
biliosis fluxibus ex vsu quoq; erit.

*Melan-
cholia.*

Verum si melancholici succi aliquid redundare compereris (quod rarò acci-
dere solet) præmissa purgatione, si affectio recens fuerit, medicamentis leuissi-
mis, ex ijs tñ, quæ melancholiam purgant, velut est confectio hamec sine scam-
moneo, & colocintide vtendum est. Infusum foliorum senæ, epithymi, & poli-
podij, aut serapium ex eisdem, & fumaria cum succo borraginis, & infuso rosa-
rum siccarū cōpositū, idē quoq; beneficiū præstare poterit: sicut aqua lactis, in
qua per noctem contabuerint senæ. 3. vj. Verum si affectio inueterata fuerit, pur-
gandum quoque est, eo tñ medicamento, quod modicū ingestum plurimū edu-
cat, qualis est confectio hamec, aut sunt pilulæ de lapide lazuli, aut serapiū nu-
per adductum, si ei addideris lapidis lazuli ligati momētū. Quod si malū his ce-
dere nequeat, non erit ab re. g. ij. stibij optimi pparati cum saccharo rosaceo p-
bere. His quidem factis, q̄ humoris peccantis naturam respiciunt, expendendū
quoq; est, vt primam & secundam indicationē in curatione huius affectus pro-
positas absoluiamus, an corpori astringentia sint adhibenda, & qua nā rōne, cor-
pus ipsum deinceps roborare possimus. Quippe veretur tñ Gal. lib. de præsa-
gatione ad Posthumum, indebitum astringentium vsu, q̄ id solū exstimaue-
rit cām præstitisse tumori ventris, quem vxori Boeti accidisse eadē parte refert.
Quamobrem præmissis omnibus, quæ hucusq; retulimus, cōmodum fore exi-
stimat Gal. prædictis astringentibus vt. Cuius snām confirmat quoq; Aetius.
lib. 4. Serm. 4. c. 66. loquens de rubris fluxibus astringendis, dicens. Mulieri ru-
bro fluxu vexatæ primum sanguinem euacuabimus per venæ sectionem: hæc
enim non solum materiam ad vterum confluentem diuerit, sed detentionem
etiam, ac constrictionem vitam efficit. Multa insequerentur incommoda, si san-
guinis, vel cuiusq; fluxus lauationem localibus auxilijs reprimere mus: nā aliquæ
in hy-

A in hydropem, aliqua in nervorum affectiones, aut oris ventris, aut capitis vexationes collapsæ sunt. Quæ sententia profectò constat, quantum sit astringentium usus formididus: ex quo infero minimè esse toti corpori adhibenda: nam cum pleraq; repellendi quoq; vires obtineant, intropellent ad canales, per quos effluere assuescunt excrementa. Quamobrem tantum ex usu erunt vtero, & vicinis partibus adhibita.

Dictum etiam est à principio huius cap. necessum esse totum corpus roborare, ne aut amplius eadè excrementa generet, aut per inconsuetos canales expurgat. Sunt autem auxilia, quæ id possunt ea, quæ præter id munus, partes quoq; firmare, ac densare humores queunt, tam per alimenta, quæ optimè sunt substantiæ (verum non tenuioris, sed aut mediocris, aut crassioris) quàm per medicamenta, veluti est aqua ex chalybe sæpius extincto, aut frustis alabastri succèssis, & eodem modò extinctis, vel posca ex decocto poligonis, symphiti, plantaginis, & hordei: vinum etiam nigrum, & austerum, vel potus, in quo dissoluantur trochisci ex lemmia, spodio, aut succino. Roborant quoq; partes miro modo leues & frequentes frictiones, q̃ vegetiorem calorem ad eas renocent: dū primò lintheis mollibus, & molliter fiant, secundo verò asperis, & duriter: nam primis alimētum reuocatur ab internis partibus ad extimas, duris verò per cutim resoluitur, quod inutile est, donec natura designat ad intimas partes pellere. Ex quo proculdubio partes roborati est necessum, nam euocato ad eas nativo calore, & propulso excremento rationi consonum est, firmiores fieri.

B Quod si membri alicuius vitio affectio suboriat, coniectandum quidè est, id fieri ex facta aliqua intemperie, quæ loco alimenti proprii, aut humorum (si eorum fuerit officina) excrementa, & vitiosos succos gignit, quos tanquā inutiles (fortasse vt minis noceant) expellit, ac in vterum transmittit. Cui affectio-
*Si vitio
alicuius
membri
fluxio
fit.*

C ni cum aliquod membrum assuescit, diuturnus efficitur affectus: curandi tamè ratio habita illius membri maxima providentia, in eo consistit, quòd excrementum illud deinceps generari interdicit, & genitum per distantes ab vtero partes euacuet. Sic ventriculo providendum est, dum prædicta imbecillitate laborat, præmissa leui purgatione, & ordinatissimo victus moderamine, per vomitus tertio quoq; die prouocatos, ac per eam purgationem, quæ per epicrasim fit, pilulis de mastiche, de rhabarbaro, & alijs, quæ ex mastiche, aloe, agarico, & rhabarbaro conficiuntur. Verum si vomitus profuerint, præsertim si leui irricamento fiant, innitendum est plurimum eisdem: nam excrementa euacuant, & ob id natura à consueto fluxu dissuescit. Quod si hæc non prodesse videatur, potui frequenter porriges decoctum radicis chinæ, vel ex eo serapium conficies, cui munus proculdubio incumbet exiccandi humiditates, si quæ sunt, & visceris roborandi. A quibus ventriculum innges, vt reliquias cõteras, & eius substantiam robores: intus quidem per calidissimos aque potus, per vini etiam haustum cum modico aromatico rosaceo, vel diarrhodone, aut theriaca, vel cū modico rhabarbaro masticato, tertio quoq; die sumpto, vel serapio de mentha, de absinthio, de corticibus citri, & similibus. Exterius verò inunctionibus ex oleo absinthiæ, nardino, de mentha, de cinnamomo, de semine, aut radice, vel folijs angelicæ: aut appposito facello ex galanga, corallo, garyophyllis, nardo, cinnamomo, rosis, absinthio, & mēta. Item affixo emplastro aliquo ex ijs, quæ pro

ventriculo passim solent parari, & nos quoque adducemus cap. de vitijs ventricu-
li ex vtero: aut inuncto etiā ventriculo ex balsamo nuper ex india ad nos aspor-
tato, aut oleo de abiete, vel naph. Item facto ex eisdem emplastro, additis carā-
na vel techamacha, gummi alioqui ex India quoque adducto, & vtilitatis non
contemnenda. Sed animaduertisse in his omnibus auxilijs oportet, vnūquod-
que esse adhibendum iuxta ideam humoris peccantis, aut naturam intemperā-
menti, cuius occasione ventriculus imbecillitate laborat.

Iecoris quoque vitio vterus affici solet transmissis ad eum alienis humori-
bus, quorum prouidentiam abunde monstrauimus hoc eodem cap. docentes
humores à natura alienos vel minuire, vel alio transferre. Cui sanæ curationi
addere tantum expedit ea, quæ huic visceri robur præstare nata sint, tantis
sumpta, quàm exterius adhibita: quorum subinde maximam copiam reperies
lib. nostro secundo de auxiliiorum indicatione cap. de prædijs roborantibus.

Solet non raro fluxione à capite concitata vterus fluere: cui sanè obsistes adhi-
bita capiti eadem diligentia. Nam instituta optima viuendi ratione ex victu ac
potu moderatis, caput primo purgare oportet iuxta naturam humoris ex eius
intemperamento geniti: sic pilulis cochijs, aggregatis, arabicis de agarico, fu-
ridis, aut eis, & si ne quibus: prout magis visum fuerit, in parua tamen quantita-
te (ne inopinato fiat vi medicamenti maior ad vterum fluxio) necessum est uti.
Postmodum capiti appones, quæ reducendi ipsum ad antiquum temperamen-
tum vires habeant, & aliæ etiam, quæ si quid intus manet, quod postea lesurum
sit, digerant, & consumant. Cuius census sunt pulueres, & sacelli confecti ex
chamaemalo, coriandro præparato, stæchade, maiorana, rosis, thure, & alijs hu-
ius conditionis, si frigidam distemperiem causam huic malo præstare comper-
tum sit. Cui etiam vsui commodissimum est per epricam caput purgare ali-
qua ex prædictis pilulis in parua quantitate, vel alijs ex agarico, aloe, & rha-
barbaro cum modico turpeto confectis. Prodest eodem modo puluis sparte pa-
rellæ noctu pondere. 3. j. sumptus cum aqua maiorana, aut in ouo sorbili. Ve-
rùm si calidum steterit cerebri intemperamentum, rarius purgationibus vte-
ris, frequentiusque ipsum attemperare studebis balneis aquæ dulcis, lactis, de-
coctionis ordeï, rosarum, & papaueris, vel extremitatum animalium, cui po-
stea insperges pulueres rosarum, myrtillorum, coriandri præparati, & coralli,
aut cucufam ex eis parabis addito bolo armeno. Vsui tamen proficius est pul-
uis cornu cerui, rosarum, & myrtillorum cum ouo sorbili sumptus, dum femi-
na dormitura est. Prodest etiam, & multis probatissimum præsidium repertum
est, quod constat cremore seminis lactuce prius macerato in aqua extinctionis
chalybis, addito puluere eboris in tenuissimum pollinem redacto: quod femi-
na summo manè tertio quoque die ingerat. Nec displicet in hac causa aliqua
ex prædictis sudationibus uti. Quod si ne hæc quidem sufficere videantur, ad
aliud auxilium longe vtilius, & tutius confugiendum est: cuius naturæ fonta-
nella altero brachiorum aperta esse creditur. In qua sanè sitam esse maiorem
huius curationis partem experimento fidissimo compertum mihi habeo: nam
hæc à capite, quod redundat, expurgat, & vterum ab antiqua, & miserrima illa
fluxione vindicat.

Supereit his oïbus adhuc consideratis, animo euolendum quantū negotium
faceffat

A facillat in hac affectione vteri ipsius prouidentia. Quam proculdubio esse dupli-
cem esse videmus: alteram, quæ vtero primario offecto debetur: reliquam verò, quæ
ipli per consensum à nuper dictis partibus laeso proficua existit. Primam quidē
diuides in tot partes, quot sunt causæ, quæ vterum excitare ad expulsionem na-
te sunt: quippe vel distemperies est, vel vitium in figura ex laborioso partu, ictu
aut percussione contractum. Distemperiem quidem (quæ aut cōficere propriū
alimentum nequit, aut complecti, continereq; non valet) corriges ijs, quæ om-
nino contraria sint intemperamento: quorum non leuem copiam reperies lib-
huius operis 2. c. de vteri distemperie. At complectendi, retinendiq; munus mo-
do ex distemperie, modo ex frigura vitio, vel per assuetudinem recipiendi ab
alijs partibus sumpto consensu, aut vterunq; fiat, aut difficulter perficies (pre-
missa vniuersali prouidentia, per ea auxilia, quæ densandi fluentia excrementa
comprimendi partes vtero vicinas, & corroboradi vterū ipsum vires obtineāt,
Cui accedit secunda indicatio, quæ impedit quominus excrementa hæc in vte-
rum confluunt, aut ad ipsum transmittantur. Quæ quidem opera efficies per epō-
ta, aut per os sumpta, per infusa in vterum, aut aluum, & per exterius adhibita.
B Sic alijs non proficientibus, inter plurima alia, quæ c. de mensū fluore diximus,
portulacam commāducatam, & eius succum potui datum prodesse plurimū,
compertum est. Item decoctum, aut puluis balauitij, fructus rubi: equisetum et-
cum aqua chalybeata, aut vino rubro sumptum: hypocistidis, aut lētisci fructus
cum vino: sammius aster, terra lemnia, coagulum leporis, hædi, aut capreoli: itē
vua immatura, sicca, & in puluerem redacta, vino aut aqua chalybeata excepta,
aut picæ cortex & myrti, quæ idem beneficium præstare fertur. Sic præonia gra-
na quindecim, vel coralli. 3. j. cum vino nigro, vel vinacea trita cum aqua capi-
tum rosarum, aut plantaginis. Nec minoris momenti esse creditur prædictum le-
poris coagulum (vt Gal. refert. 10. simpl. aceto exceptum. Quod si defluxus cali-
dus fuerit, vterusq; exulceratus steterit, lac asinæ mire prodesse comperimus: si-
cint succus stercoris eiusdem asinæ optimis herbis nutritæ: aut succus alicæ, pti-
sanæ, vel rosarum, quæ sanè omnia prædicto lacte admixta, plurimū iuuare
scimus. Item lac caprillum ignito chalybe, aut lapide vstulatum, deinde coctū
cum farina tritici, ordeï, fabarū, & orizæ ex usu esse fertur. Præstat quoq; lens
C excorticata cū aceto bis cocta, mica panis posca madefacta, panis hordaceus,
oriza cum posca, pyra, cidonia, mēspila, sorba, oxalis, & cyme rubi iure incoctæ,
valer quoq; hmoi vsum, & fluentis humoris densationem, & partium, ad quas
& per quas fluxio fertur, corroboracionem præstat: tandem fluxum compescit
confectio, quæ recipit coriandrorum preparatorum, seminis acetosæ, seminis
plantaginis an. 3. ij. terræ sigillatæ, boli armeni, an. 3. s. specierum aromatici rosa-
ti, diarragacanthi. 3. j. ana & s. quibus subtiliter in puluerem redactis, & cū sac-
charo resolutis, in aqua plantaginis quantum sit satis fiat, confectio, cuius 3. j. &
s. cum hausto vini nigri diluū, aut aquæ chalybeatæ manè laborans sumat ven-
triculo ieiuno, & desuper dormiat abstineatq; a pastu quatuor horarū spatio.
Consimile huic beneficium impartitur id medicamentum, quod recipit gum-
mi arabici, tragacanthi. 3. ij. mastichis. 3. j. quibus consimiliter puluerizatis, aq-
commixtis saccharo dissoluto in succo citoniorū fiat confectio in rotulis: entus
semina quoq; sumat. 3. ij. prædicta lege. Maioris adhuc efficacis esse creditur
H 2 id,

id, quod recipit ouorum recentium albumina numero duo, thuris masculi, bo
 li armeni, terræ sigillatæ, ana 3. s. quibus mixtis fiat admodum electarij. Ex vsu quo
 que est, & experimento comprobatur singulis diebus dragmam vnâ radicis phi
 lipendulæ virentis, cum vino nigro potandâ, vel in ouo sorbili deuorandâ. Sed
 longe vtilius fore arbitror, ex succo eiusdem radicis serapium conficere, eiusq;
 mane. 3. j. cum aqua ferrata porrigere. Benefacit quoq; aliud, quod recipit vini
 nigri chalybeati. 3. iij. gummi arabici, tragacanthi, boli armeni, coralli, rubei pul
 ueris myrthyllorû, & coriandri pparati, ana 3. j. quibus mixtis fiat admodum loch.
 Itē confert summô manē fœminis hoc malo vexatis præbere. 3. s. huius pulueris,
 qui recipit lapidis hæmatitis torrefacti, cornucervi vsti, corallorû rubeorû, an.
 3. j. & siccantur oia aqua rosacea, aut chalybeata, & sole iterum siccantur. Cō
 similem huic vsui pstat puluis, qui recipit ossium dactylorum subtiliter pulue
 rizatorum. 5. s. sanguinis draconis. 3. j. amyli. 3. ij. Parat et alter ex granis granato
 rum torrefactis pondere. 3. j. ex thure. 3. ij. cum modica miua citoniorum.
 In vterum et, si hæc non profuerint, infundes eorum, quæ c. de menstruo fluore
 diximus, aliquid quale est quod humores putredine, vel mixtabile acres, aut et
 frigiditate insigni vnitatē diuidentes, mulcent, tergat, & abluat: velut est lac qd
 uis, et amylo incrassatum, hydromeli, cremor alicæ, & orizæ, fenugræci succus:
 additis quoq; quæ parum astringunt, vt thure, manna thuris, aloë lotâ, vel absin
 thio pontico: ac in nimis pituitosa, myrrha, præsertim si pruritus affectioni ad
 iungatur. Quibus addere poteris ex ijs, quæ valentius astringunt, modicum, vt aca
 cia, hypocistis, galla, balauustum, & malicorium: vbi admodum diluta fuerint:
 quibus admisces oleum rosarum ænanthium, vel de mastiche. Cum hoc tamen
 raro his vti datur, nisi vtero immédica fluxione vexato, & ob id exulcerato ni
 mis: idq; cautiùs, ne menses quoq; sisti contingat: ob idq; longè à menstruatio
 nis tpe ea esse adhibenda censeo. Securius tñ extrinsecus oia pharmaca vtero ad
 hibebimus, qualia sunt enchathismata, suffumigia, & longè magis inunctiones.
 Sed primitus fertur apud viros nō contemnendæ autoritatis, oxalidè utero appo
 sitâ comodissimè fluxum muliebrem sistere, & qd magis mirandū est, menses nō
 cōpescere. Parantur quidē enchathismata varia pro humoris fluentis varietate:
 vt abundè dictū est c. de mensum fluore. Verum ne aliquid eorum, quæ huic
 vsui idonea esse possunt, deesse videatur: nosse oportet valere plurimū in hac re
 decoctum consolidæ maioris, & in pituitoso fluxu lexibiu cum modico alumine,
 vel decoctū herbarū, florū radicū, & seminū exsiccantiū, vt lexibij parati ex ci
 neribus ilicis, quercus, ficus, aut cannarū, q̄tum sufficiat ad enchathismata con
 ficienda, sumas, in quo radicis bistortæ incoques, & lapati acuti, ana. lib. s. corti
 cis mali granati, gallarum. an. 3. iij. rosarum rubearū. p. ij. fiat decoctio: cui ad
 de aluminis 3. vj. & facito encathisma. Quod si sola aqua p̄dictis reb⁹ seruefacta
 sine cineribus, id efficere velis, securius facies. Aliud et parabis, qd recipit florū
 clematis. p. j. hedere. m. j. fabarum integrarū numero xx. ordeï leuiter torrefacti.
 p. j. rosarū rubearū. p. ij. fiat decoctio in aqua artemisiæ, vino rubro, & aqua plu
 uiali ad lib. ij. cuius fiat forus infusio, aut iniectio in vterū. Seruabis tñ modū ef
 ficiendi iuxta humoris peccantis conditionē, additis nimirū, q̄ aut attrēperent,
 aut calfaciant. Ex vsu quoq; sunt suffumigia: quorū primū recipit galliæ musca
 tæ, & alipre muscatæ, an. 3. j. ladani, hypocistidos, ana 3. s. stiracis, belzoini, ligni
 aloes

A aloes, santholorum omniū, ana. ʒ. j. nucis muscatæ, macis, gariophyllorū an. ʒ. ʒ. mucaginis gummi quantum sit satis, vt formentur trochisci: quibus vtēdum est frigidiori, & tenui existente pituita, nā acrioribus purgamentis enchathismata, & suffumigia q̄ mitiora sint, adhibenda esse consulit rei rō. Vtēro verò adhibenda sunt, quæ temperamentū, & robur præstent: primò compressionis gratia vt re emplastro, quod recipit radicū bistortæ, musci quercus ana. ʒ. iij fiat emplastrum pro matrici: quo ferunt tanquam secretum saluæ suffitu menses immoderate fluentes, & orine muliebri profluuiū sisti mirū in modum. Confert, & posca tepida admixta decocto poligoni, symphiti, plātaginis, & hordei cū oleo rosaceo, mellino, scū myrthino, pauco uino nigro admixto. Cataplasmata ē ex ordei farina, fabarū cum eadem posca, aut decocto ex radice symphiti, poligoni, plātaginis, aluine, palmulis, & balaustio. Fovēre item partes oportet eodē decocto, addito uino, nigro, aut oleo myrthino cum pulueribus santholorū, terræ lemnæ, trochiscorū de succino. Regionē quoq; vteri inunges vnguento, qđ recipit vini nigri stiptici li. ij. scorix ferri li. j. bulliāt simul vsq; ad cōsumptionē medietatis, & post colaturā, uino adde olei rosarū, myrtulorū, & mellini. an. ʒ. j. & ʒ. ʒ. pulueris balaustiorum, rosarum, & radice symphiti. an. ʒ. j. bulliant iterum ad consumptionem vini, & adde ladani depurati, & ceræ quantum sit satis, ut fiat unguentum: cui consimilē uisum p̄stabit emplastrum diaphanico appellatum. Sic calida existente cā prodest illud vnguentum, quod recipit succi solani, succi semperuivæ, & plātaginis. an. ʒ. j. pulueris coralli rubei, rosarū rubearum. an. ʒ. ʒ. boli armeni, terræ sigillatæ, pilorum leporis combustorum, an. ʒ. ij. ceræ quod sufficiat, ut fiat vnguentum, addito modico oleo rosaceo, & absinthij.

Atqui licet hæc dicta sint in vteri gratiā, dum sua sponte huic malo cām præstat: non ob id omnino contemnenda est totius corporis prouidentia, ne aut ali quid quoq; in uterum transmittat, uel ab eodem utero, si malè affectum sit, ui comprimentium recipiat. Quæ in re eam prouidentiam, quam superiūs diximus obseruabis, cauens omnino ventriculi, aut alterius uisceris cruditatem.

C Hæc sunt candidæ lector, qđ ex multis alijs, quæ, & legi, & probavi, seligere potui: quæ si non profuerint (crede mihi) nihil aliud magis prodesse poterit, q̄ aut sudare, aut balneis uti, aut fontanellam altero brachiorum, aut crurum aperire, iuxta fluxus principium, & originem. Quod proculdubio tutissimum, proficuum, & summopere necessarium esse experimento, & ratione didicimus.

De menstruum cum morbis implexu, & prouidentia. Cap. 16.



Nihil profectò in scēminarū morbis peritos medicos deterre re magis, anxiosq; ac sollicitos reddere assolet, q̄ menstruorū, cum morbis implexus: rursus imperitos nil citius in præcipitium defert, ac laborantes feminas ocyus perdit: quippe siue sanguinem demas, siue non demas, expurgantivè pharmaco utaris, aut secus, uel quoduis aliud præsidium instituas, certū est (nisi menstruorū cōplicationi aliqd tribuas, aut illi ex toto prouideas) te potius læsurum, q̄ q̄ beneficium aliquod præstare possis. Nam id proculdubio est, quod peritos medicos remoratur, nimis confidentes turpiter decipit, argutos,

H 3 & di-

& diligētes deludit, pigros transacta occasione arguit. Deniq; cordatos oēs, diligētiore cautioresq; reddit. Quo quidē factū est, vt non pauca inter fēminas hac sola occasione potius perierint, q̄ ex vi, & efficacia morborū: quorum senitiā proculdubio (vel leuissimis auxilijs) fugerēt, nisi mēstrua purgatio morbis ipsis succresceret, q̄ vel proficua remoraretur auxilia, aut anteuerteret, aut eorū naturā mutaret, vel quantitātē imminueret, ac deniq; formā & modū immutaret. Quamobrē hac in parte huic rei integrū caput dicare decreui, vt deinceps tyronibus constet, quid agendum sit, menstruis morbo alicui superuenientibus.

Constat igitur menstrua purgationem aliquid posse peculiarius, distinctiusq; in morborum curationibus indicare: quod profectō efficit vno è tribus modis. Primò quidē, cum menstruis imminentibus, fluentibus, remoratis, suppressis, & ante tēpus debitum instillantibus affectio aliqua, quæ curationē exposulet superueniat. Altero verò, quum morbo aliquo præexistente, menses, vel imminēt: vel quia menstruationis, & morbi tēpora cōplicantur, aut quum debitum tēpus remorantur, & fortassē ob id causam morbo præstāt, vel ipsum augment, aut aliquod graue symptoma ipsi accersunt, quo exacerbatur, excandescentq; magis: vltimò verò cum consuetum, & naturale menstruationis tempus anteuerit, & in aliquo ex prædictis temporibus inopinato irruit: atq; id quidē vel copiosè, vt morbo sufficere possit, vel diminutè ac parcè, vt ne sufficere quidem valeat, impedire tamen proficua auxilia semper studeat. Quibus exactè pensatis, qualis futura sit cuiusque prouidentia, iam audies.

Quòd si mēsum suppressio, vel remoratio (vtcunq; fiat) morbum præcedat, considerandū primò est, an remoretur natura menses nunc denuò, vel suppressi diu sint: tum quidē vterius sciscitandum est, an ex prædicta suppressione morbus, qui succrescit, suboriat, necne. Quòd si ita sit, proculdubio a sanguinis detractione ex talo curationē auspicari oportet: neq; ante purgandū, sudandū, aut vomendū est, quàm sanguis mittatur, idq; ex talo, vt dictū est. Quo facto, si affectionē urgere comperiamus, sanguine iam misso ex talo pro menstruationis consueta copia, ad uenarum aliarū partium scissionem (si affectio detractionē sanguinis postulauerit) deueniendū esse consulit rei ratio, etiamsi menses alijs præsidijs adhuc exhibitis non profluxerint. Verū de alijs auxilijs administrādis sciendum est, si recētes fuerint suppressiones, & morbus non plurimū urserit, expectandā esse mēstruorum fluxionem antequam manus adhibeamus, ad ipsam prouocandam. Non etenim equè tutum est mēstruo suppressio purgare, vomere, aut sudare, sicut sanguinem mittere: nam hoc in quouis affectu fieri licet, illa uerò opera nō, nisi in urgente, aut pmissa sanguinis detractione, præsertim ex talo. Ceterū si suppressio fuerit diuturna, uel affectio grauis, cunctandū non est, quin mittendus sanguis protinus sit, si id affectio postulauerit: uerum si alia auxilia poposcerit, ea cōfestim adhibebis (leui facta mēstruorū prouidentia) pro morbi usu, & indigētia, citra ulteriōrē mēstruorū considerationē, quæ prædicta auxilia remorari possit. At dū menses morā trahūt, & morbus succrescit ex alia cā à sanguine mēstruo diuersa: censeo quidē curationē auspicandā esse ab eo auxilio, quod causam, & morbum exposcere cōpertum sit, citra respectū ad uenas tali, licet ntrumq; respicere satius, meo, & multorū iudicio, foret. Quā in re cōsiderandum est, an morbus sit ex ijs, qui plurimum urgent, uelut pleuritis,

Aritis, angina, uel id genus, quo tempore ab ipso solū (nisi ex mēsum suppressio-
ne morbus oriatur: nā tunc ex talo scissiones utiliores existunt) indicationē su-
mere ad auxiliorum adhibitionē oportet: uel an eorum sit, qui inducias præbēt
expectandi; quod si ita accidat, non nihil menstruis tribuendum consulo, facta
primitus ex talo sanguinis detractione, frictionibus, lauacris, ac surarum liga-
turis, & cucurbitis: post verò morbo ipsi prouidendum est, ut usus postulauerit.
Quod si mēsum profusio iam iam immineat, & eo tempore morbus subo-
riatur, sicut de remorantibus diximus subaudiendum est, quatenus ad sanguinis
detractionem attinet: quatenus verò ad purgationem, & alia artis præsidia, que
alicuius momenti sunt, minimè. Quippe differre ea oportet, donec menses pro-
fluant, aut consuetum tempus menstruationis præterierit, & alijs præsidijs ten-
tatum sit, eos mouere, aut minuere sanguine leuiter ex talo missio: q̃ si ad mor-
bum auferendum non proffit, proderit tamen, ut purgare, sudare uel laborantes
(quod morbus expostulat) tutius possis.

B Cæterum si ex mēsum debitum tēpus anteuerterit morbus accidat, cre-
dendū quidem est ex cā, quæ materiā menstruorum ad citatiore excretionem
irritauit, morbū quoq; ipsum principiū traxisse. In qua sanè re, siue plenitudo,
siue cacochimia sit in morborum principijs, sanguis mittendus est ex talo: ac si
multū urgere affectionē comperiamus, ex brachio, præsertim si totius corporis
plenitudo malo, & mēsum principium præstiterit. Verum si in utero fuerit re-
dundantia, innitendum magis est sanguinis missionibus ex talo, donec uteri ple-
nitudinem depositam esse constet, nec verendum est, nimis urgente adhuc ar-
dentissima febre, ex talo sanguinē mittere, licet affectione inter inguina, & alas
existente ex brachio exposcere id videat. Nā sciso talo eodē malo paulò minus
subuenimus, & præcauemus humorum ad caput ascensionem, quod frequen-
tissimè in his febribus accidere conspiciamus. At si cacochimia utriusq; uitium
præstiterit, coniectandū est, an menstrua purgatio consuetam quantitatem adæ-
quet, quo tpe sanguinis missione ulteriori opus nō est, sin aliter, sanguine ex
talo missio defectum naturæ adimplebis. Quo facto, verendum non est, adhuc
instillantibus (diminutè tamen) mēsum, ijs pharmacis uti ad purgationem,
C quæ humores naturam laceffentes ad citatam menstruationem, & morbo mate-
riam præstantes auferant. Atque hæc de prima parte dixisse sit satis.

At si tempore ad menstruam purgationem statuto menses fluxerint, & cū ali-
quo ex morbi temporibus coierint (qd̃ grauius, & difficilius est) considerandū
primò, principiū ne sit, & qualis affectus natura, & conditio existat. In qua sanè
re (dū usu venit) consuetū apud plerosq; medicos reperio, apparentibus mēsum
bus (etiā si à principio morbi id accidat) mox à sanguinis detractione subsistere,
quantūuis necessaria sit, & morbus urgentissimus: differentes quidē per duos,
aut tres dies, ac exultimantes hac existente, non esse opus alia vacatione, donec
natura à mēsum subsistat, vel parū antè. Quos mille modis deceptos fuisse, &
morbos subinde immedicabiliter creuisse nō semel cōperimus. Ob id quidem
urgente affectu, si non copiosè fluant, si euidenter non conferant, etiā si debito
tēpore proueniant, mihi non est dubiū, quin expectato primo nature impetu,
quē in vacationibus (adhuc præter naturā factis) expectare iubet Hipp. opus
sit, trāsactis ad minus duodecim horis sanguinē ulterius mittere. Verum id qui-

H 4 dem

*At uel in mēsum
ut etiam in mēsum
et si morbi erit
de, si ite dū in
quid*

dem ex talo, tñ inquam, quantum sat sit ad complendam naturalem, & consue-
 ram illius scēminæ menstrualē quantitātē. Quippe in leuioribus affectionibus,
 & q̄ non plurimū urgent, menstruationi prouidendum est semp, sanguine nimi-
 rum misso ex ea uena, quæ ipsum ab utero extra, & ad utrū euocet alioqui pe-
 riculum est, ne menstruo non probè purgato, affectio, quæ sua sponte leuis est,
 grauior subinde fiat. Ob id quidē ad uterum sanguinē in leuioribus affectibus
 euocabis lauacris, ligaturis, & frictionibus: nā satis est prædictis affectionibus, q̄
 sanguinis detractioni cessuræ sunt, ipsum per commodam regionem utrunque
 educere potius; quā mēstruis (quæ iā iam fluere cōperunt, quorum in utero nō
 leuis copia existit) ad superna euocatis, aut ob contrariam reuocationē, maio-
 ris vel alterius mali cām existere, sanguine ex brachio misso. Verum si purgatio
 nē leuis hæc affectio postulauerit, ipsam quidem remorari opus erit, ne motu
 illo ad contraria factō, aliundeue turbatu, aut euocato uteri sanguine, quæ dixi-
 mus mala, & longē grauiora succrescant. Quamobrem clysteribus, aut supposi-
 torijs, quæ partes utero uicinas irritent, rem oēm potius agere oportebit. Cete-
 rum si affectio ex grandioribus fuerit, & ijs quæ maximum, ac breue periculū
 minantur, mihi non est dubium, quin aliquando (uelut, in angina, phrenitidi-
 ne, pleuritide graui, & similibus) ex usu sit ocysimē ex brachio sanguinem mit-
 tere. Ego tamen securitatis gratia, in grauioribus affectionibus, primo ex talo sā-
 guinem mitterem, incipiente (vt dictum est) affectu, reuulsionis, & menstrua-
 tionis cām, mox tñ eadem die, præsertim si purgatio menstrua non creuerit, uel si di-
 minutē processerit, ex brachio citra cunctationem sanguinem demerem: quip-
 pe grauioris, & vrgentioris mali conditio dignitate, & occasione agendi supe-
 rat reliquam indicationem: modò ea lege, quam nuper adduximus, id opus fiat.
 Quā sanē curandi rōnem adseruare oportet in reliquis morbi temporib. qua-
 tenus ad sanguinis detractionem attinet; uerum in purgatione, vomitib. & sudo-
 re non ita: nā mēstrualis purgatio semper horū auxiliorum indicationes supe-
 rat. nisi ultra tempus statutum durauerint sanguinolenta quādā uteri purga-
 menta, q̄ non plenitudinē, neq; naturæ actionē, sed uitium, & irritamentū facul-
 tatis attestantur. Quib. etenim sic existentib. ego non dabitarem vrgēte purgan-
 di occasione, pharmacum porrigere: quin potius arbitror, necessariū eo tpe ef-
 fe, ad vindicandam naturam ab iniurijs humorum mordentium, & irritantium
 ipsam intra uenas, & uterum: cuius rei rōne credendum est purgamenta illa diu
 instillare. Cum hoc tamen si aliqua occasione intueri oportet diligenter men-
 strualem naturæ motum, & abstinere ab omni medio opere, ea potissimum est,
 ubi menses in morbis stata periodo profluunt nisi (vt dictū est) iā iam desinenti-
 bus, aut instillantibus purgamētis illis, alioqui tutum nō est, imo periculo ple-
 num, & ab omni rōne absonum existit, naturam à consuetō, & utili fluxu debi-
 to tempore commoto, ullo uacuationis genere diuertere. Nam qui rōne quæ iu-
 dicantur, & iudicata sunt Hipp. mouere, aut nouare medicamentis vel aliter irri-
 tando omnino interdicat, eadē profectō mēstruam purgationem tueri, innare,
 aut finire oportet. Verū cū artis præcepta vrgēte necessitate euertere utile, & ne-
 cessarium sæpe sit: ob id quidem, q̄ hucusque diximus, diligenti animo rimari
 oportet, & exequi, ubi tempus occasionem præstiterit, ne occasione oscitanter,
 aut negligenter prætermisā, in turpius erratū medicus, & laborantes decidant.

Quodd si

fluctibus mē-
 stru- in graui-
 morbi duomo-
 de mēstru-
 sanguis.

Artis præcepta
 in vrgēte sunt
 inmutanda.

A Quodd si menses incipiente morbo, procedenteve immincant, coniectadū co-
rpe est, an affectus, qui viger, ex ijs sit, qui ex vtero prodeunt: an ex alijs, qui vel
toti corpori cōmunes sunt, vel alicui ex p̄cipuis membris peculiare existūt.
Nam si primum, mihi non est dubium, quī longe vtilius sit citra vllam moram,
ex talo sanguinem mittere, q̄ ex brachijs: quippe coniectabile est ex uteri pleni-
tudine, q̄ exitum iam iam minatur, morbum originem traxisse: ob idq; certum
erit tutiores, & vtiliores esse ex talo sanguinis detractiones, quæ per cōmodio-
rem regionem euocent. & euacuent vteri redundantiam, & mali simul causam
elidant. Verūm si ex corpore vniuerso, vel ab aliquo ex p̄cipuis mēbris mor-
bus oriatur, properandū ocylimē est ad sanguinis detractionē ex brachijs, ea ni-
mirum vena scissa, quæ toti corpori, vel mēbro primò affecto cōior existat. Stū-
dendum igitur est copiā demere ante quidem, q̄ menses profluāt, ne postea co-
gamur, necessariū auxiliū differre menstruis incipientibus, vel ex distantiori
parte, q̄ affectus postulet id efficere, minori laborantis cōmodo, ac fortasse mor-
bo facto grauiori. Verūm in alijs auxilijs, purgatione nimirū, vomitu, aut sudo-
re, non ita; quippe instante menstruo verēdū est aliquid horū tentare, ne vel di-
strahatur, vel ab antiquo, & necessarijssimo munere p̄pediatur natura: quo ni-
hil ipsi grauius esse solet. Nā sepe motus ille (vel motui paratus sanguis) p̄ter mo-
dū detentus, aut aliō euocatus in aliq̄ mēbrū princeps inopinatō irruit, vel ibi
dē detentus putrescit, & cām malo p̄existenti adauget, aut aliud grauius denudō
progignit. Quamobrē differre oportet huiusmodi vacationes, donec mēstruatio p̄-
tereat, nisi in ijs feminis, quibus procrastinari frequēter mēses contingit: in qui-
bus vrgēte necessitate purgare salē oportet, (licet vomere p̄ vehemētiā motus
ad superiora, vel sudare, p̄sertim sudoribus arte ex citatis, eo tpe tutū nō sit) com-
pleto menstruationis tpe, quia id permittere v̄ consueta procrastinatio. Cūcur-
bitis verō semper locus concedit, p̄sertim vniuersali vacatione p̄missa, ac à fe-
moribus, & suris facto operis principio. Verūm si debitū, & statutū mēstrua-
tionis tps menses p̄tergrediantur, animo eo tpe expendendū est, an id, femina q̄
laborat, de more habeat, vel diu suppressos habuerit, & vltimō, an ex noua sup-
pressionē morbus principiū, aut incrementū, exacerbationēve nanciscatur. In
qua sanē repensandū quoq; est, menses (sicut reliquas vacationes) vna ex qua-
tuor causis, pluribus, aut simul oibus posse detineri, nimirū, ex materia, facul-
tate, instrumento, & cā sine qua non. Nunc verō sat est nosse, materiā posse esse
crassiorē, vel copiosiorē, vt id ma- lū efficiat: facultatē deiectā: instrumentū im-
peditū, & vltimō sensum parū iusto hebetiorē. Vtūq; tñ proueniat, si sanguis
p̄ affectus indigentia mittendus est, & femina id procrastinationis vitiū de mo-
re haheat, cunctandū non est, sanguinē ex ea parte mittendū fore, cuius scissio-
nem ē directō affectiōi, & affectæ parti prodesse magis cōperiamus, nulla, vel
leni de mēstruo facta consideratione. Idem quoq; agendū arbitror, vbi diu fē-
mina menses suppressos habuerit: quippe eo tpe citius, & copiosius sanguinem
mittere oportebit ex p̄dictis venis citra vllū venatū tali respectū. Quod equidē
in alijs auxilijs, sudore nimirū, & purgatione ita exequendū fore nō cēseo: nam
prouocare prius menses oportebit, nisi morbus ex vrgētiōribus fuerit, aut sup-
pressio diuturna. Verūm menstruis in morbo v̄turis, ceterū deficientibus, ita vt
coniectabile sit, ob defectū morbo cām, & fomentū p̄stari, nulli esse dubiū arbi-
tror,

*Instabile mē-
struū p̄stari
ad nō p̄stari
arbitror.*

*Quatuor de
causis mēses
defiētur.*

tror quin sanguis mittendus ex talo sit, donec vel ~~quod~~ menses prorumpant, vel A
 vteri plenitudini satisfactum esse conijciamus: idq; non solum in sanguinis de-
 tractionibus, verum & in omnibus alijs auxilijs exequendis obseruandum est
 est. Primò nanq; in hac curatione hos menses prouocare, vel expectare, aut sup-
 plere sanguine misso, opus erit, postea, ad alia auxilia confugere: nisi vehemen-
 tissima, vrgentissimaq; fuerit expurgandi necessitas, qd facies sub cōditione, ni-
 mirum, cum mēsum remoratio malo cōm non pstat, vel auget: q si aliqn neces-
 sitas vserit id quidē cautē, & prudenter facies, blandis tñ, & lenissimis medica-
 mentis, quæ naturæ imminentem motū non euertant, & vtilē affectui moliant
 vacationē. At si debitum tps menses anteuertant, qd plerunq; in morbis cōtin-
 gere scimus, considerandum primò est, quid boni vel mali ea res portendere
 possit: secundò, à quibus causis proficiatur: tertio verò, & vltimo, quid agen-
 dum vel non agendum sit. Nihil profectò in curandis feminarum morbis, diffi-
 cilius, grauius, molestius, & periculosius reperies, q menses inopinatò morbis
 quibusq; succrescere: præsertim ipsis incipientibus, & anteq̃ medicus auxiliares B
 manus omnino præstiterit: nam reliquis temporibus, vbi agendum nihil est, le-
 ue quidem, & tolerabile existit damnum: huius profectò mali meminerat Hip.
 li. 2. pop. par. 3. tex. 5. dicens de his qui febri citant, & menstrua ipsis succrescūt.
 Quibus in febribus anxiosis horridis rubescunt facies, laboriosè degunt. Dolo-
 res oculorum capitis grauitates, paraplexie, & muliebria si apparuerint, maxi-
 mē aut quibus primum, sed virginibus, & mulieribus quibus ex multo tpe, sed
 & quibus, non quo consuetū est tpe, aut oportet apparent, deinde pallidæ fiunt
 qua snia visus est comprehendisse maiorem huius rei q ad mēstruorum imple-
 xum pertinet partem. Difficultatis quidē, & molestiæ cā multis proculdubio sit
 rōnibus: prima, q auxilia aliq̃ pficua, & necessaria mēses fluentes reuāt, vel
 remorentur saltem, adeò vt morbus tñ crescat, q deinceps beneficium suscipe-
 re aliquod vtiliter non possit. Præterq̃ q cum mēstruorum anticipatio ex gene-
 re sit symptomatica vacationis, dubium non est, quin maximum arguat peri-
 culum, maius quidē in morborū principijs, q in quouis alio, ob adductas à me-
 rationes. Cui accedit vacationes nullas in principijs morborum viles vsquā
 natura mouere posse. Verum cum hoc contingit aliqn vtilem esse hmōi men-
 struorum anticipationem, nimirum, cum in morbi statu prorumpit copiosè, &
 cum tolerantia. Quod (licet tps anteuertat) iuuat peofectò magis commoditate
 tps morbi, & copia, q irritamento obfit: velut et de declinauione subaudiendū
 est: dummodò nō cohareat cum alia naturæ vacatione. Quippe eo tpe grauius
 malum portendit: arguit. n. naturam maximè irritatam, & ob distractionē nul-
 lam vacationem perfecturam. Causas verò habet mēstruorum anticipatio, C
 iudicio nostro, numero quatuor: nimirum, materiam plus iusto copiosam, acrē,
 mordacem, tentiorem, aut oīno à natura alienā facultatem, expultricem quidē
 irritatā, aut retentricem nimis deiectam: instrumentum pter naturē modū laxū,
 apertum, aut disruptum: ac vltimò sit pp cām sine qua non, exquisitionem vīde-
 licet, & acutum sensum, qui à rebus et secundū naturā existentibus, exacerbāt.
 Atq; hæc de causis dixisse sit satis, vt quisq; intelligat prælagij rōnem iuxta cāx
 naturam, & curandi et methodum. Quippe aliqn opus est minuere, q abundāt,
 nonnunq̃ quæ virtutē exacerbant reuēdere, aut sensum stupe facere, vel vijs, &
 meati-

Anticipatio me-
struorum in prin-
cipijs morborū
nō quā vtilis

Anticipatio me-
struorum in statu
morbi pter
hinc iugatur
altera vacua-
tionem.

Anticipatio
quatuor causis
in xta quas
diuersa cura
fit.

A meatibus patulis puidere. Verū menstrui (vtcumq; sit) debitū tēpus an reuē-
tib. morbo incipiente, magnā fas est diligentia adhibere in sanguine pro rōne
morbi vltius mittendo: p̄sertim si anticipationē ex copia pficisci cōperiamus,
quo casu nullo interposito tpe, ex talo primo quantū sat sit ad impetum naturae
fluandum sanguinē mittimus, q; si necessitas vltius pergat, & vteri plenu-
do deposita sit: audacter ex brachio, vel ea parte, q̄ affectus postulauerit, sangui-
nē mittere licebit. Siquidē symptomatice vacuationes id permittere vñr, quin-
imo exposcere sepius. Quapropter in anticipationē mensiū differre nō licet
vltiorē sanguinis detractionē, si affectionē postulare cōperiamus, sicut in a-
liis menstruorū cū morbo implexib. sed protinus ipsum mittere, si ex vteri ple-
nitudine prodeat, ex talo, nō semel, sed bis, & pluries: sin aliter, semel ex talo
quantū sat fuerit: & affectus postulauerit, nimirū quod sufficiat cōsuetē purga-
tionis quantitati rēdere, idq; maxime si affectio ex his sit, q̄ caput irrucere solēt,
vt in ardentissimis febrib. conspicimus: deinceps verō ex brachio. Secus quidē
res se hēt in reliqs vacuationū generib. in quibus plus tēporis expectare oportet,
ac differre, donec natura, vel quieuerit, vel saltē remissius egerit. Quo tpe
apparentibus tantū stilla sanguinis aut vteri sanguinolentis purgamentis, vrgē
te affectu, pharmaco purgare tantū, ac sepe necessariū existit: p̄sertim si p̄cedere
iā morbo, ac eunte ad iudicationē, anticipatio fiat. Quibus procul dubio tēpori-
bus cōiectandū erit vitiosos humores, acres, & mordaces id efficere: ob idq; p̄-
perandū est ad purgationē ne eorū vitū intus perperā cohibitū in grauius ma-
lū cōmigret. Verū si in morborū principiis ex humorū corruptela potius, q̄ co-
pia menstrui anteuertit statutū tēpus, magis ob id innitēdū est sanguinis de-
tractionib. q̄ purgationi, licet partius q̄ in primo casu, quod in statu, & declina-
tione fieri minimē licet, sed vberius purgandū, quia ea tēpora ex artis rōne pur-
gationi potius, q̄ sanguinis detractioni idonea sunt: nisi ēt eis dē tēporib. sangui-
nē abundare cognitū sit, quod vtile foret à principio affectus impedire: nā pe-
riculo plenū est sanguinē in statu, aut prope ipsum abundare. Quod si ob medi-
ci, aut laborantis negligentiā factū nō sit, & menses ea causa in statu instillaue-
rint, sanguis quidē eo tpe mittendus est, cautiū tñ q̄ in principio, sicut in prin-
cipio cautiū purgādū, q̄ in declinatione, idq; si necessitas vrgeat, mēlib. adhuc
ex toto nō finitis. Itaq; debitū tēpus menstrui anteuertentib. in morborū prin-
cipijs, mittendus sanguis ocysimē ex talo est: & si necessitas vrget, ex brachio ip-
sis nondū finitis: p̄sertim si ex totius plenitudine anticipatio fiat: sin aliter, id fie-
ri quoq; pōt, sed partius purgandū tñ si id plurimū affectionē exposcere cōspi-
ciamus, ipsis tñ iam iam desinentibus, idq; maxima cum affectus vrgentia, ac p̄-
nuntiato prius damno ab assumpto pharmaco, & maximo periculo ex dilatio-
ne. In aliis verō vacuationibus, vt superius dictum est, fieri pōt. At si in statu, aut
declinatione anticipatio accadat, & morbus praestiterit expectādi inducias, dif-
ferre purgationē tutius est: sin aliter, iam desinente menstruo, & nusquā aliter:
licet his tēporibus audacius purgate liceat facta collatione ad principiū, vt nu-
per diximus: p̄sertim vitiōsis humoribus causam anticipationi praestantib. Hec
atq; optime lector animo frequenter enolues, vt ex mentis exercitatione, &
artis principijs peritiā assequaris, qua in rebus grauiorib. & difficillimis, qua-
les huiusmodi sunt, rectum ad agendū possis proferre iudiciū, ac decretum.

De

*Menstrui antici-
patione in brachio
hic magis q̄
ad pedem.*

*stat et decli-
natione morbo
aut laboris pur-
gationi, nō sa-
guinis/menstrui*



Ad menstruam quoque purgationem, & ad eius proculdubio vitia pertinere existimamus eos tumores præter naturam, quod feminarum mammis adnascentes vulgari nomine, zaratanes, nuncupari conspiciamus, malum quidem maiori ex parte feminis familiare, graue, difficile, & maioris, ac periculosis præludium.

De cuius sanè natura, & essentia non satis conuenit inter autores: quamobrem hac in parte eius conditionem, & differentias explicabo docens causas, signa, & veram præcauendi, & curandi methodum, si prius docuero, quales in mammis experimento, & obseruatione comperiamus tumorum differentias prædicto tumorum generi per similes adnasci.

*Quia
mamma
laxata
fuit, plu-
res, &
grandes
venas
habet ob
idque re-
ceptioni
propriis-
sima ex-
istunt.*

Frequentissimè quidem in feminarum mammis (in ijs præsertim, quæ viro orbata sunt, aut parere ante debitum tempus desierunt, vel steriles existunt: sicut in virginibus, quæ iam grandiores sunt & viro maturæ) duros conspiciamus succrescere tumores mille accidentibus præditos: quos quidem ob id rude vulgus existimat cancos esse, aut eosdem semper minari. Verùm vt rem à primis principijs aggrediamur, expendat diligens lector experimento quotidiano esse confirmatum, sex tumorum durorum sortes cancrum simulates, aut minari res, feminarum mammis succrescere posse: has quidem præter communes tumorum differentias. Prima porro ex crasso fit, & caliginoso flatu mammam vniuersam distendente ducenq; eam in turgorem. Altera dum mammarum glandulæ humore aliquo fluente, aut sensim, & paulatim ibidem concreto, & infarcto tument, dolent aut citra dolorem turgent. Alia verò dum ex pituita vel quouis alio crasso humore à capite fluente, vel aliunde in mammas transmissa, aliquid imbibitur citra collectionem in ipsis factam, cuius ratione duræ apparent marmæ, dolentes quidem, si bilis flauæ, vel adusti alicuius humoris aliquid accesserit, indolentes verò, si citra ipsos fluat. Quo proculdubio malo affecta mamma in maiorem molem augeatur citra tumorem aliquem parti alicui eius peculiarem. Quod ob id fieri scimus, quia humor imbibitus potius existit, quam alicubi collectus: res sanè ad tumorum præternaturam confectionem apprimè necessaria. Quarta quidem duritiei species fit, cum scrophula mammis adnascitur: quod frequentissimum est: vel glandula ipsa in scirrhum conuersa, duritiè in mammis repræsentat non leuem. Quinta sanè fit, dum ex causis huic rei proficuis scirrhus tumor in mamma paulatim congeritur. Sexta porro, & vltima, cum scirrhus tumor, vel quouis alius ex prædictis in cancrum migrare nititur, aut iam iam in eum mutatus existit; idque cum vlcere, aut citra ipsum. Verum vt quisque hæc omnia distinguere sciat, ac præcauere, & pro vsu, & indigentia curare discat: placuit hac in parte cuiusque seorsum meminisse, & signa, causas ac medendi rationem docere, ne nobis vsquam accidat, quod multis euenisse scimus, nimirum, ex negligentia propter mali ignorance, aut ex nimia diligentia propter rusticum futuri mali timorem, in grauiora pericula feminas deferre, curatione potius, quam sua sponte vi morbi excitata.

Fami-

A Feminis quidē ijs, quibus, & menses, & semen ex suppressione, aut impro- *De fla-*
 spera purgatione corrumpuntur, & in utero, & vicinis partibus existētes, ibiq; *tuolo*
 corrupti, & vtcunq; vitiatī, à se crassos halitus fundunt: succrescit faciliè ob sym- *tuolo*
 pathiam his partibus propriam, vt commoto ex aliqua euidēti vel abdita cau- *tuolo*
 sa flatu, illucq; delato, cor dolitet, & mammae (sinistri praesertim) turgent, ac in *tuolo*
 tumorem eleuentur dolore non leui, simul cum brachijs, & torus lateris consen-
 su, & cruciatibus. Quā sanè tumidam dolorosamq; mammarum affectionē mul-
 ti dolore, & tumore decepti indicant tumore esse cancerosum, vel cancerum mi-
 nante. Verum si quis re hanc diligentius pensitet, comperiet causas habere p̄di-
 ctam affectionem cognitu quidem faciles, praecautione verò difficillimas, & sua *Causa.*
 natura graues. Prima sanè omnium est obstructio, quae vel mensium purgatio-
 nem cohibet, minuit aut remoratur, vel vteri necessaria, ac vtilia purgamenta
 supprimit. Secunda quidem excretionis priuatio esse censetur, sine inconsumpta
 fuerit, sine consueta. Ex quibus iam tertia prodit, nimirum, excrementorum, aut
 humorum, quos nuper diximus, corruptio: ex quibus vel adaucta fuliginum
 copia, vel plus in se cohibita aliquid ad reliquas corporis partes transmitti ne-
 cessum est: ad eas praesertim, quibus maiori consortio cohaeret, & gaudet vterus
B ipse. Quo fit, vt succrescat quarta, & vltima causa, ac immediatior, videlicet, ob
 flatum in mammis receptum tensio, quae tumoris naturam aemulatur. Verum
 quia huic parti propriè sunt partes quaedam, quae dolore possunt, & rursus hali-
 tus maiori ex parte vitiosus, corruptus, acris & mordax existit, fit subinde faci-
 le, vt dolorem haud mediocrem edant: quinimo doloribus cancerorum perfi-
 similem, grauem quidem & acutum, ob halitus illuc ascendētis naturam, & co-
 ditionem: extensum etiam, & pluribus partibus communem ob colligantiam
 & consortium mammarum cum brachijs, scapulis, costis, & his proximis parti-
 bus. Quibus sanè, & causas, et causarum differentiā haud difficulter distingues,
 vt huic malo prouidens praecauere faciliè possis, quominus ad maiora, & gra-
 uiora fiat comeatus: quippe non difficulter in affectione hac ascendente ali-
 quo ex residuis humoribus vel excrementis, schirrhosa, & postmodum cācro-
 sa efficitur durities, quod frequenter accidisse comperimus.

C Reperiet diligens medicus, si rem hanc attento animo considerauerit, affectū *Signa.*
 hunc mammarum flatuosum esse tumorem, quem (licet mammae cinitatem in-
 signem non habeat) in eisdem fieri facillimum est ob spongiam, raram, & laxā
 naturam, q̄ sortiuntur: quò fit vt non difficulter recipiant flatum, & aliquo t̄p̄is
 spatio pertinaciter contineant. Quem sanè tumorem nosces, & ab alijs eiusdem
 partis tumoribus distingues, quia in eo, si quis mamam manibus comprimat,
 reperiet vniuersam esse in tumorem elatam, tensam, dolentem, & non vnicam
 eius partem, neq; quid peculiare in ipsa tumidum, aut dolens existens, sed rigi-
 da rota est. Grandulas ēi eius citra dolorem contingeret attestabitq;: q̄ si q̄n doli-
 tent, potius extensione, q̄ ex duritie fieri comperiet. Sed distingues eam affectio-
 nem à reliquis duris, quia in ea, vera durities nō reperitur, sed tensio, & turgor,
 res quidem longè diuersa à duritie. Praeterea id cognosces, q̄ in reliquis māmā-
 rum tumoribus semper aliquid durum remanet, dolorosum vel dolore carens,
 diuq; perseverans: at in turgētia seu inflatione p̄ interualla quod tensum est re-
 peries

peries, idque uel menstruationis tempore, uel per lunares circuitus, aut ex aliqua occasione, uel citra ipsam. Femina item mœsta est, aut animo deficit, uel uteri, aut hypocondiorum, ac cordis dolore premitur. Sed quod frequentius ipsis accidit, saltus quidem cordis est, & palpitatio: deniq; dum aliquid eorum, q̄ in utero præter naturam retentam computrescit, mouetur, magis, ac magis prædicta affectio exacerbatur. Quibus sanè occasionib. cessantib. uel sponte, uel p̄sidio quouis mox subsideat mammae, & dolore leuantur, & accidentia omnia, quæ mammarum tumorem comitabantur, cessare uidentur. Habet etiam id peculiare hoc tumorum genus, ut difficilis sit iudicii, quod plerumque uel aliis tum moribus adiungatur, uel durante affectu mox alter succrescat.

Curandi
ratio.

Magni quidem est momenti in hoc malo prouidentia: quippe ipso prædito, aut extirpato, maiora proculdubio præcauemus: ob id qui uerâ desiderat nosse curandi rationem, legat c. de uidiuarum, & uirg. melancholia lib. 2. huius operis, ante quidem, quàm curatrices adhibeat manus. Interim tamen sciat primum curandi principium pendere ex ea uacuatione, quæ sanguinem in utero abundantem minuatur, scissa uena, quæ utero correspondeat, qualis est, quæ in malleo his reperitur, ea porro quantitate, quæ plenitudini, habitui, ac menstruorū priuationi æqualis existat. Quo sanè præsidio triplex præstamus beneficium: sanguinem nimirum, ne putrescat, uacuatione facta efficiamus: menses euocamus, & ultimo eorum ad minus defectum supplemus: præterea prouidemus, ne affectus ex flatuosum in scirrhosum, aut uerum cancerum commigret. Quam etiã sanguinis detractionem tutius, & commodius per interualla facies, saltē quarto quoq; mense, menstruationis tpe. Interim in aliis præsidii menses euocare opus erit, ijs quidem, quæ (ut dictum est proprio cap.) id efficere nata sint, uel exhibito chalybe præparato, crurum lauacris, in sessionibus in calida aqua, uel pedibus ibidem diu immorantibus, ligaueris, cucurbitulis, & modico exercitio. Verum quia uires non permittunt rem omnem sanguinis missionib. iusto frequentioribus fieri, & quia coniectabile est, corpus uniuersum, mesereon, uteri uenas, iecoris, aut splenis scatere crudis, melancholicisue, aut utcunq; aliter uitiatis excrementis, ex usu erit his medicamentis per uices, & interualla corpus purgare, quæ diximus cap. nuper citato. Huius sanè census sunt cōfectio hæc sine scāmoneo, & colocintide, agarius, folia senæ infusa, decocta, uel pruna damascena, saccharo, & prædicta decoctione condita: ualet & syrupus ex prædictis foliis confectus cum passulis, & succo borraginis, addita pro libra decoctionis. 3. j. lapidis lazuli linteo molli ligata, & per diem integrum macerata, & expressa, cuius. 5. iij. porrigere poteris. Præterea, facta purgatione, cordi prouidendū est ijs, quæ flatū discutiant, qualia abundè reperies c. de cordis affect. Deinceps in mammis apponere oportet linteolū crūdum aqua uitæ sæpius madefactum, & umbroso loco exiccatum, uel eidē saponis spuma imbutū, aut oleo liliorum, de sambuco, uel ex semine, aut radice angelicæ confecto. Præstat, & confectum ceratum ex eisdem cum modica cera, balsamo, uel oleo abietis, ac pulueribus plumbi usti, & non loti, anisi, aut seminis rutæ. Cui et usui non parum proderunt, pleraque ex ijs, quæ inferius hoc cap. sum dicturus, præsertim ea, quæ discussoriam, & anodynam obtinerint efficaciam, uelut est oleū de napha solum, uel cum modice cera, uel aliud ex nup dictis. In qua sanè curatione

tam

A eam victus rationem institues, quæ & parca sit, & optimi nutrimenti: cum potius parsimonia ne, vel crudum ex alimento quid supersit, & obstructionib. obfit, vel malum in aliud degeneret, nimirum, in ventris, aut vteri inflationem.

Solet non raro in feminis (quibus, aut menstrua deficient, aut impropere profluunt) caput fluxionibus doloribusq; grauissimis tentari: quibus sine occasione, aliquid eius, quod influit in mammas, vel ex vtero illuc commigrat, in eas in tumorem eleuat vniuersas cum dolore vel cura ipsam. Quæ porro affectio non leuibus, aut vtcumq; adhibitis præsidis subsidebit miscetque: quin potius minari grauius aliquod malum videtur, præsertim cum in ea affectione tota mamma intumescat, velut in precedenti dictum est: ceterum dissident, q̃ in illa flatuosa substantia, in hac verò humor magnitudinem, & turgesciam efficit. Quamobrem etiam si causæ ratione differant, morbum tamen in magnitudine vtraque constiuit.

*De mām-
mis du-
ris, et tur-
gentibus
humore.*

B Causas habet hęc tumorum species non contemnendas: vnam quidem menstruorū suppressionē, cuius ratione facto recursum ad māmās, easdē præ copia in tumorem eleuat, doloremq; subinde concitat, dum nimis tenduntur, aut dū id, quod influit, acrius, mordaciusq; extiterit. Quod etiam secundo contigisse cernimus cōfluente à capite tenui pituita flatibus admixta, præsertim si dolor simul accesserit. Ex quibus causis scimus feminas non raro graui dolore premi, idq; nō in māmīs solum, sed in humeris et, brachijs, ac sub alis, ita vt plures existimarint, cancri esse principium: nec omnino sanè falluntur, præsertim si quis eā affectionem negligenter tractet: nam sepe eius, quod influit, aliquid in duriem ita grauem commigrat, vt difficile nō sit credere, in cancerum quoq; posse degenerare: & ob id curandum est eam affectionem rectè distinguere, præcauere, & curare, ne quid præter institutum nobis inopinatò accadat.

Causa.

C Cognosces aut hanc affectionem, distinguēsq; a cæteris sibi similibus, quod in hac tota mamma intumescat, doleatq; etiam æqualiter tota: item quod nulla sit in ea pars, quæ magis quā altera induruerit: licet cum morbus diu durat, id quoq; reperiat. Præterea id cognosces, q̃ per interualla ac certis quibusdam temporibus tumores doloresq; exacerbari magis contingat: quod sanè ad p̃sum fluxionum, vel prope tempus menstruationis euidentius fiet, ac subsidebit protinus, vel cessante fluxu, vel mensibus prætereuntibus, & eò quidem citius, quò magis sanguine menstruo purgata fuerit mulier, licet non nihil in māmīs semper dolorosum super sit, quod in inflatione non accedit, quia penitus, quod flatuosum est resoluitur.

Signa.

In hac quidē affectione ei causæ prouidebis primò, q̃ cognoueris malo principium p̃stare. Sic etenim capite affecto, & instillante in māmās, primitus exiccantē victus modum institues ex passulis nimirum amygdalis tostis, amylo, melle rosaceo, ante oēm victum assumpto: in gestis postmodū autum assatis carnibus cum potu ex aqua anisi, vel radicis chinæ, aut spartæ pærellæ. Quo quidem facto ad medicinalia te conferes præsidia purgato prius corpore: caput et pilulis parua & frequēti purgatione euacuas. Quem sanè vsū præstant pilulæ sine quibus, aureæ, arabicæ, ex hiera, ex agarico, ex hiera & agarico simul: ac si ventrem affectioni consentire comperias, ex mastichinis quantum sat sit porriges, vel ex mecho acano, indica nimirum radice. Exhibebis quoq; noctu coriandrum præpa-

*Curandi
ratio.*

præparatum uel anisum tostum, aut puluerem spartæ parellæ cum ouis sorbilibus, aut pilulas ex agarico, & spartæ parellæ decocto confectas. Verum si hæc (præsertim adhibitis crurum frictionibus, lauacris, & imperato modico exercitio) prodesse non videantur, confugiendum proculdubio est ad sudandi munera, quæ in hac affectione magni esse momenti creditur. Quod præsidium parabis decocto spartæ, aut radice china, vel serapium ex prædictis conficies, quod sanè non minoris momenti esse scio. Cæterum si ne hæc quidem sufficere constet, fontanellam altero brachiorum aperire proficuum, & summopere necessarium existet. His quidem factis mammas ijs medicamentis tractabis, quæ resoluendi, & modicè laxandi vires habent, quale creditur esse unguentum, ceratum vel cerotum ex oleo amygdalarum dulcium, de semine lini, liliorum, axungia gallinæ, & anseris cum modico diaquilone, loco cere: facto ungueto vel ceroto, put magis placuerit. Prodest, & emplastrum filij Zachariæ cum diaquilone, & pulueribus ireos. Itè si mamma nimio dolore, aut calore crucietur, ex usu est unguentum rosaceum cum modico plumbi usti, & cera alba: aut idè unguentum sepius in mortario plumbeo agitatum, uel oleum omphacinum cum pinguedine gallinæ, & oleo amygdalarum dulcium, quæ etiam in eodem mortario sepius agitentur, & proderunt magis, si ex eisdem ceratum cum modico diaquilone, uel cera confeceris. Cui etiam affectioni consimilem curationè adhibebis, si ex supprellis, aut improspere fluentibus mensibus mammas indurari comperias: præterquam quod vniuersalis prouidentia, non quidem in purgatione, sed in mensium prouocatione & sanguinis missione ex talo præmittenda est: cui quidem curationi innittendum erit ante particularem auxiliorum administrationem.

*De di-
nis mam-
marum
glādulis
ac de ex-
tū scro-
phulis.*

Inter eas mammarum affectiones, quæ cancrum simulant, aut minantur, una profecto est glandularum, quæ in mammis secundum naturam existunt, durities, aut noua glandulosi tumoris generatio siue dolens, siue dolore carens existat. Solet quidem non raro (quemadmodum amygdalis, & columellæ in ore euenire conspiciamus) in mammis quoque fluxio eius conditionis delabi, quæ sola citra inflammationem, durum tumorem concitare nata est. Quæ sanè affectus, si dolorem sibi comitem habeat, non pauci inter medicos tumorem esse cancrum minantem iudicant: verum, ut mea mens est, longè ab eius natura distedet. Quod equidem constabit, si quis consideret, hanc affectionem dupliciter posse mammis succrescere: vno quidem glandula ipsa glandulosa ac duriori facta: altero uero, dum in mamma glandulosus quidam tumor progignitur, qui ei generi tumorum incumbit, quod scrophulas obtinere scimus: quæ sanè multis rationibus scrophulam esse arbitramur: & ad scirrhosam naturam Gal. lib. de tumoribus præter naturam, & 13. metho. reduxit dicens. Scrophulas esse glandulas in schirrum conuersas. Quorum sanè tumorum vnumquemque; mammis euenire non raro conspiciamus: quippe aliquando glandulas indurari scimus: nonnunquam uero alias ipsis persimiles mammis propter naturam accrescere. Quamobrem considerandum est, glandulas duobus modis indurari, aut (ut rectius loquar) apparere induratas: vno quidem affluente humore pituitoso, & fluxili, quæ in eisdem glandulis turgorem creat sine dolore, vel fluxione admixto acri, & bilioso humore, quo cruciatus non leues in mammis, & vicinis partibus inferuntur: altero etenim cum ipsa mamma, haud secus, ac in alijs eius naturæ partibus scrophula gignitur. Inquit. n. Celsus. lib. 5. cap. de strumis. Nascuntur maxime strumæ

Ama in ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus, in mams quoq; feminaru se reperit, chirurgus Mages autor est. Quam sane huius viri opinio-
 ne verissimam in plerisq; feminis comperimus: in quarum mams strumofus tu-
 mor succrescit ex cocto pure, vel sanguine formi glandula adipifcente: qua
 est sententia Tagaultium tueri euidenter constat. Cuius proculdubio nature at-
 bitramur esse non paucos ex tumoribus, qui cum dolore feminaru mamas extor-
 quent, quos subinde medici existimant caneros esse, aut minari, cum meo, & mul-
 toru experimento constet, nullam aliam acquirere (nec diuturno adhuc tempore)
 conditione, sed eo statu pluribus annis persistere, non sine magna quorundam ad-
 miratione. Causas quidem habent hi glandulosi tumores longe diuersas, si-
 cut & natura diuersam sortiuntur (ut dictum est) per paulatinam congestionem al-
 ter: alter vero per defluxum. Quippe glandulas fieri turgentes contingit, vel men-
 struis deficientibus recurrentibusq; ad mamas, vel defluente tenui aliquo hu-
 more pituitoso solo, vel seroso sibi admixto. Ut his feminis accidere conspici-
 mus, quod cantu, vel quouis alio superioru partium exercitio nimis vtuntur, mensi-
 bus quidem fluentibus, aut imminetibus fluere. Ex quo iam constabit glandulosis
 mamarum partibus humore hunc susceptantibus dolore, & magnitudine acce-
 dere, ita ut glandulas, quas antea percipere erat difficile, iam vel leuissimo tactu co-
 periamus duras, vel dolentes, aut utroq; diu affectas. Strumam vero ex purulen-
 to, & sanguineo humore fieri refert Celsus, quam equidem causam feminarum
 mamas hoc malo perdere, maiori ex parte arbitror ob mensium defectum, &
 putredinem: licet strumas plerumq; ex crassis, & viscidis humoribus notissimum
 sit prodire, quod etiam in feminarum maminis accidere non raro comperimus.

Causa.

DFacile quidem noscimus hos tumores tactu, ceterum difficile distingui-
 mus vnus ab altero: nam uterq; duritie obtinet non leue, dolent ambo, sed magis phy-
 geton, quam scrophula. Habet tamen hoc peculiare excrescens glandula, quod aut phygeto-
 non sine ratione redaximus, quod non semper, sed affluente humore, doloribus, &
 cruciatibus exacerbetur, idque iuxta fluentis humoris naturam, & conditionem: sub-
 sident quidem, & sedantur dolores quouis presidio, aut sponte resolutio humore.
CPræterea glandula facile hinc inde mouetur, scrophula vero immobilis sciri
 instat existit sine dolore, & maiori duritie prædita, ita ut non immerito quod scirrhus
 dixerit. Verum a scirrhus peritus distinguet, quia indurata plerumq; dolet, scirrhus,
 aut scrophula minimè, aut per quod raro. Item glandula detumescit occlusimè quouis
 presidio adhibito, scrophula vero non, nisi diu presidia adhibueris. Tandem licet gla-
 dula indurata brachia quoque & clauiculam plerumq; dolendo attingat, neque ita
 molestus dolor est, neque persistens, ut reliquorum tumorum, qui cancerum minant, nisi
 iam glandula in scirrhum commigret, quod potius ex incuria medicorum, quam ex affectionis
 natura proficisci arbitror. Vltimo tamen scrophula vnus locum obsidet, vnâve duritie
 representat: glandula plerumq; in paruulos secatur tumores, seu extuberantias
 intra mamas diuagantes, quas vix vna ex parte comprehendere poteris, etiam
 si bis, aut ter mammam attingas, sed semper nouum obsidere locum representat.

Signa.

Huic affectioni curandi ratio existit duplex, altera quidem, quæ duritiem emol-
 liat: altera vero, quæ & cancerum inhibeat, & si quid eius factum est, augmentum
 præcaueat. Hæc autem vna est, & in glandulis induratis & in scrophulis: nam primo
 expendisse necessum erit ante omne opus, traxerit, ne principium durities ex impro-

Curatio
ratio.

I ba

ba viuēdi forte, an ex menstua purgatione perperā fluente. Quōd si primū, cū A
 viuendi legē institues, quæ ex toto sit præcedenti aduersa: verū cum plerūq;
 ex crassis, viscidis, ac pituitosis humoribus affectio originē sortiatur, victū por-
 riges extenuantē, siccum, & modicē calidum, fugereq; præcipies ægotantem à
 crassis, viscidis & coctū difficillimis alimentis, ac solū ipsi concedes arietū, vitu-
 lorum, auium montanarū ac domesticarum carnes cū passulis, & amygdalis tō-
 stis, ficubus, & alijs, quæ prædictis similia existāt. Potus sit ex aqua cinnamomi,
 unisi, vel (quod magis probo) ex radice chinæ, vel spartæ parellæ decoctus. Cē-
 nā verò, q̄ tenuem imperabis ex ouis, aut pyris assis, vel fructu aliquo saccharo
 condito. Exercitiū sit moderato maius ante cibū, & summo mane factum. Verū
 in medicinalibus præceptis hoc primū dignum obseruatione existimo, nimirū,
 frequentiores debere esse purgationes, minutas tñ, & facta prius per extenuan-
 tia, & inscindentia pharmaca præparatione. Quod sanè probè facies syrupis de
 risantijs, de radicibus, hydromelite, rhodomele, & similibus. Post modū verò
 eā purgationē institues, qua crassos humores educas, vel ut est ea, quæ ex agari-
 co parat, turpeto, cartamo, folijs senæ, pilulis ex hiera, mastichinis, elephāginis, B
 & alijs, q̄ consimiles habeant vires. Quōd si hæc prodesse nō videantur, ad artifi-
 ciales sudationes veniendū esse consiliū rei difficultas: quas sanè moliri oportet
 decocto radice chinæ, aut spartæ parellæ: ac probarē maximè in hac re serapiū
 aliquo ex prædictis decoctis confectū, eo mō, quē docuimus. lib. 1. de p̄fid. indica.
 His quidē factis, & ut par est, pro viribus ægotantis, & morbi indigētia repeti-
 tis, ad topica auxilia confugiendū est, qualia mox referam, si prius dixerō, quid
 agendū si menstuis deficiētibz, vel improbè fluentibus si eos huic malo p̄sta-
 re principiū constet. Quippe in hoc casu initiū curationis auspicandū arbitror
 à sanguinis detractione: si plenitudo adfuerit non leuis, ex brachiorū basilica,
 quindecim nimirū diebus, plus minusve paululū, ante menstuationis tēpus: si
 naliter, vel si iam mētes instauerint, vel nuper præterierint, diminutēq; proces-
 serint, ex talo. Quo facto pro plenitudinis copia ad mensū prouocationem pro-
 perandū est ijs, q̄ proprio ca. diximus. Interim tñ non est ab re bis terve in anno
 sanguinē ex brachio ē regione māmæ affectē minuere. Postmodū glandulis ex C
 acris, vel nimis tenui fluxione induratis inunctionē parabis ex oleo rosaceo, pin-
 guedine gallinæ, anatis, & butyro, ac modica cera alba. Itē ex vnguentō rosaceo,
 & cera, ex oleo rosaceo, ex oleo amygdalarū dulciū, sesamino, violarū, & axun-
 gia anatis sēpius in plūbeo mortario agitatīs: vel ex emplastro filij Zachariæ cū
 modico plūbi vsti sēpissimè loti. Quibus, cessante iam fluxione, ac si resoluendi
 mens fuerit, dolore oīno remisso, addes olei chamæmeli, vel liliorū quantū sat
 sit, vtritra nouā attractionē, aut caloris concitationē resolvas, id qđ emollitum
 vi emollientiū pharmacorū iam steterit, diu etenim in his persistes, aut telā con-
 facies his vnguentis imbutam, quæ fixius mammis adhæreat, donec vel dolorē
 cessasse, vel duritiem mitiorem esse comperias: nouatis ad tempus his præsidijs.
 Verū si duritiem in scrophulā, aut scirrhi effigiē migrasse cōperias, p̄missa
 vniuersali prouidentia, q̄ diximus, expurgatione paulò efficacioribus facta vte-
 ris: vcln fieri solet radice indica mechoacam appellata, & diaturbit à Rasio scri-
 pro lib. 9. ad Almanzorē cap. de colica, & alijs id genus. Et rursus facta cōf. dera-
 tione eorū excrementorum, q̄ ex malo viuendi genere prodeunt, necnon, & ex
 men-

A menstruis suppressis, aut improbe fluentibus, ea oīum habita prouidentia, quā superius diximus. Quo facto, ad topica peculiarius veniendū esse cōsultat rei natura, & cōditio, q̄ p̄dictis cedere nequit, nisi grauiora adhibeas. Quamobrē cognitis māmārū scrophulis, duplex erit curādi ratio (nā licet hoc tumorū genus in canerū ob humoris sortē non ita facillē degeneret, sed diu in eadē sp̄e perstet, cū hoc tñ haud leuē pr̄requirit in artifice diligentia) vna quidem, q̄ sensim, & paulatim emollientibus, & discussorijs auxilijs paulo efficacioribus tumorem dissipet: altera verò, q̄ radicis manus opera tumorē euellat. Primò hanc emolliōnē, & discussionē tentabis, donec ex toto durities euanescat: huius ministri sunt emplastrū nigrum Gal. adscriptū li. 6. phar. ge. qđ recipit olei vete is. 5. ii. viridi aris. 3. ii. picis. 5. j. siladani. 3. v. j. lythargiri. 5. ii. fiat emplastrū. Cui cōsimile efficies, si addideris diaquil. mī. puluerē radicis ireos, & his iunctis emplastrū confeceris. Valet & diaquilon Mesue. Sed pretiosius his oībus est oleū de bufone, aut vnguentum ex eodē oleo, pice, & plumbo vsto, vel lythargirio cōfectum: itē idem oleū cum diaqui. ad cerati formā redactū. Cōfert, & emplastrū melilotum cum modico ammoniaco, & oleo liliorum, ac puluere radicis ireos. Quod si ad maiore duritiē affectio pueniat, cōficiēs emplastrū ex radicib. altheę cōctis, & extractis per setā cum modico oleo ex bufone, pinguedine gallinæ, & anseris, & puluere plumbi vsti, ac radicis ireos: qđ profectò magnæ esse frugis arbitror, p̄sertim si nigritiē durities contraxerit: sic & alia adhibebis, q̄ paulò inferius recēlebo in scirrhi curatione. Sed nō est minoris momēti apud chemicos medicos, id quod recipit nucum cupressi paria quinque, sicuū paria tria, radicis arundinis. 5. l. coquant in oximelite, post salis cōmunis, cineris spongię, chalcitis ana 5. ii. iuri expresso addantur, mixtaq; in vnguēti formā redigātur.

Verū si eò scrophulæ duritiē peruenisse videas, q̄ pr̄terquā, q̄ emolliuōnē, aut suppuratiōnē non cōsequaris simul radices in venas, & arterias inferere videatur, aut (vt rectius loquar) ad maiore molē sese extendat, tunc sanē ad manus opera peruenire necellūm erit: in scilla nimirum mamma, prius scrophula vtrinq; digitis cōpressa, quā tñ acu perforabis, & filo per foramen traiecto, manuq; sinistra cōprehensio, hinc inde leniter à māmārum carne scalpello separabis, ita ut simul totā scrophulā cum pellicula extrahas: cauēs ne pelliculæ quicquā intus super sit, qđ tēporis tractu regenerationi scrophularum principium pr̄stet. Qua facta curatione vlcus per vniōnē simplicē curabis, facta nimirum futura, q̄ discillas partes vniat: quē sanē curationis modum nō parum profuisse constat. Verū si intus quicquā ex pellicula, vel scrophula ipsa remanere comperiamus, ulcusve nimis dilaceratum esse, curare oportet ijs, q̄ ipsum digerant, ac superfluum exedant, velut est vnguentum ægyptiacum cum puluerib. aluminis, & albumine oui superpositis, q̄ dolorem leniant. At dum varias inferere in māmā radices certum sit, aliter quidē ipsam scrophulam tractare oportebit, nimirum factis iuxta p̄dictis radices in circuitu scrophulæ paruis incisionibus scalpello, vel ignito ferramēto, ac immisse arsenico instar grani tritici minutissimi: hoc quidē in robustis fēminis, in alijs verò sat est Vigonis puluerē immittere, ac desuper vnguentum populeonis apponere, aut oxierati pannum: quod facies donec radices exesas esse comperias. Quo facto, secedet facillē struma, & vlcus (ut par est) suppurantibus donec ad abstergētia deueniendū sit, curabis. Po-

rest et struma curari affixo in medio eius candenti ferro, vel facta cum scalpello A
 scissura: in q̄ ex causticis medicamentis aliquid immittere par erit, donec tota e
 strumae caro exeat. Causticū huic vsui parat ex fermenti partibus, & vna arseni
 ei: ex quib. facta massa in furnello desiccabis, cuius instar nuclei pini modicum
 immittes. Abscindes et scrophulā si fili modicum sumptieris, & in aquā arsenici
 ter quaterve immergas, donec vim caustici sumptisse cōperias, quo sanē filo ra-
 dicē scrophulæ ligabis, singulisq; diebus cōprimes, donec arefacta radice præ-
 tabitudine, & alimēti defectu scrophula exarescat, & procidat, aut facilius ab-
 scindi possit. Quo facto reliquā curationē, vt vlcus ex postulauerit, ministrabis,
 cauēs ne iterū malū reueriatur purgationibus, & victu moderato, & superposi-
 to aliquo ex ijs emplastris, q̄ māmam roborēt, & si qd adhuc superest, discutiāt.

De mām-
 matum
 scirrho.

Seſe iam offert illud māmmarū vitium, quod cancro finitimum exiſtit, qui-
 nimo ipſius præludium eſſe plerunq; ſolet. Scirrhoſa quidem durities, non ra-
 rō in ſceminarum māmīs, ita pertinacis naturæ, & malitiæ excreſcit, vt vel diſ-
 ficulter emolliatur, vel facilē in cancerum migret. Quamobrem, & generationis
 modum, & naturam, & cauſas, ac ſigna ante curationem docere erit opus. B¹

Cauſa.

Generatur quippe in māmīs ſcirrhoſa durities vno ē tribus modis, quantum
 ex varijs Gal. locis colligere potui. Primò quidem, ex atri humoris affluxu, id ē
 aſſerente eodem Gal. lib. de tumor. præ. na. per hæc verba. Quatuor. n. hi ſunt, qui
 frequenter ſiunt affectus propter influxū humorum, eripelas, & edema, inflā-
 matioq; & ſcirrhus. Quam equidē generationis rationem ijs ſeminis accidiſſe
 cōperimus, quibus obſtructo ſplene, nequeuntq; ſanguinē à melancholiciæ spur-
 citia purgare, ipſum per vniuerſum corporis ambiū redundare cogit: in qua-
 rum māmās haud difficulter illius humoris non parua portio inſluit, quæ ſanē
 ſcirrhoſam duritiē tractu tēporis contrahens, hūmōi affectum progignit. Proſi-
 ciſcitur ſecundò eadē affectio ex vbertate melancholici, & craſſi ſanguinis, mē-
 ſtruis non fluentibus, ſed paulatim illuc non ſubito (vt in primo generationis
 mō dictum eſt) recurrentibus. Ex quo proculdubio in eiſdē venis, & carne con-
 denſato inæqualis in māmīs durities ſuccreſcit, prædicto humore ad māmās
 velut alimento eunte. Qua etenim ratione fit facilē, vt per diuerſas māmatarum
 partes diuerſi tumores duritiē non leni polleant. Vlūmò tamen ſcirrhoſa hæc
 affectio per paulatinam (vt Medici ferunt) congeſtionem plerunq; ſuccreſcit,
 humore nimirum melancholico in dies magis, ac magis congeſto, adheretſcen-
 teque, donec in immedicabilem duritiem, & magnitudinem ſuccreſcat: diſfert
 tamen hæc generationis ratio à ſecunda, quia in hac ſolū in māmatarum car-
 ne concreſcit, & induratur humor, in illa verò in venis, & carne. G

Verū quomodo ex his tribus modis fiat, fieri ēt tenetur vna ē duabus cauſis,
 exiccatione videlicet in humore à calore facta, aut concretionem ex frigido in-
 gruente. Quippe humores, quos ſemel in aliquo māmārū loco contineri cōtin-
 git, calor ita, reſoluta tenui eorū parte, incrallat induratq; , vt in ſcirrhoſam hæc
 duritiē migrare per quā facilē conſpicias. Quod proſectò, vel ex frigidityte pro-
 pria, vel externa, aut defectu proprii caloris adeò denſari contingit, & coerceri,
 vt in grauiffimā, & immedicabilem denſitatē prōptē migrāſſe cōſter: mō id ex pri-
 mæua generatione fiat: mō ex alio tumore perpetu curato, à refrigerata nimirū
 iuſto nimis inflammatione, vel vehementer, aut ante tēpus reſolutione perpeſſa.

Eſt

- A** Est igitur scirrhusa durities tumor durus doloris expers quē (licet variā sortiatur generationis rōnē) duplicis tñ differentie, & nature existere scimus: quippe alter exquisitus est, dolore carens, alter verò non exquisitus, leuē doloris speciē referens. Exquisitū cū censent auctores q̄ ex melancholico sit sanguine, aut crassa pituita nimilq; condensata. Eū verò, qui sensu leui gaudet, ex alterius humoris miscella fieri constat, aut ex assato sanguine, humoreq; atro, quē bilē atrā appellant. Ex quib. cōstare arbitror causam huic malo materiā pstantē, nullā aliā esse q̄ humorem melancholicū, sanguinēq; crassum, aut nimis crassam pituitē, ni affectio, vt dictū est, illegitima fuerit. Neq; obstat quominus hæc vera sint Gal. li. 5. simp. c. 9. scirrhu fieri ex bile atra dixisse: nā eo loco, & sepe alibi, arbitror, per verbum atrā bilē subintellexisse melancholiā, quemadmodū facili colliges ex eiusdem auctoris verbis, q̄ loquens de medicamentis huic affectioni pfectis, illi necessaria esse emollientia auxilia pfitet, q̄ sanē morbis ex atra bile ortis cōuenire minimē possunt. Sed habet pter has causas generales, oībusq; cōes femineū corpus vn̄ aliam peculiare, nimirum, mensū suppressionem, & improperam purgandi facultatem sanguinem rōnem. Quippe cum purgatio illa crasso, melancholicoq; sanguini expurgando idonea sit, si q̄ supprimit, aut vitari contingat, vitiatos in corpore superesse humores nulli fore dubiū arbitror: quos sanē in graue aliquod malū prorumpere certum est, p̄sertim circa eā partem, cū qua maiorem habet vterus cōiunctionem, & colligantia: quo fit, vt feminarum mammae subinde facili in hæc vitia prolabant: præterq̄ quod receptioni excrementorū ob laxitatem māmaram, substantia prona sit. Huius affectionis signa haud facili inuenies, ac licet inuenias non ob id vitūq; cancerū minati peipies, aut secus, quod in hac curatione maioris est momenti. Sed dignosces scirrhusam esse duritiem ex tumore sine dolore duro, ex inæquali corpulentia, ex colore fuscō aut subnigrosco: dum ex pituita p̄dit, ex subalbo colore; & corpulentia equa biliori, vt ex Gal. constare v̄ lib. de tumor. pter naturā, c. 10. & 14. meth. c. 9. Nō exquisitum verò eo dignosces q̄ dolore ad tactū præ se ferat, alioq; minimū, aut per q̄ paruum: quæ et rōne distinguetur ab imminente cancro, siquidem citra contractum dolet, & à quauis causa excandescit, exacerbatq; magis, quod scirrhus non exquisito cōuenire minimē p̄t. Præterea generationē habet nō exquisitus ab exquisito diuersam: nā plerūq; per defluxum fieri constat, aut per intempestiuum discutientiā pharmacorum vsum, vel ex aliqua causa externa, q̄ dolorem in mammis excitauit, cuius occasione in eādem aliquid induruit, vel ex corporis vbertate ibidem confluxit: præterq̄ quod ex aliis tumorum præter naturam generibus proficisci solet, velut ex erypelate, aut phlegmone.

Signa.

C Cum duplicē hæc affectionis cōditio terminum sortiatur, resolutionē, nimirum, emolliuione pmissa, vel canceri principium, in q̄ duo scirrhusa durities migrare plerūq; solet. Ob id quidē in hac curatione p̄sertim in māmīs, quæ ob p̄priā laxitatem plus recipiunt, & facilius indurant, grangi diligentia emolliuioni, & discussione innitendum est, ne ad cancerum cōmigret. Erit igit in indurata hac affectione curandi via duplex, altera, quæ mollitionem efficit & studeat: altera verò, quæ extrahere doceat id, quod in mammis durum superfit, ineptū alioqui emolliuioni, aut resolutioni: nam suppurari hæc mala nunq̄ cōtingit, vt optime Hip. docuisse constat li. 2. de mor. mu. per hæc verba. In mammis tubercula

Curanda
ratio.

I 3 fiunt

sunt dura partim maiora, partim minora, haec autē nō sunt suppurata, sed semp
 duriora. Quinimo si quis suppurationē tentare audeat, dubiū nō est, affectionē
 citius in cancerū, aut exulcerationē degeneraturā. Antē tñ, q̄ ad emollitionē ve
 nias, curandum proculdubio est, corpus ab excrementis, & crassis humorib. im
 mune reddere, uel mensib. euocatis, si forē defecerint, ablatis obstructionibus,
 corpore purgato, uel sanguine misso, aut ad inferas sedes euocato, iuxta corpo
 ris affectū indigentia q̄ppe nōnullis, p̄sunt euocata hemorrhoides, uel sanguis
 ab eis missus, aliis sectiones ex talo, uel ex sinistra saluatella. Sed qđ utilius esse
 arbitror, est ter, quaterve in anno corpus à melancholico succo purgare, qđ fa
 cies, his medicamentis, q̄ superius diximus melancholiā posse purgare, uelut est
 illud Mathioli, appellatū, elleboris mundi, uel aliud qđ hac lege cōficiet: exci
 pe ellebori nigri. ʒ. ij. rhabarbari. ʒ. iij. zingiberis, cinnamomi, gariophyllorum
 nucis muscatae, an. ʒ. smasticis croci, epithimi, an. ʒ. radice dulcis rase. ʒ. iij.
 macerent in musto, aut uino dulci ad cōsumptionē medietatis, & collature su
 me cū aqua lupulorū. ʒ. iij. Sed in uacuando his humorib. q̄ & difficiles sunt, &
 raro cōibus medicamentis cedunt, arbitror summo opere esse proficiū, p̄ internal
 la p̄bere stibij p̄parati, modicū, nimirū. g. 4. aut ʒ. nā id cenſeo esse, qđ in his hu
 morib. cōsuluerat Hip. uidelicet ea medicamenta esse adhibenda, quorū partū
 ingestū plurimū educat, ac licet primo accessu ualidum, & formidandū uideat
 medicamentum, usus tñ, & prudentia facile nōstrabunt proficuum fore. Verū
 si his uti formidaueris, aliud ex elleboro p̄parare poteris, qđ utilissimū fore arbi
 tror, recipit qđ corticū mirbalanorum oīum. ʒ. ʒ. polipodii. ʒ. i. foliorū sen.
 ʒ. iij. agrimoniae, florū uiolarum, boraginis, & buglossae, an. p. ʒ. bulliant simul
 oīa in feri lactis, li. iij. ad cōsumptionē medietatis, & in fine adde epithymi. ʒ. i.
 ellebori nigri ʒ. j. misceant, & colet: ac fiat apozema, cuius ʒ. ij. aut iij. porrigere
 poteris. Quibus exhibitis aliqd ex cordialib. pharmacis uesperē porrigere po
 teris quale est, electariū tria santhalorum de gēmis, cōfectio alcherimes, & alia
 ejus naturae: q̄ si mitiorib. purgantib. uti uelis, ea reperies facile li. 2. c. de uir. &
 uid. melancholia. Huic ē corpori eā uictus rōnem institues, q̄ crassis humorib.
 extenuandis, & conterendis idonea sit: sic & exercitium, & reliquum uitae stu
 dium pari pensu donec humores mitiores, & humectiores reddis. Postmodum
 uerō ad rectā emolliendi rōnem exequendā, considerabis, an tumor duritiē cō
 traxerit ex nimia humorum uiscidorum copia, qđ haud difficulter cognosces
 ex tactu: q̄ppe sic indurati tumores minus tactui resistunt, & quodāmodo cras
 sam duritiem prae se ferunt. In quo sanē affectu modicē calidis, sicciorib. inscin
 dentibusq; pharmacis p̄missis duritiem frenare opus est: huius naturae sunt, q̄
 ex aceto conficiuntur pharmaca, uelut & dematosis cōuenire dictum Gal. est, in
 xta ipsius decretum li. 8. de comp. phar. lo. c. 8. inquit. n. Quae uerō ob frigidos, &
 uiscosos humores in solidis corpōribus imbutos indurantur, ex necessitate fri
 gidam habent affectionem, quare & calfacientibus simulq; tenuium partū
 pharmacis opus habent: haec. n. sufficientia sunt, & ad uiscositatem humorū in
 duratis partib. infartorum extergendam, & ad secundā crassitiem, & discentien
 dos humores ita extenuatos. Cuius ē fuit sententiae li. 2. ad Glau. & 14. metho.
 c. 5. Verum ex recta medendi ratione (ut nos lib. nostro, de indic. c. de emollien
 tibus docuimus) constat induratis mammis, nec liberaliter, nec protinus acetū
 esse

A esse porrigendū, nisi dum inueterata admodū est durities, idq; aliorum medica-
 mentorū admixtione, ne vel māmā ocyllimē aceti viribus cōtabescant, vel scir-
 rhosus tumor preliis indurescat. Quamobrē principium curationis auspicari
 oportet ab inunctionibus, q̄ cōficiuntur ex pinguedinibus, & oleo sabino, vel
 oleo, in quo incoxeris radicē lilij, cucumeris amari, anethū, aut fenugrēcū. Pre-
 mittere ēt conuenit fomentū ex radicibus althē, maluarū, & ex fenugrēco, ad-
 diis. .i. radice cucumeris amari, ac folijs ēt maluarū. & branchē vrlinē cū se-
 mine lini. Quibus per dies aliquot factis deueniendū est ad pharmaca, q̄ acetiū
 recipiant, cū moderatione tñ, quale est, quod hac lege conficiunt. Excipe aceti
 mulsi, in quo percoxeris hyssopum, thymū, pulgē, anethū, radicē althē, & fe-
 nugrēcū. .i. pinguedinis anatis, anseris, & cerui, & ac olei ryciniani. .i. bul-
 liant sinu ad consumptionē aceti, & vtēre, partē bis die inungendo. Quid si ef-
 ficacius efficere velis, adde ammoniacū. .i. vel diaquilonis gummati q̄tū sit satis,
 vt fiat cerotū, si solidior forma magis placuerit. Præstat, & diaquilon mams, præ-
 fertim si in eius confectioe aceti modicū addideris, vel pinguedinis anatis, &
 vituli momētum cū oleo rycino, aut de radicibus lilij. Idē quoq; beneficiū præ-
 stat oxicrocē, sed longē præstantius arbitror vnguentū agrippa in cōmuni for-
 ma adhibitū, vel ad solidiorē redactū, cui admisceas aliquod ex pharmacis, quæ
 vel corporis tēperiem emulentur, vel tumoris peculiarē aliquā conditionē re-
 spiciant: ego quidē centēo maiori adhuc momenti esse, si diu in mortario plū-
 beo id agitaueris. Quibus cognitis, facile erit maiore pharmacorum copia iux-
 ta vsus varietatem effingere. Verum si duritiem tumor contraxerit, factū per
 intempestiuā resolutionē, siccitate in humoribus ibidē contentis indurata: cura-
 tionē proculdubio aliter institues, præsertim cū cōstiterit prædictā duritiē causā
 fuisse, aut Solē feruēdū, vel validū exercitiū, ardentissimā febrē, aut medi-
 camentū nimis calidū importunē parti adhibitū. Quippe humor oīs eo ad ter-
 ræ naturā propius accedit, quō magis aquosæ acereq; substantiæ fuerit expers.
 quib. facile priuatur vi calificantū, & exsiccanti cōsuetū. Quæ quidē rōne
 humida pharmaca his profutura esse mihi, & oib. est cōterum: primò, quia hu-
 midū separat, id quod viscidū ētā parte, cui adheret, & crassim mixtione atre-
 nat. Sic n. corp⁹ vniuersū alimētis copiosioris, & humidioris substantiæ refice-
 re humectareq; prius oportet, nullo exercitio, longiori somno, & oīa nī tran-
 quillitate imperius. Deinceps tñ duritiē emolles pinguib. & ijs, q̄ humidiora
 sunt, id linimentis maxime utendū est, eo præsertim, quod conficitur ex mucila-
 ginib. extractis, oleo amygdalarū dulciū, aut decocto seminis maluarū, vel cre-
 more seminis melonū, ac ultimò, decocto fenugræci, althē, & similiū: ex quib.
 addita pinguedine aliqua leno igne ad consumptionē decocti linimentū cōfi-
 cies, quo vtēris, si prius partē mucilaginis, & nuper dictis decoctis emolles-
 cis. Cōferet ēt vnguentū ex radicibus althē, costis, pistatis, & extractis, per setā
 cū modico vnguento rosaceo, vel resumptiuo confectum. Prodest & cerotū
 refrigerans. Galienū oleo amygdalarū dulcium: item oleum de seminib. me-
 lonis, & encorbiz cū pinguedine anatis, & modico vnguento rosaceo facto lini-
 mētē, vel ceratū cū modica cera alba. Eundē quoq; usum præstant mucaginē psy-
 lli, & oleis citoniorū, & fenugræci cū oleo rosaceo, omphacino, si diu in morta-
 rio plūbeo agitentur: aut ipsum rosaceū, & omphacinū cū eadē plūbi mixtione.

Quòd si per cōcretionem ex frigiditate partis, aut humoris, vel ex frigore cuius rei extrinsecus occurrantis, duritiem mammas contraxisse certum sit (ut plerunq; melancholicis, aut viscidis humoribus in eas partes fluentibus accrescentibusve contingere solet) longè aliter emolliationē instituere oportebit. Primum quidem victum institues moderatissimum, mediumq; inter omnem excessum: vitā nec sedētariā, nec nimis laboriosā, ac pari omnino pensu in cæteris rebus. Sed in animi passionibus omni arte curandum est, tranquillitatē, aut hilaritatē adseruare. Ad medicinalia igitur deuenientes, innitendum est bis, terre in anno corpus vacuum immuneq; ab excrementis & crasso sanguine reddere: mitētes sanguinem ex sinistra basilica, aut siluata lateris, vel si mēstua probè non processerint, ex talo. Quo facto pro habitu, & viribus fœminæ, coniectandum est, an hæmorrhoidum fluore fœmina perpeffa fuerit, vel ipsas dolētes, aut nimis tumidas habuerit, nunc verò suppressas habeat. Qua in re easdem iterum euocare necessum erit, vel hirudinibus affixis sanguinem ab eisde elicere. Sic etenim corporis cacochimiā per purgatiua pharmaca turius, ac facilius detrahes bis tertē (ut dictū est) in anno, corpore purgato cōfectione hæmec simplici, casia fistula, manna vel serapio ex infusionibus rosarū, aut violarū, vel prunis decocto senæ, & saccharo conditis, aut ipso senæ decocto cū saccharo, & passulis. Postea verò reliquias cōteres eisde decoctis, & prunis frequētius, & in minori dosi exhibitis, & tandē ijs, q̄ superius diximus humorē melancholicū purgare posse, maximè adhibitis g. 4. stibij præparati, qđ huic malo proficuum arbitror fore p̄sidiū. Verū circa partiulariū auxiliorū administrationē primò expendendū esse consulo ea, quæ congelatione induruerūt, vel ex propria humorū frigiditate cōcreuerūt, emolliationē possē n̄ scisci ijs medicamētis, q̄ verè emollientia dicuntur, qualia esse dixit Gal. lib. 5. simpl. c. 6. calidæ, & sicce naturæ exstantia: inquit. n. eodē loco. Oris autē induratorū affectio ex fluxione viscosa, & crassa paruis particulæ poris siue meatibus impacta, digesto verò p̄ halitū, qđ tenue est eius, ac subtilē: ac deinde qđ reliquū est, refrigerato, ac veluti congelato, scirrhusa sequit̄ dispositio, ac proinde frigidū pathos aiunt. Porro qm̄ cū frigiditate humor redundat sup̄fluus, idcirco et cōposita esse eius medelā oportet: ob refrigerationē. s. ex calfacientia poscētē affectu, ob alienā verò humiditatē, q̄ mediocriter siccant. Hinc etenim euenit, qđ q̄ congelata soluiunt, non tū calida sint, sed et sicca. Quamobrē nō solū in mamarū affectionibus, verūm & in multis alijs (ut latius lib. 2. de ind. diximus) mineralia pharmaca admiscere pinguis, & ijs, q̄ inter emollientia Gal. annumerat, proficuum esse semper duxi: ut calore, qđ cōcretū est, eliquaretur, & qđ calore liquatur, mineraliū siccitate ebiberetur consumereturq; Sic profectò plūbū serosam materiā exulcerationē minātem, conterit, & exsiccet. Cuius et naturæ creditur esse bdellium, stirax, galbanum, ammoniacū, & medulla omnis. Sed prodest primò accessu parti adhibere linimentū, qđ conficit̄ ex emplastro filij zachariæ, & pulueribus marchasitarū vel plumbi vsti, sicut idē emplastrū diu in mortario plūbeo traiectū, p̄sertim si gummosum aliquid addideris: confert, & idē emplastrū ad solidiorē formā reductū cum eisde pulueribus, & modico diaquilone. Erit et proficuum diaquilone maius cum plumbo vito, & marchasitis p̄paratis, ac pinguedine anatis. Itē ceroneum Nicolai vel diaquilone gummatū, aut illud, qđ conficit̄ ex bdellio, galba-

- A** galbano, styrace, ammoniaco, medulla cernina, vituli, ac adipib. anseris, & anatis cū modico oleo cōmuni. Conferūt in super reliqua oīa, q̄ glandulosis tumoribus, & scrophulis prodellē superius diximus, & multa quidē alia, q̄ ipse effigere poteris, si p̄ceptū Gal. 2. ad Glau. tenueris, quo loco scirrhosam duritiē curare docens, inquit. Nō igit̄ curād. e sunt partes indurate medicamento immodice siccati, sed cū eo, qd calorē habeat tepidū, humiditatē verō neq; multā, neq; oīno minimā: qd. n. superflūū humorē habet, nihil oīno dissoluit, qd verō minimū, plus q̄ oportet exsiccat. Verū si p̄dictis pharimacis duritiē emolliri nō cōtingat, ante quidē, q̄ in cācrū degeneret, proficiū erit cōsiliū, chirurgica operatione scirrhosam duritiē radicatus amputare. Quinimo (vt verū fatear) nullā aliā ex duris mammarū affectionibus audaciū licebit ferro extrahere, neq; tutius, q̄ scirrhosam, idq; non leuibus rōnibus. Prima quidē, q̄ nullū hēat more cācrorū sanguinē in venis prope duritiē cōgestū: cuius occasione nō rarō (ē si exatē thuat carne scirrhosam duritiē iterū (& maligniorē qdē) cōcrescere scimus. Secūda, q̄ a fluxū sanguinis plerūq; periclitari cōtingit laborātes cācrosis tumoribus scissis, vt aperitissimis verbis ex Aetio cōstat ser. 4. c. 44. dicente. Cancros in pectore obortos oīno deploratos esse scito, quemadmodū. & eos, qui in capite, collo, humeris, sub alis & inguinibus generāt̄ sunt. n. & hi inenrabiles: nā p̄ter q̄ p̄fectē tolli nō possunt, sanguinis eruptionis timor incūbit, vt ex ea arger inter manus pereat: qdē quidē in scirrhī abscessione cōtinget nunq̄. Tertia sanē rō est, quia cācrorū vlcera, ē si arte fiant, & probē curent, periclitant̄ frequenter ob vitū sanguinis vel cancri malignitatē, infamabilia fieri: & aliq̄ vniuersa māmā (adhuc cancro exēpto) cancrōsa efficitur, & maligna ex ulceratione perit. Quibus rōnibus adstri pulatur Aetij autoritas, qui ser. 4. c. 50. ex Leonidis decreto hāc refert verba. In alijs quidē corporis partibus prius ostendimus induratū tumorē sine dolore esse, at in māmīs nō ex affectionis natura, sed detracta papilla grauitate, dolore inducit. Si itaq; tota māmā indurata fuerit, atq; ita scirrhī tumor induratus thoraci annexus, vt citra periculū à sanis partibus amputari non possit, chirurgiā nequaq̄ attendimus: si verō summitas māmāe solū indurata fuerit, aut vltra dimidiū affectio nō occupauerit, summitas amputanda est citra inuersionē: neq; n. in scirrhī tumore indurato, velut in cancro sanguinis eruptio nē vereri oportet. Qua snia euideret cōstare arbitror, qd sit grauius, & periculo sius cancrū ex māmīs euellere, q̄ scirrhū, p̄sertim si in papillis nō sit, vt pauld̄ inferius docebo. Itaq; in scirrhosa mammatum duritiē primō innitendū est, ipsam medicamentis emollientibus lenire. Quod si id nō profuerit, considerādū tunc vltērius est, an tota māmā indurauerit, vel scirrhosus tumor thoraci annexus fuerit, ita vt sine periculo à sanis partibus separari nequeat: quo sanē tpe chirurgiā tētare nefas esse arbitrat̄ Aetius. Verū si summitas māmāe solū indurata fuerit, securissima erit duri abscessio, securior quidē, q̄ ea, q̄ in cancro fit, ē si in papilla steterit, vt c. 44. dixerat. Quippe subdit rōnē. c. 50. dicens. Si verō summitas māmāe solū indurata fuerit, aut vltra dimidiū affectio nō occupauerit, summitas amputanda est citra inuersionē, neq; n. in scirrhoso tumore indurato, velut cancro, sanguinis eruptionē vereri oportet, neq; vbiq; vltionē cōsulit, sed ea legē q̄ pauld̄ inferius scribā. Ex quo dogmate duplex insurgit, post scirrhī abscessionē, curādī ratio: vna porrō quam Aetius scribit eo loco dicens; Post amputationem

tionem verò linimenta indemus, & reliquam vlcerum curacionem adhibebimus: altera quidē, & q̄ non minoris mōimentū vīsa est (si citra sanguinis fluxum immodicum, aut paruum dilacerationē, chirurgia præcessit, aut nihil alienum intus relictū est) ea quidē erit, q̄ per primā à chirurgis appellatā intentionē fit: nimirū, per simplicē partiū cohaletū futura, aut ligatura factum. in ima tñ scissuræ parte (vt tutius res fiat) relicto foramine, per qd̄ si quid occultè reliquum est, vel cruentum, aut dilaceratum, in puris forma expiret. Quam sanè curandi rōnem: multi ex peritis chirurgis, reliquis omnibūs feliciorem, & tutiorem expēriuntur: q̄ si aliā via incedendū sit, ad Aetij curacionem confugiendum esse consilii vel fluxus sanguinis, vel carnis dilacerata suppuratio. Eæ māmārū dūrities, quas vulgus zaratanes, nūcupat, sese iam offerunt: ignotum sanè morbi genus, & qd̄ ex viri alicuius probi, & antiqui decreto non satis quale sit, cōstat, aut q̄ fortuari peculiare naturam. Ob id necessū mihi erit hac in parte, eius conditionem, & substantiam dōcere, signa ēt, causas, & veram medendi rōnē: ac primò qualis sit præcauendi ratio, & modus, ne in immedicabilem cancerū prolabatur, ac si forte inciderit, qualis ēt sit via (si non curacionis, saltem ne in mortem ocysimè degeneret) leniēdi, ac differendi id malum, ne miserè feminas torqueri permittamus: Vt igitur ex virorum doctissimorum vsu, & diuturna obseruatione colligere potui, prædictam mammarum dūritiem, quam nomine Hi spano, zaratan, appellamus, iph quidē nōcē canceri cōprehendunt, idq̄ non solū in seminārū māmīs, sed in quauis ēt alia corporis sit parte. Verū q̄ sit à rōne alienum, discēs faciliē, si exactè consideraueris eam curandi rōnem, q̄ autōres hi prædictis tumoribus adscribūt. Quippe emollientia pharmaca liberaliter admiscētis, q̄ cancro proficua sunt, cum ex oīum autorum decreto euidenter constet, exacerbari plurimūm cancerosos tumores emollientium adhēsū. Præterea, si exactè consideres cancerorum naturam, longè à prædictis tumoribus differēte cōperies, siquidem cancer tumor est durus, & inæqualis, licet rōtundus, venas habēs in circuitu turgidas, liuescēs colore, magis q̄ inflammationes nigricans, calidus, subito accrescens, ægros maximè fatigans, & perpetuo ferè dolo e affligens. At tumor, de quo nunc sermo hī nec maximum dolorem, nec punctionē, aut inflammationē, nec semper, sed ex aliqua occasione, aut imminentibus mensib. sorti ri comperimus, sed immunes ab his accidentibus per intervalla viuere feminas scimus. Item cancerum ēt si vras, aut feces, vel reuerti protinus vel in grauios malum mutari conspicias, vt ex Celsi decreto constat euidenter, qui hæc refert vtrba: Quidam exciderunt, quidam adūsērūt, neq; vlli nunq̄ medicina profuit, sed adustā protinus concitata sunt, & reuētiunt, excissa verò, post inductā cicatricē reuētiunt, & qm̄ mortis attulerūt. Sed prædicti māmīnarū tumores haud difficulter excidunt, nec redeūt amplius, si rectè cures, neq; mali quicq̄ subinde sequitur. Quibus rōnibus persuasus, censeo hos tumores, veros canceros nō esse, licet Gale. eos nōcē canceri cōprehendit. Inquit. n. secundo ad Gla. Reliquum est, vt de carcinosis tumoribus dīsceramus, qui in omnibus quidem partibus corporis fieri consueuerunt, sed in māmīs p̄sertim mulierū, q̄ à natura purgationē nō habent. Quod sanè dīscum iam intelligo, cancerosos tumores p̄p̄tius in māmīs succrescere, ob earum ad recipiendum p̄p̄titudinē, quā in reliquis partibus verū nō. subinde sequit, tumores, quos, zaratanes, appellam⁹, hac Gal. doctrina

com-

Deduris
mānu-
rum tu-
moribus
quos nul-
lus tu-
ratanes
appellat

A cōprehendī, siquidē multis rōnib. aut dictum est, à uero cancro differre constat, Neq; rursus noīe scirrhi eos cōprehendere æquum est, cū scirrhus tumor exquisitus oīno dolore careat, & q nō exquisitus est, leuē fortit. idq; solum in ea parte, qua tumor uiget, qd ea lege p̄d. alis tumorib. accidere nō apparet: si qdē actiorib. qnq; cruciatib. p̄ intervalla, & uicinijs et partes affligit, quibus constitit longē inter se differre. Erit igit, ne lōgius abes, hæc tumorum species media qdā durities inter scirrhu, & cancerum, uel ut rectius loquar, durities qdam siue scirrholā, siue alterius speciei, ex ips quā diximus mānis peculiariter posse accidere q in cancerum migrare tentat. Itaq; cum durities aliqua cancri naturantia adipiscit, anteq̄ ex toto in ipsum cōmigrat, hæc qdē uerē nomen fortit eorum tumorum, quos zaratanes appellamus, ita ut mediam cancerorum, & reliquorum, qui duri sunt, tumorum, naturā adipiscantur. Cuius doctrine gratiā expendisse oportet cancos fieri vno ē duob. modis: quoddam. n. incipiendo ex atro adustoq; humore, ex quo proculdubio fieri oēs huius sortis tumores Gale. facit. Quos equidē, quantumuis parui sint, scimus à principio dolorē, & nō leuia accidentia, ac pleraq; alia mala inferre quiniūmo aliqui veneni instar, intolerabilia. Quosdam et constat fieri non incipiendo quidē, sed p̄ transmutationem ex scirrho, aut quauis alia duritie in cancerum, præsertim si p̄exillens durities ex melancholiā non naturali proficiscat, vel aliquid humoris adusti accedat. De quorum sanē numero est scirrhus cancerosus nominatus, quē existimamus cōprehendī sub noīe, zaratā: sicut re uera reliquos oēs, licet non sint de genere scirrhi, dum cancerum minantur, aut in ipsum cōmigrant, hoc noīe cōprehendere licet. Huius porro tumoris meminisse Auic. constat per hæc uerba. Et qnq; canceratur sephytos, & propinquitas sephytos ad cancerum, & elongatio ab eo est secundum multitudinem inflammationis, & paucitatē eius, & apparentiā pulsationis in eo, & occultationem eius. Eiusdem quoq; sn̄ r. Rasiū fuisse constat, dam̄n. qui: Quotiescunq; cum apostemate schlyrotico inueniuntur accideria apostematis calidi, sicut dolor, pulsatio, inflammatio, & oīa alia signa eis attinētia tunc illud apostema de genere cancerorum est. Pari quoq; lege lo. m. de Vigo, vir in re chirurgica maximū pretij, eadem uerba refert dicens. Reperitur sephytos non purum, & cancerosum, cuius signa sunt dolor punitiuus, pulsatiuus, & inflammatus. Atq; licet ex his locis constet, hos viros de sola mutatione scirrhi in cancerum loqui, cum hoc tñ asserimus, tumores oēs duos, quibus in cancerum mutari contingit, tunc iure optimo noīe, zaratanes esse comprehendendos: ac tenemus quoq; differre à uero cancro, & scirrho, ac reliquis duris tumorib. Horum equidem tumorum iuxta hanc, q̄ diximus, descriptionem Hipp. primū oīum meminisse constat lib. 2. de mor. mul. per hæc uerba. Et in mammis tubercula sunt dura, partim maiora, partim minora, hæc autē nō sunt suppurata, sed semper duriora, dcinde ex ipsis nascuntur cancri occulti. Quum aut cancri futuri sunt, prius ora amarescunt, & si quis plura dederit, accipere sentiunt, & compescendo faciunt. In qua sententia, si quis attento animo mentem hoīs exp̄dat, reperiet proculdubio hos tumores, quos zaratanes appellamus, non fieri solū, ut multi autumant, ex scirro cancerum minante, sed plerunq; ex aliis duris mām. tuberculis proficisci, ut Hip. uerba mōstrare uidentur.

Habet hæc scitissima affectus natura causas non paucas, quarum qdā occasionem

sione huic malo pstant, quædā materiā suppeditant, alia verò ex ulcerationem A
meliunt. Cōstat igitur ex Hip. fortiori principium huius duritiæ, plerunq; ex im-
probo mensiū fluore, siue oīno supprimatur, siue diminutē (dummodo quod
tenue est, erumpat solū manente inuis, obstructionis causā, crassiore sanguine)
siue ordinatē profluat, qd humorum cum sanguine mixtorū hetero genecitatē
cōmonstrat. Quibus et caulis accedit praua, & pauca mensiū purgatio, vt lib. de
loc. aq. aer. Hip. refert, q̄ sterilitatē infert, ac subinde plerunq; sterilitas huic ma-
lo principium pstat: purgatur. n. in partu mulier, & in lactatione prauis, & melā-
cholicis recrementis, q̄ ob cōtinuā in pueris lactandis vacuationē, aut cōfertā,
& copiosam in partu aggregari minimē possunt. Ob id virginib; viduis, aut nu-
p̄tis, q̄ vel non peperunt, vel parere immaturē desierunt, plerunq; hæc māmā-
rum vitia accidisse cōperimus. Huic et causarum generi reduciū improba viuē-
di rō ex crasis, viscidis, aut quouis alio modo vitiatīs edulis facta, vel nimis se-
dētaria, aut curis, & vigiliis plurimum turbata, & plena. Quæ proculdubio oīa
vel crassos in corpore congerunt humores, vel probos plus iusto exsiccant, &
in assatos, ac subinde crassos cōmutant. Præstat itē huic affectiōni materiā solū B
ea melancholiæ species, quæ p adustionem fit. Verūm hac solā rōne à scirrhus, &
cancro differre cognoscimus, sub hoc genere causæ, q̄ scirrhus, si exquisitus sit,
nō ab hac, sed à naturali, aut crasso alio humore proficiū: cancer ab atra quidē
bile. At is tumor hoc habet peculiare & propriū, q̄ principium suæ generatio-
nis à crassis humorib; nascitur, siue melancholici, siue pituitosi sint: postea tñ
vel adusto illo, qui præexistebat humore, vel alio denuo in partem confluentē,
qui adustus sit exulcerationem sortitur. Hanc equidem generationis viam, &
materiam curaturus exactē expendat, alioqui profectō perdifficile erit, frugis
aliquid huic malo præstare. Præsertim ni exactē expenderit imminentem exul-
cerationem, quam paulò inferius nosse, monstrabo.

Signa.

Verūm noscendi hos tumores, ac distinguēdi eos ab aliis eiusdē sortis rō, &
modus haud obscurē constabit, si quis quæ ex Hip. Auic. & Rasio attulimus di-
ligenti aīo expendat. Inquit. n. Hip. loco paulò ante citato de his tumorib; verba
faciens. Cum autē cancri futuri sunt, prius ora amarescunt, & quidquid ederint
oīa amara esse vñt, & si quis plura dederit, cōpescenda faciunt, & accipere re-
nuunt. Mente verò pcellunt, & oculi duri fiunt, & nō acutē vident, & ex māmīs C
dolores ad iugulum transiliunt, & sub scapulas, & sitis tenet, & māmæ graciles,
& ipsæ p totum corpus attenuatæ sunt, & nares obstructæ sunt, & non leuātur.
Quibus proculdubio verbis cōplexus est pleraq; ex signis, q̄ frequenter in fœ-
minis sic affectis conspiciunt. Quæ sanè magis elucescent, si in mediū adduxe-
ro, q̄ Auic. profert verba, inquit. n. Et propinquitā sēpheros ad cancrum, & elō-
gatio ab eo est secundum multitudinem inflātionis, & paucitatem eius, & ap-
parentiā pulsationis in eo, & occultationem eius. Sed clarius id quoq; mōstrat
Rasius dicens. Quotiescunq; cū apostemate schlyrotico accidētia inueniuntur
apostematis calidi, sicut dolor, pulsatio, inflātio, & oīa alia signa eis attinen-
tia. Verū pter hæc oīa nosse et oportet, tumorem quēmus durū eo tpe in cācrū
migrare, cū dolores acuti p interualla, vel minima occasione repetunt, q̄ equidē
ad brachia, humeros, & costas non rarò extenditur, præsertim si prædictæ par-
tes moueantur. Quibus etiam accedit, si tumor in conspicuo sit, ipsius magni-
tudo,

A tundo, q̄ cancro incipiente maior existit, color cineritius, ac subobscurus, & tandem durities: venæ et ipsi in circuitu adnascuntur liuescentes & tumidae, vari-
cū instar. Quæ omnia si ad extimam partem vergat tumor, facile percipies: finali-
ter, ea quæ rete frustra est, q̄ nimia carnis molles, & loco abdito delitescant, oc-
cultenturq̄, quo tpe ex dolore, & doloris modo sat est exquirere. Quippe ex-
pectandum non est, oīa signa simul in quoniam tumore reperiri posse: oīa. n. qui
perfectus iam est & consumatus habere tenetur: incipientibus verò sat est quæ-
dam adesse: ad ultioribus alia: & omnia deniq̄ in perfectis. Qui hos tumores cu-
raturus est, p̄dicta causarum genera tria diligētī animo expendere prius curet. Cur. 3. 16
7. 410.
Primum quidē omni arte studeat, eam in mensium purgatione moderationem
ponere, q̄ nec parca, neq̄ ita quouis alio vitio defecta sit, q̄ in p̄dictū huius
mali apparatus degeneret nunq̄. Secundū talem victus conditionē eligat, q̄
omnino p̄dicto humori contraria existat: aut rursus, talē purgandi formā, ta-
lia et pharmaca, q̄ illum humorē, & non aliū, purgando eligat. Tertiū verò,
& vltimum omni diligentia caueat, quo minū acce aliquid, ac mordax in cor-
pore subsit: ac si fuerit, quominus in eam partē aliqua occasione confluat. Quo
sanē facto, ad effectus curationem tutius deinceps venire eniuis conceditur. Cu-
randum quidē primò est, menses suppressos vel diminutos euocare, aut quæ-
uis alia vteri purgamenta, si quæ fuisse suppressa, ea sanē arte q̄ sepius p̄cedē-
ribus c. docuimus: p̄sertim si obstructio aliqua insignis in viscere aliquo, aut
vtero ipsi p̄stiterit, eam deinoliri primitus curabis, chalybe preparato exhibi-
to, vel quouis alio modo. At si id commodē fieri non detur, vel firmina steri-
lis quoquo modo fuerit, fontanellam altero crurum adaperies, qua quod in
corpore crassum, defectu naturæ purgationis, superest, facile expurgari possit.
Deinceps tñ mediocrē in omni q̄titate, & qualitas excessu victum imperabis,
qui potius ad humidiorē non nihil accedere tenetur, cauens omni studio exer-
citiū excessum, sed in eo, & cō reliquis moderationē imperans: p̄sertim abstine-
ntiam ceterū alimentorum, q̄ crassos viscidos, vel nimis tenues, & acres humores
adaugere nata sint. Quos si in corpore redundare cōpereris (nō subita purgatio-
ne, q̄ nimīū humores exarat) protinus p̄ epicrasim purgabis ips, q̄ superioribus
c. hos humores purgare posse diximus: velut est serum lactis cū rhubarbaro, cō-
fectio hamec siue f. amonco, & colocintide, decoctū senæ aqua lupulorū vel p̄-
dicto sero factū, aut prunæ damascenæ eodē decocto, & saccharo conditæ, vel
sirupus ex his cōfectus, addita in ligatura i. j. lapidis lazuli p̄parati pro libra
ipsius syrupi, aut portioes g. iiii. p̄parati sibi. Quibus frequenter vti poteris sal-
tem bis, aut semel in mense hiberno, ac p̄cauere vel mali augmentum, vel mali
gnam exulcerationem. Quod si à sanguinis missione curationem auspiciari velis
ex vso facies, p̄sertim ex brachio nisi mensium gratia ex talo id efficere placue-
rit. Erigatur (ad tumoris curationē deueniendo) duplex medēdi via & rō: vna,
q̄ duritiē emollire doceat: altera verò, q̄ ipsam manū extrahere. Illa quidē, indi-
cationes sumpta à materia, & cōditione huius tumoris, q̄ peculiarē sibi p̄quiri
diligētū, longē diuersam à tumorib. quorū subinde naturā sortit, scirrho nimi-
rū, cancro, tuberculove, aut quouis alio ex p̄dictis. Quippe scirrhosa substantia e-
mollitionē ex opat malacticis medicamētis factā: ac ceteri natura oīno hæc eadē
renuit: quoniam ex accipari eisdē Gal. apertē docet. Sed medicamētis à principio

rcm

reages, lōgē diuersis ab ijs, q̄ in augmento p̄ficua esse docebo. Verū in genere **A**
 oīa huic ōperi pharmaca mixta debēt esse naturē ex malacticis, & siccis, ac alijs
 ēt, q̄ mōstrabo, cancris fore necessaria. Sic dū māmārum tumor citra manifestā
 cām dolere incipit (habita prius corporis p̄udentia) rosacco vtendum est, vel
 omphacino oleo, aut rosaceo omphacino, quib. aliqui ex vsu erit, dum timoris
 iāiā aliqd emicat, nonnihil succi plantaginīs, vel solatri addere. Qui ēt succi, si
 feruoris aliqd in tumore insit, in mortario plūbeo agitati plurimū p̄bant. Ean-
 dē quoq; intētionē cōplet ceratū ex eisdē sic agitis, & oleo omphacino, ad suc-
 corū cōsumptionē seruēfacto cū modica cera, & anatis pinguedine: p̄stat & idē
 beneficiū vnguentū ex tutia cōiter factū. Sed mirabili quadā efficacia credit̄ rē
 pellere, & acré calorē cōpescere lamina plūbea crebris foraminib. excavata, q̄
 Gal. 9. simp. summopere cōmendatā esse legimus. Refert idē autor ex Apol. li. j.
 de cōpo. phar. lo. hisce tumorib. incredibili quadā cōmoditate p̄desse vngētū
 qđ recipiat olei rosacei omphacini. ʒ. vii. agitent in mortario plūbeo, & pistillo
 plumbeo ad spissitudinē, & mutationē coloris, pulueris cerusæ, & lythargirii,
 m. li. j. q̄bus in eodē mortario mixtis, vtilissimum fit linimētū. Verum dum miti **B**
 gare dolorē tm̄ in aīo est, ex solo p̄dicto oleo cum pinguedine anatis, aut citra
 ipsam, mirabile fit p̄sidiū. At si id quoq; opus efficere piacuerit, & cū hoc modi-
 cū resoluerē, fomētis vti est opus ex decocto foliorū fragini cōfectis, quē ēt vsū
 ferunt p̄stare solia eadē aqua decocta, & pistata, ac sup̄ dolentē māmā calētia
 imposita. Verum si dolor vltra p̄gat, p̄sentaneū fit remediū, hoc vti linimēto, qđ
 recipit olei rosacei. ʒ. iij. seminais papaueris albi. ʒ. j. opii. ʒ. j. gummi arabici ʒ. iij.
 ceræ q̄tum sufficiet, vt fiat linimētum. Fiunt et̄ vnguenta, aut linimēta nō parū
 momēti ex mucilagīnib. seminis citoniorum, & psyllis, extractis succo tolani,
 aut plātaginis cum cerusā, & tutia, vel modico lythargirio, p̄sertim si in morta-
 rio plūbeo diu agitaueris: sic & sola ipsa mucilago ibidē ad mutationē coloris
 agitata, nō minoris est momenti. Caterum cum in animo est, exulcerationē im-
 pedire eisdē prorsus remedijs vtemur, q̄ & mordacium, calidiorum, & acrium
 succorū defluxū auertant, vel eorum acrimoniū retūdāt. At dum studemus, qđ
 in parte induratum est, emollire, & resoluerē, inter pleraq; alia, q̄ passim repe-
 riunt, singularis efficacīa est hyssopum cerotum descriptione Filagrii, p̄sertim **C**
 si diachilonis minoris momētū ei addideris: itē diachilon gummatum cū pin-
 guedine anatis, & anseris. Eiusdē ēt vtilitatis esse d̄r emplastrū filii Zachariæ cū
 puluerib. plumbi vsti & loti, aut marchasitarum, vel lythargirii. Confert itē &
 cerotum ex pinguedine anatis, & anseris cum puluerib. plumbi vsti, ac modica
 cera. Præstat & aliud, qđ recipit olei rosarum, & chamemali, an. ʒ. j. pinguedinis
 porcinae. ʒ. f. pinguedinis gallinae, anatis, & caponis, an. ʒ. ij. ceræ quantum sit sa-
 tis, vt fiat spadrupum. Vsu ēt probatum habeo aliud, qđ recipit olei rosati. ʒ. iij.
 cerusæ. ʒ. f. plumbi vsti, tutiæ p̄paratæ, & lythargirii subtiliter in puluerē reda-
 cti, an. ʒ. j. sepi caprini, pinguedinis gallinae, anatis, & caponis, an. ʒ. f. ceræ quan-
 tum sit satis, vt fiat ad forma vnguenti albi. Observatione quoq; prodesse aliud
 cōperimus, qđ recipit emplastrū diachilonis Rasis. ʒ. j. pulueris marchasitarū p̄-
 paratarū, & plumbi vsti, an. ʒ. j. malaxentur simul, & extendant sup̄ pannū seri-
 cū. Aliud quoq; p̄batum reperio, qđ recipit olei amygdalarū dulciū. ʒ. j. f. pin-
 guedinis gallinae, & caponū, ana ʒ. ij. pinguedinis porci. ʒ. f. plumbi vsti. ʒ. iij.
 ceræ

A cere quā sit satis, ut fiat ad modum tele ceratæ. Quibus proculdubio, & alijs, quæ sumpta ab his indicatione facile effingere poteris, dolorē mitigabis, fluxum reprimēs, duritiem emolles, & tandem qd liquatum, emollitumq; fuerit, resoluēs, p̄ter q̄ omnia, oleum vel vnguentum ex bufone adhibere poteris, vel ut Fallopius aduertit oleū ēt ex viperis, quod ego in his q̄ dolore ex venenositate materiæ cruciantur, proficuum esse arbitror. Sicut in his q̄ dolore vexantur emplastrum ex vnguento tutiæ, & emplastro filij Zachariæ equis numeris confectū. Quod si & his omnibus affectum subsidere, & minui non comperias, coniectandum proculdubio est, ac verendum, ne in verum cancerum, aut malignam exulcerationem cōmigret: ob id quidē anteq̄ ad chirurgi manus deveniendum sit, iterum tentare oportet ipsam duritiē conterere ijs, q̄ id efficere nata sint. Sic dū ex humore crasso, & viscido prodit affectio, ferunt, succum nasturtij, coriandri, & intibi cum aceto, & lentibus decorticatis, super positum parti affectæ plurimum prodesse item gallitricum comestum: centum grana herba: tormentilla trita, & super imposita, vel agrimonia cum nuce vetusta, & ranci da pistata. Confecti, & ranarum pinguedo, q̄ maximi esse in hac re pretij multi, & non contemnendi auctores scribunt. Itē, & vnguentū ranarū, qd mirabilis esse efficacix creditur, & hac lege conficitur. Excipe viginti ranas, quas extinctas, aut viuas butyro recentū, aut pinguedine anatis inuolues quā sit satis, easq; sic in ollam vitream multis foraminibus in fundo excavatā proicies, q̄ sanē in alterā capaciore immittes, & per partē eius supernā ignē, factō prius ex luto cooperimento appones, donec butyrū, & ranas satis superq; in mai⁹ vas eliquari cōperias. Postea verō separata pinguedine ranas cōbuti permittes, donec in puluerē cōmutari facile possint. Quo facto ex ranarū butyro solo vel cū cera, vel in mortario plūbeo agitato, linimentū mirabile parabis ac expuluerib. simul, & ex cācorū, & limaciarū pulueribus cū p̄dicta pinguedine vel alia ei simili, vnguentū nō minoris momēti cōficiēs. Vtū quoq; est emplastrū de carnibus ranarū, sed de limaciarū carnibus p̄cipuū esse arbitror, ut Gal. de fer. li. 1. 1. simp. aperte monstrat: iterū huic vsui p̄iosius est plūdiū, qd ex limaciarū carnibus, & testis simul paratur, pdest, & p̄dicta caro cū lixiuio pistata, & parti durā affixa. Sed cū dolor nimis vrget, confert summi opere fomentum, qd recipit succi plāragibis, lanceolar, vermicularis, consolidæ maioris, & radicis ireos. ʒ. iij. onorū albumina duo, olei rosarū, & aquæ rosarū. an. ʒ. j. aceti albi. ʒ. j. calefiāt, & pannum eisdē imbutū parti appone. Sed reperiunt instillationes duæ, quas huic vsui maximē esse p̄ficuas arbitror: prima quidē recipit terebinthinæ, p. ij. masticis, sarcocolle. an. ʒ. j. & siliq; aloes, ireos, carpobalsami. an. ʒ. iij. incidat lignum aloes in frustra minuta, & ireo radix, & carpobalsamum terant: deinde in mortario plumbeo, & plūbeo pistillo vehementer ducant, postmodum in alembico igni lento apponant, donec subliment, ac si alēbicum fuerit plumbeum, proderit magis, tandē q̄ instillauerit, in plūbeo vase resōde: cuius deinde excipe partes duas, & parti vni optimi balsami admisce, ac addito oleo de vitellis onorū, partē imunge. P̄terea secundā instillationē efficere poteris, si p̄dictis rebus addideris ranarū, & limaciarum carnes, & tria gallinarum oua cum testis cōquassata, q̄ oīa instillari permittes quā sit satis: p̄stat emplastrū ex eicribus coctis aqua pluviali, & cinere. Verum si ne hæc quidē prodesse videant, sed eō durities perueniat, q̄ im-

medica-

medicabilis existat: tunc quidem coniectandum est, an scissionē admittat. Quip
 pe Aetius Ser. 4. c. 44. eos cācros scissioni esse idoneos arbitratur, qui in summi-
 tate mammarū consistunt: nā reliquos, qui aut mediā mammam occupant, vel
 prope costas degunt, chirurgi manibus non licet euelleret: inquit. n. Cācros in
 pectore obortos omnino deploratos esse scito, quemadmodū & eos, qui in ca-
 pite, collo, humeris, sub alis & inguinibus generantur, sunt. n. & ij incurabiles.
 Nam prāter id qđ perfectē tolli nō possunt, sanguinis eruptionis timor existit,
 ne ex ea eger inter manus percat: eos verō, qui papillā summitatē occupant, af-
 fectā partis amputatione facillē curabis. Itaq; constat eos tumores scalpello esse
 solum extrahendos, huius viri decreto, qui in partis affectā summitate, & exte-
 ma regione consistunt, vel eos qui adeo induruerunt, vt extractioni solum ce-
 dant: vel eos qui iā principium exulcerationis contraxerunt: hi. n. nulla alia via
 tutius q̄ scalpello curantur, licet costis adhāreant. Nā quō diutius ibidē immo-
 rantur, eo citius fāminā perdunt. Exulcerari. n. vno ē duobus modis hos tumo-
 res posse, arbitramur, & experimento cōperimus: altero extrinsecus accedenti-
 bus tenuibus, acribus, ac serosis humiditatib⁹: altero verō cū itra tumores alios
 & in medio ipsorū cōgerit ixorosum saniosumve pus, aut ixor vel aquositas qđ
 dā acris, erodens, cerulea, viridis, fusca ut q̄ exulcerationis futurae sunt pludiū,
 vt monstrat dolorum immanitas, aliquñ pulsus citra venarū externarū turgētā.
 In extractione verō summopere curandum est eos radicitus euellere, quippe si
 ex toto non abscideris, nil aliud facies q̄ ex non vlcerato cancro, vlceratum effi-
 cere. Qua profectō rōne consulit Rasi⁹. i. 3. cōti. liberalius vlceratos cācros ma-
 nibus, & chirurgia euellere, dum radicitus id efficere studeamus: finaliter, ten-
 tādum id minime est, & minus adhuc in nō vlceratis, ne vlceratos facias. Quā-
 obrē cautē id opus tentare oportet paruo nimirū existente cancro, & cōspicuo
 & corpore ēt vīctū, & medicamentis satīs munito. p̄munito. Constat tñ ex Gal-
 quenens ad operationis modū attinet li. i. 4. meth. duritiē manibus esse com-
 prehendum, per partē eius posticā, vt extra ad papillā promineat: tunc māmam
 scalpello scindere longitudinaliter oportet, & vtraq; parte carnē à duritiē sepa-
 rare. Quo factō vel instrumento aliquo vel filo acu per duritiē traiecto, ipsam
 cōprehendes, vt facillē à partibus māmā scalpello duritiē separare possis. Ac ne
 interim dū id opus fit, sanguinis fluxus infestet, nō erit ab re māmā ligatūra pro-
 pe radicē eius cōprimere: duritiē verō extracta exprimens parum partes sunt
 sanguisq; crassus extrahendus, ne iterū fomētū nouo affectui p̄stet ibidē manēs.
 Postea velut vlcus simplex scissionē curabis, vt ipsū permittere visum fuerit: sed
 arbitror per simplicē vnionē curari rarō posse. Prāterea, has partes vrere, licet
 aliquibus vtile, & necessārio visum fuerit, mihi tñ arrisit nunq̄, nisi sanguinis
 fluxione nimis vrgente: causticis tñ pharmacis primō esse vtendū cōsulit rei rō,
 ac vltimo (si prodesse nō videant) ad ignitum ferramentum veniendū est. Maxi-
 me quidē vstione opus habemus, vbi vel pelliculē, vel folliculū, aut tumoris ali-
 quid post abscissionē in vlcere remansit: uel si quid ex māmā virulēta corruptio-
 ne cōputruit. Nā aliter māmā vrere, timore & periculo plenū est, vt Gal. vī. 2. ad
 Glau. c. de cācro. Qđ si feceris, aureo instrumento ad glādis, aut dactili formā ef-
 formato, facies, vsta solū q̄ sup̄fuit parte, sanis manētib. illesis. Iuxta māmā at, &
 regione eius in parte appones, phibēdā fluxionis grā, frigidorū, & astringen-
 tium

A tium pharmacorum aliquod, uelut est succus polygoni, equiseti, semperuine cum modico terra lemnia. Quod si adhuc aliquid supererit, caustico medicamento satius est paulatim conterere, quam copioso igne viscera urere. Postea uero ea uite ratio instituenda, quæ ulteriorem illius humoris, uel tumoris generationem, aut grauioris mali, omnino impediat. Reliqua uero huic curationi profutura ex Actio colliges, qui latius huic instituto innititur, ac cōsulit quid agere oporteat mamma iam aperta, & duritie ab eadem abscissa.

Qualis nam sit cancerorum natura, constare iam euidenter arbitror, si quæ nuper dicta sunt, exactè expendens. Quibus, ut clarior euadat doctrina, addes, *De ulceris & ulceratis mamma tumore* canceri nomine non esse intelligendum, quod Celsus astruit lib. 7. nimirum, partis corruptionem, sed intelligendum solum esse, quod ipse lib. 5. c. 28. carcinoma appellat, etiam si carcinoma, & cancer de utero quoque dici possint. Cuius sane ulceris, aut canceri tres adinuenit Celsus species, viam quæ cacoethicum comprehendit ulcus cum duritie, & tumore; alteram sine ulcere; & tertiam, quæ thymium appellat. Est igitur cancer tumor tactui retinens, inæqualis, instar feræ feræ, penitissimè pertinaciter insertus, radices longè lateq; extendens, & uenis circumfusus, uelut alligatus, quas circum circa uaricosas habet, colore cineritius, ad rubrum uergens, & aliquò sublimidus, & uidentibus quidem mollis apparet, tangentibus autem durissimus est, ac dolorem inducit pungentem, quod late se extendit, ut sæpe per consensum glandularum malignas inflammationes sub alis exciet, dolore extenso per scapulas ad clauiculam. Quæ procul dubio diffinitione euidenter constant signa omnia, quibus faciliè ueniamur huius mali naturam; ob id quidem breuitati studens hæc ad cognitionem sat esse arbitror, si quis intelligat, canceri iam confirmati ea esse propria, non quidè incipientis, ut paulò ante decimus. Est tñ huius mali duplex conditio: quippe ex canceris quidam sunt ulcerati, quidam uero non ulcerati, in qua sanè re, qua potero breuitate exponā utrū horum appellet Hipp. cancerum occultū, ut euidenter constet, an curare occultos caneros liceat: dixerim reconditos, aut externos ulceratos, & an possibile sit, hos, radicitus extirpare, ac licet possibile id sit, an liceat, & ultimò qua medendi ratione utrosque tractare oporteat.

C De cancerorum materia non satis constat apud autores: quippe Gal. lib. de tumoribus prat. nat. & 2. de sa. natu. & 2. ad Glau. ex non feruida atra bile generari, uidetur fateri, cum alijs in locis constet, ex adustis humoribus progigni. Sed ne longius abeam, autorem ipsum intelligo de eo humore loqui, qui adhuc feruens non existit, hoc est, qui actu non sit in fero, fieri tamen ex humore, qui iam ferbuit, qui si iterum ferbuerit, in exulcerationem duritiem deducit. Atqui cum ex adusto fiat humore, sit sanè, ut tam leua inducere possit accidens: uidelicet aliquò ex melancholico humore fieri Gal. fateatur, quod intelligendum arbitror, si calorem, & uisionem nactus sit, & non ante. De canceri occulti natura uaria autores proferre comperio: nam ex antiquioribus non pauci, ut Actius sentit, ulceratos, occultos appellant, quos Hipp. refert, minus esse non curare: cuius procul dubio sententiam multi ex autoribus probarunt, asserentes ulceratos non esse curandos: quamobrem constat, ulceratos Hipp. intellexisse, dum refert, curandos non esse occultos. Alii quidem per occultos intelligunt eos, qui abditas corporis sedes inhabitant, & eos etiam, qui extimas, ubi ulcerati sunt:

K qui


qui auctores arbitrantur quoq; ulceratos radicitus posse euelli. Mihi autem ar-
 risit magis sententia eorum, qui tenent, per occultos, Hip. intellexisse ulceratos, A
 ubicunque sint, & non ulceratos, si in recondita corporis sede immorentur: il-
 lud quidem, quoniam ea operatio, quæ ulceratos exagitat, multū excruciat, &
 debilitat ægrotantem, nec finit morbum, cuius origo iecur est: hoc uerò pro-
 pter loci commoditatem ineptam operationi manuum, & fluxum sanguinis,
 quem compescere in abditis corporis sedibus perdifficile est. Cum hoc tamen,
 ut omni dubio respondeam, mihi alienum è ratione semper uisum fuit, chirur-
 ga operatione carcinoma quoduis extrahere: tum quia, etiam si ex toto erradi-
 ces, non subinde corpus sanabis: reuertitur enim nō multò post, ut ex Celsi de-
 creto diximus: tum uerò, quia periculum est, aut corpus deinceps in grauius ali-
 quod malum prorumpere, aut in affecta parte ulcus cacoethe, & insanabile su-
 peresse. Quamobrem censeo, id opus maxima cum cautione aggrediendū esse
 Gal. 14. metho. dixisse: inquit enim. Caterum si quando carcinoma per chirur-
 giam curare audebis (quasi opus graue, & periculo plenum) cõpisse quidē ab
 euacuando per purgationem melancholico humore oportebit: ubi uerò totū, B
 quod uiciatū est, prorsus excideris, sicut nulla supersit radix, sines effluere san-
 guinem, nec properè eum inhihebis, immo premēdo potius, quæ circum sunt
 uenas, exprimes ex his crassiorem sanguinem. Quamobrem semper suspecta
 mihi fuit huiusmodi curatio, nisi uel incipiens fuerit durus tumor, & alijs au-
 xilijs non cesserit, uel ex alio tumore prodeat: nam cancerum, qui à principio ta-
 lis fit, curare radicitus perdifficile tibi erit. Quod si forte per mammam aliquid
 effluerit, ne curare tentes, sed sine, utius id quidem est, ut Hip. refert li. 5. pop-
 in historia mulieris, quæ in abderis, circa pectus carcinoma habebat.

At in his curandi ratio consimilis est nuper dictæ curationi, præterq̃ q̃ nulla
 admittit malactica medicamenta, sed gaudet in principio repellentibus, ac di-
 scussorijs: uerum non his, quæ astringentia sint, sed quæ frigida tantum naturæ
 existant: ut humoris acrimoniā simul repellendo retundant, & maiorem flu-
 xionem inhiheant, ac si quid fluxum est, discutiant. Caterum quia Actius ulce-
 ratorum, & nō ulceratorum copiosè curationem scribit, & nos paulò superius C
 utilissima adduximus pharmaca: ob id quidem pauca referam, & primò quæ ul-
 cerationem quodammodo impedire nata esse existimo. Ferunt proculdubio
 huic usui non parum prodesse, desuper in carnosā duritiē apponere pimpinel-
 lam, arnoglossam, & agrimoniam simul contritas: eundem præstat usum puluis
 capitis gruis exsiccati, uel mustelæ combustæ. Sed præcautioni, & curationi si-
 mul prodesse certum est succum semperuiuæ cum cerusa, aut succum lactuæ
 cum bolo armeno, uel terram sigillatā cum mucilagine psyllij, præsertim si
 omnia diu in mortario plumbeo agitaueris. Præstat & emplastrum de cancris
 flumiatilibus: idem beneficium confert succus solani, aut semperuiuæ in mor-
 tario plumbeo sæpius agitata. Sed ulcere iam conspicuo curandum est ea ap-
 ponere medicamenta, quæ sine mordacitate siccant, ut Celsus consulit libr. 5.
 c. 28. Nam satis sunt eo tempore medicamenta, quæ quasi blandiuntur (ut Celsi
 uerbis utar) apponere, quam sanè curandi rationem fucatam Medici appellāt.
 Sed ex peritissimis chyrgis didici, diuturna obseruatione sibi esse confirmā-
 tum, maximi esse momentū unguentum illud quod recipit lithargirij ʒ. j. duca-
 tur

Atur cum pi^o illo plumbeo in marmorea pila, & adde donec incorporent^r aquæ rosatæ, olei rosati, & aceti, ana ʒ. iij. quod facies donec acquirat, linimenti formam. Aliud etiam experimento proficuum comperio, quod recipit olei rosati cum succo solani, vt paratur, ad conficiendum vnguetum pompholygos. ʒ. iij. pulueris lithargirij. ʒ. ij. pulueris Ioannis de Vigo. ʒ. f. pulueris cerusæ lotæ, & plumbi vsti ac loti ana ʒ. iij. ceræ albæ ʒ. vj. misce, & fiat vnguentum liquidum pro linimentis ponendis intra ulcus. Aliud præterea referi Gal. lib. i. de com. phat. ge. c. 2. quod recipit olei rosacei. ʒ. x. ducantur in mortario plumbeo sub Sole donec crassescat, & nigrescat, & postea adde plumbi vsti, & loti. ʒ. j. cerusæ, & lithargirij puluerizatorum. ana ʒ. xij. ducantur simul cum ʒ. j. ceræ albæ donec mediocrem acquirant consistentiam. Quod si hæc prodesse non uideantur, ad chimica auxilia ueniendum esse consulit rei magnitudo, & malignitas, interq; primas tenet oleum de stibio, & de fæce uini, aut aceti, vel de salibus, aut ferro uel ex plumbo, quorum extractionem latè docet Andernacus tomo eius operis 2. fol. 722. Haud secus grandioris pretij est illud vnguentum, quod recipit turis lotæ, & cerusæ ana partes æquales, terantur cum oleo rosarum, & succo portulacæ, aut solatri, aut cucurbitæ, uel mucagine psyllij, & postea fiat frequenter linimentum. Prodest, & frequens vsus aquæ solatri: item ex vsu est, si amyllum, cerusa, thus, aloes, & terra lemnia cum aqua solatri dissoluantur, & linimentum fiat, quod nusquam exsiccari permittes. Dimitto hac in parte si ca medicamenta, & alia non pauca, quæ passim à Medicis scribuntur, ut quæ uel parui momenti sint, uel vulgaria existant.

F I N I S.

8
C



DE VIRGINVM ET VIDVARVM AFFECTIONIBVS;

ET DE VTERI MORBIS.

LIBER SECVNDVS.

B *Stulhi hoc secundo libro, optime Lector, ea complecti vitiorum genera, quæ & utero ipsi primario pertinent, & alia, quæ ab ipso proficiscentia reliquis corporis particulis communia sunt. Principio tamen sumpto ab ijs, quæ ex utero prodeuntia multis modis semina torquere habent, virgines præsertim ac viduas. Secundo tamen loco eorum recordabor, quæ utero ipsi messe assolent, velut ulcera, & reliqua huius census mala.*

De uteri natura, ac de morbis, quibus affici potest.

Cap. I.



I **N**TER pleraque, eximia membra, quibus natura toti corpori ministrat, quoddam, idque præcipuum in feminis fabrefecit tantæ proculdubio dignitatis, & præstantiæ, ut iure optimo à Platone, tanquam animal quoddam in corpore peculiariter viuens fuerit existimatum. Est quidem uterus tantæ efficacis in feminarum corporibus, ut in eo tota ferè sanitatis ratio ex Medicorum omnium decreto, sita feminis existat: ob id profectò hac in parte decreui, eius naturam, & conditionem scribere, ut facile deinceps cuius innotescat affectionem omnium ipsi pertinentium causa, & modus.

C *Vt igitur mulierum uterus, ex quo tam miranda humani generis machina faberrime ortum traxit, in maximam omnium admirationem innotescat. Principio pars illa, quæ pudibundâ appellant, sese nobis tractanda ingerit, offertque. Porro muliebrem naturam, os genitale, genitale muliebri, partem hanc pudendam nuncupari vidimus: qui carnis tuberculum hiuleum bisidumque; puberibus maturitatis indicio, pube intactum honestatumque; prominet, vulnam intus tutantes, ac custodientes. Quibus sanè in partibus ueneream appetentiam sitam esse multi existimant. Cæterum nymphaeam etiam, utrinque admotam, naturam eò progenuisse, quo primo hoc monimento, aer ea, ac cætera quæque; extra officere ualentia, arceantur, credi par est. Sed occurrit post hæc ceruicis os aliquanto præstantius, intra clutorem muliebri genitali annexum: subinde ceruicis ipsa ceu pars finitima, quæ nular canalis, & ab Arist. et matrix dicitur. Ab intimo, qua*

K 3 uterus

uterus definit ore, prolifico maris semini accessum præbens, adusq; muliebrem naturâ recto tramite protensa ceruicula hæc inchoat efferturq;. Verum ob sui constrictionem in nonnullis mulieribus ad dextrum, in alijs ad lævum magis collabitur. Huic quidem velicæ foramine directo per eius meatus nervosus cartilagineusque parte superâ annectitur: quæ lotij à renibus ad vesicam delati, fistula intra muliebrem naturam sita, nymphæ nascente visitur. Sic n. vesicæ fistulæ foramen humidis recrementis à mentibus verò uteri cernix illi continetur in mulieribus egressum suppeditat. Est autem huius partis longitudo quatuor sexve ad summum digitorum: amplitudo, verò, quæ colent capiat, cariosa ad modum, cartilaginea, ut partus tempore faiscat, dilatetur plurimum atq; contrahatur, modicè obdura, ne transmutationibus his pallioni cuiuspiam obnoxia euadat, proindeq; ut concubitus tempore, genituram excipiens tantisper opportunè attollatur. Quandoquidem in fundæa mollitie partibus quibusdā eleuatis, alteris concidentibus, anfractus sinuososque prolifici seminis vsum ad vuluæ grandiorē sinum transitum prohibentes, molitum iri cognitum sit. Quod si non celerrime permeauerit, longiorē moram in ceruice trahens, spiritus genitui ocyssimè exhalante, genituraq; tempore suo prorsus priuata, haudquam concipi posset. Huic etiam spherica rugiosaq; cavitās inest, ut penis subingressu tentigine oblectamenti causā afficiatur: in cuius sanè confinio nervosa exilitas colligationibus venulisq; tenuibus ex adiacentibus particulis exortis dispersa contexta e minimissimis maculis interstincta, inuenitur, quæ integræ virginitatis testimonij assertum hanc eugion vel hymenæ vocant, ex qua coitu primo excissa, cruorem emanare aperitissime constat. Præter hanc stat protinus uteri os, quod eatenus (intelligo internum illud ostium, quæ loci desinit, & ceruix inchoatur) nervosum existit, quo excellentiore sensu, coitus tempore summè oblectetur, modica duritiæ affectum, ut vuluæ os ob immodicam duritiem haudquaquam coniungat: ut n. uterus simul seminis faculationem intra se susceperit, vniuersum alueum contrahere, atq; os ipsum sigillare opus est: ob id decuit modica duritiæ constare. Glandulosum insuper est, instar glandis penis mucronatum, foras in ceruicem inæquabile sua faciē, admodum oris cavuli recens editi prominens. Deinceps verò uterus subsequitur, quem nominibus alijs utriculū, vuluam, mulierumve locos, ac matricem meliorum consensu appellare liceat: sed de nomine sit satis.

Ad rem igitur accedendo, locum uteri ac domiciliū rimari prius oportet: porro ima spina, quam caudam appellant, incoxarum ossē desinit, quod transuersum longèq; valentissimum, vuluæ, vesicæ subrectum intestinum tuetur: ab exteriorē parte gibbum, ad spinam verò resupinatum à lateribus adest, in ipsis coxis sinus orbis latos obinet, à quib. os pectinis suboritur, quod super intestina sub pube transuersum ventrem confirmat: in viris rectius, in feminis in exteriora magis, ut partui commodius sit, recurvatum conspicitur. Uteri itaq; positura inter imam spinam, & ultra vesicam infra mediam aluum habetur: ab vmbilico enim paululumve suprâ ad suæ ceruicis initium vsq; extenditur, quate infra aluum situs. Tunc a parte priore vesicæ eidem iuncta præsertim versus ceruicem, quandoquidem vuluæ amplitudo vesicam superueniat, qua parte ab eadem minimè regitur, lateraliter coxarum ossibus recuruatis, posticè, ima spina

A na sub recto intercedere intestino circuit, qd ne facile hoie in inchoato, cum in creuerit, duriori mattici entis oblederet. Quia illi regionē cōdiderat natura, ut cōmodius arterijs, cordi, iccori, venis, cerebro dorsaliq; medulla, nervis pcor- dijs, itē māmīs, renibus, vētri, coxendicibus, pubi, cunctis his vnā committeret.

Vteri igitur quātitas in virgine admodū exigua vīditur, in euirginatis autē, nī si dum vterō gerunt, non multō maior, quā manu comprehendī queat: ita vtrū vterulis iam sit similis summitati asperae arteriae, vt rectē ab Herophilo compara- tum est. Verū quantitas hēc ambigua indiscretaq; aetate, tēperatura, venereo- rum vsu, muliebri profluvio, fetura, & adhuc fatum vnā cōceptorum nume- rō, corporis proceritate contrariantibus censetur. Est insuper neruacea materia per simili pelliculosa: quippe quae ad puerperij vnus vel plurium magnitudi- nem extendi posset, verrucosa cavitare pollicari crassitudine constat.

B Extat etiā tunicis duabus obductus, interna vna, & altera externa. Tunice huius villi per longum porrecti (quos rectos appellant) insunt, q admodum pau- ci existunt, eoq; illis viri duntaxat geniturā facillimū quidē trahere erat. Sunt & villi per transversā ducti (transuersi appellati) quos sanē in vtero redundare operae pretium fuit, quando quidē ijs ipsis etiā rapta genitura detentum itura foret, simul, & fetus toto tēporis tractu a cōceptione ad partum vsq;. Quinetiā & illi in latū diductos (qui latitudinales nominant) inesse liquet, qbus partus fetura absolunda est: & ob eā rē si uterus duas eas partes cōplexus in vniuersū spectetur, quadrangularem orbiculatam figurā prae se feret, amplitudo cuius ad ceruicē coangustatur, qua sui parte ima canalis effertur: & ob id cucurbitae vtrinq; paululum cōpressae speciem repraesentat. At extrema mēbrana separata, internam tunicā diligentius rimari oportet: cui sinus gemini, alter dextra, laeva parte alter leuiter discreti sunt, ad vnā ceruicē coeunt. Quos planities quēdā intus, semina per quā similis, separant: cui etiā ex rugositatibus comparente- minentia plures, quae priscos deceperunt, vt crederent, varios esse sinus, quod leuiter credendum est.

C Venas hēt etiā vterus non paucas (sed a caua disseminatas, nullā) a vena aor- ta diductas. Caterum extrinsecus, canalis parte superna, qua vulua p̄tinitur, & ceruix innascit, vtrinq; testis conspicua magnitudinis coherescit, vnus dex- tro, alter laevo lateri sorte creditus, nō minores multō ijs, qui virorū sunt, durio- res tñ, qui intus matricis ceruici adherent, quos peritonaeum deducens, in ip- sos vasa seminalia obuoluit, simul cū ppria ipsorū tunica epididymiae nuncu- pata: carent tñ erythroide, & seroto, & darto, a quibus vasa semen in cornua de- ferunt, q̄ propē vteri suūdem laxiora existunt. Habent tñ distincta inuoluta, q̄ toleratissima natura cōprocreauit, vt salualem quendam succum, qui mulieri- bus oblectamini esset, molirentur. Supra hos deinceps, bina cornua sic n. ap- pellant) lateri dextero vnū, alterū leuo admoda, perinde atq; additamenta duo tendunt. Etenim qua parte vtero annectunt, pleniora sunt atq; crassiora, tñ ad- ilia coxendicesq; procedentia minuuntur atq; attenuantur. Hae sanē cornua ap- pellamus duas ipsius apophyses exiguas a lateribus adilia perreptātes, papillis seu cornibus exorientes p̄similes: iuxta quas semē muliebri excernit, quae sanē eo tēpore, vt ceruix, & loci prolificae geniturae, belluones insigni tantisper am- plitudinē, ad eandem vorandam, dehiscendam protinus ab initio extendunt.

Postremo similia uasa ad hunc modum intelligere oportet: venales gemini A
meatus de aorta: nena flexuosis orbibus ad testes portendunt, alij totidē iusta re-
nes eodē deueniunt: sed hi sanguinolenti, illi quos mittit aorta exangues cōpa-
rent. Qui oēs circum duos: nā dictos testes pgressi, sese flectunt, mox cornua sub
eunt, subinde passim in tenuissimas fibras diuiduntur: quarum pars maior ra-
morum seriē sparsa ad uterum deuenit, substantiā penetrans, ex qua ēt, ferūt co-
tylidones fieri, quibus partus per umbilici radices aliqua ex parte utero uali-
dissimē cōmittitur. Ex quibus ēt genitalis quidam succus citra uoluptatē emis-
sus, ad conceptum necessarius in uterum instillat. Ex alijs uerō menstrua pur-
gationis aliquid in uterum defluit, præstaturum quidem fœtui alimentū: ex qui-
bus rubentia membra apparere in genituris assolent. Ex qua ēt uasorum propa-
gine ramusculi quidam in internum uulua ostium protendunt: unde inutilis
quædā humiditas, q̄ supra saliualem succum uocauimus, incredibili (ut ferūt)
uoluptate exiliendo, ac per saltus haud secus, q̄ uirile sēmen prorumpit, tanto
in plerisq; impetu, ut marium more longius prosiliat. Hinc sanē orta est cōtro-
uersia inter Gal. & Arist. nā hoc utile, & ad prolem necessarium Gal. fateatur: in
expediens uerō, atq; irritum Arist. & Auer. arbitrantur. Nec mirandum est, me
hac in parte non meminisse uiarum, quæ utero, & mammarum consortium p̄stāt,
quia de hac re alibi disputatum est. Hæc itaque est huius membri descriptio, q̄
summo opere esse cognitu necessariam reor ei, qui uteri affectiones exactē distin-
guere cupit: nam, ut in singulis uteri morbis monstrabo, eorum quilibet suam
sortitur differentiam, & conditionem, sumpta ratione à natura, seu officio cui-
us uis harum partium, cui morbus subijcitur.

*Uteri
usus &
morbis.*

His ita constitutis, ut à primis principijs rei huius exordiamur, uteri usum
hac in parte expendisse oportebit, & morbos ēt, ad minimā usq; eorum differē-
tiam. Hēt igitur uterus triplex officiū, unum quidē sibi proprium, & peculiare,
quod illi inest, quatenus pars simplex & similis est, quo pfectō sibi alimentū
allicit, & in sui naturā cōmutat, aliturq;: non quidē, ut multi censent, ex sangui-
ne menstruo (nā cum non trahit, ut pars simplex, sed suscepat, ut instrumentum
alijs usibus dicatum) sed ex proprio, & peculiari alimento p peculiare sibi in-
fitas uenas, distinctas à menstrualibus, p uniuersam uteri substantiā dispersas.
Quo sanē munere, ut optimē utatur, fruit̄ proculdubio duplici instrumentō, tē-
perie nimirū, & optima partium unione, in quibus sita hēt alterā sanitatis par-
tē: quapropter ad hanc partē pertinent morbi ex distēperie (licet temperamen-
tū oībus uteri actionibus cōmune, & proficuum existat, ita ut eo mutato ali-
nascant̄ utero morbi, ut inferius monstrabo) & soluta unitate, q̄ utrisq; partib⁹
cōis existit, cui ulcera, & aliæ continui diuisiones reducuntur. Secundum uerō
uteri officiū, id est, quo dignitate, & præstantia ab oībus alijs membris dissi-
det, non quidē ob sui commodum, sed p fœminæ utilitate, & beneficio p̄ficiū
existit: nā qua rōne in utroq; sexu mēbra quædam sunt totius corporis uacua-
tionibus dicata: ita in fœminis peculiari quadā dote, membrū hoc excogitauit
natura, cui propria (p̄ter alia officia) inest uacuandi rō, & qua rōne deficientib⁹
uesica, & intestinis à proprio munere, maximum subinde incommodum cor-
poribus subsecuturum speramus, ita quoq; & potiori quadā rōne, in fœminis
hanc partem sanam, & menstruationis officio idoneam desideramus. Quod si
aliquo

A aliquo modo contrariū fortē acciderit, mille procul dubio illis succrescunt affectionum modi, menstruis præter naturā utcumq; suppressis: nā quo substantia aut superfluum illud, quod per uterum excernitur, præstantiorē obinuerit naturā, eo si præter naturā institutum supprimatur, grauiora suboriri mala necessum est: Præstantioris quidem esse substantiæ semen, & sanguinē menstruum recensuerat Gal. li. 6. de lo. aff. & ob id, si retenta putrescant, aut utcumq; aliter uitient longē grauiora efficiunt accidentia, & maiora mala. Tertium autem, & ultimi uteri officium speciei propagandæ proficuum, & dicatum est: quod sanē diuidere in tres potissimas partes mihi hoc loco placet. Quippe uitiatum cuiusuis instrumenti propria actio, aut ablata ex toto operandi potentia, aut diminutē agēte, uel corruptū, & menstruosum, pducēte effectū. Sic. n. ex feminis qdā oīno non concipiunt, quas peculiari nomine steriles appellat Hip. Aliæ concipiunt quidem, sed fœtū perferre nequeunt, aut necessarium, & pñitum tempus gestare sunt impotentes: quibus frequenter abortire contingit, q̄ diminutē uteri facultas operetur. Rursus aliæ concipiunt, & fœturā continent, ceterū monstrum quid ex utero producant, uelut est mola à Medicis appellata, ac sunt alij mendosi, & monstrofi conceptus, qui mira uarietate ludunt, & peritissimis Medicis plerunq; illudunt: quos ex corrupta uteri actione proficisci nulli esse dubium arbitror. Atq; hæ sunt in uniuersum omnes uteri affectiones, quarū speciatim meminisse quoq; oportebit, sumpto ab hysteriis affectibus initio.

De hysteriis affectionibus in genere. Cap. 1.

FREQVENTI nomine cum antiquiores Medici, hysterā, uterum appellauerint, iure ob id optimo ipsius affectiones hystericas, seu uterinas nuncupauimus: quas hoc uno capite cōplecti mihi nunc in animo est. Dictum nanq; superius leges, uteri munia tria potissimum officia diuidi, quorum primum est sibi proprium, & peculiare, alimentaria, ipsius dicatum, totum naturali potentia subditum, aliud uerō cōius est, toti speciei subseruiens, cuius ratio, & finis est prolem procreare. Sic etenim Gal. 6. de lo. aff. c. 5. uterum diffinit eam partem, q̄ natura mulieribus ad concipiendum concessit. Cui subseruit tertium uteri officium, licet uniuerso fœminæ corpori sit cōmune, & proficuum, quod est menstruum sanguinem statutis temporibus expurgare, & semen in ueneris actibus excernere, quæ sanē omnia pari quoque legē certis quibusdam temporibus contineri oportebat: hoc quidem, ut fœtui subsit materia, & locus: illud uerō, ut fœmina excrementis purgata uegetior, sana & conceptui aptior existat. Verū sicut utroq; modo seruata naturæ lege, inculcata sanitate fœmina uiuit: ita quoq; prorsus dum utrunq; , aut alterum modū excedit (ut lib. de uirg. morb. Hip. recenset) mille affectionibus fœrē incōprehensibilibus, premitur miserrima fœmina. Sic profectū fluentib. debito largius mensib. fœminæ fiunt steriles, imbecilliores, pigræ, ineptæ ad actiones obeundas, decolores, tædiosæ, & tristes, ac plerunq; degenerat affectio in malum corporis habitum. Sic semine, aut quauis alia substantia defluente, eadem & longē grauiora subsunt accidentia: tandem corpus in maciem, & tabundinem quando ocysimē degenerat. Verū tolerabilia profectū quis existimabit huius-

huiusmodi mala, si ea cōsideret, q̄ ex insolita, & p̄ternaturali seminis, aut san- A
guinis menstrui retentione suboriri assolens. Quæ p̄culdubio oīa facile colli-
gēs, si Hip. legeris loco paulō ante citato: quippe inquit. Nā cū virgines iā matu-
ræ viro steterint, natura duce sanguis menstruus ad matricis locellos, & venas,
ab hepate defluit, qui cū ob illarum angusta oscula, q̄ nondū patuerunt, aut in
fœminis, q̄ viro orbata sunt, viscosis, & crudis humoribus obstructa, & deniq̄
ob sanguinis crassitiē erumpere nō possit: tum rursus p̄ venæ cauæ maiorisq̄
arteriæ propagines ad cor, hepar, diaphragma, & præcordiorum venas regur-
gitat. Capiti quoq̄ non minor pars cōis fit, & tandem circa viscera oīa acciden-
tia grauiā parit, difficiles respiraciones, tremulum cordis palmum, hepatis inflā-
mationē, & mille alias eius distemperies, ventriculi subuersiones, cibi fastidiū,
vomitum, ingentem famē, varium malorum appetitum, cardialgiā, epilepsiam,
& delirium: sanē, iudicio nostro, optimē huc afferri potest illud Gal. dictum li-
bro de diffē respir. nimirum, quæ p̄ter naturā sunt, varia & multiplicia esse, in-
quitenim. Vnum. n. est, quod secundum naturā se habet in animantis corpore,
varium aut, & dissimile, & multiplici errore inuolutum id, quod p̄ter natu- B
rā habet, adeo, vt necessario sequatur esse incomprehensibile. At si qua in re, dū
p̄ter naturā efficitur varia, multa, cognitu difficilia subsequuntur accidentia,
maximē profectō in semine, & sanguine menstruo retentis coniectabile effici-
turā quibus tot oriuntur vitiorum genera, quot neq̄ scripta reperiri possunt,
neq̄ facile memoria teneri, vt eorum possit lex, & ratio difficulter haberi ali-
qua. Quo quidē factū est, vt medicorum non pauci consiliō destituti ab horum
affectuum curatione desistant, vetulis, & mulierculis id munus relinquentes.

Proficiscitur itaq̄ huius miræ varietatis ratio, una potissimum ē tribus rōni-
bus: nā dū hæc duo excrementa p̄ter naturā legē cohibentur, aut putrescūt, aut
alterantur, aut quantitate solum, & copia abundant, & peccant. Quippe hac ra-
tione virginum morbos fieri Hip. retulit li. de virg. morb. dicēs. Cum. n. hæc par-
tes replete fuerint, & horror cū febre ingruit, erroneas febres appellant: his ha-
bentib. p̄acuta quidē inflāmatione insanit, p̄ter putredine verō clamat, præcali-
ginositate aut timet, ac formidat, p̄ter cōpressionē verō circa cor strangulatio-
nes parat, p̄ter sanguinis aut malitiā animus mœrens, ac anxius malum trahit. C
Qua sententia euidenter constare vī, quanta varietate mutetur humor, & q̄ ma-
la efficere possit. Quod ēt ex ipsa rei natura, & conditione haud difficulter pro-
bati potest: nam si nerui, xena, musculi, adde & cornua vteri, mensium affluxu
aut viri coitu non humectentur, tunc exsiccata prolabi ad aliquam partem, &
vterum ipsum lacerare necessum est: pariter si mensū repletionē distendunt: sic
& eodem modo, si semen in vteri cavitāte, & vasis coaceruatum computruit, in-
credibilia quidem mala suboriuntur. Pari quoq̄ pensu dum citra putredinē,
sola copia abundant, malum, quod per se efficere nequeunt (p̄ter plenitudi-
nis damna) alterius mali interuentu moliantur: nam & fluxus sanguinis hemor-
rhoidem, mariem, aut per uomitum, & urinam patiuntur: item hepaticam dy-
senteriam, hydropem, corporis contractionem, lassitudinem, tumores p̄ter
naturam, & alia pleraq̄ vitia succrescere longē diuersa ab vterinis affectibus
existimamus: quæ omnia, vel deposita plenitudine, curare non est difficile.

Verum cū prædicta excrementa alterantur citra aliquam putredinem solū
calidiora,

A calidiora, frigidiora aut sicciora facta, affectus uterinos efficiunt quidem, sed neq; admodum graues, neque ob id facile intelligibiles. Nam primò feminæ hoc modo affectu æstuationibus, sibi inquietudineq; non leui vexantur, ubi caliditatem contraxerint excrementa. Item pallefcit corpus, albidius aut decolor redditur, & ipsa femina pigra efficiunt, maſta, & edioſa ac mille doloribus plena: quæ quidem accidentia neq; ordinem ſeruant, neq; legem, q; ſi perſeuerauerint in aliquo ſtatu, frigiditatem in ea parte contractam eſſe auſtantur. Alia etiam ex hoc vitij genere ſuborinuntur accidentia his equalia, & ſimilima, quæ proſectò præſidium maioris mali, & grauiorum accidentium exſtunt. Quobrem eis citra cunctationem ſubueniendum eſt, antè quidem, quam in copleſſiam, aut alium grauiſſimum affectum degenerent.

Ceterùm dum ſemina eò miſeriæ, deuenit, q; huius excrementa, ſemen videlicet, & ſanguis menſtruus, putreſcant accidentia quidè grauiſſima ſunt, & alie ætè terribilia, & quæ ſui ſpecimen, & naturam facile monſtrant: ſed tam ſunt varia, vt neq; certa lege, neq; vlla methodo comprehendere queas. Subitũ in hac re mirari, cùm vnica ſit materialis eſſe, vnica formalis ſeu efficiens, putredo, vnica particula affecta, vt utitur, quanam rōne tam mira accidentium varietas ſubriatur. Quod ſanè ita fieri poſſe, tria oſtendunt facile: primum, putredo ipſa: ſim putreſcentis ſubſtantiæ copiam æternam verò, & vltimam, varietas, & natura mēbrorum, quæ vtero ſic affecto conſentiunt, & compatiuntur. Circa primum attento animo lector expendat, qd licet ſanguis ſolum putreſcat, aut ſemen ipſum putreſcat, aut vtrumq; ſimul, ea tñ eſt putredinis natura, & conditio, vt omni genæ varietate, & mille modis fieri poſſit iuxta quam ſanè diuerſitatem accidentia quoque variari neceſſe eſt, velut de re quā diximus dum præter naturam effici. Conſiſgit in ſuper miræ hæc & multiplicis nature varietas in putredine multis modis: primò quidè ratione cauſe mouentis humorem ad putredinem, q; eſſe variis inſiciabimur nemo, ac ob id varias pullulare putredinis rationes, & differentias: ſecundò id contingit ex loco, ubi putreſcunt humores: multa n. atque varia putredini poſſe ſuecreſcere ex loco, maniſteſtiſſimum eſt; vltimò varias contingit oriri putredines ex varia putreſcentis rei natura, & ſubſtantiā. Ex qua quidem conditione plurima hyſtericis feminis accidunt malorum genera, ex ſemine nimirum, & ſanguine menſtruo corruptis: idq; duabus rōnibus: prima ob putreſcentium perfectionem: conſtat n. ſemen ex perfectiori ſanguinis parte, & calore nativo perfectiſſimo, ac ex copioſo ſpiritu: ut ſanguis ex quatuor humoribus, & totidem humiditatibus, quæ ſingulis humoribus ſunt adiunctæ, ita ut quilibet humor ex parte tenuiori, & craſſiori, ac mediocri conſtitutus exiſtat. Ex qua procul dubio varietate mirum uideri non debet, ſi unicui cū ſit humor, ſanguis nimirum, aut ſemen, tot modis vitari poſſit, ac tot accidentium varietates efficiere. Secunda huius rei ratio eſt, quia putredinem contingit fieri prædominantibus in ea uno, duobus, tribus, aut omnibus humoribus, vel paribus eorum, quas diximus conſtituere, ac componere utranq; ſubſtantiā, ſanguinis ſcilicet aut ſeminis. Quobrem rōni conſonũ vñ, varia ob id ſeminis ſubſecutura accidentia fore, & qd mirabilius eſt, unicũ & idẽ accides in diuerſis feminis, & temporibus, & qd adhuc maiore infert admirationẽ, in eadẽ femina, & eodẽ

tem-

*Cur ex uni
ca cauſa
tam mira
accidentia
variari
possint?*

tempore diuersa, varia, & sæpe contraria succrescere accidentia. In qua procul dubio re, rationem monstrositatis, & varietatis hystericeorum affectuum consistere arbitror: nimirum, quod præualeat magis in putredine, causæ efficacia, aut loci putredinis deterrima conditio, vel humoris putrescentis malignitas, aut quod prædominetur magis in putredine vnus humor, vel vna substantia ex nuper dictis, quàm alia.

Ad dubitare iuxta hanc rationem mihi visum est, cum sanguis, & semen temperatissimæ, & perfectissimæ sint substantiæ, qui fieri possit citius, & deterius ceteris oïbus posse corrumpi, cum bilis tanto deterior, tanto tempore incorrupta duret non solum in vesica fellis, sed prope cutē in arquatīs, & pituita in arthritide prope articulos. Verū quia hic non est disputationis locus, breui quadam rōne respondere huic dubio mihi est in animo. Inquit Arist. lib. de longi. & breui. vitæ. Pura oïa & impermixta, vt quæ magis à contrarietate recedant, diuturniora esse: contra, citò vitiari, aboleriq; quorum essentia multa oppositione constat. Sic elementa, inquit, lapides, & metalla, q̄ vel simplicia sunt, vel eis proximè accedunt, incorruptibilia creduntur: contra, lac, sanguis, & semen seruari diu minime possunt, vtpote, q̄ manifesta cōpositione, & varia constant. Quod euidenter monstrant sanguinis grumus vbicunq; sit, lac et coagulatum in puerorum ventre, & semen retentum: q̄ oïa facillimè, uel aeris cōtactu alterantur, quæ variā, & perfectissimā nacta sunt elaborationē. Ob id profectò, homo crebrius ægrotat, quia multiplici, & perfectissima constat cōpositione. Neq; obstat quominus hæc vera sint, sanguinem menstruum nouem mensibus citra euidentis vitium in utero gerentib. contineri: nā eo incolumis adseruatur, q̄ partim repleat vasa, partim fœtui p̄stet alimentum, partim verò in secundina colligatur: q̄ natura familiarissimā ob id sanguinis substantiæ fabrefecerat, vt ibidem citra corruptionem contineretur toto prægnationis tpe. Cur verò præstantiora queq; deteriora dum corrumpuntur, euadant (quod experimento quotidiano comperimus: nā sordidiorem putredinem cæteris animantibus, hoïum cadauera cōtrahunt, & oua putrescentia, ac poma, quo præstantiora fuerint, & odora, eo deteriori corripuntur putredine) duplex ratio cōmonstrat: prima, q̄ præstantissimā substantiā nequit deuincere, ac superare, nisi vehemētissima, ac spurcissima causa, quia cæteris facilius resistit: qua propter necessum est putredinē, & vitium causæ naturæ responderē: secunda, quia perfectis substantijs quoduis vitium deterius efficitur imperfectis. Quibus rationibus multi addunt, illud in causa esse, q̄ ex pluribus, & maximè diuersis perfectiores mixtiones euadant, calore nativō ueluti iunculo colligante cogenteve oïa: sic naturali calore dissoluto, dispersis oïbus prodit fœdus sapor, odor, & color, quæ magnæ putredinis, & horridæ sunt indicia: ita vt semine, & sanguine menstruo corruptis, quasi venenū in corpore nasci, lib. 3. & 5. de lo. patien. expresse fateantur Gal. Auer. & Auicē. Ratio quidem in promptu est, quia si ex purissimis alimentis, sanguine nimirum, semine, aut lacte, moro, ac melone vitiatīs, facillè venefica, ac deleteria excitatur qualitas, multò profectò rectius ex ipsorum excrementis generari poterit, quod in utero potissimum accidere certum est, eo q̄ sentina sit uniuersi corporis, & substantia, quæ putrescit, præstantissima. Quo fit, vt fœminæ vterinis molestare, veneni instar symptomata persentiant.

Cur

Cur præstantiora
dum corrumpuntur
deteriora
euadant

- A** Cur verò in plerisq; feminis vtero affectis hæc veneni seminata clā ocul
tēq; diu lateant citra euidētem corporis noxā, ac ad ipsū m̄, & per intervalla re-
uiuiscant eluceſcantq; grauissima symptomata, haud facile est nosse: ſcimus tñ
non ſolum in his, verum, & in multis alijs, qui venenū ſumpſerunt, diu in cor-
pore venena latitare: nam ſi Hipp. credimus, viginti annos malum ocluditur
oppreſſum aut reuerſum. Cauſa tñ huius rei non deſunt: quippe quod ſenſim,
& paulatim fit, nullum donec in habitum vergat, ſpecimē de ſe præbet, ſed dū
factum eſt, ſubito in grauissima prorumpit accidentia, ac ſepe in mortem. Præ-
terea, ſi ignobile membrum venenum adoriatur, donec ad nobile peruadat, nil
mali, aut q̄ pauciſſimum ſentimus: cū. n. ad nobile peruadit, facile toti corpo-
ri cōis fit affectio. Ad hæc, præſtantiſſima eſt membri, in quo viget aſluefactio,
et ſi ex deterrimo ſit, quia tñ abeſt, vt in membrum lædatur, quod ſæpe hmoi hu-
mor alimentum præſtare poſſit. Verum cū ex alimento creſcat vltra debitam,
& conſuetam magnitudinem id excrementum, pellitur ad aliud mēbrum, vbi
morbū facit, quia in ſuetum, quia multum, & quia prauum, quo tpe fieri gra-
uiſſima accidentia mirū nō eſt. Poſtremo huic malo principiū pſtat diſſenſio fa-
cta ex pellente: q̄ non pellitur quod p̄ter naturam effectum eſt, & ſic accreſcē-
te, cōparatur venenosa illa qualitas, q̄ pauld poſt in morbū, & ſeuiliſſima accidē-
tia, prorūpit. Quibus proſectō conſtare arbitror, qualis ſit huius dogmatis ratio
& veritas, vt cognita cauſarū varietate, medētis cōſiliū tutius, & certius euadat.
- B** Secunda ratio varietatis prædictorum accidentium, quæ ſecundum tenet lo-
cum, excrementorum q̄ritatē reducenda venenam ſemen, & ſanguis mēſtruis
cū intra vterum putreſcunt, nō ſolū hæc mala pariunt ex diuerſis putredinis
modis, ſed ex copia et ſanguinis, & ſeminis putreſacti: quippe maxima q̄ritas
vtriuſq; vel alterius in ſeuiliſſimos, & varios prorumpit affectus: parua verò eoſ-
dem minatur, ſed non perficit. Sic etenim facile reperimus apud pleraſq; ſemi-
nas quærimoniā, & ſenſus plurium, ac diuerſorum affectuum, qui vix cōprehē-
di, & diſtingui poſſunt, præludium quidem maiorū: quos ſanè leuiſſimis anxi-
lijs, aut ſola animi diſtractione vel delectatione curabis, adhibitis et leuib⁹ fri-
ctionibus, exercitio, ac deambulationibus, & huius cenſus alijs. Itaq; venenosi
& corrupti humores natura eadē mala minatur, & aliqñ efficit, ſed pp parua
humorum corruptorum copiam, aut non perficit, aut mox ſubſiſtit. Habent tñ ex
diminuta prædictorum humorum q̄ritate hysterice & ſemina hoc proprium, &
peculiare, ut mox ab acceſſione, & q̄ primū quieſcit malum, ad priſtinam, &
antiquam ſanitatem redeant, veluti ſi nihil perpeſſe fuiſſent: quod alijs, q̄ ex ni-
mia humorū copia laborant, non dat: ſuperſunt quidē illis per aliquod tps nō
leuia præteriti mali veſtigia. Quibus et feminis accidit, varijs accidentibus vni-
co, & eodem tpe corripi, ac mox ſubito leuari: ratio quidem eſt, quia parua hu-
moris aut huius copia cōtemnit, à ſe reiſcit vel deuincit particula illa, ad q̄ ex
vtero aliquid tranſmittitur, huius rōne accidentia ſuboriuntur: quod alijs ſemi-
nis, quæ plurima abundant huius venenosi humoris q̄ritate, nunq̄ conceditur.
Succeſcunt præterea his feminis varia accidentia, & in diuerſis partibus, q̄a ha-
litius pauci elati ex parua materia peruenientes ad particulam aliq̄ malū ibidē
efficere conantes, ad alias protinus tranſmittuntur, & pari modo ex his ad reli-
quas,

quas, in quibus omnibus proculdubio aliquid mali perferantur necesse est, A
quod varium esse contingit ob membrorum varietatem.

Tertia sanè, & vltima ratio diuersitatis hystericonum accidentium, est membrorum consensus, quibus vterus communicat suum vitium. Ex qua quidem causa, prædicta accidentia tribus potissimum rationibus subortuntur: prima, ex consensu mutuato præstitoq; alicui membro ex affectione vteri: secunda, ex mutua reactione, q̄ membrum læsum iterum præstat, & refert ipsi utero: quod profecto multorum accidentium solet esse causa. Nam cum membrum aliquod primo ab utero afficitur, rationi consonum videri, excrementa, quæ ex vitio contracto generantur, maiori ex parte transmittenda fore in vterum ipsum, tanq̄ in membrum imbecille, primo affectu, & corporis quodammodo sentinam: quod dignoscitur, quia accidentia, q̄ sic affectis superueniunt, redolent quadam tenus naturam excrementi in vterum transmissi. Tertia porro, & vltima ratio est, quoniam licet accidentia ex utero prodeant, non in sequuntur naturam seminis, & sanguinis menstrui corrupti, sed naturam excrementorum a membro aliquo affecto in vterum transmissorum, aut eorum, quæ in utero generantur, præter semen, & sanguinem menstruum. B

Prima porro diuisio, q̄ ex consensu proficiscitur, quadruplici constat membro, dimitto hac in parte consulto tres consensus differentias, quorum Gal. meminit. lib. 1. de locis aff. c. 6. quia huic vsui non ita sunt proficue, licet earum aliqua ex vsu sit: nam consensus ab utero præstat primo per partium quæ coafficiuntur similitudinem: cōpassiones. n. & confusus facilius, & promptius fiunt inter similia: & ob id utero affecto nervosum genus omne facillime cōpatitur: non quidem, ut multi falso censent, quod plures, & magnas nervorum propagines vterus fortia tur, sed quod membranosa constet substantia, & nervea natura intexta: qua ratione etiam vesica, & colis nervea dicuntur. Secundò idem consensus præstat per vicinam: quo fit, ut plerisque feminis vrina supprimatur, & varijs modis vitietur, rectum intestinum tenasione afficiatur: sic & mesereon, uentriculus, intestina, & venæ meseraicæ varijs accidentibus premuntur: præterq̄ quod nervea sunt hæc omnia, & ob id etiam compati possunt. Tertio uero consensus fit maximus per colligantiam: scater. n. uterus uenis, ijsq; grandioribus, ut ex Gal. constat, qui lib. 6. pop. par. 1. inquit. Vterus inter omnes corporis partes plurimas, grandissimasq; uenas habet: per quas proculdubio iecur cōpati per facile est, sicut iterum utero referre supplitium accepti mali: nam illi ob id præstat feculentum, & impurum sanguinem, quo (ut nuper dictum est) vterus nouiter afficitur. Arterias quoq; hoc uiscus non paucas neq; paruas suscipit à corde, per quas varia, & grauissima, ac periculossissima cor susceperat mala, quamobrem rationi consonum videri, cum uterum, & intra ipsum contra plerumq; ex putredine refrigerari contingat, citra frigidorum humorum abundantiam (adhuc in biliosissimis corporibus) grauissima feminarum non paucas perpeti accidentia frigidam naturam falso æmulantia. Ex quo et sequitur non posse cor deinceps in caloris utero transmutare (arterijs ab utero ad ipsum vergentibus, paruis frigidisq; halitibus plenis) quantum utero calfaciendo sit satis. Pari quoq; ratione uterus diuersis nostri corporis partibus mille modis alligatur: quas simul cōpati necessum est, subindeq; varia efficere accidentia. Quarto uero, & vltimò omnes partes uero de mandato ab utero consensu cōpariunt, suscepta nimirum substantia aliqua ex ijs, q̄ in utero præsentantur: et si uterus nullam haberet similitudinem cum alijs partibus, colligantia, aut

A aut vicinā, eā totū corpus cōfluxile, & trāspirabile sit, facile quāuis eius pars alterius damnum susceptat transmissa ad eam aliqua substantia ex ea, quæ laborat. Ex quo etiam varia, & grauissima subsequi accidentia conspiciamus, tum ex substantia, tum verò ex partium diuersitate.

Hæc igitur sunt varietatis hystericorum effectuum causæ, quorum sanè naturā bellissimè expressisse visus est Gal. lib. 6. de lo. patien. c. 5. docens, q̄ licet affectus nomen sit unum nimirū hystericæ passio, nihilominus tñ sub se comprehendit innumera, & varia accidentia, iuxta diuersitatem trium causarum, quas nuper adduximus. Quas sanè oēs si quis sedula diligentia intueatur, perdisceat facile, cur feminae aliquæ refrigerentur, & mox simul incallescant: item cur marcidæ appareant, aliquæ verò nimio madore, ac pinguedine abundant. Ex eisdem quoq; causis proficiunt, caput vniuersum vel aliquam, aut plures eius partes fixo, & stabili dolore apprehendi, nonnunq̄ mutabili, sæpe diurno, sæpissime à quibusvis externis causis exacerbato, ita ut solam dolorum capitis varietatem comprehendere difficulter queas. Quis præterea narrare poterit dorsi, thoracis

B lumborum, coxendicum, ventris utriusq; & crurum dolores? quos nulla quidem alia rōne certius ex utero proficiscentes cognosces, q̄ eò q̄ nullam feruent legem, nullamq; uniformē naturā habeant: sed varietate maxima præditi nullis limitibus, aut conditionibus coerceri possunt. Monstrōsa nāq; varietas hæc aliunde q̄ ex utero proficisci non pōt præsertim cum dolor, neq; distemperie, neq; tumorem præter naturam eius partis, quæ dolet, comitem habeat. Ex eisdem quoq; causis prodit quædam famina famescere citra vllam rationē, alias verò idq; frequentius cibos fastidire, & abominari: plures tñ optimos, & vsuales odio habere, spurcillimosq; & inusitados prosequi. Inter quas multe quidē no munt, & nauseabunde existunt citra manifestam causam: quarum ventrem si purges, magis lædes, q̄ ex halitu ab utero illuc irruente affectio suboriat. Sic plurimæ ventris inferioris murmurio, doloribus, & cruciatu maximo premuntur, flatibus ventris, & intestina distendentibus: quæ potiùs leuantur vterinis auxilijs, q̄ quouis alio præsidio. Cordis item morsu, & dolore premi plures, omnibus cōpertum est, ore. s. ventriculi compatiēte, aut corde ipso. Quibusdā arteria iuxta dorsum, & quæ mesenterium ambit uehementius pulsant: vñ eas mēstas esse, inquietas, anxiosas, animo linguētes, aut syncopicas quotidiana experiētia conspiciamus. Quod si septum transversum malum apprehenderit, hinc difficiles respirationes, suffocationes seu strangulationes, sicut ex laqueo periculum impendere, manifestum fitatq; in hoc etiam uaria existit difficilis respirationis mutatio, & grande periculum. Verū si iecur degustauerit uteri vitium ob deprauati sanguinis generationē, faminae protinus obstructionibus innumeris corripiuntur, decolores fiunt, pedibus tumēt, totum ē corpus redditur cacoethes, tumidū, & iamā in malū habitū cōmigrans. Sed quis numerare poterit accidētia, q̄ aīalis potentia, dū læditur, perfert, quippe aliquā motiua facultas ita pueruitur, ut aliqua pars corporis, aut plures uel totū corpus tremore afficiant: contusiones et p̄sertim pedū, ac manum eadē læsa efficiunt resolutionē, iuxta naturā habitus, qui aut neruofas partes, aut neruorū capita, aut neruos ipsos ptingit. Aliquæ ex motus defectu uoce priuant, & mutē p̄ aliqd̄ tps̄ supersunt: ex quo et emanat respiratione priuari nō rarò, & periclitari suffocatione mille modis:

partim

partim obstructis vijs, partim musculis respiratori feruentibus plurimum letis, ita ut verè videantur omnino respiracione priuari.

Tanta itaq; in p̄dictis accidentibus repetitur varietas, ut rarò in eadem femina idem accidens (licet ab eadem causa) eodem modo proficiatur. Pari quoq; lege diuersissima sunt symptomata, q̄ sensibus exterioribus uteri vitio succrescunt. Nā ex feminis quādā ita toto corpore, aut aliquo mēbro torpent, ut paralytici pati videantur: aliæ varijs & inordinatis dōloribus aded afficiuntur, ut neq; alicui causarum reducere, neq; in aliquo genere cōplecti facillè possis: plures gustu, & olfactu priuantur, plurimæ verò pranè gustant, aut olfaciunt citra gustabilem, & olfactibilem uitium. Aliæ sanè sunt, quæ aut sordescunt, aut tintu aurium perpetuò cruciantur, licet non pauca vitia in visu quoq; persenscant. Habet autē auditus hoc peculiare in hystericeis affectibus, quod et si femina in accessione oībus alijs sensibus priuentur, auditu tñ nunq̄, aut rarò priuantur. Ex eodē fonte manat sensus internos varia et pati uitia: nā quādā delirāt, maniacæ, ac furibundæ redduntur: aliæ vultu existente secundum naturā amētes fiunt, & veluti congelatæ supersunt, nihil percipientes, neq; respondentes quicquā. Dignum profectò animaduersione hac in parte esse existimaui, diligenter expendere, si ex vitioso semine tot iam seuaq; accidentia feminis succrescant, an ea quoq; castis, & pudicis viris pariter possint accidere: cui dicimus, q̄ licet aliquid hystericeis persimile in viris et videatur, id tñ neq; ita frequēter, neq; pari vehementia, ac in feminis, quia improporcionale vitium est viris, q̄ & calore abundant, & vegetiores sunt, & vitium ipsum frequentissimè frigidum: q̄ si in mare aliquñ id accadat, melancholica vitia affere potius q̄ alia conspiciamus. Succrescunt tñ ea mala feminis, q̄ uterus sit corporis sentina, & excrementorum putridorum conceptaculum, aded ut nihil mirum sit, si deleteria frequentissimè in eis suboriantur qualitas, propter caloris imbecillitatem, q̄ causis putredinis minus resistit: quibus accedit mensium, ac seminis in uterum profusio, & improba expurgatio. Atq; hæc accidentia retulisse sat sit, quæ veluti summa capita existant eorum, quæ frequentissimo euentu experientia comonstrat. Verum quia non sat esse grauissima hæc accidentia sic in genere nosse, ad rectam medendi rationem, ni quis exactè cuiusq; naturam adipiscatur, ideo per capita, ea distribuere in animo est, initio sumpto ab uteri strangulatione, tanquam à communissimo in hoc genere affectu.

De uteri strangulatione.

Cap. 3.



INTER maximos, & grauissimos effectus, quos ex uteri consensu feminarū sexus perfert, vnus profectò est uteri stragulationis, q̄ eo maximè nomen generis (hoc est, uterinus affectus) obtinet, quod magna grauissima & cæteris periculosiora inferat accidentia. Què quidē affectū non genus hystericearum affectionū, licet generis nomen sortiatur, sed unā potissimāque prædicti generis speciem esse censemus, ut Hip. refert lib. de virg. mor. qui inter cætera accidentia hysterica, quæ recensuit strangulationem, tanquam specie annumerat. Quod sanè malum tunc est, cum sanguis menstruus redundans aut

Aut vitiosus vel quævis alia ex vtero cū septū transversum comprimit, & oppri-
mit, ut ex Areteo Gal. Actio ac Paulo euidenter cōstat. Qui proculdubio autores
strangulatus nomen vsurparunt, p̄ symptōmate quodā, in quo sēminæ veluti
strangulari ac suffocari vident, respiratione omnino suppressā. Verūm, q̄a potis-
simū huius morbi accidens respirationis cohibito est, ob id iure optimo, cōi-
oium consensu, suffocatio nuncupatur. Cum hoc in Stephanus Atheniensis vir
maximæ eruditionis, & autoritatis commento li. i. ad Glau. inter vteri strangu-
lationem, & aphn. eā seu respirationis priuationē, nō minimū adinuenit ac pro-
fer d̄fferentiā, nec omnino quidē vanā: nā refert aphn. am proficisci ex super-
fluitate seminis in vtero putrescentis, q̄ in cor frigidus quosdam halitus trans-
mittit, quibus aut cor ipsum obstruentibus, aut refrigerantibus respiratione inter-
cipit: strangulatum verō fieri refert vtero retracto protrulq; versus partē supe-
riore, quo, & intestina, & vterus, & septum transversum comprimuntur ita, ut
respirationi nullus aut q̄ minimus sublit locus. Ego tū in hac re cenleo, hāc esse
differentiam operationis causarum, non differentia affectus. Erit igitur matricis
præfocatio nil aliud q̄ vteri (ob siccitatem, vel ex retento menstruo, aut humo-
rum affluxu, seu exacerbata putridi spermatis virulenta exhalatione) versus dia-
phragma, aut ad alterum latus conuulsio: cui non raro ex retento menstruo ve-
narū obstructio coincidit. Quippe si nerui, venæ, musculi, adde, & cornua ma-
tricis mensium affluxu, aut vteri coitu non humectentur, tūc exsiccata, facile ver-
sus diaphragma, & ad neruorū principium recurrit pariterq; si mensium reple-
tione p̄dictæ partes distendant, ad septum transversum irruit. Sic prorsus dum
sperma in vteri cavitatē, & vasis coaceruatū cōputruit, incredibile est quanto
neruorū musculorumq; nixu vterus conuellitur, ut eius virulentia exprimere
expellereq; possit, q̄ sanē exhalatio si ad cerebrum ierit, exhorresco dicere, q̄
sæua accidentia ac varia deliramenta proritet. Cū igitur diaphragma, præci-
puum respirationis organum, & præcordia, vteri ad superna conuulsione, coar-
ctata fuerint, nil mirum, & mulieres sic affectas, quas Græci hystericas dicunt,
suppressio arteriarū pulsū, & anhelitu, velut exanimis in terrā concidere. Con-
sistit itaque, ut ex Gal. 6. de loc. affect. c. 6. & li. 3. de artic. constat, vniuersa huius
affectus ratio in difficili quadā respiratione, & vocis priuatione, quæ penē ad
aphn. am omnimodā accedit: sic. n. inquit Gal. Veluti in eo affectu, quē nonnul-
li vteri suffocationē, alij spirationis ob vterum, ablationem vocant. Quæ sanē ac-
cidentia optim. Hip. complecti uisus est lib. 4. de rat. vict. (vel ut ego magis cre-
do ex Athænci si. 2. diphosoph. Polibus) his verbis. Si quis (ait) repētē obmu-
tuerit, is uenarum obstructione molestat, id si sano absque euidenti occasio-
ne acciderit, venam brachij dextræ internam secare oportet, & sanguinē p̄ cor-
poris habitū, ac ætate detrahēre: & subdit, ut integram affectus notitiā præstet.
His sic affectis, accidit faciei rubor, defixus oculorum intuitus, digitorū in ma-
nibus tremor, dentium stridor, maxillarum vellicatio, extremitatum refrigeratio,
spirituum in venis, & arterijs conclusio: & iterum subdit. Si verō ab atræ bi-
lis effluxu internæ corporis partes corroduntur, aut venæ aridiores factæ distē-
dunt, tunc inflāmate ad se humoris affluxū alliciūt: unde corrupto sanguine, &
ita ob eius cōsistentiā concreto, ut spiritus per naturales meatus exire non pos-
sint, corpus, & viscera ifrigidari necesse est. Hinc morbos comitiales, vertiginē,

L

capius

capitis grauedinē, loquelæ priuationē, spasmos, & syderationē euenire oportet, A
 p̄sertim si talis sanguis, & oppilatio iam uel ad cor, hepar, & cauā eius uenam
 peruenerit. Hæc quidē & multa alia refert, q̄ licet Gal. ad hystericum effectum
 non retulerit, ego t̄m f̄m̄inis uterinis affectionibus molestatis adaptare semp̄
 studui. Quibus proculdubio constat optimē dictum esse Gal. Ani. & Constan-
 tino ad morbos frigidos huiusmodi affectum esse referendum.

Huius aut̄ affectionis triplex cognoscit̄ species: prima, uehementissima, in
 qua laborantes pulsu, & respiratione priuantur, p̄terq̄ in medio pectoris, i quo
 oīum quid superest: in qua specie corpus uniuersum refrigeratur. Secunda
 quidem est, cū agrē laborantes spirant, licet sensu oīno non priuentur, cū hoc
 t̄m pulsum habent paruum. Altera uerò est in qua præter dicta, brachia, & cru-
 ra et contrahuntur: cuius meminit Gal. 3. prori he. com. 27. dicens. Conuulsio-
 nes in hystericis sine febre faciles sunt, ut Dorcadi: quibus equidem accedit q̄-
 dam anginae species, quæ ex resiccato gutture sit ab halitibus illuc ascendentibus
 ab utero, cui et̄ medeberis per uteri prouidentiam sanguine missio cauens B
 ne ad ipsum ex supernis extrahas, nisi urgentia affectus grauis ad modū sit, sed
 semper utero prouidendū est. Quas proculdubio differentias iuxta causæ uehe-
 mentiam, ac membri, cui affectus ab utero præstatur, suboriri necessum est. Ex
 quibus constat morbum hunc aliquando ad uteri intemperamentum simplex,
 aliquando ad idem cum humorum accessu pertinere: præterquam quod ad ute-
 ri situm, & figuram plerunque reducitur, ut inferius patebit.

Verū quia consimiles huic affectioni plures aliæ reperiuntur, uelut est syn-
 copis, apoplexia, & epilepsia, ob id profectò necessum est, in quo dissideat, aut
 conueniant considerare, ne quis in curatione, aut cognitione facilē decipiat. Con-
 ueniunt quidē p̄dicti affectus cum uteri suffocatione, q̄ repentē in oībus
 laborantes obmutescant, & se continere minimē possunt, catetum dissident à
 syncope ex pulsu, quia in syncope pulsus aboletur, in suffocatione uerò plerun-
 que manet, licet exiguus, aut languidus, aut rarus. Itē in syncope sudor frigid⁹,
 & color plumbæus erumpit: at in suffocatione, aut color non mutatur, aut non
 nihil pallidus efficiunt. Differunt quoq; quia syncopim leuat gratus odor, & C
 idem suffocationē euocat: sic etenim Auic. arbitratus est, & affirmat 21. 3. tract.
 4. c. 17. hystericā passionem syncopi esse grauiorē, q̄ ipsam syncopis frequenter
 antecedit. Differt et̄ à catalepsi suffocatio, q̄ non habeat partes rigidas, & oculo-
 los apertos, ac in eodem statu permanentes. Dissidet non minus ab epilepsia
 conuulsione, qua carent, quæ uerē suffocantur citra alterius symptomatis com-
 plexum: aut saltem conuulsio si quæ adest, perpetuò affligit, non ut motus cō-
 uulsiuus: item suffocata non omnino sensu priuantur, ut epileptici: quippe re-
 cordantur plerunque eorum, quæ audierunt, dum suffocarentur.

Verū dissidet ab attonito morbo: q̄ maneat, plerunque sensus in hystericā
 affectione, & nō adest stertor, neq; semper refrigeratur corpus. Præterea in hy-
 stericis spuma signū est salutis, in alijs p̄focationibus lethale, ut cōstat ex Hip.
 2. aphor. 13. A lethargo etiam distinguitur febre. Caterum à uenenis frigidis,
 tribus maximē distinguitur: primo quòd non sudent, neque habeant liuorem
 vnguium & extremitatum, & syncopis, ac deliquium animi sunt longiora: nā
 & hæc si adsint in uenenatis moriunt̄: sunt et̄ in uenenatis, aut dolor, aut icterus

aut

A aut vomitus. Verum quia solent hæc signa aliorum affectuum, etiā suffocationi grauiori accidere, ob id accidentia intueri oportet, ne aliquñ turpiter decipiamur. Causam huius affectionis potissimā, & immediatā esse vitium instrumentorum respirationi seruientium, eamq; ab utero mutuam non dubito. *Causa.* Quin proculdubio mille modis ipsa instrumenta laedi certum est, nimirum proprio temperamento uitiato, vel humore ibidem contento exuperante, aut corrupto, uel ipsius uteri mutato situ, aut figura utcumq; euerfa. Ex quibus omnibus septū transversum per sympathiam afficitur, ac hmōi accidentia concitat, utero non quidem conuulso, sed ueluti in septum transversum irruente, aut in aliam partem prolapso. Quod nullo alio modo fieri constat, q̄ dum uterus siccitate, plenitudine vel morfu alicuius venenosi, & putridi, versus illam partem quæ afficit, irruens vi prædictarum causarum septum opprimit. Hip. in lib. de nat. mulier. & de mor. mu. solam uteri peruersionem censet, causam esse uarietatis symptomatum huius mali: quid uerò Hip. addendum sit, iam refero. Sunt aut huius morbi in genere hæc, quas diximus, causæ, verum accidentiū uarietas quoq; forsitur causas pro cuiusq; natura, & sorte: referam omnia, & singulis suam causam adscribam. Deficit primò in plerisq; ex toto respiratio, deficientq; ceteri sensus, & immobiles existunt pulsibus manentibus illæsis: quod fieri est necessum nō ex uteri retractione solum, ut aliqui autumant, sed ex prauis halitibus cerebrum ascendentibus præcedentibusq; spirituum animalium liberum ad instrumenta actionū adiū. Carent aliquñ hmōi feminæ pulsu, idq; corde refrigerato ab eisdem venenosis halitibus, qui plerūq; frigidam naturam repræsentant aut suffocato, spiritibus retrocedentibus ad cor ipsum, caloremq; ueluti extinguentibus: quod fit ut sæpe extrema frigeant, & frigidus erumpat de fronte sudor. Accidit quoq; eisdem aded difficilis respiratio, ut quasi suffocari videantur: quod quidem fieri arbitror septo transverso, & cæteris instrumentis respirationi seruientibus ex utero per uiciniam compressis, aut aliter male affectis. Aliæ loqui minime ualent, sentiunt in leuiter, & optimè audiunt: quod una è duabus causis fieri posse constat, nimirum, quia halitus ille frigidus ad cor ascendens, respirationem interdicens, defectu aeris loquelam, & pulsum interdicat, indicium quidem cordis affecti uel accidit instrumentis respirationis immotis manentibus: quapropter aerem locutionis materiā trahere minime possunt. Fieri aut hæc occasione constat, q̄ septo transverso cōpresso difficulter respirant, & loqui conantur, licet non possint. Uterus igitur hæc oīa uitia præstat, uel mutata propria figura, q̄ situm mutari cogat, uel temperamento eius plurimum ad frigidum subuerso: uel halitibus ab eo transmissis in partē secundo affectā, ut cor est, cerebrum, uel quæuis alia ex respirationi seruientibus. Cuius halitus rōne in hmōi affectu conspiciamus, utrum ita in tumorem eleuari, dum flatibus ibidē genitis uel aliunde transmissis distenditur, ut mutata magnitudine, partes sibi proximas comprimat, & illæ vicinas, donec per continuitatem septum transversum comprimatur, & suffocari laborantes videantur. Quod et ad latus, & ad uarias partes procumbere posse dictum Hipp. est, & frequenter conspiciamus, ut inferius cōstabit cap. de uario uteri situ. Fit etiam id malum, dum uteri uasa aded humore impleantur, ut mutata quoque uteri figura, idem, ob eandem septi transversi compressionem, subsequatur accidens: licet ob aliam rationem symptoma hoc.

211. A.

L 2 profi-

proficisci ex hac causa quoque possit: nimirum, eisdem vasis non solum humore, sed flatu etiam repletis distensisque, ac ob id contractis. Quo fit, ut vena cava hac ratione plena ad iecur retrahatur, & ea parte maius malum laborans persentiscat, & sic arteria, & reliquæ partes, quarum vasa implentur: nam vasa, & cætera omnia mollia, dum in latum extenduntur, breviora fieri habent. Quod eleganti sententia Hipp. dixisse constat lib. 3. pop. dicens. Polemarchi uxori in morbo articulari coxæ dolor quidam vehemens, causa erat, quod menses non prodirent: vox interciperetur per totam noctem usque ad meridiem, audiebat autem, & sapiebat, & per manū significabat, quod circa coxam esset dolor. Quæ sententia euidenter constare arbitror, ex uteri immodica plenitudine huiusmodi perversiōem fieri, & accidere quoque, in uterinis passionibus aliquā audiri, & mentem superstitis esse, reliquis potentijs, vel uoce interceptis. Igitur in vasis cumulatū sanguis, aut turgens spiritus ea omnia extendit, vasa autem per tensionem, & repletionem breviora facta, utrum ad se retrahunt idque, vel equaliter, & tunc uterus recta sursum vētriculum, & diaphragma versus ascendere videtur: vel inæqualiter, tunc autem vel in dextrum, aut in sinistrum, ad partem scilicet vehementius trahentem inclinat uterus, facturus quidem prædictam respirationem.

Itaque utero grandiori facto, ac in tumorem elato, & retractis vasis ad sua principia suffocationem fieri certum est. Non enim verisimile existimo, uterum mutari, neque ut animal (ut multi censent) licet gratis odoribus deleatur, & fetidis horreat: nam id ex nativæ quadam sympathia habet, sicut cetera a membris delectari, & gaudere alimentis sibi familiaribus habent ex naturali principio ipsis insito, ac respicere ingrata. Neque ut membrum, quod moveri liberè possit, id efficiat: sed eo quod venis, arterijs, & filamentis alligetur varijs corporis particulis ob idque repletis illi, nil mirum est, si versus illam partem retrahatur. Quod sanè vitium Hip. appellasse uteri prolapsionem ad partem censeo: nam is est modus loquendi huius auctoris frequentissimus, quem reperies libris de mor. mul. Secunda porro causa ex ijs, quas retulimus, est frigidum uteri intemperamentum ex frigido semine per corruptionem facta, cor & uniuersum corpus refrigerans: quo sanè ad respirationem, & ad alia munia inepta redduntur membra, & cuiusque potentia: quo fit, ut ventilatione, ac refrigerio non egeant, sed sola sufficiat uniuersi corporis transpiratio, quod haud difficulter internoscimus expulsiū exiguitate, & languore, quæ cordis, aut alterius visceris frigiditatem, attestantur. Tertia uerò, & vltima causa, quæ alias non paucas complectitur est putridus, & corruptus seu venosus halitus à putrida aliqua substantia ex utero proficiscens intercludensque vias respirationi dicatas, compressis nimirum instrumentis vel obturatis meatibus. Quæ profectò causa prævalente magnas, & inæquales fieri respirationes contingit, sicut scēminas maxima angustia premi, donec excreto ubicunque flatu, aut humidum putridumve aliquod uteri purgamentum natura pellat, affectio subsideat. Ex qua itē causa, sicut ex plurimis alijs deterrima figura utero comparatur, & vitiatas subinde situs acquiritur, quibus mille accidentia ex ijs, quæ uterina censentur, scēminis succrescunt. Recenset quidem ea Hipp. lib. 2. de mor. mul. per hæc verba. Porro omnis occasio uteros appellere potest, si quid malè habeant: nam & à frigore pedum, ac lumborum & a saltatione, & terrore, & lignorum sectione.

Actius

A Actus tñ, & alias recensent causas, aut externas, aut manifestas, quas ego cōsul-
 to prætereo. At Hipp. referens eodē loco differentiās huius prolapsionis paulò
 superius inquit. Dico aut cum vteri ex loco moti fuerint aliò aliās allabuntur:
 ad quemcunq; verò locum allapsi fuerint, dolores ingētes incūbunt (& subdit
 partes recēdens) & si q; velicā contingat, dolorē exhibet, & urinā non suscipiūt.
 Et refert. Si verò ad sedē conuertantur vteri, secessus excrementa impediunt, &
 dolores occupant lumbos, & intestinum rectum ac inum ventrem, & podicē:
 ac pergit dicens. Si vteri ad sinistrā partē ac coxā declinauerit, dolor acutus, ac
 vehemens hēt lumbos, & laterum mollitudinem, ac ipsū crus, & claudicat.
 Et multò inferius prope finē libri inquit. Si cor strangulatur ab vtero, reprimi-
 & spiritus hēt, & anhelatio: & refert iterū. Si verò sub septo trāsverso ac p̄cor-
 dijs vteri sedere videant, de repente voce destituunt, & p̄cordia dura fiunt, &
 strangulatur, & dentes confert, & vocata non audit. Dixerat quoq; eadem Hip-
 po. ipse lib. de nat. mul. fidem præstans prædictæ sententiæ. Cum verò ad p̄cor-
 dia vteri allapsi fuerint, suffocant, & ubi frequenter acida euomunt, ad modicū
 tempus melius habet. Sic vteri obliquitatem, inflationem, & extorsionē ea quo

*Si ex fla-
 tu fiat
 accessio.*

B Sed, consideratione hac in parte dignū iudico expendisse, an seminis, & san-
 guinis menstrui corruptio (quā tantorum malorum cām esse diximus) intra vte-
 ri cauitatē fieri teneatur, ut hæc mala moliri possit, an potius intra eiusdem vteri
 vasa. Cui dubio dicimus, certum esse in vtrāq; parte has substantias posse cor-
 rumpi, & ea mala efficere. Censeo quidē in hac re vteri motus & peruerfiones
 plerunq; ex vasorum plenitudine à sanguine menstruo, & semine facta contin-
 gere: & ex hac etiam cā vteri strangulationes proficisci: licet ex flatu corpus vte-
 ri distendente non rarò succrescant. Verū ea mala, q̄ ex corruptione harū sub-
 stantiarum prodire conspiciamus, frequentius extra vasa corruptis semine, & sā-
 guine menstruo delapsis prope testes, & in vteri cauitatem, ac non purgatis: et
 si, ut mea fert sententia, non rarò intra vasa ipsa putrescere contingat, efficereq;
 febres, & alia accidentia, quæ diutius durant, q̄ vteri strangulatio, & pleraque
 ex ijs accidentibus, quæ subito cessant. Quippe coniectabile est, mala, quæ diu
 durant, & diuturnas virginum febres, potius ex causa conclusa, & intra vasa la-
 titante fieri, quā ex ea, quæ in vterum prolapsa haud difficulter purgari pos-
 sunt. Ex quo quidem arbitror, hystericas virginum affectiones maiori ex parte,
 ex semine, & sanguine menstruo intra vasa vitiatīs fieri (licet ex eisdem in vterū
 prolapsis aliquando rarius tamen id succrescere contingat: præsertim in gran-
 dioribus, & ijs, quæ salaces sunt vitāq; degunt sedentariam, ac virorum lo-
 quelis, & contactu vniuntur & gaudent) eas verò affectiones, quæ viduis acci-
 dunt, plerunq; ex eisdem substantijs in vterum prolapsis in eoq; putridis profi-
 cisci credendum est, ut euidenter constat ex vteri purgamentis, quæ plerunque
 habent, quæ suppressa facillē hystericum affectum accrescunt. At in sterilibus,
 & virginibus, ac solidæ contexturæ fœminis intra vasa huiusmodi putredines
 fieri, ut plurimum, arbitramur.

L 3

Sed

Sed dicet fortasse quispiam qui fieri possit, hanc substantiam corrumpi intra propria & naturalia loca, cum id accadat frequentius his substantijs dilabentibus, in loca non naturalia: praterquam quod si intra vasa putrefieri aliquo modo possunt, multò rectius id fieret in omnibus feminis parum ante menstruationem, concluso ibidem sanguine futuro menstruo. Cui dicimus, non minus id fieri posse, quam dum sanguis id febrim generatione intra vasa putrescit, prohibita naturali caloris ventilatione: sic virgines, & solidioris contexturæ viduæ, præsertim iuenculæ, cum ob naturalem meatuum constrictionem improbe purgentur, plerunque ea mala perpetiuntur semine, & sanguine menstruo intra vasa putrescentibus. Quo fieri arbitror, ut virgines frequenter febricitent, & febris non sit admodum intensa ac periculosa, quæ minera putredinis longè dilata sit à corde: at viduæ, & quæ viro videntur maiori ex parte refrigerentur, ut pote semine, & sanguine extra vasa prolapsis, & putredine vel corruptione alia refrigeratis. Contingunt quoque hæc eadem mala ex læuigato, & nimis uacuo vtero: sic etenim ad loca humida sese conuertit, & de capite ac reliquo corpore (immodico etiam labore) siccatus trahit: quod gravidis accidere quoque potest inopia alimentis, aut concalfacto labore vtero. Quamobrem Hipp. dictum esse celsol. 1. de mor. mul. in ediam esse vtero affectis perniciosam: inquit enim. Si suffocatio de repente accesserit. fit autem maximè his, quæ cum uiris non coeunt, & seniores magis quam iuuenibus. Leuiiores. n. vteri ipsarum sunt, fit autem potissimum tunc, ubi mulieri vasa euacuata fuerint, aut plus solito laborarit reficcata à labore vteri conuertuntur, ut qui vacui sint, ac leues: quæ sententia arbitror constare, ex siccitate, & inanitione proficisci non rarò vteri conuersionem, uel ad coxam, uel ad hepar, uel ad alias partes, ut Hip. mens est loco nuper citato: licet Gal. 6. de lo. aff. ca. 5. quodammodo huic sententiæ videatur refragari, docens vterum nullum situm mutare; Sed uelim ego hac in re monitum lectoris, ne intelligat Hip. id intellexisse, ut uerba sonare videretur, nimirum, uterum hanc, aut illam partem peruenire, sed quod uteri uasa uelligamenta ex ea parte distensione, siccitate, aut inanitione conuellantur, dannumque circa eandem partem inferant, haud secus quam si vterus eisdem partibus incumberet: nam hoc est, uterum ad humiditatem concurrere, ut Hip. refert. Quo sanè in sensu uolo intelligi loca illa Hipp. quibus docet huc, & illuc vterum vagari.

Contingit ultimò uterum affici, & prædictam suffocationem efficere, & defluxione à capite uel quauis alia parte facta, aut ex susceptione aeris, cuius ratione inflari conuiiente collo contingit. Dimitto etiam consulto hac in parte uteri inflammationes, & alios affectus, qui solent huic malo causam præstare, quorum suo loco latius meminero. Neque est ab re toto animo expendere causas quoque procatacticas, utpote quæ non rarò id malum efficere assuescant: ut frigiditas intro pellens superfluum humiditatem: exercitium plurimum dissolvens: quies, quæ plurimos generet succos, eosque crudos, ac uitiosos: somnus multus: ueneris intermissio: prauis succis alimenta, & grauiora animi pathemata, quæ proculdubio omnia uel per se, uel internis causis commotis, affectum hunc excitare nata esse comperimus.

Instantem huius affectus accessionem planè ostendunt ea ferè signa, quæ præsentè, licet non æquè intensa: nam dum imminet, torpor mentis accedit, pigrizia,

Signa
causarum
& affe-
ctus

A crurum imbecillitas, pallor faciei, & iam approximante affectu, sopor grauis desipientia, sensum interceptio, vocis priuatio, crurum contractio, quibusdam risus, alijs lachrymæ, alijs utrunq; plerisq; oris ventriculi morsus, cibi fastidiū, nausea, & omnium rerum veluti obliuio quædam: item pulsus debilis, cordis palpitatio, dolor capitis plerunq; cum rubore labiorum, faciei, & oculorū, qui etiam interdum sic clauduntur, ut aperiri facili nequeant: interdum tristantur, aliqui vertigine corripiuntur, aut stupent, vel, licet intelligant, & audiant, respōdere tamen non possunt, ut de vxore Pollemarchi retulit s. pop. Hipp. adest etiā quibusdam murmur in hypochondrijs: alijs venter tumet, & dolet ita, ut se erigere non possint: si plures cruciantur putredinoso halitu sursum ascendēte: crura quoq; imbecilliora ceteris partibus existunt: corpus etiam fit pigrum ad omnes motus voluntarios. Quæ omnia proculdubio augentur muliere iam suffocatione apprehensa, & contractis antrorsum cruribus, quæ in spinā veluti mortua cadit. Quibusdā cum sic afficiuntur, ab utero instillat seorsum quid, aut spermati simile aliqui insensibiliter, aliqui verò cum delectatione excrementum, præsertim plus iusto tractatis pudendis partibus, alijs effluit flatulenta pituita, alijs perfectò bilis. Quorum signorum Hipp. meminisse constat lib. 2. de morb. mul. per hæc verba. Cum vterus strangulat, spiritus autem aceruatim sursum commotus fuerit, & grauitas incubuerit, & mens percussa fuerit, & loqui nō potuerit, & perfrigeratio adeit, & spiritus offendens, & oculi obscurantur. Qua parte multa alia recenset prædictis simillima, quæ breuitati consulens prætermitto.

Cum ad rectam medendi rationem proficuum sit, nosse affectus ipsius causam, & occasionem, ob id nobis in animo est hac in parte huius affectionis cās exquirere. Primo quidem vteri intemperamentum ei malo principium præstare venabimur ex sequentibus c. quæ docent intemperantia vteri curare. Sanguinem tamen menstruum huic malo occasionem porrigere, ostendunt multa: prius menses præter consuetudinem, & tempus suppressi, vel ob improbam vitæ institutionem, quæ crassum generat sanguinem, vel quia ora uasorum, p. quæ labitur in vteri cavitatem, clausa sunt: quod ex priuatione signorum aliarū causarum facile discis: item māmæ turgent lacte, totum corpus graue efficit, & partes colli, & oculorū dolent, sic, & partes iuxta renes, & femora: rubent item supremæ partes ex calfacto retento sanguine, aut vitiatò alijs humoribus simul redundantibus. Quod noscimus, quia si causa noxæ frigida est, vniuersum corpus adeò refrigerat, ut vix sensu pulsum deprehendas; si acris materia extiterit, conuulsionem excitat: si melancholica, mororem, animi uerò deliquia ob accessionem vehementiam, & maximas refrigerationes, ac oris ventriculi uitia prouenire cōperies. At semen esse uitiatū, & abundās ostēdit uidua iuuenula, & boni habitus: ut accidētū alia uel accessionū uel p̄sentis grauitas, & seuitia, & cubitus casus: quia semē tenuius est, & acutius sanguine ipso. Sic. n. his, q̄ ex cā laborāt, pulsus, & respirationis priuationes, cōuulsiones, & animi defectiones magis insunt, ut Gal. refert. 3. de lo. pat. ab excreto multo, & tenui semine, aut pauco, & crasso prius liberat. Cōstat quoq; hāc esse cām, quia mēstruæ purgationes optimè p̄deūt, cū hoc m̄ laborās nullū, aut tenue p̄sentit leuamē. Verū an sit accessionis causa acēsus uteri, ut ferūt, uel recursus ad superiora, aut (ut rectiūs loquar) uasorū illius partis cōuulsio, cognosces, quia symptomata sunt suffocationi p̄xima,

L 4 ma,

ma, adest suspirium, vertigo, capitis dolor, cibi fastidium, nausea, ructus, & intestinorum crepitus: sentitur quoque grauitas, & compressio tanquam à rotundo aliquo corpore circa umbilicum. Quòd si uterus peruertatur versus partem anticam, posticam, lauam, aut dextram, fœminæ grauantur, dolent, tumentilia, uel pecten, uel vesica, aut rectum intestinum iuxta partem, cui uterus incumbit: quòd etiam manifestum sit, quia si fœmine eo tempore viro utantur, adeo os uteri puerum apparet, ut semen protinus dilabatur. Signa verò, quæ fœminas hoc modo affectas viuere, aut posse uiuere, vel morte periclitari ostendunt, sunt (præter lanæ floccum naribus appositum, aut vas aqua plenum super ventrem situm, aut speculum, quod halitum respirationis suscipiat) quæ ab sternutatorijs phar-
 cis desumimus: nam facillè cognosces fœminam uiuere, si appposito aliquo sternutatorio cerebrum quodammodo moueri uideatur: quod solet etiam mirum in modum monstrare pilorum auulsio è pudendis partibus facta: quòd si his non reducatur, periculum est, ne mortua sit fœmina, uel morti proxima. Periculosas item eas accessiones iudicamus, quæ præter id quòd frequentes sint, diu protrahuntur, & in quibus spiritus summe difficilis est, pulsus creber, & ordinis ex-
 pers, aut ex toto abolitus, summum corpus in his frigido sudore madescit, moxque syncopis sequitur, & aliquando mors. Minus profectò grane vitium est, in quo hæc, quæ proposuimus, omnia reperiuntur solo illaeso spiritu: & rursus minus graue, in quo sensus, & motio integritatem habet. Præterea, morbus is quibusdam quasi circuitibus, ut comitalis, mouetur: inciditque magis hyeme, & autumno, maximè calidis atque humidis puellis, & uiduis et, quæ præter morem viro diu carnere: item his, quibus sterilitatem medicamenta conciliarunt. Grauidis aut licet diu menses supprimantur, symptomata hæc raro accidunt, quæ humorum parte puriore fœtus in utero alatur, reliquum crassius in uasis ad uterum pertinentibus, in secunda ad partus expulsionem seruetur integrum, aut non ita corruptum, nisi aliunde, ut ex febre magna, aut prauo uitæ instituto, uel antiquo uteri intemperamento vitium accesserit: cuius sortis nonnullas fœminas cognouimus, quæ, & menstruantes, & utero gerentes hoc affectu haud leuiter premebantur. Accidit non minus id malum a pituita putri quàm plurimis fœminis, iisque nati grandioribus, & mensium, ac seminis annos egressis, ut sexagenarijs, & septuagenarijs. Quod etiã vitium ex hac causa commune est iuueniculis, quæ victu utuntur parco, & potu largo, atque intempestiuo aquæ aut vini.

*Curandi
ratio.*

*Accessio
vis prou
dentia.*

Cum dictum superius sit, causas huius affectionis in genere triplices esse, triplicem quoque medendi rationem fore, subinde necessum esse arbitror: idque non solum in uera curandi ratione a causa ipsa principio sumpto, verum, & in ea, quæ accessioni debetur. Non enim utique fas est, fœminas sic affectas ab accessione reuocare: sed aliter eas, quæ ex uteri retractu, aliter quæ ex semine corrupto aut sanguine menstruo, & vltimò, aliter eas, quæ ex flatu iacent: quod pariter prorsus ratione sub intelligendum est de singulis causis. Dictum quidem est, contingere omnem uteri strangulatum aut subuersa ipsius figura, aut mutato temperamento proprio uel humorum, uel ab halitibus ipsum distendentibus, aut principem aliquam corporis particulam irruentibus consortio venarum, aut arteriarum, vel quouis alio modo. Sic dum figura vitiata strangulatum infert (præter quàm quòd, ut Paulo placet, cibo potare eo tempore utendum non est)

A est) corpus eo situ locare oportet, quo citius ad pristinam figuram, & situm vterus reducat. Sic accliuibus scapulis, femora, ac inguina in declinem locū pro na locentur, quo tpe omni ingenio curandum est, vterum reducere frictionibus ventris deorsum factis, crurum vinculis, cucurbitis et siris, femoribus, ac inguinibus affixis: q̄ si prodesse non videatur, umbilico eas apponere oportet, quo citius ad proprium locum euoluatur vterus. Praestat et, sicut in omni alia causa, pilos digitorum pedum violenter euellere: sed feminas sic affectas citius ab accessione reuocat pilorū ē partibus pudendis violenta euulsio. Ceterū q̄a naturali quadā sympathia uterus prauos odores auersatur, amplectiturq̄, ac sequitur gratos: ob id natibus quae fatida sunt, ad mouere oportet, qualia galbanum, alia fetida, opopanax, castoreū, bitumē, oleū ex gagate, & sulphuris, vel pilorum, aut papiri cōbustio, & alia huius census, quibus et digerendi qd in vtero est, facultas inest: à quibus abstinendū esse consulo, si semina epileptica fuerit. Prodest et odor lucernarum extinctarū, aut fumus ex vltis plumis potissimū perdicis: fumus itē ex corio, & ē succo capilli quoq; hoīs, cornu cerui vel alterius animalis, aut ungula: lana itē combusta vel planus, quorū proculdubio uapor seu fumus sua feditate vterum trillatum descendere coget, ac spiritū animāle, & vitalē quasi sospitos spergeficit, & vaporem infestissimum, à quo vterus deturbatur, resoluit contentq; . Possunt itē ex praedictis vsui parari medicamenta, exceptis pice liquida, galbano, & similibus. Sic vtile paratur immedicamentū ex galbano, aceto dissoluto, & ex castoreo, ana. .j. sē sulphure viuo. .j. j. aut i eodem aut conizā, & iuniperi baccas incoquere. Itē vinum in quo ferbuerint camedrys macerata, & betonicae folia trita. .j. i. munda exhibita. Sed Gal. 6. de cōpo. phar. lo. refert .j. i. agarici potui datā mirificē conferre. Itē sternutamentum mouere plurimum cōfert puluere tenuissimo piperis, nasturtij, & sinapis, quo plures pristino statui restitutas cōspeximus. Verū q̄a plerūq; caput ab accessione male hēt, ipsum, & spinā inungere cōuenit oleo de spica calido, vel alio cōsimili, Vtero ad mouenda interim sunt, q̄ grati, & boni sint odoris, tū quia prauos halitus ad se elliciūt q̄ tali existunt, natura gratū insequente: tum uerō, quia & ipsos discutunt, & partes pudēdas aperiūt, ac laxāt, ut aliquid facilius expurgari possit, p̄terq̄ q̄ uterus ipsum sympathia quadā ad se reuocant, & ob id ad naturalē sitū reducūt. Neq; credēdū ex hac causa est, vterum animal esse sensus, & motus particeps, sed quia rebus à natura productis oībus inesse animā appetitiuā cōstat: vñ, & plantas animalia ob id esse, ac appetitu cognito ad sibi conferentia moueri censendū, quo appetitu allectus vterus insequit bonū odorē: & ob id sit, prauos halitus dissipare, & qualitate odoratorū tueri propriā naturā, nō qd odorē percipiat, sed quia odorata oīa hēant certā qdā naturā ipsi summo pere gratiā, & amicā. Eadē quoq; rōne hepar dulcia affectare, heliotropiū ad Solis accessum, magnetē septentrionē versus se inclinare uidemus: qua et uterū odorata confectari, grauiter olētia abhorrrere experimur: qd in mēbris nostri corporis vtile amplexantibus trahentibusq; , & contrariū reiicentibus verū quoque existit. Sunt autē ea, q̄ id munus praestāt veluti ziberū, bombax muscatus, uel gossipiū muscho conspersum, oleū muscho perfusum, galia muscata, alypta muscata, & gariophyllū, atq; alia huius cēsus uelut oleū iasmini, naphthē, styracis, cinnamomi, itē cinnamomū ipsū, cost⁹, calia, lignū aloes, diābra, & dimoschū.

Sed

*Aut po-
ne antea
paruas
cucurbi-
tes affi-
gere.*

Sed immittere oportet in sinum pudoris, & vteri cervicem, quæ ex his cõpossi-
m prodesse comperimus, quale illud est, quod recipit alyptæ musca & .j. ligni
aloes, gariophyllorum ana .j. musci, ambre, ana g. v. excipiantur oleo de spica,
additis sty race, balsamo, aqua muscata, vel alia odorata, cum ladano fieri pos-
sunt pelli, qui in vteri collum immissi plurimum prosunt: præterquam in vir-
ginibus, quarum pudendum sat est inungere.

Sed antequam aliàs huius affectus causas aggrediar, recēdere hac in parte mi-
hi visum est, qua curationis lege Hipp. ab accessione reuocabat fœminas, qui-
bus uterum à sua sede dimoueri contingebat. Quam sanè si quis attento animo
intueatur, reperiet facillè cõsimilem esse in omnibus ferè huius autoris scriptis.
Nam lib. de nat. mul. postquam vteri varium situm recensuit, inquit. Postquam
igitur allapsi fuerint, tepefactoria adhibeto, & graueolentia suffito, infra autem
odorata, & castoreum bibendum dato, & conizam: vbi verò deorsum processer-
int, infra graueolentia suffito, sub nares autem odorata, sedatis autem dolori-
bus pharmacum bibendum dato. Qua sententia videtur, vniuersam curationē
complexum fuisse, sicut lib. 1. & 2. de mor. mul. qua parte instituit curationem
ex fomentis, lana, spongia, aut vesica oleis imbuta, & vteris adhibita: ex ijs etiā,
quæ modicè flatus discutiant, & vteros ad inferiora euocent. Sed potissimam cu-
randi rationem, adducit idem autor lib. 2. per hæc verba. Caput quam citissimè
radito, & per fasciam supra umbilicum, si opus fuerit, deligatam detrudito: da-
to autem castoreum, & conizam, & ruthæ aquam, cuminum æthiopicum, ra-
phani semen, sulphur, myrrham: ad nares graueolentia, ad vterum beneolentia
adhibeto. Cuius census millies repetitam eadem parte reperies curationem: cē-
seo quidem mixtam confusamq; Hipp. ex curatione, & reuocatione ab acces-
sionibus afferre non rarò curandi rationem. In qua re Hipp. laudo consiliū, qui
fœmora, & inguinæ inungit, quod virginittis præcauendæ gratia, virginibus
proficuum fore censuit: etiam si alia ratione id fecerit autor, nimirū, ne calidio-
ribus pharmacis excandescant plurimum: inquit. n. lib. de natu. mul. virginem,
vt viro cohabitaret, persuadeto, ad vterum verò nihil adhibeto. Atq; hæc sunt in-
ter alia pleraq; quæ consultò prætermitto, ea, quæ ab Hipp. ad uteros è sede di-
motos afferri constat, mihi tamen arridet magis eam curationem instituere, &
eidem, in reuocandis ab accessione fœminis, inniti, quæ semini, flatui, & sangui-
ni menstruo corruptis proficua esse constet. Fœminæ, quæ ex sanguinis men-
strui abundantia ob retentionem, hoc affectu premuntur, non vtcunque leuari
ab accessione desiderant: raro enim eis prodesse conspiciamus fœtida, neq; odo-
rata, rariùs adhuc cucurbitas, quinimo obesse plerunq; assolent. Quamobrem
eas reuocare oportebit, si periculum suffocationis immineat, sanguine misso ex
talo: nam licèt in alijs causis id auxilium tentare nefas esset, sanguine tamē, aut
semine suppresso, præsertim in fœminis quibus sanguinem abundare cognosci-
mus, tutissimum, & utilissimum existit præsidium: nullo enim alio vires onere
pressas, vias nimia redundantia obæcatas, & suffocationis periculum leuare ci-
tiùs poteris. Præterea, clysteria immittere frequenter præsidio est, præsertim si ea
repperint medicamenta, quæ vterum respiciunt, qualia diximus. li. nostro de
psid. indi. Cui quoq; vsui glandes p sedē inijcere oportet ex cumino, ruta, hiera-
simplici, & carycis. Idē beneficiū præstare cognoscim⁹ cucurbitas suris, fœmorib⁹,
& pro-

A & prope inguina cū scarificatione, aut citra ipsam affixas: quo quidem casu eas umbilico apponere citra deiectū, vt vulgus oīno imperitū efficit, periculosum & graue plerunq; est, ob plenitudinē vīarū vteri. Inungere quoq; ventrem inferiorē, & totū vteri regionē, pectinē, & lumbos ijs, quæ humorem, & flatūs attenuent, & vias dilatent, necessariū, & vtile experimur, ut per vteri meatū aliquid erumpat, quod facilius accessio quiescat. Est autē huic vsui aptum medicamentū oleū irinū, de croco, de anetho, de lilijs albis, de ruta, ac de nardo. Admiscere ē oportet, q̄ modicē ventrē & vterū ipsum laxent, veluti oleū amygdalarum dulciū, vel sesaminū, ne si humores tenuari cōtingat, maiores efficiant dolores ob maiorem p̄dictarum partium tensionē. Vteri et osculo, quæ trahendi, & expurgandi ab eodem vites obtineant, adhibenda sunt: virginibus facta iuxta inguina inunctione: corruptis verō inunsiis intra vteri osculū pessarijs, q̄ ex nuper dictis medicamentis faciliē parabis, quorū copīa hoc cap. paulō inferius abūde reperies. Vinculis itē & ligaturis fortissimis vtendū erit, præsertim prope digitos pedum, & suras, ac fēmora, quo facto sepe humores ad inferas sedes euocantur, & halitus retrahuntur, quibus ocysimē accessiones cessare solent.

B Quod si ex retento semine accessiois vehemētia suboriat, citra vllam vacationē rem oīm agere oportebit: præterq̄ clysteribus iniectis, vel suppositorijs, quæ irritata aluo aliquid ab vtero, vel circūvicinis partibus extrahere sint nata. Conficiuntur quidem ex hiera, mercurialis succo, & oleo liliorum: à quo auxilio ligaturis partiū extremarū, frictionibus, pilorum anuersionibus, & vellicatis quoq; narib. & auribus, vociferationibus, tandē motibus vehementibus excitare laborantem oportebit. Cucurbitas ē affigendas esse p̄dictis partibus consilii rei rō. Sed cauere hac in re oportet à titillationib. quas multi cōsulant in partibus pudendis fieri, et si fēminas ob id leuari excreto semine conspiciamus: nam scimus nō licere medico christiano. Est autē utile pessarijs, & inunctionibus p̄dictis uti, donec vi medicamēti aliquid spumose, aut aquose substantiæ excernat. Conficiunt huic vsui pharmaca hac lege: excipe alyptæ muscatæ. ℞. iij. ligni aloes, gariophyllorum. ana. ℞. smucei, ambræ. ana. g. iij. excipiant oleo de spica, & cū cera fiat pessarium. Cui consimile efficies, si exceperis galliæ muscatæ. 3. j. cinnamomi, & gariophyllorū. ana. 3. j. ambræ, muschi. ana. g. iij. ladani, styracis, ana. qd sit satis, ut fiat suppositorium. Inungere quoque pudendū oportet, & vteri externā regionē oleo costino, de lilio, de spica, laurino, uel ex angelica herba confecto, additis puluisculis nuper dictis. hē umbilico emplastrū aliquod p̄ matrice appones, uel gummi aliquod ex ijs, q̄ nuper ex India asportantur, ut carannā, techamachā, uel balsamum, aut styracem liquidam, uel oleū de styrace, & alia non pauca, quæ caliditate pollentia, huic vsui non parum cōferunt atqui salacibus fēminis calidis, aut uirginibus admiscenda esse ijs, quæ utero possint, alia q̄ caliditatē contēperant, consilii rei rō, præsertim si eis addideris q̄ semen minuant, aut refrigerent, ueluti agni casti semen, corallum præcipue album, rosam albam siccam, semina plantaginis, & eius naturæ alia. Verum ī uiduis, & grādiōrib⁹ fēminis, & ijs, q̄bus pituita, & reliq̄ succi frigidi abūdāt maioris efficacīe emplastrū efficere oportebit. Cui⁹ naturæ est id, qd recipit alyptæ muscatæ, pulueris gariophyllorū, & angelicę. an. 3. j. pulueris rosarū, et coralli albi an. 3. j. terebinthinæ, & cerę, quod sit satis, adde ambrę g. iij. Itē aliud conficies

*Si ex semine
fiat accessio*

ficies, quod recipit galliæ muscatæ, diambre. an. g. x. pulueris santholorum om
niū, coralli, agnicasti, & rosarū albarū. ana. ʒ. j. ladanī depurati quātū sit satis,
ut fiat emplastrū. Aliud ē parabis vsui p̄ficuū, qđ recipit olei naphthæ. ʒ. j. theria
cæ magnæ. ʒ. j. pulueris galliæ muscatæ. ʒ. l. zibeti. ʒ. j. pulueris seminis angeli
cæ, cinnamomi, & gariophyllorū, ana. ʒ. galbani. ʒ. ij. ladanī depurati quod suf
ficiat. Aliud etiā maioris pretij cōficies qđ recipit, olei cinnamomi, de spica, &
balsami. an. ʒ. ij. pulueris cinnamomi, macis, gariophyllorū, & seminis angelicę
ana. ʒ. j. galliæ muscatæ, alyptæ muscatæ, diābræ, & diamusci. an. g. v. ceræ, & te
rebēthine qđ sit satis. Ex vsu quoq; erit emplastrū ex sola theriaca cōficere, qđ tā
to erit efficacius, quātō venenosior extiterit humoris natura. Qđ si alias velis ex
periri emplastrorū formas varijs vsibus p̄ficuas, abūdē paulō inferius reperies.

At si ex flatū vterū distēdente euertereq; eiusdē figurā, ac circumstantia mē
bra cōprimēte, in accessione fœmina incidat, curandum est omni arte flatu
discutere. Primò quidē clysteribus discutientibus, qualia superius diximus: qui
bus addes oleū rutaceū, aut irium, vel in quo cuminū ferbuerit, vel anisum. In
unges quoq; infernā aluum prędictis oleis, pręsertim si eis addideris theriacā. B
Profunt etiā fomenta ex decocto chamæmeli, anethi, thimi, fœniculi, rutæ, rtemi
siæ, anisi, cumini, baccarum lauri, & similibus. Pessaria itē adhibebis, potissimū,
quibus additū sit aliqd flatū discutiēs, velut est puluis cumini, rutę, anisi, cashe
cinnamomi, ligni aloes, & costi. Qua sanē cā existente incredibili efficacia con
ferunt cucurbitæ circa scarificationē frequēter vmbilico affixæ: quinimo cēseo
ob hanc cām solum ventri esse apponendas: nā licet muliercularum vulgus in
quavis suffocatione eis utatur, p̄ficuas magis hac cā p̄valente esse arbitror. Qua
p̄ cautē in alijs causis, aut nunquā eis vtendum erit: quā itē cā existente vmbili
co emplastra pro matrice apposita mirum in modum prosunt, quæ faciliē para
bis addito prędictis aliquo ex discutiētibz puluisculis, veluti est lignū aloes,
cuminum, anisum, cinnamomum, costus, chamæmelum, & eius naturæ alia. Ex
quibus ē sacculum parabis, & ventri calidū frequenter adhibebis, sicut & ple
raque alia, q̄ flatibus discutiendis idonea reperiuntur, ac nos adduximus li. no
stro de pręsid. indica. Cōsideratione quidē dignū existimaui hac in parte expē
disse, an sic affectis vinum porrigere tutum sit: quippe Hipp. id v̄r consuluissē li. C
i. de mul. natu. dicens. Si vteri ad hepar accesserint, muta de repente fit mulier,
& dentes confert: tum manibus subtus depelle, ac infra hepar, & hypochondria
fascia mulierē cōstringito, ac ore aperto vinū odoriferum infunde, naribus gra
ueolentia offer, subtus verò aromatis bene redolentibus suffito. Quā snā freti
non desunt qui Auicē. erroris accusent, qđ vinū mulieribus hysteris inerdī
xerit, his verbis. Caue ne des eis in potu vinum, qm̄ aqua est eis conuenientior,
neque carnes grossas, & ea quæ addunt in carne, & spermate. Verū si quis rei
huius veritatē, & vtriusq; autoris mētē æqua lance expendat, reperiet, neque se
bi accessionibus ob virtutis languorem, & spiritus coarctationem syncopis cre
bro coincidere solet: quamobrē Hip. accepta à virtute defecta indicatione, quæ
cæteris præpollet indicationibus, pro reficiendo uirtutis robore, aperto egrota
tis ore uinū odoriferū instillari iubet. Aui. verò ex sanguinis redūdātis, & coa
ceruati in vtero spermatis copia præfocatio oborta fuerit: tū ea quæ sanguinem
& sper-

A & sperma in viduis uirginibus, ac reliquis ad iugent, rectè vetat, qualia sunt cz-
ro, & vinum. Verùm si uteri præfocatio ex obstructione venarum eius a sangui-
ne crasso facta prouenerit, tum ego aquæ potum penitus dissuaderem, vinūq;
album, tennē & dilutū magis vsui esse arbitarer, præcipuè si in eo, vel in aqua
ei admixta; quæ menses mouent, ut libanotis, schinantum, pulegium, & grana-
iun perit prius macerata fuissent.

Leet plerūq; facile videtur veram genuinamq; huic affectioni curationem
ascribere, mihi profectò difficillimum uidetur: adeo ut scribentium incuria, &
medentium negligentia totum morborum uteri negotium, alioqui grauissimū
mulierculis, ex vulgi opinione potius, quàm medicis, nec peritissimis quidem,
committendum sit. Quamobrem ne in turpi hæc ignorantia versemur, paulò
diligentius rem hanc expendisse oportebit. Curandi igitur ratio in uteri suffo-
catione tota complectitur partes ac methodos, quot causarum differentias affe-
ctus ipse. Atqui cum is proficiat vel ex sanguine menstruo adaucto, putrido,
& nulle alijs modis uitiato; uel ex semine corrupto, aut exuperanti: aculimò
B ex flatibus ab eisdem, aut alijs humorum spurcijs proficiscentibus. ideo pro-
fectò quid unaquæq; causarum præ requirat, seorsum pensandum est. Dimit-
to etiā hac in parte externas, & manifestas causas, inflammationes, & aliòs pe-
culiāres uteri affectus, quia eorum latius meminero paulò inferius.

Si uero menses abundauerint, & huic malo principium præstiterint, non q-
dem ut suppressos menses eos tractare oportet: sed considerandum prius est, pu-
truerit ne sanguis, alteratusue fuerit, uel aliud contraxerit (præter copiam) ui-
tium: nam his profectò rationibus dixit Hipp. lib. de mor. mul. feminas ex ute-
ro suffocari. Inquit loquens de sola mensiū suppressione. Hæc igitur causa est,
ut ipsi sint occlusi (& subdit) quin suffocatio alias atq; aliàs ipsi irruit. Et refert
mala, quæ tertio, aut quarto mense feminis accidere possunt, si illis menses sup-
primantur, aut ob externa uel internam causam retroierint, ut accidisse forori
Liciniæ reuulit Hip. lib. 7. pop. tex. 86. cui uomitus omniumq; accipiebat super-
uenerunt, & cruenta per uomitum excretiones, & strangulatio ad cor procede-
bat. Qui sanè affectus sanguine misso facillè sublidet. Verum sanguinem mitte-
C re non utcumque licet, sed cum præ copia fluere menses desierint, primò ex bra-
chijs ipsum detrahare oportebit, postmodum uero ex talo, idq; tempore, quo
menses fluere assueuerant. Postea in medio mensis ex altera saluatela tutissimū
est sanguinem mittere, ut medicamentis menses ducentibus subsit locus; qualia
hæc sint, c. de mensium suppressione reperies. Confert item tam ijs, quibus san-
guis ex obstructione abundat (quo tempore ex talo primitus sanguinem mit-
tes) quàm alijs, quibus (ut dictum est) ex copia menses non fluunt, paucissima ui-
ctus ratio, & moderatum exercitium uicinationibus præmissis, ut omni arte qd
superat naturæ uires auferatur, & in his quæ crudo sanguine abundant, arbi-
tror crurum scarificationes sufficere. Quippe id consuluit Auic. prohibens, ne
nimis albis feminis audacter sanguinem fundamus, uel in his quæ crudis abun-
dant, quod etiam Gal. dixisse constat: nam ex copioso sanguine extracto præter
id quod qui superest, recrudescit, maior fit in utero obstructio confertim ad ip-
sum euocato sanguine. Atq; feminas sic affectas ex toto esse abstemias, id est,
uino non utentes uolumus: præterq; si cruditatis aut uentriculi rōne eo opus sit.

Quod

Quod si impacti hærentesq; in vijs uteri menses extiterint, ibidem putrescere, **A**
& suppurari profectò necessum est, id quod apertissimis verbis scripserat Hip-
li. i. de mor. mul. dicēs; Quibusdā suppurati fiunt menses, vbi per duos, aut tres
menses moram contraxerint. Verùm suppurationem tripliciter terminari eodē
et loco refert, sic scribens. Si melius habitura est, menses ipsi erumpunt in pudē-
dum, & procedit pus, ac sanguis, & procedit graueolēs ad septem, aut octo, aut
nouem dies, (& subdit.) Si uerò non contingat, vt menses ipsi in pudendum pro-
cedant, suppurati facti, ad partes supra inguē, iuxta lateris mollitudinē erūpūt
citra tuberculum, vtpote pure rupto, & illa parte purulencia, graueolencia pro-
cedent. Cui addit aliā suppurationis rōnē, q̄ in tuberculum degenerat, dicens;
Quibusdam vbi bimestres, aut trimestres, aut diuturniores fuerint mēses, & ad
lateris mollitudinē allapsi fuerint, cū non suppurati sint menses, velut tuber-
culum sit supra inguen, sine capite, magnū, rubrum, & vulgus mediocrū igna-
rū quid hoc esset, iam sæpe secuerunt, & sic in periculū induxerunt. Iuxta quos
suppurationis modos ego et censeo menses diu detentos uel diminutē, aut cor-
ruptē prodeuntes posse aliud uitium contrahere, quod nōdū suppurationē at-
tingit: sed cū parte aliqua ex uteri uasculis reconduntur, putorē quendā, & vi-
tium contrahunt, à quo facilē uterus excandescit, & alterat. Qua quidē rōne ex
quaui interna aut externa occasione ad uterinā suffocationē facilē mouent ob
hælitus indomitos partes principes adeuntes, aut uterum distendentes alteran-
tesve: quod profectò dānum pleraq; fœminas pati, mihi est experimento com-
probatū. Cuius affectionis signa ut Hip. doceret, hæc refert. Dolores. n. incidunt
in pectinem, & pulsationes fortes, & contractū non sustinent. Dixerat et supe-
rius. Et dolet quidē reliquū corpus, maximē verò collum, & spinam, & lūbos,
ac inguina. Cui sanē affectioni curationē institues consiliū Hipp. insequens,
lib. i. de mor. mul. qui loquens de ijs, quæ probē à partu nō purgantur, inquit.
Si uerò uteri angustioris ipsi fuerint, & puerperij purgationē non emisserint,
inflāmur, & si nō curetur breui, oīa magis ipsam affligent. Et odor malus erit
& exitus intumescit, & si non inflammati fuerint uteri, sua sponte exit malum
grauolēs, & liuidū, aut nigrum grumosum, & mulieri puerperij purgamenta
purgantur. Qua snia docet sanguinē mēstruū ex partu, aut ex alia quauis causa **C**
retentū, uel uterū inflāmare, aut ipsum putrescere ea putredine, de qua nunc ser-
mo habetur. Cuius medelam scribit subdēns. Qñ verò nō exit, sed mulieri mor-
tē portendit, nisi quis breui uenā secet, aut vētrē einolliat. Præstat aut clysterem
adhibere: si verò ad vomitū facilis fuerit, et vomitū inducere, melius aut est lo-
tiū ciere, & exsudare. Quibus sanē verbis vniuersa medēdi rō corrupto sangui-
ni p̄ficiua ab eodē Hip. in totū scribit. Nāq; nulli fore dubiū arbitror, quin mox
ab accessione sanguinē protinus mittere oporteat, nō tñ ea copia, q̄ posse extra-
here, dū citra uitium sanguinē redūdare cōperiamus: cōsulēdū. n. est lapsis corru-
pto sanguine viribus. Postea verò, q̄a rōni cōsonū existit putrescētē sanguinē in
paruos degenerare humores; vētrē duobus modis emollire oportet: clysteribus
nimirū, qui autēperādi purgādi, & emolliēdi vires hēant, vt vicinā rōne aliqd
puterū ipsis iuuatibus ex putredinoso sāguine stillare possit: & purgātib' phar-
baro, sēna, & agarico purgationes mille modis istituere poterimus, vt p̄cedētib'
bus

Abus cap. abundè dictū est, sed laudo paulatim vterū expurgare, per pessaria ex mercuriali, & ventrē ipsum ab assumpto mercurialis decocto. Laudat quoque vomitū Hip. quo parū raro, & cautè uti consulo. Præstat et vrinæ mouere, si affectus recens fuerit, ac si inueteratus sudorē enocaret: et si in nouis affectib. leniter ad tēpus sudare tutum, & vtile sit, præferim, ex decocto lupuloyū, chamæmeli, pentaphylli, capillorū veneris, florum papaueris erratici, & buglosæ adungere tū ventrem oportet oleo violarum, amygdalarum dulcium, & de seminibus cucurbitæ, & melonis. Prodest quoq; in vterum immittere, q̄ consimilē pbineant virtutem, ut rosarum decoctum, violarum, & hordei cum saccharo.

Quod si sanguis retentus ex caliat extareseatq; vterus quoq; exurit, & subinde in p̄dictum incōdit affectū. Qd̄ op̄imè aduerisse Hip. cōstat, qui loquens de retentis men. lib. ij. 2. de mor. mul. sic ait. Anxia erit, & aliās, atq; aliās se ipsam iactabit, & animo deficiet, & pituiā vomet, & sitis fortis ipsam corripiet, nimirū dū exurit venter ab vteris sanguine plenus, & ad contactū dolebat. Et referēs huius causæ signa inquit. Et aliās, atq; aliās febriet, & vteri aliās, atq; aliās murmurabunt: dū videlicet sanguis in ipsis cōmouet, ac discutrit, & venter cōsuetomō non secedit, neq; vesica, urinā excolabit, maximè cū vteri ad stomachū, qui neruosus est, mulieri allapsi fuerint, & ad ventrē irruerint. Dolet spina & totū dorsum, & lingua ipsius refrenat, & hanc nō clarā hēt, & animi deliquiū adest, aliquibus et vocis priuatio, & stomachus morder, & flaua bilis exit, & spūs offēdens, & anxia est, & iactat se ipsam, & ardet: postq̄ aut̄ transmutati fuerint, & vesica tenuē sanguinē ab vteris trahat, tunc vrinæ mingitur rubra, & dolet quidē reliquum corpus, maximè verò collū, & spinā, & lumbos, & inguina. Quibus verbis apertè constant signa, quibus sanguinē exuti, ac effruescere intra vterū faciliter cognoscimus. Quod cū cōpertum nobis fuerit ocylsimè sanguinē mittere, idq; copiosè teneatur: p̄cipuè quidem ex venis tali, aliquā cōfertim, aliquā lente, ac paulatim. Cui vsui confert plurimum p̄missa vacuatione p̄dicta, ex altera, aut vtraq; saluatella sanguinē mittere. Per moderatas et potiones ad frigidum nonnihil vergentes, & p̄ alimenta huius census corpus ipsū, & sanguinē contemperare, & mitescere oportet: sic esus lactucæ, portulacæ, cucurbitæ, & iura pullorū, & carnes, id beneficiū largiuntur: itē potus aquæ hordei, buglosæ, acetosæ, borraginis, cichorij cum succo granathorum, & saccharo. Præstat quoq; corpore manna, aut cassia leuiter purgato lactis vsus, vel feri cū saccharo, aut ex infusione senæ, vel florum cordialiū. Itē clysteria ex decocto maluarū, prunorū, hordei, ac saccharo, & oleo rosarū, ac violarum prodesse plurimum scio. Inunctiones quoq; p̄ficuæ sunt ex oleo amygdalarū dulcium, vel de seminibus cucurbitæ, & melonē cū vnguento rosaceo. Sed attento animo pensitādū est, ne nos causā decipiat suspicantes sanguinis feruorem esse: quippe si is non fuerit, nō est oīno tuum frigida hæc prælidia vtero admouere: quāobrem donec ex toto certū simus de causæ natura, à tēperatioribus initandū est, & paulatim ad frigida progrediendū. Verū in oībus his vteri suffocationibus, quæ ex sanguine prodeunt, mirabile fit prælidium, si menses probè non fluant, ex hæmorrhoidibus bis, aut semel in anno sanguinē extrahere affixis hirudinibus.

Verū si seminis abundātia, vel corruptio cām huic malo præstiterit, maiori opus est diligētia, & maturiori cōsilio. Solēt quidē virginibus, & ijs feminis, que

*Si semē
causam
huc ma-
lo præ-
stat.*

quæ nimis salaces sunt, ex sola seminis abudantia hoc malū effici, sicut in gradioribus, & magis salacibus ac viduis, & alijs, q̄ viri cōgressū experiri allue-
runt, ex eodē corrupto, aut quolibet vitio. In virginibus verō, q̄ aut salaces nō
sunt, aut vigesimū quintū annū modū nondū p̄terierunt, raro hæc vitia ex cor-
rupto semine oriri contingit: licet aliquñ vel ex nimio hoīum consortio, vel ex
prauo vitæ, & victus instituto illis semen corrupti cōtingat, & grauissima suc-
crescere accidentia: in alijs tñ oībus, & ex abundanti, & ex corrupto. Quibus
proculdubio medela esset plerunq; viri consortium, & accessus: verū quia nu-
bere oībus, aut non libet, aut non licet, alijs p̄sidijs curandum est, seminis eo-
piam minuere, & eisdem feruorem ac putredinem cohibere: q̄ si id per difficile
fuerit, innitendum est corrupti illius humoris resolutioni, & euacuationi.

Primum igitur oēs sic affectæ fœminæ victu vtantur tenuissimo, & maxime
extenuante, frigido et qualis lactuca est, & portulaca, panis ordeaceus, pisces,
& similia cum largiori aquæ potu. Ieiunent quoq; ac laborent, & lasciuum con-
sortiū ac loquelā vitent. Quippe ex veneris apprehensione, impudico sermone
virorum elegantis formæ aspectu, vino generoso, carnibus, & ceteris sanguinē
ac semē augētibus, facilē semē excreuit, aut mouet, & non excretū subinde pu-
trescit. Quo circa omni arte curandū est, ea adhibere, q̄ semen adhuc genitū mi-
nuere nata sint. Semen quidē (inter pleraq; alia) genitum cohibet, & gigni pro-
hibent diaciminū, diatriopipereon, diacalaminthæ, semen agnicasti, rutæ, mē-
thastri, quorum puluis sumptus vel lumbis aspersus proficiuus censet. Cui p̄si-
diorū sorti consimilē gratiā præstant ijs fœminis balnea, præsertim naturalia.
Prodest quoq; viticis semen torridum, ac folia, & flores, similiter cannabis se-
men, lactucæ, & nymphæ radix cū aqua plantaginis vel chalybeata. Cōfert nō
minus laminā plumbeā lūbis affigere, præter q̄ in nuptis, quæ parere amant: se-
men itē, & succus plantaginis, & puluis conchularum eidem parti appositus.
Itē ex prædictis herbis refrigerantibus super renes quasdam arefactas spargere
oportet, vel eardū puluisculū cū folijs rutæ, viticis, calaminthæ, rosarum, & simi-
lium, licet Aetius lumbis nocere referat: cum hoc tñ Gal. li. 6. de san. tuen. c. 14.
nō solum hæc, verū, & multa alia commendata relinquit, inter quæ assiduū
vsum viticis, & rutæ probauit. Cōfert itē. 3. s. castorei robustis fœminis præbe-
re, qđ cautē efficere oportet. Iuuat nō minus pastillus, qui recipit seminis rutæ,
agnicasti, & vriticæ. ana 3. s. seminis lactucæ, portulacæ, plantaginis, & papaue-
ris albi. ana 3. j. seminū coriandrū torrefactorum, & cannabis. ana g. iij. diacala-
minthæ. 3. ij. cornu cerui vsti, seminis rosarū, santhalorū, & corallorum. ana g.
v. seminū mellonū. 3. iij. sacchari dissoluti in aqua rosarum quantum sit satis, vt
formēt pastilli: quorū 3. s. cum aqua plantaginis pōrriges. Præstat itē p̄dictum
vsum cōserua, q̄ recipit terebinthinæ abietis lotæ in aqua artemisiæ. 5. s. seminis
danci, agnicasti, pulueris cinnamomi. ana g. viij. cum modico conseruæ anthos
fiat bolus. Itē purgando semini idoneum est medicamentum, qđ recipit terebin-
thinæ abietis. 3. iij. agarici trochiscati. 3. j. seminis dauci, cannabis, pulueris li-
gni aloes. ana. g. viij. cū saccharo fiat bolus. Porphyrus itē citante Stobæo sermo-
ne. 68. tradit salicis fructū cum vino propinatum libidinis impetū marcore affi-
cere. Sed ante eū Plin. li. 24. c. 6. scribit, folia salicis cantusa, & epota intemperā-
tiam libidinis coercere, atq; totum eius vsum auferre sæpius sumpta. Quin &
eodem

A eodem loco prodit, si cinis myrice arbusculæ bonis castrati vrinæ miscetur, vel in potu, vel in cibo venerē finiri. Idem lib. 26. c. 10. tradit, nymphæam, heracleā venerem in totum adinere, & radicem quoq; eius genitalibus illitam inhibere venerem. Ferunt etiam lactucam idem lib. efficere, eo quod Pithagorici ipsam eunuchion appellare consueverint, q̄ scilicet ineptos faciat ad venerem. id q̄ Athenæus quoq; scribit. Autor etiam geoponico lib. 12. c. 24. prodit, mentham rebus veneris ineptam esse. Quod tradiderat Marcellus, qui ponit menthā inter herbas veneri contrarias: quibus astipulatur antiquus ille prouerbialis versus ab Arist. relatus probl. sect. 20. c. 2. menthā in bello, neq; edito, neq; serito: cuius rationē reddit ipse Arist. q̄ ea herba membra refrigeret, eo argumento q̄ semen genitale corrumpat: frigus autem fortitudini, & audaciæ, q̄ bello necessaria sunt, maximè aduersatur. Cui adstipulatur Gal. qui. 6. simplici. scribit, q̄ cōceptum vitare dicatur. Sed his omnibus non obscure aduersatur Diosco. lib. 3. c. 37. scribens, eam herbam calfaciēdi vim habere, atq; venerem stimulare: cui Paulus consentiens tradit, eam in tertio ordine esse calidam. At Hermolaus Barbarus hanc controuersiam dirimens Corollarii cap. 363. Fieri potest, inquit, vt per se calfaciat, & per accidens refrigeret, vt in aliis plerisq; frequenter conspicitur. Cuius sententiam proculdubio censeo verissimam esse: nam præ calore cōsumptis humiditatibus, & semine ipso, facilè qui ea vtuntur, & à venerē abstinēt, & refrigerantur. Verū Arist. dicendum est, non quod refrigeret, nocuā esse miliubus, sed quod multam sanguinis profusionem comesta, si quis vulneretur eo die, proritat, vt non contemnendi autores referunt, quapropter militibus pugnaturis noctuam arbitrantur.

Ceterū, quia non sat est in prædictis affectionibus, alioqui grauissimis, seminis generationem prohibere, sed genitum iam resoluerē, aut euacuare: ob id curandum omni ingenio est, id efficere. Quod sanè Auic. exequitur opus, vomitibus prouocatis: quia tamen ratione id fiat, ignoro, ac censeo rarò, aut nunquam vel cum maxima præmeditatione faciendum, licet Hip. aliquādo id consuluisset constet, vt lib. 1. de mor. mul. scribitur. Tamen recantat palinodiam, & id omnino interdicit lib. 2. per hæc verba. At supernum ventrem ne moueto, cecutiūt enim, aut circa fauces turbationes, & alia infestabunt. Verū cum hoc prodesse aliquando poterunt, præsertim purgato corpore, ac si femina ad vomitū facilis fuerit, sed maximè inundantibus in ventriculo humiditatibus, vt idē Hip. paulò inferius refert. Sanguinem verò mittere semine existente multo tutissimum est consilium: nullum enim inter auxilia aliud reperies, quo promptius, & securius feminas hoc affectu oppressas leuare possis. Verū dum semē corruptum est, raro in femine commodum sanguis mittitur, ob idq; censeo, veteres autores rarissimè id commendare: quod si aliquando efficiunt, credo intelligendum fore ad adauctum semen minuendum, non ad corruptum: licet aliquando in bene carnosa femina, iuvene, ac salaci, tutum sit.

Quatenus verò ad purgationē attinet, experimento diuturno mihi est compertū in feminis sic affectis, purgationes parum, aut nihil prodesse quinimmo obesse plerunq; Ratio quidē id conuincit, quia semen, siue abundans, siue corruptum, rarò expurganti pharmaco p̄ vterum, aut ventrē duces: sed potius profectò, humore cōmoto, eleuatisq; vaporibus, prōptius in grauiora mala semina

M

deferres.

*purgatio ex
plu rocto*

deferres. Confertū per interualla, & paulatim corpus purgare, ne si quid excrementorum superfit, in vterum forsan dilabatur. sitq; maioris mali causa, & rursus, vt excrementa vtero vicina expurgentur, quorū successione fortasse aliquid eius, quod corruptū est, & excisum, secernet natura. Præstant huiusmodi vsum medicamenta, q̄ nuper diximus ex terebinthina confecta cū aloe, & agarico, aut agaricus sæpe potui datus ex aqua mercurialis, vel plātaginis. Itē pillula ex mastiche, ex agarico, & aloe cū rhabarbaro: præstat etiam syrupus ex rossis perficis cū agarico factus. Sed laudat Hip. frequentissimē purgationem per mercurialem factā: vtilior tñ mihi visa est, quæ fit per syrupum confectum ex succo, & plurimis infusionibus mercurialis: quæ in vterinis affectionibus magni esse momēti experimēto didicimus. Cōmendat itē Rasis trochiscos semel aut bis in hebdomada sumptos, qui recipiunt foliorū agnicasti, foliorū rutæ, seminis cicutæ, menthastri montani, seseleos, aristolochiæ, & ruberæ tinctorum ana partes æquales, formentur trochisci, & quantitas sit singulis vicibus. 3. ij.

Post quæ sanē præsidia vterū ipsū purgare necessum est, quem vsum præstat liquor vterum iniectus, qui recipit aquæ naphthæ lib. j. aquæ ocymi 3. iij. galliæ muscatæ 3. ij. galbani 3. ij. musci, & ambre, ana g. v. syrupi de artemisia 5. ij. croci puluerizati, cinnamomi, & gariophyllorū, ana 3. j. Quod præsidium maius beneficiū præstabit, si vterum prius purgaueris suppositorio ex mercuriali, & agarico, vel quouis alio ex supradictis. Verū si nec his affectionē subsidere cōspiciamus, ijs, q̄ exteriū apposita semen digerant, & vterum roborent, vtendū est, velut sunt prædictæ infusions, & pessi, ac naturalia balnea ex sulphure. Cōferūt, & inunctiones pectini, inguinibus, ac lumbis apposito ex oleo rutaceo, irino, liliaceo, nardino, viticis, acrutæ seminibus cocto: quibus addere oportet saluæ, costi, casie, calaminthæ cōtusæ, seu seminis cannabis quippiā cū modica cera. Prodest quoq; non parū inunctio ex oleo dulci, in quo semen agnicasti, cinnamomū, & seminis angelicæ modicū coxerint. Quibus factis emplastrū ceroneū supra easdem partes apponere oportet: non tamen illud, quod p matrice scribitur, nam id plurimū astringit, sed aliud ceroneum inscriptum, quod ex lachrymis fit digerentem facultatem obtinens, quod conficies admodum scuti, & in parte acuta ipsius apponēda sunt grana aliquot moschi: & eandem acutam partem inferiori parti appones, vt gratum odorem inspīret intra vterum, quod magni momēti solet esse.

Conficienda itē sunt alia emplastra pro matrice, q̄ iuxta formæ indigentia vtilia existant. Verum experimēto didici, dum tetros halitus retūdere, & corroborare magis in animo est, id summopere proficuum esse, quod recipit olei naphthæ 3. j. theriacæ magnæ 3. j. pulueris galliæ muscatæ, zibet, ana 3. f. pulueris seminis angelicæ 3. j. pulueris coralli, & santhalorum, & seminis rutæ, ana 3. f. pulueris cinnamomi, & gariophyllorū, ana 3. j. galbani 3. ij. ladani, quod sit satis. Parabis itē aliud, quod recipit olei cinnamomi, & de spica, ac balsami, ana parū, pulueris cinnamomi, gariophyllorū, nucis, & seminis angelicæ, ana 3. j. galliæ muscatæ, diambre, diamusci, ana g. vj. ladani, cere, ac terebinthina, quod sit satis. Aliud huic cōsumile cōficies, quod recipit ex oleo belzoini, & de styra ce, balsamo, & ex gummi, quod ex India asportatur, caranna appellato, additis pulueribus agnicasti, rutæ, viticis, & eorū, quæ semen minuere diximus, quā-
rum

A tum sit satis, ut fiat emplastrum. Sed conferre summo opere cōperies emplastrū, quod ex theriaca, semine agnicasti, & angelicæ conficitur.

Dum status huic malo causam præstat, nullā aliā prærequirit diligentiam, q̃ *Si ex eam, quæ prima huius capitis parte scripta reperitur, proficua huius affectio- flatu.* nis accessioni. Quamobrem ne videar ea sæpius repetere, illuc diligens lector recurreret, interim tamen ventriculum, & ventrem inferiorem inungere oportebit oleo de cinnamomo, de angelica, de aniso, de pipere, de gariophyllis, quorum etiam guttulas tres cum vino sumere, non erit ab re.

Ceterum, quia pertinacissimus is affectus, neq; his omnibus adhuc subsistere plerumq; constat: ob id quidem frequenti observatione mihi est probatū, altero aut utroq; crure fontanellam aperire, per quam putores illi, & corrupti humores ex semine, & sanguine menstruo prodeuntes, ratione venarum, quæ utero & cruribus communes existunt, citra damnum spirent. Quod procul dubio censeo esse vltimum efficacissimum, & tutissimum præsidium, idq; summo opere hac ratione commendo, & laudo.

B

De virginum & viduarum melancholia. Cap. 4.



INER varias fœminarū affectiones, vulgarissimā esse virginibus grandioribus, viduis ac sterilibus fœminis melancholiā, nulli esse absconditū reor: quod etiam vitij genus cōtingere scimus ijs, quibus menses, aut puerperij purgationes ex aliquo extremo casu supprimuntur, aut improspere pfluunt. Quippe huiusmodi fœminas, & mœstas, & cogitabundas, timidas, ac anxias esse, citra manifestā causam cōperimus. Quod quidē nulli alteri fœminarū sorti, ita frequenter accidisse scimus, ac virginibus, viduis, & sterilibus fœminis. Differt tñ hoc melancholiæ genus ab ea melancholia, q̃ cōiter viris, & reliquis fœminis accidit, q̃ hæc ex aliqua cōi causa proficiscitur: viduarū verò & virginū melancholia, ex certa quadā & his solis peculiari. Itē, quia illa citra manifestā intermissione affligit: hæc verò non nisi per intervalla, & suscepto ab aliqua leui occasione principio. Præterea, illa nullum aliud accidens secū affert, præterq̃ metum, & mœsticiam, & ea q̃ cōiter melancholiæ sunt propria: hæc autem, fletū, & risum, anxietatē, desperationē, & (quod omnibus melancholiæ speciebus denegatum est) dolores tum varios, tum alicuius signate partis, præsertim sinistri lateris è regione cordis, vniuersam mamam aliquā occupās: quibusdā item spiritus deficit alijs, si spirant, dolor non levis adest, & alia non pauca succrescunt peculiaria accidentia, q̃ paulò inferiùs recensēbo, si prius dixerō, melancholiā virginū, & viduarum in vniuersum esse insolentē, & subitam, præter occasionē, aut cum leui tristitia: tacitum & cautum delirium cū alicuius partis internæ dolore, anxietate, & flendi, vel tacendi desiderio, cū hypochondriorū etiam è regione dorsi manifesto pulsū, à quibus mox subitò ad pristinum redeunt statum. Cuius speciei morbi hæc symptomata sunt, nullus est q̃ doceat, neq; ego faciliter monstrare potero, sed constabit procul dubio, si quis ad vnguē expenderit causas, quas iam memorare aggredior.

Causam verò huius affectionis haud faciliè inuenies, ni prius in memoriā reuocaueris pulchram quandam Hip. sententiam, quā lib. de virg. morb. in hunc *Causa.*

M 2 modum

modum scripsit. Est enim muliebris natura animi magis deiecta, ac imminuti: **A** ceterum virgines nobiles, & maturæ viro hoc magis patiuntur, vñ cum mensum descensu, antea non valde hinc affectæ. Postea enim sanguis in uteros confluit, elui effluxurus: quum igitur osculum exitus nō fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit, propter cibos & corporis augmentum, tunc sanguis non habens effluxum, præ multitudine resilit ad cor, & ad septum transversum. Quum igitur hæc repleta fuerint, cor satium fit, deinde ex satuitate torpedit, postea ex torpedine delirium apprehendit. Et paulò inferius subdit. Quum enim hæ partes repletae fuerint, & horror cū febre ingruit, erroneas febres appellat: his autē sic habentibus, præ acuta quidē inflammatione insanit, præ putredine verò clamat, præ caliginositate autem timet ac formidat, præ cōpressionē verò circa cor, strangulationes parat, præ sanguinis autem malitia animus mœrens, ac anxius malum attrahit. Ex qua proculdubio sententia euidenter constat, duplicem esse mœroris, mœstitiæ, ac prauæ imaginationis virginum, & viduarum, quæ sic affectæ sunt, causam (præter alias cōmunes causas) alteram, mulieris naturam, quæ animi est deiecta: alterā verò, sanguinis vitiosi prope cor conclusi tetram exhalationē, quæ & cor anxium reddit, & spiritus cerebri obscurat, ac **B** imaginationem peruertit: præsertim si his amatorius ardor accesserit. Idē quoque viduis accidere consuevit, dum curis, & mœrore animum cōterunt: in his enim ex vehemēti animi motu cerebrum adedō laborat, & infirmatur, vt sæpissimē in hæc mala prorumpere conspiciamus. Præterquam quod accedit vitæ mutatio, & ob viri defectum improba vteri expurgatio, tam à feminis recremento, quàm à mēstrua purgatione: in quibus & virginibus sanguis ob prædictā causam vitiosus refluit ab utero ad cor, atq; ita animum corrumpit. Verum licet in principio lib. nuper citati Hipp. referat, aliquando hæc vitia viris succrescere, cum hoc tamen frequentius feminis euenire affirmat, eō quod animum feminæ habeant magis deiectum, quem illis ita inesse arbitrandum est, quod desiderium & nimis segnem vitam degant, vt antiquiores philosophi existimarunt, at segnes, atque pigras ob id asserunt esse Aristot. & Auicē. & Alber. quod frigidiores, ea causa sint, & cum calore destituantur, fit facile, vt animum habeant timidum & magis deiectum quauis causa concitante, vel nulla: animositas enim à calore proficiscitur. Quibus accedit, prædictum sanguinem vitiosum, & conclusum, **C** alterum affectionis principium præstare: nā cum in virginibus, ac viduis osculum exitus non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit, tum sanguis (vt dictum est) præ multitudine resilit ad cor, quibus accedunt & viduis labores, curæ & assiduæ cogitationes ob consueta vitæ mutationem. Quippe rusticæ, & cōmunes feminae viduæ, quibus vitam mutari non cōtingit, sed laboriosam (vt antea) degere, raro in huiusmodi affectiones incidere visæ sunt: sicut quæ præstantioris sunt sortis, quas decet præ honestate alios mores profiteri. Itaque & virginibus ex huiusmodi sanguine, & viduis ex eodem, & semine improbè purgatis, facile contingit cor & cerebrum affici, & mœstas cogitandasque esse: nam sanguis ille conclusus licet nec putrescat, nec in cor feratur, incalescit quidē plus iusto, & resoluta insensibiliter parte tenuiore, quod crassū est, cum aut agitur, aut incalescit ex aliqua occasione, prædictum vitium gignit, halitibus ab eo elatis, in cor ac cerebrum transmissis. Quod euidenti constat

Ex re tanto
sanguine
ob semine

A stat argumento: nam cum halitus quiescit, aut minimè effervesceat sanguis, labunda incedit fœmina, & citra melancholicæ specimen, & mox subito affectu mœrore corripitur, quod causam habeat intra corpus, quam leuissima occasio concitat. Quæ profectò ratione cõstat, prædictas fœminas successu tēporis (licet dum affectus incipit & viget, totum corpus exalheri, & faciē inflammari per intervalla persentiant) in frigidos eosq; gravissimos affectus delabi. Quippe sic fieri necessum est, maiori sanguinis parte melancholica facta ob tenuioris partis resolutionē. Quod verò incalcescat sanguis, & ob id subtile resoluatur, experimento & ratione mihi est cõpertum: nam fœminas sic affectas constat arteriā prope dorsum nimis ultra morē & naturā, pulsantem obtinere: etiam si in viris hypochondriaca melancholia affectis id quoq; reperiatur ob sanguinē venæ caux, aut venarū iuxta ipsam cõclusum & exalfectū. Quod sanè symptomata citra vllā dubitationē omnes fœminæ sic affectæ perpetiuntur: quinimo causam potissimā melancholicarū affectionum in eisdē censeo esse succensionē arteriæ illius, quæ iuxta dorsum sita est. Ex quibus euidenter cõstat, morbū in hac affectione esse huius arteriæ inflammationē, cui consentiunt cerebrū & cor, quæ adustis & tetrīs fuliginibus obscurātur, vnde mœstitiā, mœrore, metū & tacitū deliramentū prodire necessum est: quæ sanè omnia principiū & causam sortiuntur ex concluso & concalfacto in vteris sanguine, vel semine.

Hinc sanè euenit omnes melancholicas fœminas prædictā pulsationē iuxta *Signa.* dorsum obtinere, & eandē habētes melancholica pati accidentia, quod primū & potissimū huius mali signū esse arbitror. Consimilem huic affectionē retule rat Aretheus lib. 2. de can. & sig. acutarū pass. c. 8. qua parte vitia & affectus venæ magnæ descendēis prope dorsum recenset, inter quos innumerat certum quendam morbū ex sanguinis plenitudine obortū, qui in succensionē cõmigrat, & subdit. Quibus arteria secundū dorsum inflāmat, quod pulsatio in alternitris præcordijs manifestat: nā & ipsa venæ caux morborū particeps efficitur. Quæ equidē affectionem censeo citra dubitationē fœminas perpeti, cum sanguis menstruus prope vteri venas concluditur: nā cum ibidē inflāmetur (ut dictū & necessariū est) nil mirū si & arteria ipsa, quæ iuxta dorsum sita est, particeps fiat prædictarū affectionum, & subinde præ calore ea parte succēso ultra modū pulset. Quod quidē ostendunt signa, quæ autor eodē loco recenset, quæ in virginibus & viduis melancholicis facillè reperies, si ea attento animo exquiras, in quibusdā tamē magis, in alijs verò minus: inquit autem. Cutis sic affectorū squalida, rufosa atq; aspera est, sed in partibus prominentibus atq; ossibus, ut cubitis, genibus, digitorūq; articulis magis talis conspicitur. Sōni tumultuosi fiunt: alius quibusdā nihil reddit, quibusdā exiguum. acre, biliosum: lotium acre, biliosum mordaxq; est. Mens utiq; his constat, sed quadam segnitie torpet, & corpus tabe consumitur. Quibus constare arbitror, cõsimilia accidentia fœminis suboriri, his quidē, quibus ob prædictas causas, arteria illa pulsatur: ob idq; in omnibus reperimus ferè semper eadē mala, quæ hac in parte Aretheus recensuit. Præter quæ etiā fastidiosæ sunt, languētes, sitibundæ, tēdiosæ, cõsilijs inopes, desperatæ, mœstissimæ, timētēs, lachrymosæ, & insuper nullis delectantur rebus, neq; gaudēt, sed tēdio habēt omnia, solitudinē amant, & ob id magis lēduntur: donec halitus à prædicto calore leuatus etianescat: nā tūc subito ad an-

tiquā consuetudinē & statū reuertuntur, ita vt nō paruā admirationē inferat tā subita mutatio: nisi cū malū iam diu inueteratū steterit, vt c. huic affectioni dicato latius docebo. Habēt etiā aliud peculiare, nimirū, non posse verbis exprimere quid sentiant, aut quā molestiā perpetiantur, sed cōquerūtur, & multa dicunt, ex quibus quid certū colligere minime poteris, tandē fatētur se multa mala perferre, ceterū verbis ea distinctē exprimere nō posse. Sed addubita bit fortasse quispiā, quā nā ratione cū melancholia sit propria cerebri affectio, fœmina sic affecta magis de corde cōquerantur. Cui dicimus, fœminas esse roboris cordis, ac animi magis deiecti & imbecillis: ob idq; perferre magis in corde affectū, viriū & caloris damno, quā in cerebro. Quāobrem cū fœminarum plures frequentissimē hoc affectu premantur, teneris ex interrogatione, ex frequenti loquela, & sedula inspectione corū, q̄ loquuntur, desiderant, timent, aut efficiunt, ac ex hypochondriorū tactu id venari: semper prae oculis habens vniuersam huius affectus rationē pendere ex vtero, & propaginibus venarum ipsum circumstantibus. Quibus etiā fœminis ea mala succrescere cōspicimus, q̄ de sceletirbe & stomachace veteres medici scripserunt, referentes ea vitia magnis lienibus, quorum occasione & ventriculus, & vniuersum corpus mille modis afficiuntur, hoc quidem grauitate, & impotentia ad actiones obeundas adeo graui, vt multū eā affectionem paralytis speciem censuerint, itē tetro colore genuum & articularum impotentia, & oris fœtore, illud verō anxietate, & fastidio, ac adeo graui vtrius molestia, vt iure optimo stomachachexia à multis appelletur, malum quidē ex humida melancholia, & sordida proficiscens.

*Præsa-
gium.*

Sed vt ex Hip. decreto cōstat lib. de virginū morbis, ex prædicta melancholia sorte, plerunq; nisi maturo cōsilio fœminæ præueniantur, in mania & ferina deliramenta promptē decidunt: inquit enim. At ex corde & septo transuerso tardē refluit: venæ enim obliquæ sunt, & locus periculosus, & ad deliriū, & insaniam paratus. Et paulò inferius subdit. Præacuta quidē inflammatione insanit: ac referens varia deliramenta, inquit. Animus moriens ac anxius malum attrahit: sed & aliū horribiliter cōpellat, & in puteos prosilire ac iniicere iubet, & strangulari, tanq̄ meliora sint hæc, & omnē vitæ vtilitatē excedentia. Aliquādo verō sine spectris ac phantasmatis voluptas quidā adest, ex qua mortem velut bonū aliquod amat. Accidit quidē hoc vitij genus virginibus, viduis, & sterilibus etiā si viris cohabitēt, vt Hip. in fi. li. de virg. morb. adducit: sed præcipue puerperis, & improspere purgatis: vel quibus menstrua purgatio ob subitā occasionē subito etiā retrocedit: ac vltimo ijs, quibus vteri purgamenta, & subito casu subsistunt. Quibus omnibus fit, vt aliquid in cor, & cerebrū cōmigrēt, ipsaque adeo lēdat, vt nō solū imaginandi potentiā vitiet, verū credere, q̄ cogitauerint, cogat, proferreq; efficiat. Quippe hac ratione inter alias melancholici à mania cis differunt, quod illi verētur publicē pferre, q̄ imaginātur, q̄ quodāmodo suspiciātur vera nō esse, & ob id taciturni, moesti, & cogitabundi existunt, sibi secretū adseruantes: hi verō statim in publicū proferunt, q̄ mente cōcipiūt, idq; cū erroneū sit, tanq̄ à causa præter naturā cerebri potētias subuertente factum, facile deliramentum apparet. Quin adeo crescit timor, & vitium imaginatricis vt lib. nuper citato Hip. scribat. Ex quibus adeo fortiter pauent homines, vt delirent, & demones quosdā videre se putent ipsis noctu quādoq; infestos, quādoque

A doq; interdū, aliquando verò vtroq; tēpore. Deniq; ex leui sanguinis coaceruati ex calfactione melancholiā, & ex hac ob fortē vaporē, & mēstitiā vltērū refecatis humoribus maiore accrescente efferuescentia, prodire deliramenta necessū est. Quapropter mihi curaturo incumbit, & melancholiā, & mania quas ex vtero feminis accidere diximus, seorsum meminisse, & cuiq; propria ac pecul'aria auxilia adscribere.

Primū igitur in curatione expēdisse cōuenit, nō expedire in quouis melancholiā tēpore eandē conscribere curandi rationē. Quippe alia pręrequiritur *Curam di ratio.* incipiente affectu, seruētq; adhuc incluso sanguine in vteri valis: alia verò feruore iā restincto in aliqua humoris portione, ac in alia nuper succēso, alia rursus dū quod adurit, & super ex calfactū est, eā siccitatē, & naturā adipiscitur, q̄ deliramentis, & mania idonea sit. Quod faciliē diligens medicus cognoscat ex mali principio, & ex antē habito vitę instituto: & quando inceperit mēstitiā fēminā apprehendere: nā si nuper hęc apparuerint, feruorē adhuc sanguinē cōtinere credendū est, pręsertim si accessio illa breui cessauerit, & ad antiq̄ vitę consuetudinē fēmina protinus redierit. Si enim diu durauerit affectio, si postq̄ cessauerit, vestigiū superfuerit, si mores quodāmodo mutauerit, si nequuerit imaginibus melancholicis, & illusionibus, ac mēstitiā, resistere, vel maxima cū difficultate, argumentū procul dubio sit euident, aliquid tā crassum, & fēculentū superesse, cuius tēperaturā, & mores fēminę cōditio insequitur. Verum si ex toto subuersum fuerit viuēdi studiū, vel maiori ex parte, & fēmina, neq; loquat, neq; respōdeat, neq; more solito letetur adhuc cū sibi familiaribus, & amicis, credendū est, maximā fuisse humoris subuersionē, & maiore humoris partem exustā, diuq; caput, & cor subinde infestari, ita vt subito casu ex mēiore, & mēstitiā in maniacū deliriū proflire sperandum sit. Quod sanē malū puerperis ex suppressa purgatione, cū exusta, & pernitiolā fēculentēq; sit substantię, dū subito supprimitur, ocysimē accidere cōspicimus, & quialet enim humoris illius vitii diuturnitatē tēporis, qua in alijs fēminis paulatim, & sensim vitiantur humores. Quod si in prima vitij sorte, fēminę & humoris statū fuisse cognoueris, nullū aliud auxiliū pręrequirere credendū est, q̄ vitę fortē instituere parciorē, & copiosē sanguinē detrahēre. Inquit enim Hip. lib. de virg. morb. Ceterū curatio, vt hinc liberetur, est sanguinis detractio, si nihil fuerit, quod impediāt. Deniq; primo accessu victus copiā minuere oportet, & eū qui tenuioris sit substantię eligere, ac mediocri tēperamētū, ne nimia copia sanguinis quoq; copia vberior fiat, ac ex crassa substantia melancholicus magis succrescat succus: mediū quidē tēperamētū, ne calore vltērū efferuescat sanguis, ac frigore cōcreseat, frigidiorq; fiat melancholia. Corpus itē exercitijs mandare opus est, distrahēdq; animū varijs, & delectabilibus rebus. Mox tñ à principio sanguinem detrahēre ex brachiorū basilica, si longē à mēstruationis tēpore distauerit fēmina: sin, aut immincant mēses, aut nuper pręterierint, ex malleolis. Ceterū interim, dū fēmina viro nō vititur, probarē maximē tertio, aut quarto quoq; mēse in medio eius sanguinē ex brachio mittere, vt sublato redundante minus efferuescat quod superest, quod si religiosa fuerit, aut vidua, sat erit bis in anno eadē lege sanguinē fundere. At si toto tēpore, quo mēses fluunt, aut parū ante ipsum mēsta melancholicāq; magis steterit fēmina, duobus, tribusve diebus ante id tēpus sangui-

nē ex talo mittere, & presenti melancholiæ, & futuræ præsidium erit. Conuenire quoq; vsu cōpertū est, dū aliquod viscus etiā malū ex cōsortio cōtrahit, saluatellā scindere, manus nimirū dextræ, aut sinistræ, prout iecur, aut splenē cōpati nobis cōpertū fuerit. Verū quando cor etiā patitur, aut ipsę fœminę calore interno cruciantur, & hac ratione opus est vltteriūs sanguinem mittere, tunc sanē distinctione vtendum est.

Quippe aut viriū prouenit ex iecore calido, & eo tēpore sanguinē ex saluatella dextra fundes, quia propter humorū inustionē abundat splen melancholiā, cuius cōsensu cor cōpatitur: quod si tunc ex sinistra sanguinē detraxeris, ob spirituum resolutionem magis lædes, sicut dum vires ob melancholiā deiectæ sunt. Verū si citra viriū dispēdium splen inflāmur prædicto humore suscepto & cor simul coafficiatur, tunc ex sinistra saluatella sanguinē fundes. Caterum, quia in hac affectione mesereon quoq; in cōsensum nō rarō trahitur, illius etiā prouidentia habere conuenit, sanguine nullatenus, vel quā parciūssimē misso, nisi suppressi menses id postulauerint, aut per hemorrhoides id feceris.

Verū si prædictis signis cōpertum fuerit, melancholici succi iā factū aliquid superesse, sanguine misso (sed multo parcius) purgantium medicamentorum aliquod adhibere oportet, quod crassos, & melancholicos succos educere natum sit. At cū humor huius naturę, vt ex Hip. constat, q̄ in parua quantitate exhibitā multum educat, expostulet, ea quidē fœminarum natura, & affectionis cōditio citra euidens dānum sustinere nequeant; ob id quidē ijs agendum est pharmacis, q̄ lentē, & paulatim parum, sed frequenter educant. Sic ex aloe, agarico, & mastiche cōfectę pillulę singulis hebdomadis sumptæ plurimum pstant: sicut aliæ, q̄ ex aloe, & pulueribus rubrę tinctorum, & foliorū senæ tertio, vel quarto quoq; die ingestæ. Sed lōge vtilior est cōfectio amech sine scammonio, & colocintide facta, qua ter quaterve in anno moliri purgationē poteris. Prodest, & purgatio ex. 3. j. pulpe calic fistulę cū 3. j. & .s. pulueris foliorū senæ. Itē ex vsu est singulis diebus, vel quarto quoq; die (prout alius egerit) quatuor quinqueve prunas damascenas cōditas saccharo, & decocto foliorū senæ. Valēt etiā aqua lactis sola, aut in qua diu maduerint folia senæ, & flores appellati cordiales. Præstat quoq; semel in hebdomada. 3. iij. in frascriptæ decoctionis sumere cū modico saccharo: sit quidā ex xij. 5. aquę lupulorū, borraginis, aut cichorij, & 3. j. & .s. foliorū senæ, q̄ bulliant leuiter, ac maneat in infusione per noctē. Ego quidē in his, & plerisq; fœminarum affectionibus, quibus aliquid melancholicū adiungitur, felici successu vtor syrupo nostro hac lege cōfecto. Recipit quidē aquarū borraginis, cichorij, & lupulorum, ana. 3. x. succi borraginis clarioris facti. 3. viij. succi pomorū redolentium. 3. vj. foliorum senæ. 3. iij. florum cordialium, ana 3. .s. radicum scortionerū mundatarum minutim incisarū. 3. ij. bulliāt lento igne ad cōsumptionē vigesimę partis, & facta colatura, adde rhabarbari electi, & agarici trochiscati, ana. 3. iij. & .s. & facta leuissima ebullitione iterū ex primantur: quibus adde pulueris lapidis lazuli preparati, ligati, ac infusi p noctē, & expressi. 3. ij. & sacchari albissimi quātū sit satis, vt fiat syrupus mediocri cōsistentiæ cum modico cinnamomo, cuius ab. 3. ij. ad iij. porriges. Sed in hac curatione mihi semper visum fuit, humidioribus pharmacis potius vtī, q̄ siccis: exacerbatur quippe non parum siccis melancholicus humor: nisi post eius
vsu

A vsu prebueris ptisanæ modicum, vel decoctum ordeï, portulacæ, aut violarū. Quod si hæc prodesse non videantur g. ii. j. stibij præparati præbere tuto poteris, si femina robusta fuerit, & ad pituitæ crassæ habitum vergens, facto tamen initio à g. ij. vel tribus, qua prudentia arbitror nil mali posse pter spem accidere. Verum quia in p̄dicta affectione præter cerebrum, pati etiā cor & uterum cōspicimus, utriq; providendum est. Cordi quidē p̄ inunctiones ex oleo, vel vnguento naphthæ, & iasminorum cum ambra, musco, & gallia, ac reliquis odoratis, q̄ inferius recensēbo: per epithemata ex aqua naphthæ, melissæ, & gariophyllorū cum modico vino, & aqua rosacea, ac succo pomorum redolētium additis puluisculis santholorum, de grana, vel electarij de gemmis cum modico musco, vel diambra, q̄ omnia filtro serico, vel mica panis tosta, aut pomo assō excepta cordi adhibeantur. Præstat & oleum cinnamomi, gariophyllorum, vel anisi arte chimica extractum, cuius cum aqua cardiacæ herbæ sumptis tribus guttulis mire prodesse credo. Itē sacculos parare poteris ex pulueribus quatuor florum cordialium, santholorum, coralli, seminis angelicæ, gariophyllorum, diambre, & diamusci. Præstat is, qui recipit florum cordialium ana p. ij. florum nenufaris, & sambuci, ana p. j. florum melissæ, seminis ocymi, been albi, & rubri, santholorum omnium ana 3. j. quibus adde nucis, diambre, & diamusci, ac pulueris seminis angelicæ ana 3. s. pulueris granæ 3. ij. & fiat sacculus. Utendum quoq; est electarijs ex floribus, & radicibus cordialibus saccharo cōdiis. Sed huic vsui plurimum cōfert potui data aqua ex theriaca instillata cū pomis redolentibus cōtusis, pane recens cocto imbuto succo cardiacæ cū pulueribus electarij de gemmis, cum ramentis cucurbitæ, cinnamomo & succo pomorū acriū. Vero etiam providēdum est emplastris pro matrice ex rebus tēperatis, & odoris grati cōfectis, velut ex rosis, violis, & reliquis cordialibus, diambra, diamoscho, modico cinnamomo ad penetrationē, cum ladano, & cera cōfectum. Præstat miro modo emplastrum ceroneum, vel vnguentum cōfectum ex eodē cum oleo liliornum: ac si semen retentum fuisse cōperias, quæ ipsum minuant, & exsiccant, addes, velut est oleum rutaceum, vel de mentha, & attemperamenti gratia modicū olei de nenufare, vel de semine lactucæ, papaueris, aut seminis agnicasti.

C Verum si eò miseræ affectio deuenerit, q̄ in deliramenta degeneret, nō solū vtero, & melancholico sanguini providendū tunc est, sed capiti, & corpori vniuerso, ne habitualis siccitas, ac frigiditas, quales in his plerunq; reperimus, in p̄dictis partibus cōtrahatur. Qua in re sanguinē p̄ venā minus extrahere oportet, vehementius tñ purgare, & caput ac vniuersum corpus frequentius humectare. In qua sanē affectione hemorrhoides prouocare opus erit, ut q̄ per partē vtero vicinā deriuare natæ sint, p̄sertim hirudinum sucu, quo sæculentū sanguinē citra purioris dispendiū vtiliter euacuamus, & à capite, si quid illuc irruit, faciliē diuertimus. Verū si aut nō apparuerint, aut sanguis per eas extractus nō suffecerit, proficiū summo opere erit, ex venis tali sanguinē fundere. Purgare verò corpus nō leuiter, sed eo, quod modicū ingestū plurimū educat, necessum est: nā hos humores siccos, densos tantumq; solidos ne mouere quidē poterunt leuia medicamēta, q̄ superius diximus incipienti malo proficua esse. Quāobrem pillulis de lapide lazuli, tēperatis tamē, utendū est: vel alijs, q̄ recipiunt epithymi 3. vj. agari electi 3. iiij. corticis ellebori nigri 3. j. specierum hieræ simplicis 3. iiij.

3.iiij. cum melle rosaceo fiat massa: cuius quantitas sit ab 3.j. ad ij. Confiuntur **A**
 itē aliā nō minoris momenti hac lege, epithymi. 3. j. aloes 3. f. gariophyllorum,
 nucis muscate, ana 3. ij. corticū ellebori nigri 3. j. & f. cū syrupo borraginis fiat
 massa. Itē p̄dicti stibij p̄parati g. iij. vel iiij. q̄ censēā, maximi esse momenti his
 crassis humoribus educendis. Sed primitus ante hęc medicamenta purgabis, &
 p̄parabis corpus sero lactis cū folijs senæ: aut mercuriali, vt frequēs erat Hip.
 cōsuetudo. Nec mirādum profectō est, hęc valida medicamenta fēminas inno
 xiē perferre: nā protinus viscera & ventriculus adeō viātur, vt in eis plurima
 supersint crassa, ac viscida excrementa, q̄ humori melancholico admixta, id iure
 expostulent: ob idq̄; hęc & aliā frequentius (dum pro fēmineo sexu attēpe
 rentur) adhiberi possunt: quale est, quod conficitur ex vigesima parte lapidis
 lazuli p̄parati, & reliquis quindecim partibus senæ, & duabus agarici, ac tri
 bus syrapi portulacæ addita 3. f. sacchari rosati. Confert etiā in ijs, q̄ affectū iam
 inueteratum habent, ex pulueribus senæ & modico lapidis lazuli quantū g. x.
 cum saccharo rosaceo, vel violaceo bolū semel in hebdomada porrigere,
 Quod si neq; his affectio quieuerit, serapium illud a Matthiolo elleborisimum **B**
 appellatum quantitate 3. j. porrigere poteris, vel serapium ex fumaria, & ex lu
 pulis, cum ligatura lapidis lazuli p̄dicta forma confectum. Cui etiā vsui aliud
 non minoris momenti conficies, quod recipit mirabolanorum omnium, ana
 3. f. contendantur crasso modo, & fricentur manibus cum oleo amygdalarum
 dulcium, postea infundantur per diē & noctem in lib. xiiij. aquæ fumarie, &
 bulliant ad consumptionē tertiæ partis, cui adde ellebori nigri 3. ij. & f. liqui
 ritæ, & polipodii, ana 3. ij. seminis citri. 3. j. & f. postea effervescent donec solū
 remaneant lib. v. quibus adde foliorum senæ & epithymi, ana 3. j. & iterū bul
 liant donec tantū supersint. ii. j. lib. tandē facta expressione colentur, & vsui de
 coctum adseruetur: cuius deinceps excipe 3. ij. synapi ex 9. infusionibus rosarū
 3. j. aquæ cichorii 3. j. & f. porrige summo mane, ac per sex dies idem facito ter
 tio quoq; die. Verū quod in huiusmodi mentis perturbatione cōmendatum
 magis reperio, est puluis, qui & solus, & pilularum forma, vel cum saccharo
 rosarum, aut borraginis faciliē adhiberi potest pondere ij. 3. Recipit quidē epi
 thymi. 3. iiij. lapidis lazuli p̄parati, & agarici 3. ij. & f. scāmonei correcti g. xiiij. **C**
 gariophyllorum numero xx. pulueris foliorum senæ. 3. vj. sacchari albillimi.
 3. ij. cuius quantitas sit. 3. f. Fit quoq; huic vsui opiata magni momenti, quæ re
 cipit summitatum thymi. 3. f. epithymi. 3. j. f. seminis cuscute 3. iiij. lapidis lazuli
 decies abluti in aqua rosacea, & totidē in aqua portulacæ. 3. ij. diagridii. 3. ij.
 cinnamomi. 3. f. pulueris senæ. 3. iiij. margaritarum. 3. ij. moschi. g. v. synapi de
 pomis cōpositi quantum sit satis, vt fiat ad formam opiatæ, cuius dosis sit ad 3. j.
 Possunt quoq; fieri portiones ex veratro nigro, hac forma. Recipe veratri nigri
 3. j. pilularum mundatarum. 3. j. prunorum siccorum numero x. florum nim
 phæ. p. j. fiat decoctio in lib. iij. aquæ ad tertias, cuius exhibe. 3. ij. cū aliis dua
 bus syrapi violarū, quo robustiores fēminæ semel in mense, aut bis vti pote
 runt. Sed inter vnā & aliā purgationem ad condita, & opiata veniendū est: qua
 in re plurimū prodesse fertur alchermes, & triphera, aut bolus, qui recipit con
 seruæ radicis buglossæ 3. ij. seruæ enulæ 3. j. seruæ uolarū, nenufaris, &
 anthos, pulueris lātina Gal. ana 3. ij. pulueris electarij de gēmis sine speciebus.
 3. j.

A 3.j. fiat opiata. Caterum fit alia pretiosior & vtilior, q̄ recipit myrobalanorum emblicorum, & chebulorum conditorum, ana numero ij. corticis citri saccharo conditi, & radicis buglossæ, ana 3.j. conseruat anthos, & florum borraginis, ana 3.j. confectiois alchermes. 3.j. & .f. lapidis lazuli usti & loti. 3. selectarii de gemmis & confectiois de hiacinto, ana 3.j. & .f. syrui de portulaca quod sufficiat, vt fiat opiata, cuius bolum quantitatis auellane bis in hebdomada porriges. Sed si bladius tractare velis forminam sic affectā, aliud parabis medicamentum, quod recipit radicis enulæ recentis, radicis buglossæ, & liquiritiæ, ana 3.j. passularum enucleatarum. 3.ij. prunorum numero x. ficuum (quamquā nō probentur ab Alex. Trall. sed cum reijcit ficus à medicamentis laxantibus, intelligit de recentibus, carycæ verò, quia detergunt, conueniunt) 3.ij. pomorum dulcium numero ij. m. reurialis, borraginis, & capillorum veneris, ana m.j. seminis anisi 3.ij. seminis apii, petroselini, & ocymi, ana 3.ij. polipodii quercini recentis. 3.ij. foliorum senæ, medullæ seminis cartami, ana 3.j. & .f. corticis medianæ sambuci. 3.ij. florum anthos, buglossæ, borraginis, violarū, ana m. ij. fiat decoctio in lib. iij. aquæ ad tertias, & facta colatura adde sacchari quod sufficiat, vt fiat syrupus: cui si addideris agarici modicum, maxime ex vsu facies.

A purgatione verò, & inter purgandum balneis aquæ dulcis tepidæ in domo, vel in fluuio frequenter vtendum est; itē fomentis capiti adhibitis ex dulci aqua, ex oleo amygdalarum dulcium, violarum, & cucurbitæ, ex lacte etiam vel decocto extremitatum arietis cum lactucis, violis, capitibus papaueris albi, & 3.ij. ellebori nigri.

Præter hæc omnia prouocationi mensium innitendum plurimum est: nam præcipua curandi ratio in huiusmodi affectu quadruplicem præstat considerationem: quarum prima cōgestionem sanguinis in vtero impedire docet, cuius gratia studendum est menstrua semper prouocare: secunda, si quid congestum melancholici succi est, expellere docet: tertia, flatus ascēdentes discutere: quarta verò & vltima id curæ habet, vt capiti, & toti corpori prouideat. Quod si neq; ijs, q̄ superius diximus, nec p̄dictis quatuor indicationibus adseruatis morbum subsistere comperiamus, regionem mutare oportebit iuxta Hip. præceptū, qui lib. 6. pop. par. 5. inquit. In lōgis morbis terrā mutare optimum est: præsertim si ad loca humida, & tēperata, ac prope mare ipsa mutatio fuerit. Quod si morbus vltra pergat, ad fontanellas crutibus apertas venire consulit rei difficultas.

Cauere tamen in hac affectione portet acria clysteria, vtpote irritantia maxime vterum, & succos ibidem contentos commouentia: quod fit, vt non raro ab iniecto acri clystere fa minæ vehementius delirent, donec temporis tractu iterum subsideant humores.

Habet insuper hoc peculiare huiusmodi affectus, vt lentam, & paulatinam desideret curandi rationem: nam sicci & stabiles humores eūam si habituales nondum in corpore, aut capite introduxerint distēperiem, sensim parari enoliriq; conuenit, & eadem lege expurgari: ac pari prorsus modo intemperamentum introductum corrigere: nam qua ratione calidos humores ocylsimè excernere oportet, ita crassos, & lentos lentè, & paulatim. Quod si ne hæc quidē omnia prodesse videantur, splenis aut meserei regioni setonem affigere expertus sum, miro modo profuisse.



IL profectò monstrosius, nil grauius, periculosiusve, aut difficilior, & obscurior in fœminarũ affectionibus reperies, quàm eam epilepsiae naturã & conditionẽ, quæ ex vteri vitio, & confortio proficiscitur. Quippe tam est varia, difficilis, & abdita ac mille differentiis implicata, vt nullam seruare in cognitione, vel curatione certã legẽ, methodum ac regulam, qua aliquid vnum in ea, aut proferre, aut efficere possis: nam in communi epilepsia, & ea, q̃ hominibus ex alia causa vulgariter accidit, nil aliud relucet, quàm motus deprauatus, & totius corporis concussio cum sensuum oblatione: at in fœminarũ epilepsia, quis narrare poterit, qualis motuum varietas, quanta motus & exteriorum sensuũ mutatio, & vltimò omnium aliarum vitæ actionum difficillima peruersio reperiat? Quamobrem non sat esse epilepsiae naturam, & causas in genere nouisse censeo, sed quid peculiarius hæc affectionis naturã in fœminis obtineat, dum ex utero principium sortitur.

Primũ itaq; nosse cõuenit epilepsia (vtcunq; sit) nil aliud esse, q̃ totius corporis cõcussionẽ. Est quidẽ symptoma in genere deprauarũ actionum motuarũ, q̃ inordinatum præter voluntatis imperiũ efficiat motũ, laceßita solũ motrice potentia ex cerebri immodica sensibilitate à remordente, seu obstruente irritata. Quæ sanẽ cerebri sensibilitas omnes potentias expultrices, & animales secũ in cõsensum trahit, & lædit, vt se tueatur à causa illa præter naturã ad expulsionẽ omnes laceßens. Quò fit, vt cerebri potẽtia dilatatiua, & cõpressiua vehementius sese dilatet cõprimatq; vt quatiens quod sibi adhæret & molestũ existit, excutiat: quemadmodũ in sternutamentis efficere cernimus. Neq; credẽdũ est, expultricẽ naturalẽ posse ita vehemẽtes, ac varios motus edere, nisi motuã etiã in cõsensum alliciat, licet non nihil fruuet ad vehemẽtiã motionum: ob idq; non est à ratione alienũ existimare, huiusmodi motus primo fieri virtute naturali expultrice, iuuante etiã virtute dilatante, & cõprimente cerebri: quibus læsis animalẽ motuã cerebri mille motibus errabundã apparere (q̃ neruorum principiu lèdatur) necessum est. Testimonio quidẽ est differẽtia inter apoplexiam, & epilepsia: nam ob id in apoplexia malum grauius efficitur, & interimit, quia naturalis potentia, quæ valuit, ex cerebro humorem crassum in spirituum foramen & cauitates pellere, nequiuit discutere eundẽ, & ab ea parte separare: quo in casu accedente vi dilatatiuæ virtutis, motus in partibus neruosis, vtpote quæ magis læduntur, fit conuulsius, & subindẽ motus vehementia, quod nocuũ est, excernitur. Ex quibus cõstare arbitror, epilepsia motus speciẽ esse de genere cõuulsionis pertinentẽ quidẽ ad spasmu (vt ferunt) non proportionatum ad materiam: licet in quibusdam fœminis epilepsia aliquãdo accadat solum cerebri vitio citra vllam partium subiectarum concussionem.

Verũ, vt clarior euadat nostri instituti doctrina, cui morborũ generi huiusmodi symptoma reducendũ sit, disserendũ nunc est. Cõstat enim vnanimi medicorũ omniũ consensu, morbu esse in hoc affectu, obstructionẽ, eã quidẽ orta à crassis humoribus, qualis pituita est, aut melancholia. In qua re duo mihi sunt expendenda: primũ, an morbus sit obstructio: secũdum verò, an causa sit crassa & lenta.

- A** & lenta, ut priscorum sententia tenet. Circa primum nosse oportet, aliud esse in epilepsia motus illius vehementis ratione exquirere: aliud verò, causam adinvenire oblesionis mentis & sensuum. Na obstructio, q̄ huius affectus fatentur esse causam, nequit ex propria natura depravatam motum moliri, sed tantum plus minusve motum imminuere, vel ex toto auferre, quemadmodum in apoplexia, & paralyti fieri cernimus. Cōstabit igitur, aliā subesse huius symptomatis causam, nimirum (ut mea fert sententia) acrimoniā, mordacitatē, aut venositatē alicuius substantiæ illuc confluentis: deniq; id nata sunt efficere omnia, q̄ laceſcere, & irritare naturā expellente possunt. Ex quo prodit huiusmodi affectionē fieri plerumq; p̄ cōsensum, id quod apoplexiæ & paralyti non cōtingit, q̄ earū ratio in obstructiōe sita sit. Præterea, neq; sat est, humores esse acres, & mordaces, ut sensus interiores, & externos obledere possint: sed necessarium subinde fuit, aliquid peculiare interesse morbum, quē ego citra dubitationē arbitror obstructiōe esse. non tamen ut vulgò fertur, sed ut mox referā, si prius d' vero affectionē in genere fieri ex acrimia humorum, vel vaporum affluxu, qui cerebrum, aut distēperant, aut mordeant, moribusq; depravatis occasione p̄stent: itē & ex obstructiōe, q̄ sensus omnes obledat. Quippe cum duo sint symptomata, q̄ in epilepsia elucet magis, sensuum nimirum oblesio, & motus convulsivus, necessarium profecto fuit, vnumquodq; propriā & peculiare obtinuisse causam. Sic procul dubio acrimonia, & mordacitas convulsione parere nata sunt, ut videre licet in singulis ex aliqua prædictarum causarum suborto, ubi nullum apparet obstructiōis vestigiū. Pati prorsus ratione cerebri obstructiō, q̄ ex substantiæ, q̄ cerebrum conscendit, corpulentia proficiſcitur, mentis & sensus oblesione p̄rit, ut in aliis affectionibus, citra motū convulsivum cōspicimus, quales sunt soporosi affectus, & alii his per similes. Ex quibus cōstat, utrumq; symptoma in epilepsia necessario subesse, quia uterq; morbus necessario accedit ad integrā eius speciem & naturā. Verum addubitabit fortasse quispiam & merito, quā ratione in epilepsia p̄ cōsensum fieri possit, ut solum aura quedā cerebrum conscēdēs, potens sit obstructiōe efficere, ut Gale. lib. de puerō epileptico affirmat, ita ut laborans sensuum actione omnino priuetur. Cui dicimus hac ratione differre epilepsiā p̄ primogenēā affectionē ab ea, q̄ fit per cōsensum, q̄ illa maiore infert sensuum oblesionē, quia à maiori prodit obstructiōe: hæc verò minorū, quia tantū ab halitu proficiſcitur obstructiō, seu (ut rectius loquar) obtenebratio. Quod fit, ut maiori ex parte in ea externi sensus non ex toto ledatur, id quod in epilepsia p̄ cōsensum ab utero frequenti euentu experimur, ut paulo inferius latius probabo. Neq; credendū adhuc est, obstructiōe adesse in ea, q̄ fit p̄ essentiā eo modo, quo in hemiplexia, aut apoplexia reperimus: sed peculiariter quid obtinere credendū est, cuius rōne lōgissimis distāt intervallis, ut in causarū expositione iā audies. Cōstat igitur epilepsia ex duplici affectus genere, alio ad obstructiōem p̄tinentē, alio verò ad mordicationē, aut extensionē, vel distemperiem cerebri: nō q̄ solum distemperies id efficiat, sed quatenus dolorē excitet, eodēq; solutā vinitatē, vel (ut rectius loquar) solui paratam, velut dolor id moliri possit. Cōstabit et subinde ex duplici symptomatum genere, vno ad sensuum diminutiā, seu ablatā actionē reducto, alio verò ad motus facultatē cerebri animalium, naturalium & ipsi peculiarium depravationē. Quo sensu mētēs ōtūm

autorum

Causa.

autōrū cōcordes sunt: quippe epilepsiā partim ab obstructione, partim ab humorū mordacitate fieri, certum est. Quæ omnia communia existunt omni epilepsiæ, siue per primogeneam fiat affectionē, siue per consensum à quauis parte. Causas verò ob affectus variā rationē, diuidere quoq; hac in parte necessum est: nā quædā sunt, q̄ epilepsiā efficiunt p̄ essentiam, & rursus aliæ, q̄ ipsam p̄ consensum excitant. Præter quas nō desunt qui asserant, & non citra rationem, q̄q; fieri ob angustia meatus à postica cerebri parte ad spinā, vel imperforatā lacunā, aut strictiorē ad palatum, aut ad nares viā. Quod Gal. de vsu partiū scribit, optime cōparatū esse à natura, vt p̄ decliues cerebri meatus, tū per palatū in os, tum p̄ corpus narium orificijs perspicuis, ac magnis pituita, aut alia cerebri purgamenta excernantur, ne animal frequenter corripatur epilepsia: nā videmus per eam viam expurgari materiam, q̄ epilepsiā excitabat, ac spumam ex ore duci. Quæ sanē cōpositionis ratio, licet reperibilis sit, q̄ rarissimē tñ accidit, quia natura id semper in cōpositionibus cauet, nisi erret. Causa verò (vt ad pensum redeam) q̄ per essentiam hoc malum excitat, pituita melancholicusq; humor est, vel quisquis alius crassus, viscidus, ac lentus in cerebro præter naturæ institutū creatus fuerit. Verū si quis rē altius examinet, reperiet faciliē (licet Gal. q̄ diximus asserat) aliter causas cōstituendas, Galenūq; intelligendū fore: nā si vt vulgus autumat ex Gal. decreto, crassos humores huius mali causam esse verū sit, haud leuia reperiet incōmoda, quibus id ita fieri perdifficile esse videatur. Quippe crassos humores impossibile est hoc posse, quia sequeretur nil interesse inter epilepsiā ex altera parte, & apoplexiā, ac paralysem ex altera, quod probari faciliē potest: siquidē locus affectus idē est, nēpe posterior cerebri ventriculus. qua parte adhæret spinali medullæ: causa eadē, nēpe crassorū humorū copia: morbus idē, nimirū obstructio, ergo necessario symptoma tenetur idē esse. Quod si quispiā dixerit, ratione maioris, aut minoris obstructionis differre, intelligat velim, obstructionē maiore, aut minore variare nō posse symptomatis genus, sed apoplexiæ, aut paralyseos variis tantū species efficere, nō epilepsiā, aut symptoma aliquod ad actionē deprauatā pertinens, sed solū ad ablatā, aut diminutā. Præterea, videtur perdifficile à crassis humoribus epilepsiā fieri, quia sæpissimē p̄ cōsensum concitatur ab aura tenuissima, substantia aliōq; obstructioni inepta. Itē epilepsia subitò generatur, ac soluitur, hoc nequit à crassis fieri, q̄ si aliqn id accidat, vel in aliud malū degenerat, vel nō soluitur ita subitò vt cōis epilepsia: nā pituita difficulter separatur à partibus, q̄bus semel adhæsit, exēplo est apoplexia, q̄ nusquā subitò soluitur, sed dū sanescit, in paralysem degenerat, q̄ deinceps lentē curatur. Præterea, q̄ hoc morbo corripuntur, p̄tinus spuma, aut tenui liquore p̄ os excreto liberantur, ergo mali causa nō erat viscidus, & crassus humor. Vtērius ex ira, & alijs animi perturbationibus, & ex immodica cerebri sensibilitate, ac sensuū perspicuitate plures hoc morbo correptos cōspicimus, ergo nō à crassa, & viscida materia. Sūt p̄fectò tanti momenti huiusmodi rationes apud cordatos hoīes, vt iure optimo aliā teneantur exquirere in hoc affectu cause rationē: q̄ ego, saluo doctissimorū virorū iudicio, arbitror in epilepsia p̄ primogeneā affectionē, esse hos humores crassos, & viscidos, vt Gal. sententia tenet (ne videar à tanto autore leui occasione discessisse) verum alio modo dispositos, ac p̄paratos, non aut sub propria forma, ac natura existentes,

humores enim
si ex viscidis
primogeniis
causa sunt
sed ab iis modo
dispositi ac
in apoplexia

Ates, ut in apoplexia, & paralyfi cōtingit. Itaq; ut argumētis respōdeamus, ad generationē apoplexiæ, & paralyfis, p̄dicti humores crassi, ac visci di concurrunt sub p̄pria forma, quales natura sua existunt: iterum ad generationē epilepsie spumosiore, leniores, tenues, & rariores facti, aliq; impossibile est, causā huic malo coniunctam, seu continentē posse prestare. Quemadmodum spuma p̄ os excreta quotidiano euentu cōfirmat, à cuius excretionē protinus cessat affectio, quasi demonstrans, illā esse proximā illius mali causam. Quamobrem mirum nō est, si ex vna causa in eodē loco, & ex vno tantū affectu diuersa suboriantur symptomata, siquidē causa dispositio nata p̄ se est eam differentiā constituere. Secundū stat etiā differentia, quia in primis duobus affectibus p̄dicti humores facultatē deiiciūt, ac superit, ita ut ne ipsos quidē expellere possit, nec se modo aliquo mouere: in epilepsia solū eadē irritant, & lacerant ad motū expulsio nis, quē mouēt. Quod fit, ut cū p̄ impotētia, aut frequentia accessionū lassata, vel ex humorū crassitie impedita, neq; humorē mouere, facillē ex epilepsia apople xi, aut paraly sin inuina patiat: quo experimēto certior efficitur diūa generatio nis inter hos affectus. Cōfirmat nostrā sententiā altera huius affectus pars, nimirū, dū p̄ consensum efficiunt: nā citra humorū p̄sentia sola aura, halitu, aut flatu caput irruentibus in grauissimas epilepsias plures deciderūt, irritata, ac lacerata ad expulsionē facultate, & eō magis, quod acrior extiterit sentiendi potentia.

B Sed vertet aliquis in dubiū, si obstructio ad sensuū oblationē, symptoma hu ius affectionis p̄prium, necessaria est, q̄ fieri possit, ut ex aura, vel tenuissimis hali tibus, aut ex sola sensus acrimonia cerebrū obstruat, ac si nō obstruitur, qua via sensuū oblationes fiunt. Cui dubitationi dicendū arbitror, sat esse ad sensuum oblationē nebulosam illā substantiā in caput irruere, cui tanq̄ concausa accedit vehemētissimus ille cerebri motus, quo existētī ē si nulla subsit obstructio (ut in iis cōtingit, q̄ perspicaciori sunt sensu) impossibile est, aut p̄difficile sensus posse p̄prias liberē edere actiones ob cerebri in cōmodū figurā, & spiritū in ordinatos motus: p̄terquā q̄ sic affecti non oīno sensu priuantur, quēadmodū frequenter conspiciunt in hystericiis affectionibus, & epilepsia p̄ consensum, in quibus plures feminæ audiunt quidem, respondere tñ ob deprauatum mu sculorum motum nequeunt. Itaq; iam constabit duplicem esse in genere epi lepsie causam, alteram, q̄ per primogeneam affectionē captu infestat, velut est humor crassus, factus tñ rarus, leuis, & spumofus alteram verò, q̄ per cōsensum hoc malū excitar, & multiplicem habet occasionē, eamq; vel à ventriculo nō nunq̄ ortā, vel quouis alio membro, aut viscere, ex causa quidē vel manifesta, vel nobis occulta, ut de puero epileptico Gal. refert: modo ibidē aliq; venenatus humor generet, cuius halitus ad tēpus cerebrū irruens, epilepsiam excitet: modo ex morsu venenati alicuius aīalis virus in corpus ei aculātis p̄deat. Nā dū p̄dictū venenū ve nas primitus attingit, malū corporis habitū, ac tumorem p̄ter naturā in toto corpore generat, sanguine venenoso facto, & iecoris calore corrupto. Dū verò venenū arterias irruit, vniuersi corporis calor emorīt, & ma xima anxietate, inquietudine, & frigidis sudoribus, ac syncope aīal interficit. At cū neruā aliq̄ substantiā venenū primo aggreditur, in epilepticā cōuulsio nē p̄culdubio corpus defert. Cui sanē malo cōsimile vitii vterus ex semine, & menstruo corruptus in caput regerit, miramq; illā epilepsie varietatē, q̄ à prin-

cipio

*Duplex cau
sa epilep
siae in p̄o*

*de venen
epilepsia*

cipio, prosumus, machinatur, cuius varietatis ratione exponere iam aggredior. A
 Solet quidem hoc malum feminis accidere, vel viduis, qui non propter (ut moris erat) feminine vel sanguine menstruo purgatur: vel virginibus, aut sterilibus, qui minus quam abundantia iuuenilis postulat, aut consuetudo ferebat, steriles femine, & virgines menstruo sanguine expurgantur. Quibus sane substantiis suppressis continet facile inter alia vitia, venenosa sordidaque corruptione fœdari: à quibus non leuia accidentia ex iis, qui ex epoto veneno prodire diximus, miserrimis feminis succrescunt. Quippe ea ratione, qua in virorum digitis, crure, vel manu veneni quod pessimi le generatur, à quo epilepsia perficisci dictum est, eadem perfectò omnino in feminarum uteris accidisse plerumque certum est. Quam porro epilepsiam ex predicta causa obortam, non vulgare, & utcumque esse censemus, sed mille varietatibus implexa: nam quibusdam totum corpus contremiscit: aliis una aut plures partes: rursus nonnullis vel oculus solus, aut lingua, vel caput, vel manus, aut alterum crus: nonnumquam septimum transversum, & multis reliqua respirationis instrumenta: plerisque horum aliquid per intervalla ordinata, aut citra ordinem accidit, vel sponte, vel à leui occasione sumpto principio, & (quod mirabilius est) ex voce, sonitu, aut musico concentu, vel flatu, aut quavis alia re, cuius ratione intellectus consequi nequit, quod extra naturam ordinem & institutum videatur ad sensum perferre. Quibus præterea motus varietatibus aliquando accidit aliquod mentis vitium succrescere, vel alicuius externorum sensuum ita ut quidam apertis oculis non videant: alii neque verbum audire possint: multæ loqui non valentes, muta & veluti fatue decubunt. Plures ite se videre, & audire multa, qui falsa, & à ratione aliena sunt, existimant: alii quidem vociferantur, & vehementer conqueruntur, cum verò proferre quid sentiant, cupiunt, non valent: nonnulli ite risum non leue proferunt, alii fletum: omnes tamen ferè sensu tactus priuantur. Plerisque etiam pleraque ex predictis accidentibus simul iuncta succrescunt, varia & incòprehensibili cònexione intertexta: ita ut quivis feminam sic affectam novum, & nunquam visum accidens perpeti iudicare in re optimo possit. Itè ex feminis sic affectis quedam nullum cibum appetunt, alia etiam si appetant, deuorare tamen nequeunt: plurimæ si id conentur, statim euomunt: quod etiam in potu accidere còperimus: qua ratione subinde urinam non reddunt: quæ quoque varietate in appetitu accidere vulgatissimum est. Verum licet hæc omnia tam mira varietate ludentia epilepsie succrescant, una tamen eius ratio est, una natura. Cum hoc tamen licet C
 varia & diuersa existant predicta accidentia, omnia tamen prodeunt cerebro primum ex utero affecto: quod sane sic affectum alicui parti deinceps vitium communicat, cuius lesione accidens aliquod ex predictis oriri necessum est. Itè cerebrum ex utero affectum, cordi, intestinis, ventriculo, septo transversò, sensuum instrumentis, aut plurimis ex his partibus vitium còicat, nunc seorsum cuique, nunc omnibus simul, aut plurimis. Præterea, fiunt eadem vitia vice versa, nimirum, utero ledente membrorum aliquod ex predictis, quod postmodum suscepto semel damno, cerebrum quoque afficit, & in consensum trahit: quæ sane ratio maximi est momenti in monstruosa huius epilepsie varietate distinguenda.
 Quamobrem ratione diversitatis accidentium in his duobus ledendi cerebrum modis sita præculdubio esse arbitror: nam primo còsistit una diuersitatis ratio in eo quod cerebrum vitium ab utero susceptum reliquis partibus còmunicet: ex quo succrescent necessario duo accidentium genera, tria, vel plura iuxta diuersitatem par-

A. partibusque vitiis a cerebro susceperant vnde mirum non est si partes, quæ affliguntur, natura varie existunt, & cuique in ea accidentis ratio, vnde quoque succrescant in corpore accidentia. Secundò id profectò fit, quia membrum aliquod, vult aut plura ab vtero abiciuntur, & ipsa postmodum cerebrum ledunt, ex quibus eadem etiam accidentia varietatè inbori necessum est. Vt utique in fuit epilepsia, ex vtero halitus habet ex utero ferientè, vel partem, cui caput consentit: quod Hip. pulchre dixisse constat lib. 7. pop. Plurimas enim inquit vteri affectiones flatus faciunt, signa sunt rictus, & strepitus circa ventrem, & in laborum tumores, & dolores circa renes, ac coxas. Quos sane flatus mouet externa, aut interna quævis causa, quæ excitare eos debet, non in discentere apta sit: quos in flatus seu in ex semine, aut sanguine menstruo, vel ex vtraque substantia, quæ mille modis antea posse vitari diximus, prodire. Hanc sane corruptionis varietatè asserimus tertio varietatis accidentium causam consistere. Ex qua variante, quæ dissimilis ad modum est & confusa, prodit, halitus quoque, ascendentes varios esse, frigidos nimirum, quales semè corruptum gignere habet, calidos, mordaces, crassos, caliginosos, fetidos, tenuissimos, & maxime penetratores, tenaces, diuque, alicui parti persistentes, & alijs modis innumeris variegatos diuersosque ita ut mirum non sit, si diuersorum quoque symptomatum causa sint, et si affectionis ratio vna sit, quæ pouillimè causa est, cui præcipuis actionibus feminas subitò priuari conspiciamus, & si hito ad pristinum statum peruenire. Inter quas sane alias reperies, quibus diu durat affectus, plures, quæ nihil fuisse perpessus monstrant, quatenus ad corporis specimen pertinet, et si grauissima sustinuerint accidentia, item alias alijs modis efficiuntur; varietatis ratio stat, vel in varia corruptionis seminis, & sanguinis menstrui sorte, vel in membrorum, quæ aut vitiis ab vtero susceperant, & capiti referunt, vel eorum, quæ in capite ex vtero affecto coalescuntur simul, varietate quæ omnia profectò probatum est ab externa causa, quæ flatus concitaret, vel ex interna, quæ ibidem foueat, vtraque tamen inouente, aut semè, aut sanguinem menstruum prædictis modis vitantem.

Monstrare quidè per signa hunc affectum frustra, & inutile profectò est, siquidè motus deprauati, & mentis ac sensui oblationes id facile ostendunt. Ceterum per consensum ne, an per primogenitam affectionem sit, non est ita facile nosse. Docuerat in id Hipp. nuper adducta sententia lib. 7. pop. quæ hæc refert verba. Plurimas vteri affectiones flatus faciunt, signum sunt rictus, & strepitus circa ventrem, & in laborum tumores, & dolores circa renes, ac coxas. Præter quæ signa, et dum per consensum sit, nulla aut quæ paucissima spuma per os erumpit. Itè id monstratur ex mensium suppressione, vel diminuto præter morem fluxu, & in viduis, ac ijs, quæ viris vtuntur, ex seminis suppressione: nam sæpe eo ultra ætatis rationem retento grauius virginibus ipsis offenduntur viduæ. Constat item per consensum, & ab vtero esse ex alijs vterinis affectionibus, quibus haud raro feminæ sic affectu conquerruntur. Præterea, ex varijs accidentibus inordinatis, & quæ nulla similitudinem seruant: quod alienum profectò est à cõs epileptiæ natura. Item eo quod feminæ ex vtero affectu, etiam si reliquis sensibus orbeantur, frequenter tamen audium superstitem habent. Constat et, quia epilepsia ex vtero semper habet sibi comitem alterius partis affectum. Adhuc, profectò scitur à vitiis alicuius inferioris membri, quod vterus ipsi sufficit: id quod ex per-

N culla-

Affectus
per signa.

culiaribus partis symptomatis facillè inuenies: nã si vètricus fuerit, id optimè **A**
 dignoscas ex vomitu, nausea, cibi fastidio, oris vètrici morfu, atq; oris amaro
 re, q̃ sanè omnia accessiōe præcedunt, & vltimò eò q̃ famescerent potius q̃ sa-
 turas accessio apprehendit. Sic frequenter ab splene prodire distingues ex rugi-
 tu in ipsius regione, ex dolore, ex mæstitia, taciturnitate, & timore. Pari etiã ra-
 tione à corde pficisci internoscas ex anxietate, coloris mutatione, pulsus varie-
 tate, animi languore, & totius corporis impotentia. Verũ si vteri consensus pri-
 mo caput apprehenderit, subita fit accessio, præterquàm q̃ aut tinnitus aurium,
 aut vertiginosæ imagines præmittuntur. Semen verò corruptum esse eò digno-
 scas, q̃ omnia accidentia maiori ex parte frigiditatem attestantur.

Affectiōe hanc periculosam esse, & mortis præfagã dubitauit nullus, præ-
 fertim si accessiones frequentius irruant, & cor etiã oblædatur: finaliter, corpo-
 re existente pleno, & laborante languida nil mirũ si in apoplexiam ieuẽ, aut in
 paralyfim degeneret. Quapropter peculiari diligentia auxiliares manus adhi-
 benda sunt. Verũ si rariùs accessiones repetant, non est protinus verendũ præ-
 dictum malum accessurum, etiam si sæuissima prima facie videatur accessio: ob
 idq; bona spe alere oportebit assistentes. **B**

*Curandi
ratio.*

Cum non minus p̃gnantibus huiusmodi epileptici affectus accidant, q̃ reli-
 quis mulieribus, ac in accessione illæ abortu, hæc verò suffocatione, aut alio ma-
 lo periclitentur: ob id primo innitendũ est accessiōis mitigationi, vt q̃ nō mi-
 nimũ periculũ asserre soleat. Curandum igitur dũ fœminam accessio apprehen-
 derit, q̃ citissime renocare, cauentes ne vulnere percussioneve, aut alio damno
 vehementis motibus afficiatur: cum hoc tñ prohibere ex toto quominus aliqd
 moueatur, vt multi magno conatu perperam efficiunt, à ratione alienum esse,
 semper existimaui: siquidẽ dũ motus ex toto cohibentur, proculdubio accessio
 nẽ retardari haud rarò conspicies. Cum enim concutiunt partes, materia, q̃ par-
 tem internam affligit, discutitur: præterq̃ q̃ dum fœmina ab accessione renoca-
 ta est, superest deiccta, ac confracta nimis. Præterea, cūni arte studendũ est, vt
 id totum, quod cerebrum irruit, q̃ citissimè euanescat, discutiatq;: his quidẽ
 præsidijs, q̃ naribus indita innata tenuitate ad ventriculorum cauitatẽ permea-
 re, ac materiã illam absumere digerendo, resiccandoq; facile possint. Sunt aut̃ **C**
 ea ipsa, quæ alioqui sua sponte epilepsiam excitare assolent, vt lachrymæ forti-
 dæ, bitumen, castoreum, folia ruta, pulegiũ, calamintha, & id genus alia. Neq;
 mirum cuiquam esse debet, si hæc, quæ epilepsiam concitare nata sunt, leuamẽ
 in eadẽ præstare possint: quippe primũ materiã cõmouendo disponunt: secun-
 dũ verò eandem commotam digerunt discutuntve. Pari etenim ratione id ef-
 ficiunt, ac pecunia callo suspensa attenuando, in scidendo, discutiendoque, quod
 sibi proximum steterit. Qua profectò ratione censeo, mulierculas astantes suffu-
 migijs ex papyro, pilis, & alijs (q̃ fortida sunt) vstis q̃ citissimè sic affectas renoca-
 re: experimentum quidem efficacissimum ad dignoscendũ, an affectio per con-
 sensum sit, nec ne: q̃ in primogenea nihil hæc præsidia prodesse comperiamus.
 Prodest etiam aqua ex distillatione ceraforum epota, q̃ mille laudibus non cõ-
 temnendi autores extollunt: cuius etiã naturæ creditur esse aqua ex distillatio-
 ne hirudinum, q̃ paulò inferiùs scribam, mensura. ij. 3. quæ ori imposita discuti-
 tur, & propria partiũ tenuitate se in abditissimas partes insinuat. Oleis quoque
 vten-

- A** vtendum est intra aures proiectis, & super capitis suturas adhibitis: præsertim ijs, q̄ valde tenuium sunt partium, velut est oleū de spica, de sampluco, de cinnamomo, de nuce muscata, vel rutaceū, aut sycioniū, addita aquæ vitæ tertia parte. Quibus citra dubiū magis prosunt cucurbitæ vtero affixæ, & ea medicamenta, quæ vtero imposita flatus discutere sæpe diximus. e. de suffocatione. Vtero quoque odorata adhibenda sunt, nisi mulier p̄gnans fuerit, cui satis erit supernas partes suffire. Prosunt etiam extremorū vincula, & frictiones, quibus frequenter adhibitis sufficere haud rarò solet: sicut ventrē oleo rutaceo, liliorum, & de bacis lauri, ac similibus inungere. Suppositoria itē valētiora, voces & strepitus magnos conferre sæpillimē visum est. Itē in cōspectu laborantis magna luminaria succedere capite, & corpore subito erectis, & apertis oculorū palpebris. Sic & vehementissima pilorū pudēdarū partium auulsio, dubio procul fēminas hoc modo affectas reuocat: sicut viros testium dolor. Cauendum tñ in fēminis est à vehementioribus medicamentis, in quibus si diu duret accessio, eaq; sit ex mēsum suppreSSIONE, consultissimum est, ex talo sanguinem mittere: quo præsidio non paucas reuocari facilē conspeximus, præsertim alijs nihil præstantibus: in quibus, si menstrua defecerint, cauendum est à cucurbitarum super vmbilicū vsu, quarum gratia laudarem potius femoribus affigi.

In vera autem curatione obseruandum est: tanq̄ in re grauissima, & difficillima præceptū illud Hip. li. i. de morb. mul. in fēminarū curatione nō satis laudatū. Considerare oportet ēt (inquit) naturas mulierū, & colores, & ætates, & tēpora, & locos, & ventos; Aliæ enim frigide, aliæ humide, ac fluide: aliæ calide quidē sicciore, ac stabiles sunt: nā q̄ superalbide fiunt, humidiores sunt ac fluidiores: nigre verò sicciore, & acerbiores, ac astrictiores. Quæ verò vini colorē referūt, mediū quidē inter vtrasq; habēt: sic autē & in ætatibus cōtingit, iuuenēculę enim humidiores sunt, & multo sanguine plerunq; refertæ: aniculę verò sicciore, & modicū sanguinē habētes: medię vero mediū quoddā iter vtrasq; hñt, vt q̄ nūc æquales existunt. Oportet autē eū, q̄ rectē hęc tractare volēt, semper mulierū naturas discernere, & tēporū occasiones, & ætates, & tēpora, & locos, & vētos. Quæ pculdubio sententia cōstat, quanti momēti sit, & q̄ difficile fēminā curandā suscipere. Quod ēt antea lib. de nat. mul. dixerat idē Hippoc. p hæc verba: Oportet eū, qui hæc rectē tractare velit, primū quidē ex Dijs ordiri, deinde mulierū naturas discernere. Quāobré neq; temerē, nec incōsultō cuiusuis mulieris curationē aggredi oportet: sed primò in hoc affectu peculiare fēminarū cōditiones cōsiderare opus est: nā indiuidualis, & propria cōditio plurimū euariat à cōi curandi ratione. Pr mū etenim sat est, fēminæ vtero gerenti (nā de eis primitus sermonē instituere placuit) emplastrū pro matrice apponere, quod recipiat massæ emplastri p matrice, & ceronei, ana ꝑ. j. i. musci. g. vj. misceantur cū oleo liliorū, vel de spica, & siāt emplastra duo, quorū alterū ventri, & alterum dorso apponatur: cōfert vel carnis semiallæ frustū cū modico moschu, & cinnamomo eisdē partibus apponere, vel pomū assūm, vel micam tostū panis, vino irroratā, & eisdē pulueribus sparsam: vtatur ēt sic affecta trochiscis de moschu, quos ore teneat frequenter. Sed curandū omni studio est, vt q̄ breuissimē ab accessione reuocetur, adhibitis ēt prædictis oleis vtero, & naribus suffumigatis: nam periculum est, ne si diu duret affectio, scætura suffocetur.

N 2

Verūm

Si ex mē-
struo
f. 126
f. 126

Verum in reliquis fœminis curandi rō triplex insurgit: altera, q̄ vtero proui-
deat, cui summopere innitendū est: altera verō, q̄ capiti. & rursus tertia, q̄ eius
mēbri curā habeat, cui ē vel vterus, vel caput dānū p̄stat. Atqui cū vterus vna ē
tribus rōnibus id malū efficiat (propter flatu nimirū, aut halitus ab eodē ela-
tos, ex semine, vel sanguine menstruo proficiscentes) ob id profectō hęc tria in
spicere ad rectā curandi rātionē par est. Quod si sanguinē menstruū redundare
comptum fuerit; ex d. minuto, vel ablato menstruo, ex fœminæ habitu, ex ac-
cidentiū conditione, q̄ sanē mitiora sunt, ac ex totius corporis, & faciei rubore
& alijs, q̄ superius diximus: potissima curandi ratio est, vt Hipp. placuit lib. de
virg. morb. ea quæ p̄ sanguinis detractionē efficitur: tū venis tali scillis, tum mē-
strui omni arte provocatis, vt proprio cap. dictum est: tū ē per hemorrhoides.
Quibus vacationibus p̄ intervalla inter curandum factis affectionis materia
demitur, & alijs curationibus via sternitur, ac vterus quoq; disponitur, vt robo-
rantia, & discutientia innocuē admittere possit. Sed expendant hunc affectū cu-
raturi, millies mihi, & alijs viris in hac re peritis longissima obseruatione esse
cōpertū, medicamenta expurgantia, q̄ passim ab autoribus cōmendantur, pro-
desse quidē parū, aut nihil: natu cum id, quod affectū generat (ēt n̄ semel excer-
natur) sæpius sanguine ad vteros conflente, ac semine ē nouiter indies genito
& corrupto producat, & denuō accersat affectum, sit proculdubio, vt mini-
mum prodesse videantur. Quamobrē si quis malū radicatus (quantum res ipsa
patitur) euellere cupit, studeat perpetuo, vel materiā superuacua ex toto aufer-
re, vel si quid indies corrūpitur, sensim, & paulatim p̄ certū & determinatū lo-
cū, cui natura assuescat euacuare. Primū quidē fit, missio, vt dictū est, sanguine
bis, terve, aut quater in anno, idq; p̄cipuē ex venis tali, vt & putredo sanguinis
in vtero inhibeatur, & siqd̄ ibidē redundat, auferatur, euoceturq; cōsuetus vte-
ri fluxus, vt minus deinceps redūdet, minusq; qd̄ superest, putrescat. Quod si fre-
quēter accessiones superuenerint, tutū est consiliū, hirudines hemorrhoidibus
affigere, donec copia sanguinis cōuenientē extrahant. Quo facto, sanguinem à
recrementis, & vitiosis humoribus (quibus abundare, dum ultra modū detine-
tur, necesse est) mundare oportet: sic etenim sanguis, & semen tardius corrūpun-
tur. Id quidem primò facere tentabis leuissimis medicamentis (nam licet in me-
lancholia, quæ in maniam degenerat, grauioribus vsi fuerimus, poposcerat id
affectionis natura, etiam si vteri conditio ea renuere videretur) bis, terve in an-
no, tum etiam frequentius nimirum per epicrasim, ex rhabarbaro, si iecur com-
patiatur; ex agarico, si ventriculus; & ex vtroque pillulis confectis, aut expres-
sione facta, si vtrunq; membrum compatiatur. Prodest & aloes lota pillularum
forma exhibita, vel pillulæ ex hiera simplici Gal. & mastiche, vel confectæ ex
pari portione rhabarbari, agarici, aloes, & mastichis. A quibus purgationibus
confectionem Amech sine scammonio, & colocintide præbere per longiora
intervalla præstantissimum ēt præsidium, siue sola, siue cum modico rhabarba-
ro, aut agarico commixta exhibeatur, vel aqua lactis, aut decocto aliquo cor-
diali liquata. Quem etiā vsū præstat syrupus ex infusionibus, vel casia fistula,
cui adijciendū est aliquid eius, quod calfaciendi, & flatu discutiendi, ac robo-
randi vires habeat, velut est puluis hieræ simplicis, diarrhodonis, anisi, liquiri-
tæ, peoniæ, & similia. Verum cū huius, & aliarū vteri affectionū, ad eodē sit
mali-

A maligna conditio, vt præterquam q̄ mēbra nutrimentalia, & viscera omnia frequenter sibi in cōsensum trahat, cruditates quoq; multas, & varios excrementosq; succos in vtero, capite, ac reliquis mēbris gignat: ob id profectō vltius purgare aliquñ conuenit, habito respectu ad aliquem humore quē ex prædicto vitio redundare cognouerimus: vel ad aliquod ex nuper dictis membris posthabita vteri cōditione: q̄ dū sic afficitur, & semine aut sanguine corruptis abundat, raro admittit maiora medicamēta. Sic redundante humore melancholico, vel splene affecto, aliquod ex dictis pharmacis c. præce. huc trāsferre opus erit. At redundantibus pituita, vel crassis, ac viscidis humoribus, facta preparatione pillulis assaiet, de hiera, de mastiche, de agarico vū tuto poteris. Ceterū parere in hoc affectu pillulas oportet sine croco, myrrha, & alijs, q̄ caput tētare nata sunt, sarcocolla tñ, & peonia omnibus admiscēda. Quod si alijs cedere affectio nequeat, ad stibij g. iij. confugiendū esse arbitror, quod quidē p̄sidium certū, & mille modis proficiū reperies, in grauiorib. tñ ac difficilioribus epylepsijs. Sed materia vacuationi idonea reddetur melle rosaceo, hydromelite, syrupo stœchados, aquis gallitici, betę, rutę, hyssopi, vel cū harū herbarū decocto, aut cū radicibus peonię, polipodij, & acori. Quid si serapio aliquo, quo leuiter purges, vt fuerit in animo, hac lege mirabilis efficacit̃ cōpones: Recipe polipodij quercini ꝑ. iij. radice peonię, & seminis eiusdē, ana ꝑ. ij. gallitici, violarię, mercurialis, an. m. j. summitatū rutę, pulegij, betonicę, hyssopi, ana m. s. p̄sularū sine acinis, & prunorū, ana ꝑ. ij. anisi, feseleos ana ꝑ. s. seminis cartami cōtusi, & foliorū senę, ana ꝑ. ij. florū violarū ꝑ. ij. buglossę, anthos, ana ꝑ. j. fiat decoctio in li. iij. hydromelitis, & vna consumpta, infundantur facta expressione in libris duab. p̄dicti decocti, agarici ꝑ. vj. cū saccharo fiat serapiū addito modico cinnamomo. Quibus sanē p̄ interualla, & vt necessitas tulerit vtendū est, ne aut sanguis, aut alius quiuis superuacuis humor ea copia, vel in vtero, vel proximis partibus succrescat, qua in corruptionem facile degenerare possit.

In qua item curatione semini prouidendum est, ne aut plurimu crescat, aut corruptatur. Sic profectō omni arte studendum est, ipsum minuere, & exsiccare cibis, potibus, & medicamentis, quę huic vsui idonea esse, cap. de vteri suffo

C catione abundē diximus, non enim mei instituti est, eadem multis in partibus eiusdem operis referre.

Secunda verō curationis ratio, q̄ posse radicitus malū extirpare diximus, id p̄sidium adinuenit, quo paulatim, & sensim, q̄ putredini parata sunt, aut putrescunt (siquidē semen, & sanguinē non succrescere interim dū fœmina iuuetute viget, est impossibile) p̄ partē aliquā, cui natura assuescat, perpetuo fluore excernatur: id sanē p̄stat fontanella altero, vel vtroq; crure adaperita, prout iecur, aut splenē consentire affectio[n]i nobis cōpertū fuerit. Idq; hac lege facies (vt lib. nostro de auxil. indica. c. de fontanellis abundē dictū est) si affectus nondū fixū, & stabilē habuerit in capite epilepticum apparatus, sed vniuersa epilepsię ratio p̄ consensum ab vtero sit, sat est in cruribus fontanellā aperire. Verū si aut natiuū contraxerit habitū, aut p̄ affectus vetustate acquisierit, tūc & in brachio & in crure aperienda est: illud quidē, vt quod in capite indies aggregatur, epileptici apparatus causa, p̄ foramen illud expiret: hoc verō, vt ab vtero parū, aut nihil ad cerebrū ascendit, retracto p̄ cruris foramen superfluo corruptove hu-

N 3 more.

more. Quod praesidium tanti semper feci, tamq; feliciter successit, ut ex gravissimis accidētibus, & ex ijs, quæ nullis alijs auxilijs cedere voluerunt, plurimas faminas liberauerit: ad quod profectò, tanquam ad vltimum, & maximū praesidium haud frustra confugies.

*Quadi-
scunt
& robo-
rant.*

Verum ut omni studio vtero, tanq; mēbro mandanti, pvideamus, curādū est status discutere (huius certè mali immediati autores) & vterum cōsumptus humorum reliquijs roborare. Quæ sanè oīa pariter efficiunt theriacā, Mithridatū, diamos dul. & amar. electarium de gemmis, lactificans Rasis cū aqua buglossæ, capillorum veneris, vel peoniæ. Incredibili tñ efficacia prodest (& obstructio- nibus et aperiendis, ut seq. c. docebo) vsus lapidis vozoar appellati, praesertim si diluatur aqua, vel decocto schorcioneræ. Cōsumit quoq; reliquias, & miri est iuiamentū decoctum galli antiqui cum brassicā marina, polipodio, cartamo, & passulis, vel cum decoctione peoniæ, & senæ. Prosumit item tabellæ, q̄ conficiuntur hac lege: Recipe seminis agnicasti, rutæ, anisi, fœniculi, ana 3. s. pulueris ligni aloes, corticis citri, & menthe, ana 3. j. sacchari quantum sit satis, ut fiant tabellæ. Praestat nō minus aqua, q̄ extrahitur ex destillatione p̄dictorum seminū cum pugillo capillorum veneris, & radicū buglossæ, ac schorcioneræ. Eundem vsū p̄stat ventrē inferiorē inungere oleis chamæmeli, liliorū, de rutæ, de bac- cis lauri, & alijs, q̄ ex p̄dictis seminibus, & cinnamomo, aniso, pipere, & gario- phyllis p alembicum instillantur. Cōferunt quoq; emplastra p matrice, q̄ c. de suffocatione diximus, & tu ipse reperies c. de vteri imbecillitate; itē emplastrū ceroneum p se, aut p̄dictis oleis admixtum: fons et ex chamæmalo, rore mari- no, meliloto, adianto, radicibus diureticis, seminibus anethi, fœniculi, rutæ, agnicasti, cimini, & lauri. Ventrē tñ existente vacuo, hæc oīa tutius facies. Con- ducit non minus clysterium vsus, p̄sertim si hac lege conficias: excipe mercuri- alis, blii, artemisiæ, cuscutæ, melissæ, & maiorang, ana m. s. senæ, polipodij, car- tami, ana 5. s. epithymi, thymi, ana 3. v. seminis anethi, rutæ, & agnicasti, ana 3. ii. j. facto decocto adde diasenæ, diacatholiconis, ana 3. s. olei chamæmali, & anethi, ana 3. j. misce. Quæ sanè oīa moderari, & mutare facillè iuxta laborantis naturā, & affectus conditionem poteris: nam hæc tantum exempli causa dixisse sit satis, Præter q̄ omnia vterum expurgare oportebit suppositorijs, & pessarijs, q̄ & se- men educant, & menses moueant: quorum non parvam copiam reperies ca. de vteri suffocatione. Quo etiā in loco reperies stillatitiam quandam aquam, q̄ potui datam maximi esse momenti experimento didicimus.

*Quæ ca-
pit respi-
ciunt.*

Capiti quoq; prouidendum esse; cōsulit affectus rō: nā cum vniuersa eius na- tura ab eijsdem actionibus cōseruetur, pueniaturq; dum frequenter halitus il- luc peruadunt, rationi consonum est coniectari, vel ipsum fieri imbecillius, ut deinceps propria munia obire nequeat, aut resistere halitibus non valeat, uel ex eadem imbecillitate humores quoq; , seu excrementa praua loco alimenti conficere, q̄ postmodum à leui occasione cōmota, et epilepsiam excitant. Quā- obrem curandum est, ut si quid in eo adhuc, ex ijs, q̄ ascenderunt, superest, aut nouiter generatum est, discutatur, excrenaturve, ac deinceps corroboretur, ne facillimè, id vitium iterum admitat, aut generet. Primò quidem p̄dictis pillu- lis uti oportebit, praesertim mastichinis, cum sine quibus, addito modico ex co- chijs: uel facta leui aliqua purgatione, ijs pulueribus, tabellis, & confectioni- bus

A bus vti cōueniet, q̄ discutiant, si quid superest, & ē caput ipsum roborant. Cōfi-
citur aut puluis hac lege: coriandri p̄parati 3. j. pulueris radicis buglossę 3. scin-
namomi, corticis citri, seminis anisi, & agnicasti, ana 3. iij. ligni aloes 3. j. saccha-
ri 3. iij. fiat puluis, & misceantur, quo summo mano vtatur. Alter ē p̄tiosissimus
paratur hoc modo: excipe violarum 3. j. cumini, carui, seseleos, ana 3. iij. seminis
peonię, seminis rutę, & agnicasti 3. j. pulueris subtilissimi (aut cineris) cranei hu-
mani, vel cuculi, vel hirundinum, aut melillę, vel mustellę 3. iij. fiat puluis sub-
tilissimus, cuius laborans sumat 3. j. sacchari candi 3. j. cum aqua gallitrici, vio-
larum, aut graminis. Cuius ē loco tabellas hoc modo cōficiēs: excipe myrrhę
electę, coralli rubei, cornu cerui, & eboris, ana 3. j. seminis peonię maris, semi-
nis agnicasti, visci quercini, ana 3. j. cranei humani 3. j. & 3. j. cum saccharo distil-
lato in aqua rosacea si intabellę ponderis 3. j. quatum vna manū, aut vesperi
femina ingerat. Expendendum tñ hac in re est, medicamentum in hac affectiōe
deuorantia minime odorata esse oportere: quippe cum capitis granitatē faciat,
paratis ad epilepsiā paroxisum accerant. Valer quoq; si ut in omni epilepsia
cōfectio altera ex craneo humano hac lege cōfecta: excipe theriacę sinuagdorū
3. j. diamusci vtriūq; ana 3. j. theriacę magnę 3. j. & 3. j. pulueris seminis agni-
casti 3. iij. pulueris radicis peonię 3. iij. pulueris cranei humani 3. iij. cū serapio
de storchade fiat cōfectio: p̄tat idem beneficium radix eringij saccharo cōdi-
ta, & diu comesta. Ex vsu ē est cōserua, q̄ recipit radicis peonię, & eringij prius
satis decoctę lib. j. mellis quantum sit satis, vt fiat cōserua: cui adde pulueris
cinnamomi 3. j. pulueris seminis agnicasti 3. iij. Eandem & longē maiore gra-
tiam p̄tat cōfectio, quę recipit theriacę sinuagdorū 3. j. pulueris radicis
peonię maris, & seminis eiusdem, & agnicasti, ana 3. j. coralli rubei p̄parati 3. j.
visci quercini 3. j. pulueris vermium rubi, & succi rutę, ana 3. j. cornu cerui vsti
& monocerotis, ana 3. j. pulueris pullorum hirundinis adustorum 3. j. rhodo-
mellis quantum sit satis, vt fiat cōfectio: cuius bis, aut semel in hebdomada la-
borans sumat cocleare vnum. Item mirum in modum corroborat caput cōfe-
ctio alia, q̄ recipit margaritarum p̄paratarum 3. j. vtriūq; coralli, zafirosum,
smaragdorū, & hiacinthorum p̄paratorum, ana 3. j. seminis agnicasti 3. iij. cra-
nei humani 3. j. & 3. j. cinnamomi, gariophyllorum, ligni aloes, ana g. xv. musci,
ambre, ana g. iij. sacchari candi, & carnis vuarum passarum, ana 3. j. sacchari op-
timi quantum sit satis, & adde pulueris coriandri p̄parati, florū borraginis, bu-
glossę, & violarum ana 3. j. maioranę 2. s. pulueris papaneri albi 3. j. cū modico
aquę buglossę fiat cōfectio. Extrahitur quoq; p̄ instillationem gratia corrob-
randi caput, ac discutiendi, si quid in eo immoratur, mirabilis q̄dam aqua hoc
modo facta: hirundinū, nu. 4. castorei 3. j. vini albi lib. ij. aquę portulacę, & bor-
raginis, ana lib. 3. seminis agnicasti 3. iij. coriandri p̄parati 3. j. cōterantur oīa, ac
in balneo marię instillantur, & aqua vsui seruetur, cuius coclearia duo in ac-
cessione, vel extra ipsam p̄mixta vniuersali prouidentia porrigere poteris. Vsi
quoq; est aqua, q̄ ex theriaca magna, & eisdem rebus ac mica panis nelle rosa-
ceo imbuta, p̄ instillationem extrahitur. Pręstat quoq; idem beneficium deco-
ctum guaiaci, vel radicis chinę, aut falsę paretellę, additis radicis peonię, & an-
gelicę, qd sanē p̄ter q̄ quod inscindit, tenuat, & exsiccat, malignā quoq; qualita-
tē retundit, & frenat. Exteriūs verò puluisculos, sacculos, & inunctiones ad no-

*Vtilissi-
mā cōpe-
ries huius
malo,
mel scil-
licet, quod m-
stilla ex
melle,
& scilicet
procelis
in nāe
perfora-
to, solis
expositio.*

uere oportet: cuius census est puluis, qui recipit granorum myrti, & granorum A
 tinctorum, rosarum, & coriandri, ana ʒ. ʒ. ʒ. santholorum ru. violarum, nenufaris,
 capium papaueris ana ʒ. iij. florū anthos, stæchados, ana ʒ. ʒ. fiat puluis tenuis-
 simus, quo prius acetò irrorato, & ressecato inspergatur pars anterior capitis.
 Alterum etiam hoc modo conficies: rosarum, granorum myrti, an. ʒ. ʒ. ʒ. seminis
 lactuca ʒ. ʒ. granorum tinctorum, santhali ru. coralli vsti, & loti, ana ʒ. i. & ʒ. ga-
 riophyllorum, & ciperi, ana ʒ. iij. fiat puluis subtilissimus, qui acetò irroratus,
 & leuiter resiccatus vsui seruetur: ex quibus etiam facile fieri potest pileus cor-
 roborans, additis coriandro præparato, rosis, floribus borraginis, buglossæ, &
 violarum, pulueribus item seminis agnicasti, rutæ, stæchados, maioranæ, anthos
 & corticum papaueris albi. Forus non minus capiti prodesse solent, præsertim
 si fiant ex prædictis seminibus, & herbis ac rebus, quas nuper diximus: quo sa-
 nè decocto semel in hebdomada uti non erit ab re.

*Quæ ca-
 rens me-
 bris pro-
 ficua
 sunt.*

Plerumq; in hoc affectu præter caput, aliud, aut plura ex visceribus vterus in
 consensum allicit: quo proculdubio monstruosior epilepsia efficitur: simulat
 enim hac de causa propriam naturam præferens aliorum affectuū specimen. B
 Quorum viscerum curationem, dū vteri consortio vitiantur, vno in capite scri-
 bere institui: interim tamen expendat lector, necessum esse inter pleraq; medi-
 camenta epilepsia proficua, alia vsui quoq; esse necessaria, quæ & membrum
 illud à supernacuis excrementis expurgent: ac postea corroborent: nam dum ali-
 quod viscus affectu quouis efficitur (quantumuis per consensum sit) aliqua si-
 bi gignit excrementa, quæ postea nisi euacuentur, in nouum, aut maius dānum
 prorumpunt: quamobrem, si ventriculū patī cognouerimus ex generibus de-
 prauatæ appetentiæ, aut inappetentiæ, ex vomitu, nausea, vel singultu, purgare
 per epicrosim, & interualla ex vsu erit, ijs, quæ paulò inferius proprio cap. do-
 cebo, ac rursus corroborare, conterereq; humorum reliquias, quod pari lege
 de iecore, & splene, ac varijs obstructionibus, & alijs, quæ succrescere solent,
 intelligendum est.

Verū ne quis existimet, me oblitum fuisse eorum accidentium, quæ à prin-
 cipio proposueram, intelligat imprimis hæc accidentia, quatenus pertinet ad
 vteri consensum, vnam communemq; obtinere curandi rationem: nullaq; le- C
 ge, etiam si varia sint, variam exposcere medelam. Nam cū halitus ille, qui ex
 semine corrupto, vel aliter inquinato ascendit, vnus sit: vnam subinde tantum
 expostulat curandi viam, nimirum distractionem, resolutionem & aliquā extin-
 ctionem. Quæ sanè opera eisdem omnine auxilijs fient: vel saltē leuissima fa-
 cta mutatione, quam prudens & diligens Medicus moliri poterit, præhabita ca-
 se minarum consideratione, quam ex Hip. mente antea retulimus: ob idque co-
 gnita semel affectionis natura, quæ ex vteri consortio principium sortitur, etiā
 si varia subsequantur accidentia, non tenemur curandi institutum variare, qua-
 tenus pertinet ad vteri prouidentiam: nī fortè accidentium varietas ex mēbro-
 rum, quæ vtero consentiunt, varietate proficiscatur. Atque id in curatione hu-
 ius affectus obseruare conuenit, licet in cognitione naturæ vterinorum accidē-
 tium plura esse consideranda dixerimus.

De

A

De febre alba, & de virginum obstructione. Cap. 6.



INTER Virginum affectiones nullam profecto frequentius, aut vulgarius reperies, quam eam quę (eo quod proprio nomine careat) morbus virgineus appellari iure optimo potest, quę frequenter virginibus accidere conspiciamus. Appellant sanę, ut refert Ioannes Langius, eum affectum Brabantinorum femina febre albam, ob conspicuum faciei alborem: quā quoque febre amatoriam nonnulli appellant, cum palleat omnis amans, & color hic sit aptius amanti. Hanc etenim affectionem pulchrioribus feminis plerunque accidere certum est, cuius rationem non est, ita facillē monstrare, sicut neque docere, cur etiam pulchriores frequentius in melancholiam, aut quartanā febrē, & reliquos affectus ex pravis succis ortum trahentes, incidant, cum ipsę optima temperie præditę appareant. Cui, saluo meliori iudicio, dicimus, ea mala pulchrioribus accidere, quia quod formosiores sunt, eō temperatiores esse necessum est, & quod temperatius fuerit corpus, eō plures existunt in eo partes, quę purius ac temperatius alimentum desiderant, si alimentum alio persimile esse teneant. Quod fit, ut residuum alimenti deterius sit, quia quod laudabilius erat, partes ad se traxerunt, atque superante per vniuersum corpus deterioris partis sanguinis maiore portione, mirum non est, si citius in prædictos affectus prolabantur, quam deformiores feminae, quę maiorem deterioris humoris partē in alimentum commutarunt, sed ita exposcente membrorum natura, quę nō adeo bene temperata erat, sicut partes feminarum, quę pulchriores sunt. Ad pensum igitur redeunt affertur præcipuam huius morbi effigiem id descriptionē esse, cum faciei, genarum, & labiorum rubens color, velut ex anguis palleat, plūbeus, vel subalbidus efficitur, ac prædictę partes, & oculorum palpebrę quodammodo intumescere videtur, sicut & crura, præcipuē iuxta malleolos, qui noctu ordemate turgent. Contremiscit etiam sic affectis ad quemuis corporis motū, triste cor, arteriæ item temporum sensibilibus, & non citra dolorē pulsant, in quo uis corporis exercitio, plerum si in acclivē, vel arduum aliquē locū cōscendat, aut largiori corporis motu utantur, accedit enim protinus adeo difficilis respiratio, ut veluti contractę, anhelosę, & omnino impotentes sese projiciant, & mouere nequeant. Quibus nō minus succrescit, ventriculum cibos, præcipuē carnes fastidire: sic plures mæstę, fastidiosę, & veluti animi deiecti omne renouū exercitiū. Atque hæc est huius vulgarissimi affectus imago. Quamobrem iure optimo, & virgineum morbum, & febrē albā nuncupari arbitror, quod vniuersa eius ratio, ut Hip. li. de virg. mor. testatur, consistat in venarum præcordiorum obstructione ob sanguinis crassi affluxū, & permansionē. Quum enim virgines iam nature viro (aut iuniores ex esu alicuius sæculenti, aut vitiosi alimenti) steterint, suo pte motu natura sanguinē ad vteri locellos, & venas ab hepate transmittit, & cum ob earum oscula, quę propria sorte angusta admodum in plerisque existunt, & nondum patuerunt, viscidis humoribus, et fortasse & crasso sanguine obstructa, eruptioni mensium nullus, aut quę minimus superfit locus, tunc rursus per venarum maiorisque arteriarum propagines inter alia mēbra, ad quę confluere diximus ad hepar, & præcordiorum venas regurgitat, & ibidē cōpressus obstructionem efficiens

febris alba
cur pulchrioribus
accidat.

descriptio
febris albe.

causa morbi

efficientes prædicta accidentia, prædictumque affectum virginibus maiori ex parte accersit. Appellatur quidē febris alba, non quod necessariō formine sic affecte febricitent (saltem manifestē) sed quod ut plurimum, & in omnibus specimē febricitum corporum præ se ferat. Quippe præter corporis impotentiam, & mæstitiam pulsum ē habent celerem, & frequentē, non quidem quia calor semper eis dē creseit, sed quia deficit necessaria ventilatio, eō quod pulsus fiat coarctationē parum, cuius defectum suppleant celeritas, & crebritas: quapropter à plerisque has feminas febricitare fertur, licet necessarium non sit: quin potius affectus suapte natura frigidus est, & ex albo colore febrem albam fuisse appellatā censemus. Itaque ex prædictis iam constare arbitror huius affectus naturam pertinere ad alicuius visceris obstructionem, siue iecur, siue ventriculus, seu splen sit, vel vasa illis proxima, aut mesereon, quod frequentius contingere scimus, ut mox docebo, si prius dixerō, qualis naturæ sit huiusmodi affectio.

*febris alba
ante de no-
minetur*

Qualis morbus Constat quidem suapte conditione frigidum esse morbum, quod sanē præ experimentum monstrat ē Hip. li. 4. acut. nam inter alios affectus, quos ex magnis obstructionibus proficisci dixit, frigidum hunc quoque annumerat. Quod et ex eius loci sententia Gal. Aui. & Constantinus, tanquam firmum & verum autumant existimantes ab huiusmodi obstructionibus frigidus affectus subsequi necessum esse. Inquit enim Gal. 4. acut. Quando venæ superimplentur, virtutem corporis gubernatricem grauari necesse est, & periculum est, calorē cōgenitum extinguī, & propē suffocari, velut ignis nimia lignorum cōgetie suffocatur. Ex quibus euidenter constat frigidum affectū ex huiusmodi obstructionibus proficisci: argumento quidem sunt accidentia penē omnia, quæ frigidā plerumque attestantur naturam.

*febris huius
modi*

febris alba

Differt profectō à communi omnium corporum obstructione, quod hæc frigidum inferat in toto corpore intemperamentum: nā quemadmodum alijs partibus obstructis defectu ventilationis incalescunt humores & cor, ita profectō in huiusmodi feminarum obstructionibus recrudescunt humores illi, ac refrigerantur, crassescunt, & impactiores fiunt, ut vniuersum corpus ad frigiditatem moueant. Quapropter formine sic affecte, & torpent, & inhabiles ad omne opus existunt (licet aliquando plus iusto ipsas incaluisse, quod humor ille putrescat, cōperiamus) ac si moueri cogantur, statim animo delinquant ob defectum spirituum, & caloris, quæ necessaria actionum sunt instrumenta. Qua ratione censeo huiusmodi affectum posse icterum album appellari: nam quemadmodum obstructis splenis, vel iecoris meatibus redūdante humore atro, vel bilioso, reliquæ icteri species fiunt: ita prorsus redundantibus humoribus crudis, ac frigidis, mirū nō erit, si vniuersum corpus albo hoc polleat colore, qui nunc ad flauum vergat, consentiente iecoris obstructione, nunc verō ad fuscum, & subnigricantem, cōpatientē simul splene. Itaque constabit duabus rationibus, colorem in feminis sic affectis futurum esse subalbidum, & quia affectus suapte natura frigidus in toto corpore efficitur, & quia humores crudi, & frigidi (quales ad pedes, dum œdemate intumescunt, prolabantur) ac tenuissimi aliquando, qualis fluxilis pituita est, non parua portio ad cutaneas partes euolat, cuius ratione, quemadmodum in ictericis affectibus contingit, cutis ipsa albo colore tingitur. Dissidet etiā hic morbus ab hystericeis affectibus, quod in his plerumque vterus in situ, vel figura viciata

Atiata ob prædictas causas abetret, comprimaturq; subinde diaphragma, & citatiore efficiat respirationem, et si formina quiescat: at in febre alba frequentius obstructions fiunt extra utrum, in alijs nimirum visceribus: ac licet difficile efficiant respiratione non ob id est, q; diaphragma comprimant, sed quod dū ob aliquod exercitium citius, & magis dilatari conetur, & cum nequeat plurimū distendi obstructionis magnitudine ineptius proprio muneri redditur: & ob id firminæ quiescentes naturaliter respirant, motu verò, violenter & dēse. Præterea, dissidet à melancholia, quia in ea sanguis efficitur crassius, & melancholicus ex adustione, & effervescentia, aut putredine, ex cuius halitu melancholica prodeunt accidentia: at in virgineo morbo sanguis fit crassius ob frigiditatem, & cruditatē. Itē dissidet ab epilepsia generibus, quia in his halitus ex utero ascendentes ex putridis, vel aliter inquinatis semine, & sanguine menstruo, causa accidentium existunt: cæterum in virgineo morbo, non halitus, sed ipsa humoris præsentia, ac frigiditas virgineorum accidentium causa sunt. Quod si aliquñ halitus quispiam ascendere contingat, non venenosus, ac malignus, qualis in epilepsia reperitur, sed vel frigidus, vel caliginosus, aut crassus existit.

B Licet ad verā naturæ affectus virginei explanationē causarum quoq; obiter meminisse oportuerit, coger tñ clarioris doctrinæ gratia easdem specialius referre, ut facile cuius innotescat, qua curadi methodo progrediendum sit in hoc affectu. Est igitur duplex causarum genus in hoc morbo; alterū morbi ipsius, alterum verò symptomatum, q; ipse si succrescunt. Morbum quidem, cum obstructio sit, nullā aliam causam obtinere credendum est, q; sanguinis, vel immodicā copiam, q; rarē morbum virgineum efficit, licet illi principium præteruel crassitiē, lentorem, frigiditatem, ac visciditatem, q; vel ex appetitu & esu deterrimi alicuius alimenti succrescant (velut est terra, testæ fictiles, carbonēs, gypsum, cera, sal, & huius census pleraq; quorum latius c. seq. meminero) vel ex suppressis, aut improspere purgatis mensibus. Nam cum uterus sanguinis illius copiam, nec recipere, neq; expurgare ob innatā vasorum angustiam possit (quod aliquñ videtur vel nuptis, quæ improbē à mensuris repurgantur accidisse cōperimus) sequitur subinde necessario ad membra utero proxima per venas omnibus communes remeare, ac remorari in eisdem: nunc in solis venis, nunc facta ē obstructio in iecore, mesereo, ventriculo, & splene. Et cū prædictum sanguinē præ copia vasorum & viscerū calorē extinguat, ipsum cōficere eadē membra minimē possunt nec distribuere: fit quidē, ut crassus, & crudus cū supersit partibus diminutē ob id operatibus obstructions nō leues efficiat. Quæ sanē partes obstructæ, ut ad accidentium causas deveniamus, prædicta in ferunt mala ea lege, q; Gal. recenset li. 3. de diffi. respir. dicēs. Si internus tumor, aut dolor circa hypochondria cōstitit, tunc parva, & crebra fit respiratio. Deinde cum cor, stomachus, & hepar utriusque venæ chilis, & arteriæ ramis velut cōi vinculo connectantur, his sanē sanguine crasso, statuosq; spiritu, & vapore refertis, & obstructis, ut eos cor extrudat, & deoppilet, ne suffocetur, frequenti arteriarum systole, & motu eludat, & palmo cōtremiscit, quo defatigato quid obstat (ut refert idē autor lib. 4. de cau. sympt. & 4. acu.) pulsus & spirituum anhelitus interceptiones coincide re, ut veluti deploratus laborans iaceat. Et subdit eodem libro acutorum. 4.

Potest

Causa

Potest autem & multitudo, & densitas sanguinis non modò arterias inflare, & exitum obstruere, sed & ipsas propriè nominatas venas. Ex quibus euidenti argumento constat, quæ sit difficilis respirationis causâ (præter eam, quæ superius diximus, ac rursus, quæ sit frequentis, & maximæ arteriarum temporum pulsationis ratio: conatur enim cor vehementi motu, quod sibi periculû minari agnoscit, excutere quòd sit, ut èt arteriæ prope dorsum maximè pulsent. Ex quibus apparet non minus necessum esse, calorem præ spirituum extinctione diminui, & frigidos progignere humores, qui postea calorem extinguentes hac duplici ratione colorem subalbidum moliuntur, & totum corpus velut deiectû, & ad actionem quantumvis leuissimum impotens reddunt: ex quo item prodit, dum moueri conantur, animo statim deficere, præ caloris, & spirituum defectu. Atq; hæ sunt in vniuersum morbi, & symptomatum potiores causæ.

*Albedo corporis
vis humorum
euenit.*

Signa.

Signa quibus virgineum affectû nosse possimus, censeo in morbi descriptione iam dixisse: verum cum existimem in rebus obscuris, & grauioribus maiori semper opus esse diligentia, hic quoq; clariùs scribere decreui. Est itaq; primû signum, coloris genarum, & labiorum rubei, & rosei in subalbidum, aut pallidum, vel plumbeum mutatio: cui aliquâdo in medio faciei accedit purpureus color remissius quodammodo: signum profectò succensionis eorum humorû, qui vel obstruunt, vel obstructione detinentur. Pulsant item arteriæ temporû cum ipsius capitis grauitate, & dolore (vel citra ipsum) præsertim in parte eius antica, nisi vterus quoque, aut obstruatur, aut compatiatur: nam eo tempore posticam capitis partem dolere magis, superius probatum est. Fit quidè huiusmodi accidens: aut eo carèt fœminæ sic affectæ, prout ex suppressis humoribus aliquid caliginosum, vel vaporosum caput irrui, aut secus. Pulsat quoq; in pleurisq; arteria, quæ iuxta dorsum sita est, eo nimirum tempore, quo sanguis crassus in venis, illis proximis impactus incalescit, ut c. seq. latius suum probaturus. Contremiscunt cor, & totum corpus, tument pedes prope noctem, cum corporis natua vis oppressa, sanguinem satis iam conficere nequit. Præterea, fœminæ sic affectæ lassitudine maxima premuntur ob corporis quidem grauitatem humorum oppressionem, & copia subortam, & ob facultatum impotentiam frigiditate effectus contracta. Cibos itè fastidiunt, quæ improspere humorum ventriculus nanciscatur distributione, maximamq; sortiatur excrementorum copiam. Quibus porro signis alia non pauca accedunt, quæ quia non in omnibus, sed in aliquibus iuxta peculiarem cuiusq; fœminæ conditionem succrescere scimus, ob id subitico expendenda perito, ac diligenti medico. Verû ex nullo alio signo certiorè coniecturâ elicies, quæ ex mensium suppressione, vel defectu, si fœmina iam menstruationi apta fuerit, licet ante id tempus virgines esui alicuius rei deprauate nimis deditæ non rarò prædictû modû affectû patiantur. Quod sanè malum diligentia non mediocri tractare oportet, ne aut in malû corporis habitum, vel difficile melancholiam epilepsiamve fœmina dilabatur, aut in sterilitatem irreparabilem vtero resiccato, sanguine ad ipsum non confluente præ obstructione.

*Cura
di ratio.*

Vniuersam huius affectionis curandi rationem ob id difficile esse arbitror, quia non est solû eorû vasorû, quæ prope vterû sunt, in eadè obstructio, sed cû hoc vel iccur vel mesereon, vel splenè, & aliqñ vterû quoq; obstrui cõtingit: quod proculdubio mōstrare diximus cû faciei, & labiorû colorè, quæ subalbido colori adiungit: ob id

A ob id neq; vna quidem erit curandi ratio, neq; vnus modus, neq; vna medicamentorum natura & conditio. Quamobrem duplex in hac re insurgit consideratio, altera, quæ huic affectui debetur, indicatione sumpta ab aliquo ex prædictis membris, dum simul afficitur altera verò, quæ communia affert prædicia, & communem curandi viam, vicunque alicui prædictorum membrorum communis occurrat affectio.

Primum itaque dū prædicta vasa vtero proxima, aut propria, sanguine crasso implentur, & eodem facto crassiori, & frigidiore obstruuntur, ac in iecur hac ratione sanguis regurgitat, ibidemq; et obstructione molitur. Quod ex colore pallido, & malicorij, ut refert Hip. lib. de internis affect. per simili cognoscere sicut ex dolore sub vltimis costis detri lateris, & in humeris, & clavicula, & sub manibus biliosis vomitibus, & præcipue ex difficili respiratione, si superfluum lacus laborans decubat. Quæ affectus, ubi cognoueris, mox curare, ut reliquos vitæ isecos affectus docet Hip. lib. de vit. morb. sanguine nullo, non tamè protinus ex talo quantumvis mentes suppressi fuerint: cōiectabile enim eo tēpore est, sanguine potissimum rediundare in vniuerso corpore, & partibus iecori proximis. Quocirca necessarium est, cōsiliū sequi Hip. lib. de intern. affect. q. sanguine extraneæ protinus iuberetela interna cubari venam, si ante id opus sanguine ex talo minore studueris, maiores necessarid efficiet obstructions euocata ad venter, & venas obstructas totius corporis plenitudinē. At sanguine semel, aut bis, si laborans vices tulerint, & feminas sic affectas certū est posse incipere ad affectu perferremā dū inueteratū, & corpus si gidius efficiunt, purgatione potius, q. sanguinis detractioe copiosiore opus habere, extrahēdo, antequam deinceps ex talo sanguine, donec corpus suppressi sanguinis sarcina liberatū fuisse conspiciat. Quod et facies victu parcissimo, & tenuissima substantiæ instituto.

Verum in holosummi curatione et medicamenta adhibenda sunt, quæ præter hocq; mentes euocare possint, iecoris quoq; naturā, & obstructionē respiciat: in principio quidē curationis, assidues in maiori copia, & maiori diligentia, q. obstructa vasa, & iecur respiciant, pcedente verò affectu his diminutis, ad incedendum, q. mentes euocent. Hoc vno in hac re adseruato, quæ, quæ mentes euocant, nō licet adhibere, nisi consueti menstruationis tēpore si id haberi potest: si aliter, quo tēpore femina maiores perferat, sit circa vteri partes dolores maioremq; grauitatē. Primum itaq; in hoc, & simillimis affectibus, neq; confortum, neq; plurimū purgabis, ut abundē dictum est lib. nostro de præsid. indic. quippe obstructa corpora etiam si humoribus abundant, magnas purgationes perferre non possunt, q. vix maximā humorum copiam capere nequāt, quin potius obstruantur magis. Nec rursus coctionē humorum inspicies, neq; expectabis: nam humores, qui obstruentionem moluntur: concoqui minimè possunt. Quia in re his phantais primò vrendum est, quæ crassos humores attendat, vilesidos inscindere, frigidos calfacere nata sint. Quod sanè opus, neq; dū, neq; semper facies, sed per intervalla: & facta interim leuisscula purgatione, quæ quod attenuatum est, expellat, dum amplius attenuatur. Atqui quod magis attenuari humores cognoueris ex crassiore, & coloratione vrinæ, eò frequentius purgationibus, vti oportet, addito plerunq; medicamentis purgantibus aliquo ex ijs, quæ attenuant, & insidant, ut vtrunq; opus simul perficias.

Itaque

Si vena obstrua-

*in refectione
sibi in pleto
nia in vena
da vena in cu
bit*

*obstruendo
corporam
ferunt
vna/fer
actione!*

Itaque primitus in ipso curationis exordio, leuem quandam purgationē ex
 casia, manna, vel syrupo ex infusionibus præmittes, nesi cruditates aliqua in
 ventriculo, ac primis venis steterint, sanguine misso crudiores fiant, vel ad ma-
 iora vasa deferantur, aut in scidentibus, & attenuantibus admixtis ad loca ob-
 structa deuehi protinus contingat. Deinceps tamen syrupum hac lege confectū
 porriges: excipe succi cichorij clarificati. ʒ. x. aquæ ordeij. ʒ. viij. succi granatorū
 ʒ. iij. mellis lib. j. aceti ad gustum, fiat syrupus, cui adde cinnamomi parum, &
 eo vtatur manē laborans cum aqua fumarix, radicū aperientium, graminis,
 vel adianti. Transactis autem quatuor, aut sex diebus, & facta leui aliqua pur-
 gatione ex ijs, quas inferius recensebo, ad paulò efficaciora progrediendū est,
 quale censemus medicamentum, quod recipit succi intibi decocti, & depurati
 ʒ. j. oxizacæ simplicis ʒ. ij. decocti radicis filicis, & seminis securidicæ ʒ. j. & f.
 Profunt itē communes syrups, vt oximel diureticum, syrupus acetosus de quin-
 que, aut duabus, de bisantijs, & oximel simplex. Quibus adhibitis iterum iecur
 purgabis, & tandē deuenies ad vsum syrupi maioris efficacix, qui recipit adian-
 ti, lapati, lentisci, & rutæ, ana m. f. quinque radicū diureticarū, radicis acori,
 & gladioli, ana ʒ. f. quatuor seminum frigidorum maiorū ʒ. ij. seminis apiij, fœ-
 niculi, petroselini, & aliquando macedonici, ana ʒ. ij. chamædryos, & chamæ-
 pythios, valerianæ, ana m. j. ordeij mundi, p. j. infundantur radices, & semina p
 noctem in aceto, & fiat postea decoctum in aqua sufficienti, cui perecolato, adde
 mellis quantum sit satis, vt fiat syrupus, cuius quantitas sit ʒ. iij. Sed mihi proba-
 tissimus est in hac re syrupus, qui excipit succi eupatorij. ʒ. x. decoctionis stæ-
 chados radicis rumicis, acori, asari, apiij, casix lignæ, seminis viticis, dauci, lupi
 norū, floris iunci odorati, centauri, absynthij, hyssopi, & cicerū, ana ʒ. f. coquan-
 tur, vt ars docet, & colaturæ adde mellis, & sacchari quantum sufficiat, vt fiat
 syrupus, qui mihi ad prædicta opera, & menses euocādos maximi semper stetit
 momenti. Vtor quoq; decocto veteris galli cum prædictis rebus, vel aliquibus
 earū additis passulis sine granis, & cartamo. Possunt nō minus confici aliæ po-
 tiones simpliciores, q̄ recipiant radicis rubæ maioris, gentianæ, & acori, & ra-
 dicis capparis, ana m. f. temperentur in aceto albo per noctē, & postea coquan-
 tur aqua instillationis graminis, brusci, & asparagi ad tertias, quibus adde pas-
 sularum sine granis. ʒ. j. & facta colatura adde mellis, & sacchari quantum sit sa-
 tis. Poteris et in spectā semel medicamentorum huic vsui conuenientiū natura,
 variōs cuius parare potus: cuius gratia expende eis materiam præstare cortices
 radicis capparis, brusci, asparagi, salicis, graminis, apiij, cichorij, scariolæ: item
 hepaticam, adiantum, semen matatri, cinnamomum, & spicam: ex quibus iuxta
 diuersitatem indiuidualem varia effinges huic vsui medicamenta.

Sed quarto, quinto, aut sexto, quoq; die porrigere opus est, q̄ abstergerendi, &
 repurgandi infarctos meatus vires obtineant. Mihi tñ in principijs curationis
 antequā affectus in vetustatem degeneret, placuit semper dilutū ex decoctione
 radicis rubæ, & acetosæ, ana m. f. rumicis. ʒ. j. decoquantur in aqua stillatitia
 adianti & graminis, cuius cū saccharo, vel melle, aut passulis facta iterū leui e-
 bullitione. ʒ. iij. porrige. Est in hoc affectionis genere et p̄sentaneū auxiliū rha-
 barbari dilutū in p̄dictis aquis expressum, vel in aqua cichorij, aut in sero lactis
 si caloris aliqua præsit suspicio: sit quidē rhabbari quantitas. ʒ. f. vel ʒ. j. Pro-
 dest.

Adest decoctū eupatorij, & graminis cū cartami 3.j. & .℥. vel succus eupatorij cū agarico, aut cartamo, quod antiqui plurimū probarunt. Eundem quoq; vsum præstat syrupus cichorij cōpositus, vel idem rhabarbari infusum cum 3.ij. succi vel syrup. cichorij simplicis, quibus admiscere agarici 3.j. vel 3.℥. ex vfu semper fuit præsertim dū crassorum, & frigidorum copiam superasse constiterit. In ijs vero feminis, quæ robustioris naturæ sunt, dilutum pseudorhabarbari in aqua cichorij, vel graminis, incredibilis est efficacia tertio quoq; die exhibitū. Cōfert et pillularū vsus, & earum præsertim, quæ recipiunt rhabarbari 3.j. agarici 3.ii. diagridij 3.iiij. formentur quatuor pillule, quarum vnā tertio quoq; die porriges. Præstant quoq; & maxime sunt proficue, q̄ ex puluere pseudorhabarbari, rubæ, & acetosæ cum oximelite conficiuntur, quarum 3.j. & .℥. semel in hebdomada porriges, vel 3.ij. tertio quoq; die. Quibus porro omnibus medicamentis, & syrupis necessum est addere roborandi, & repurgandi iecoris gratia aliquid eorū, quæ id possunt, cuius naturæ est trochiscus de eupatorio, dialacha, diarrhodon, trochiscus de rhabarbaro, de absinthio, vel diacarcuma. Verū ex ijs eligēda sunt minus gustui ingrata, minusq; calida, ne ceteris visceribus noceant. Poteris insuper (haud inutiliter) porrigere opiatā, quæ recipit conservæ radicis apij, florum acori, & adianti, ana 3.℥. pulueris diarrhodonis, triasantholorū, ana 3.ii. trochiscorum de eupatorio 3.j. cum syrupo de bisantijs fiat opiatā. Cuius capiat quantitatem 3.ij. postea bibat aquā stillatiam radicum apij, & graminis: quorum omnium maiorem copiam reperies, & veram vtendi methodum li. 2. de præsid. indica. cap. de aperientibus.

Verum obseruare in hac curatione perpetuū oportet, maxime fore, p̄ficiunt p̄missa purgatione (si feminæ habitus nō fuerit euidenter refrigeratus) sanguinē ex saluarella mittere, præsertim si calorem vigere in viscere persentiamus. Quod si aliqui menses inceperint, vtile quoq; erit eisdē sanguine ex talo misso euocare. Quibus factis, iecur & partes prope vterum inunges vnguento, quod recipit olei nardini, & amygdalarum amararum, ana 3.ij. succi apij 3. j. coquant ad consumptionem succi, & adde spice nardi, squinanti, & asari, ana 3.j. seminis apij, petroselinij, cyperi, & rosarum, ana 3.ij. ceræ quantum sit satis, vt fiat vnguentum addito modico aceto. Aliud itē conficies, quod recipit succorū apij, petroselinij, feniculi, senecionum, & cichorij, ana 3.j. aceti 3.℥. olei 3.iiij. olei absinthij 3.℥. bulliant omnia ad consumptionē succorum, postea adde santholorū omnium, & spice, ana 3.℥. ceræ quantum sit satis, vt fiat vnguentum. Profunt nō minus emplastra, q̄ recipiunt pulueris chamæmeli, meliloti, abrotoni, yua, ana 3.j. seminis apij, amæos, absinthij, ana 3.ij. spice 3.j. dissoluantur in succo feniculi, & fiat emplastrum. Cui quoq; vsui fomentum parabis ex oleis cū modico aceto, vel ex decocto prædictarum herbarum, radicum, & seminum cū modico aceto: quæ omnia paulatim, & per interualla adhibēda sunt, ac repetitis alijs quæ aperiendi, & repurgandi iecur vires obtinere diximus. Interim tñ paulatim vteris ex rhabarbaro, & agarico purgationibus, quibus profecto vtrunq; adimplebis scopum: nam & infarctos humores purgant, & viscidos, ac adhærentes abstergunt, & ob id deobstruunt, & infarctū liberant.

Sanguine quidē (vt dictū est) improbē ad vterū descendente, & ob id redundante,

*Si splen
obstruat
tur.*

Dante, facilius longe splenē repleri, & obstrui cōtingit in p̄dictis virginibus, quoduis aliud viscus: n̄ prater id q̄ vitijis fermē ei de lien renatur, quibus hep̄ar, frequentius in obstructione (propter alimenti, quod attrahit specē, ac dū accidit, copiosiorē in super & crassiorē esse sanguinē) lecripi, vel scirrho, p̄culdubio affici cōtingit: quod nulla causa citius euenit, q̄ menstruis, vel hemorrhoidibus suppressis. Quō fit profectō, v̄ p̄dictae virginēs, quibus menses non probē prodeunt, p̄ter coem venarū obstructionem splenis quoq; frequentissimam, ac non leue patiantur. Quam prater id, q̄ ex lateris sinistri tumore oblongo tactui manifesto dignoscēs, monstrat et illius lateris grauis dolor ad iugulū sinistrum veniens, difficultas respirandi, color faciei, & totius corporis subniger, & plūbeus, halitus itē fœtidus. Alius ē sic affectis astringitur, & aliquā nigra excernit, corpus nonnihil emaciatur, tristis est fœmina, & cogitabunda, ac fastidiosa, cui noctu erumpit sudor grauis, & venae ad lienem nigricāt. Quae omnia ex Hip. videntur constare lib. de inter. affect. per haec verba. Alius splenis morbus fit in anno, veris maximē tēpore, verum à sanguine: quū enim repletus fuerit splen sanguine, erumpit in ventrē, & dolores acuti in splenem, & incidunt, & in mammā, & in clauiculam, & in humerū, & sub scapulum: color autē corporis est plumbi formis. Tandem recenset alia signa, quae retulimus, & existimat esse grauissimum affectum, quod ego intelligendum arbitror, dū in inflammationem commigrat, aut in difficultatem intestinorum. Quibus praemissis, scito, lienem coaffici ex mensium suppressione simul cum venis vtero vicinis: quae sanē causa est, vt difficulter curentur fœminae sic affectae: nā pressiores, & grauiore sunt ex melancholico sanguine obstructions, & curati difficiliore. Quapropter maturo consilio, & maxima diligentia curandū est, ne laborans, vel in icterū nigrum, vel in melancholicum corporis habitum, aut delirium degeneret, quod sic affectis accidisse frequenter conspiciamus.

*obstructione
a melancholico
sumore cum
in difficultate*

*Curandi
ratio*

Primum itaq; curantis consilium sit, ventrem cassia, vel manna, vel catholico, aut confedone Amech simpliciter emollire. quod licet alijs pharmacis Hipp. loco citato efficere docuerit, haec esse v̄ sui probatiora certū est: à quibus mox sanguinē esse mittendū ex sinistri brachij basilica consulit, vel si placuerit, ex eiusdē manus saluatella, parca tamen. Quippe copiosas sanguinis detractiones minimē perferunt splenis affectiones: menstruationis tñ tempore tutissimum, quinimō necessariū mihi videtur, ex sinistro talo sanguinē quoq; mittere. Verū si menses ex ratione non prodierint, vtilius longē fore existimo per hemorrhoides fœculentum illū sanguinē deponere, quibus quod superest, euacuamus, & ab vtero, & venis ipsi proximis, & ab splene ipsa derivatoriē deducimus. Nec desunt quidē, qui inter antiquos venas post aures scindant, & sanguine, qui effluxit, lienem inungant, sine ratione quidē, sed non sine periculo. Veteres enim naturali quadam ratione, atq; beneficio constante crediderunt, superflūū sanguinem languenti membro prestare medicinam: quod sanē veterinarij Medici recensent, & exequuntur. Caeterum constat certo experimento venas apertas, quae ad lienē nigricant in inueteratis lienis affectionibus maximē pfuisse. Quibus venis incredibili efficacia profunt hirudines affixae, aut cucurbitae cū scarificatione: quae auxilia uacuato sauis corpore, uelut topica, sunt adhibenda.

*non habet
vere remota
ratio dāte
uere commu
tatio. sed sō
cū venā conu*

Quo

- A** Quo facto maximo studio humorē leniter & blandē, sed perseveranter attenuare oportet: nam validiora medicamenta subito, cōfertim, vel sola, exhibita, plus humorem resiccant, durioresq; reddunt, q̄ q̄ tūtō emollire possint: quamobrē paulatim, & paulo validioribus purgare oportebit. Profunt itaq; primò melicratum, & potiones ex prunis damascenis, passulis, & radicibus cappariū (nam quale est hepati absinthium, tale est lieni cortex capparis, & quale est hepati eupatorium, tale est lieni scolopendrium) semine agnicasti, adianti, radice tamarisci, & seminibus illis maioribus, ac minoribus, cortice item, & radice salicis, genista, fragini, & alijs, quæ ad hepar dicta sunt. Sed conficies imprimis melicratum hac lege, corticis radice capparis ʒ. iij. polipodij ʒ. ij. passularum sine acinis ʒ. j. prunorum, nu. x. fiat decoctum ad tertias, & facta colatura, dissolue mellis ʒ. iij. Quo facto, primæ purgationes sint ex epithymo, folijs senæ, & hiera Gal. vel ea, q̄ ex descriptione Panchij apud Scribonium legitur, atq; etiam alijs, quæ c. de virg. melan. dicta sunt. Sed progrediendum ultra est in materiæ extenuatione: cui summopere conducit aqua, quæ è cotibus defluit, cum acciuntur enses cum melle, præsertim si in ea effervescat aliquod ex prædictis medicamentis: prodest & syrupus acetosus, adianti, & de pomis cum prædicta aqua exhibitus. Laudatur & usus cappariū ex oleo, & aceto, verum in sceminis admittendus non est sine delectu. Quod si uti velis, hac lege parabis: excipe cappariū li. ʒ. passularum ex Corinthio, si haberi possunt, lib. j. reponantur in lib. r. sacchari fusi aqua borraginis eum ʒ. ss. scamonei in vase, cui adde aceri modicū, qua lege tūtō eis vii poteris. Itaq; valentiora conveniunt medicamenta, q̄ in hepate, status etiam discutientia, mollientia, & aperientia, ut tamariscus, ebuli, pulvis scolopendriæ, brionia, cortex hæderæ, oximel ex radicibus, aqua graminis, lupulorum, borraginis, syrupus de scolopendria, de bisanjijs, de epithymo cum aquis prædictis, vel decocto aliquo pro splene, ut fumariæ, & gallitici, additis paucis cinnamomo, santhalis, & alijs, quæ licet vrinas moveāt, huic quoq; vsui vtilia sint. Nam licet diuretica non ita profint, quia à liene ad renes non ita comparata via est, tñ experimento didicimus lienem per vrinas non rarò expurgari: præter q̄ ea etiam, alia ratione iuvare possunt, nimirum, quia attenuant, & aperiunt, quod Hip. et lib. de inter. affect. consuluerat. Sed expendat hac in parte lector, aliud esse splenem obstructum simpliciter curare, & aliud esse id munus exequi in feminis menstruo suppressio: nā cautē & blandioribus utendum est ijs, quæ vehementiora sunt admixtis. Purgare itē per interualla necessū est, & eisdem prorsus medicamentis, quæ adduximus c. de virg. & vid. melan. quāobrem consultō ea hac in parte prætereo. Sed arbitror hic quoq; prodesse, inuenerat iam affectu, sibi præparati. g. iij. porrigere.

C Ceterū quia & flatus, & rugitus, & aquæ fluctuationes torquere huiusmodi feminas non rarò assolent (partim ex indebito vitæ instituto, partim ex ipsa naturali natura, ita ut splenis, & meserei inflationē nō leuē æmulētur, quod debito vitæ moderamine mox subsidet, remanēte parte obstructa, aut scirrhusa in antiqua duritie) p̄ter dicta medicamenta clysterium vsum, tanq̄ maxime proficuum laudo, præsertim ex decocto capitis veruicini cū herbis, ac seminibus prædictis. Sed adhuc lōgē vtiliora sunt, q̄ exterius adhibentur pharimaca, non solū id boni præstantia, sed magnos etiam lienes absumentia. Imprimis tamen ventrē iu-

*unguentum pro
indurato liene*

tamarix.

unges & splenem: quippe huius durities mollientibus, in scidentibus, & resolu-
uentibus curanda est, astringentia quoque admouenda, ut inde viscus robore-
tur, iuxta leges adductas lib. de præsid. indic. cap. de emollientibus. Primitus id
facies unguento, quod recipit, olei de capparibus 3. j. medullæ vituli, pinguedi-
nis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti, ana 3. ij. aceti 3. j. ceræ quantum sit satis,
ut fiat unguentum. Sed pretiosius conficiēs, si exceperis medullæ cerui, aut cru-
ris vituli, butyri recentis, olei de capparibus, ana lib. s. ammoniaci in aceto liqua-
ti. 3. ij. aquæ rosarum 3. iij. coquantur ad consumptionē prædictæ aquæ in bal-
neo mariæ, quo deinceps inunges lienis regionem leui manu perfricante. Cō-
ferunt etiam communiter indurato spleni radices lilij, malux, branchæ vrsinæ,
& scillæ, sed radices in oleo, & vino ad consumptionem vini ad formā empla-
stri impostæ: in reliquis verò sufficit sola olei inunctio, si minus robustæ fue-
rint. Minuit lienem non minus, ac ipsum aperit unguentum, quod recipit suc-
ci, summitatum sambuci, olei capparorum, & dialthæ, ana partes æquales, ce-
ræ quantum sit satis. Præstat idem beneficium id, quod recipit radicem, & folio-
rum miricæ, ana p. ij. infundantur in aceto, & ferueant, donec remaneat sola ter-
tia pars, tandem facta colatura, & expressione, adde tantundem olei capparor-
um, & iterum bulliant, donec euanescat acetum, & cum cera fiat unguentum.
Valet item aduersus lienis tumores, & obstructions aliud, quod recipit, mu-
cagginis althææ, & seminis eius extracte in vino albo 3. j. olei capparorum 3. j.
& s. adipis anatis. 3. s. pulueris cetrach. 3. ij. & fiat unguentum. Itē aliud conficiēs
si acceperis olibani, ammoniaci, ana 3. j. dissoluantur in aceto scyllitico ad cras-
situdinem, deinde cū succo brassicæ pistentur, & fiat emplastrum. Cui consimile
efficiēs, si acceperis ammoniacum, & oleum rosaceū, amygdalarum dulciū, de
lilij, de cucumero asininō, enim in quo scolopendrium incoxerit, & oleum de
capparibus, ut cum ficubus pinguibus quantum cuiusq; sit satis fiat emplastrum,
addita dialthæa. Confert emplastrum melilotum, aut diaquilon, vel hyssopum
cerotum cum mucilaginis radicis althææ, lini, & sennigræci. In viraginibus
autem & robustis feminis sæpe splenis duritiem, ubi alijs præsidijs emollita
quodammodo fuerit, auferunt lapis molaris, pyrites, lateres, vel lapis aliq; du-
rissimus, ubi aceto acerrimo candentes extinguantur, & vapor per infundibulū
ab splene suscipiatur. Conferre itē summopere mihi est relatam litū ex adipe
struthij, camelli, quo nullum efficacius fuerunt remedium reperiri.

Quod si inueterauerit affectus, in scirrūq; degenerauerit, tēpestiuē curare
studebis, ne maioris mali, ut cachexiæ, vel hydropis sit præludiū. Quo tēpore
in scidentia magis, tenuantia, emolliētia, atq; discutientia parti adhibēda sunt,
veluti est fofus, qui recipit radicem cucumeris agrestis, althææ, & liliorū, ana
3. j. corticū radicis capparibus, & tamarisci, ana 3. s. malux, bismalux, scolopēdrij,
absinthij, an. m. j. seminis senniculi, lini, & sennigræci, an. 3. s. florū chamæmeli,
meliloti, & genistæ, ana p. s. fiat decoctū in vino albo, & aqua cū modico aceto:
quo tertio, vel quarto quoq; die partē fovebis, & mox cataplasma parti impo-
nes, qd recipiat farinæ seminis lini, & sennigræci, ana 3. j. & s. farinæ lupinorū
3. j. pulueris radicis ireos, & tamarisci, ana 3. ij. adipis vituli, & axūgiæ cuniculi,
an. 3. j. olei capparorū quātū sit satis, ut fiat cataplasma cū modico superioris de-
cocti. Verū si id displicuerit, imperabis linimentū ex mucilagine seminis sennigræci.

nu-

A nigræci extractæ aqua scolopendriæ mensura. ʒ. ij. cui addes olei capparorū, & liliacei, ana ʒ. j. ammoniaci in aceto, & aqua dissoluti, ʒ. f. pulueris radicis brionium, & ireos, ana ʒ. ij. cū cera fiat linimentum. Quibus porrò omnibus medicamentis semper aliquid admiscebis eorū, quæ menses mouere nata sunt: habita tñ feminei sexus consideratione, qui & miuora, & mitioribus admixta expostulat medicamenta, per interualla, & à leuioribus facto exordio.

Solent quoq; non rarò virgines femine, ex p̄dictis mensū vitijs, vel ex vsu prauorum ciborū, quod frequentissime virgines perdere solet, grauissimas pari in ventriculi, & meserei venis obstructions. Nam sanguine ab uteris regurgitante venas meserei, iecori, & v̄triculo cōmunes, ac proximas repleri & obstrui necessum est: ex quarū obstructione finiuimus suboritur affectus ei, quē in hypochondriaca melancholia reperiri diximus. Quippe in vtroque affectu venæ proximæ, & cōmunes ventriculo, & hepati, quas meserem membrū obtine re diximus, obstruuntur. Ceterū dissidet virgineus affectus ex hac causa obortus ab hypochondriaca melancholia ex eadē quoq; proficiscente, quod in prædicta melancholia sanguis ille crassus dictis venis impactus, exurit & effertur: scit ex cuius halitibus caput & cor tentantur, fiuntq; subinde melancholici terrores & mœstitiæ. At in morbo virgineo, licet in eadē parte sanguis sit impactus, refrigeratur, & recrudescit, ac vniuersum affectū generat frigidum: ita vt à ventriculo, & hepate crudum subterfugiat alimentum, q̄ prædictarū obstructionū causa distribui minimè possit: quò fit, vt subalbidus ille color in facie, & tota cute efflorescat, soboles quidē, & euident signū crudorum humorū, & obstructionis. Dignosces eisdē partibus obstructions inesse ex vomitibus pituitosis, ex frequenti nausea, & ciborum inappetentia, vel deprauatorū alimentorum appetitū, aut esu, anxietate & præcordiorum tensione, præsertim à cibo, ex animo item magis deiecto, & mœsto, ex vrina alba, & copiosiori: item quia sic affectæ falsæ siti premuntur. Pulsat quidem in his minus caput, sed grauius, & diutius dolet, tument etiam oculi magis, & tota ferè facies.

B Cui sane affectioni medeberis, primò (præter obseruatissimam vitæ institutionem, quæ nihil crudum efficiat) sanguine misso, haudquaquam ex brachio, sed ex talo semel aut bis: nec tantum extrahes, quantum in reliquis obstructionibus. Quod si hemorrhoides, vel suppressæ fuerint, vel aliquando profluxisse comperiamus, ab eis sanguinē detrahes, præsertim ex illis, q̄ cū mesereo maiore habent cōmunionem: quas censeo esse interiores, quæ venarū meseraicarum sanguinolentæ propagines sunt. Quo facto, anteq̄ peculiarem mensium prouocationem, aut humoris vacuationē moliaris, scito, has feminas posse, ac debere curari per uomitus, quibus leuissimis auxilijs semel aut bis in hebdomada prouocatis (dū non instet menstruationis consuetū tēpus) blandè ac leniter p̄ interualla ventriculū, & meserem p̄ infernā aluū purgabis, non casia, sed alijs, quæ minus flatuosa existant. Præstant quidē hunc usum catholicon, syrupus ex infusionibus rosarum, agaricus, pillule de mastiche, de agarico, de aloe, de hiera Gal. quibus per interualla ventriculū purgabis: ac inter vnā & alterā purgationē ministrabis syrupū de bisantijs, adianti, epithymi, de duab. radicib. & de quæ cum modico aceto: mel itē rosaceū, & oximel simplex cū aliqua ex prædictis aquis, vel decoctis. Ex vsu interim est per eadē interualla diffusū agarici &

De mesereo, & ventriculo obstru-
tis.

Differetia inter
virginem affe-
ctam & Melan-
cholicam
hæc
aca.

Cura
di ratio.

Hæmorrhoides
de interioribus
communicant
cū mesereo
et ad exteri-
ores.

foliorum senæ in aqua graminis præbere, vel frequenter uti pillula una mastichis, & pulueris hieræ Gal. vtilissimus quoq; est syrupus tertio, vel quarto quoque die. dosi. 3. ij. exhibitus, qui recipit quidem mercurialis, buglossæ, ana m. j. passularum sine granis 3. j. senæ orientalis, & medullæ cartami, ana 5. j. & sagarici trochiscati, & ligati sex horarum spatio. 3. iij. fiat decoctio secundum artem, & facta colatura adde mellis, & sacchari quantum sit satis, ut fiat syrupus. Quibus profectò factis ad ea, quæ menses mouent, te conferes, sed interim in deobstruendis, & corroborandis ventriculo, & mesereo immorandum est vnguentis ex oleæ capparorum, de absinthio, & nardino cum modico vino, ac pulueribus diarrhodonis, & alijs, quæ superius retulimus, & c. de ventriculi accidentibus paulo inferius monstrabo. Sed oportet proculdubio huius causæ, & affectus maximam habere prouidentiam, ut qui frequentissimè accidat, & difficulter curetur, quòd ventriculus, ciborum officina semper obstructionibus fomentum præstet, & accidentium causam adaugeat.

*De utero
obstructione.*

Vteri verò obstructions curare discas, dum virginis affectus ab eisdem solis proficiscitur, c. de mensium suppressione. Quam sanè causam ex priuatione signorum aliarum causarum facillè dignoscas. quamobrem hac in parte supersedendum est ab eius peculiari curatione.

*De auxilijs, quæ
proficiunt
sunt omnibus
causis huius
affectus.*

Sunt quidem præter dicta auxilia, quæ singulis virginis morbi causis proficiunt esse diximus, alia non pauca, nec parui momenti, quæ omnibus causis vtilia experimur: veluti exercitium: pillularum, quæ obstructions aperiunt, & re purgant, quod in vijs infartum est, vsus etiam potiones, quæ id quoq; efficiunt, lapis bezoar, & vsus radices schorcioneræ. Inter quæ maiori efficacia beneficiū præstat chalybs præparatus, præstantissimum alioquæ auxilium. Quæ sanè oīa, licet virgineo affectui à quacunque causa prodeat, proficua sint, modus tamen & differentia causæ non paruum in aliquibus constituunt differentiam, ut tota ferè sanitatis ratio in eius cognitione, & prouidentia constituta sit. Sed in primis expendisse oportet vsum chalybis non esse temere, & protinus à principio aggrediendum. Quippe in his, quæ sic curantur, ocysime malum reueritur. Sed considerandum est, num affectio firmata in aliquo viscere sit, & obstructio iam facta, ita ut colorem vitiet, & actionem lædat. Quod si ita sit, non omnino posthabita vteri prouidentia (utpote à quo affectus oriatur) poteris quidè chalybe uti & alijs, quæ vehementer deobstruant: nam præualet meserei iecoris, aut splenis obstruti indicatio ei, quæ ex utero prodit. Verùm si horum membrorum, non fuerit ita facta, ac inueterata affectio, ut ex optimo sceminæ colore constabit, coniiciendum est, vtrum male affici, & ab auxilijs ipsi proficiunt incipiendum esse: ab ijs quidè, quæ simul deobstruant, & liquida sint, ac affectui vteri siue ex retento sanguine, aut semine prodeat correspondeant. Nam concuratio ea optima est, quæ à causa, & affectus principio initium sumit: ob id vtero primo prouidendum est, & mox affecto membro.

*Curatio quæ
optima.*

*energijs
modis.*

Exercitium itaq; omnibus partibus obstructis proficuum esse experimento & ratione confirmatum est: nam triplex præstat beneficium in hoc opere, dum sanguine primus misso, & leni aliquo expurganti exhibitio fit. Primum quidè excitat viscera, & omnium partium calorem: quòd fit, ut si mox, ab eo laborans quies-

- A** quiescerit, crudorum succorum coctiones prosperè ad modum fiant. Quo solo præsidio plures feminas ex grauiissimis obstructionibus liberatas vidimus. Secundum etenim humorum commodam distributionem ab exercitio in eodem optimè molitur natura: quippe dilatatis ex calore partibus, peruiæ faciliè fiunt ad eam humorum distributionem, cui antea nullus aderat locus: qua in re ab exercitio non licet desistere donec parum sudare cœperint femine: nam id est euidentis signum factæ ac scientis distributionis. Tertium quidem aperientibus pharmacis viam parat, ea nanque minimè possunt sua sponte partes peruadere abditas, licet sibi sint familiares, ut de scolopendrio, & eupatorio dictum est, nisi quodammodo dilatentur: quas proculdubio, calor exercitij adeò patulas reddit, ut faciliè medicamento pateat aditus. Quàobrem necesse est, ante sumptionem cuiusvis aperientis pharmaci, feminas parum exerceri, ac deinceps post sumptionem iterum & uehementius, ut ad partes primo exercitio apertas vis medicamenti, uel ipsum medicamentum permeare possit. Fiet tamen exercitium huic vsui proficuum summò manè celebrata præcedentis noctis sufficienter coctione: in quo labore quo difficilior & accliuor fuerit exercitij locus, & femina maiore labore id peregerit, eo partes maiorem contrahent calorem, & comatius aperientur à quo exercitio supersedendum est, reliquis totius diei & noctis partibus, ut medicamentum & natura sua munia commodius exequantur, atque hæc est exercitij lex & ratio.

Circa pillularum & reliquorum medicamentorum administratione nosse conuenit, ea, quæ in forma solida adhibentur, eis præcipue obstructionibus proficua esse, quæ in ventriculo & primis venis insunt: nam partes illas faciliè attingit vis medicamenti: quippe si fluidæ sunt substantiæ, ocylissimè ab eisdem prolabuntur. Sic pari ratione potiones & fluida pharmaca, licet omnibus partibus profint, peculiariùs tamen iecori & spleni, quæ venas habeant angustas, & sedem abditam & longè à vis communibus disitam, ita ut necessum sit fluide & tenuis substantiæ esse medicamenta illuc ventura, & adhuc tenuiora aut fluidiora, quæ vterum.

- C** Est præter dicta aliud medicamenti genus omnibus etiam obstructionibus cõe, & maximè proficuum, quo multi medicorum passim in hoc affectu vtuntur: id sanè est chalybis præparatus, cuius laudes & efficaciam nec satis nouerunt antiqui, nec iuniores experti sunt. Verum licet cõe sit feminis obstructis præsidium, non tamen omnibus pari modo, neque eadem lege administrandum uenit. Nam quibus menses, & vena ventriculo proximæ obstructæ sunt, primis diebus chalybem præparare, & admiscere oportet ijs, quæ vomitum quoque moueant: plerumque enim femine sic affectæ, potissime hac uia sanitati restituntur. Quippe si ui medicamenti excrementitium, quod in ventre redundat, ad affectas obstructione partes deferatur, dubium non est, quin maius danum id præsidium sit allaturum: ob id quidem uel diebus aliquot ante chalybis sumptionem vomendum est, vel diebus intermedijs, aut vomitoriū aliquod primis diebus admiscendum, quibus transactis substrahere uomitoriū a chalybis consortio oportebit. Cauere tamen feminas ad uomitum pronas oportet, ne immodicè vomant, cuius ratione admiscendum est aliquid ventrem roborans. At ijs, quæ iecur obstructum habent, subtilius chalybè comminuere & præparare opus erit, semperque admiscere aliquid, quod a iecore per ventrem purgare natum sit cauentes, ne ulla ratione uomitum moueamus: nam

O ; aut

aut morbus difficulter & cum grauissimis accidentibus beneficium suscepta-
bit, aut facillè deinceps reuerteretur. Sic profectò splene obstrueto præmissa præ-
paratione, quam mox docebo, crassiori modo chalybem præparabis, admisce-
bisque ei quæ succum melancholicum expurgent: crassum enim chalybem me-
lancholici humores desyderant, ut pondere & abstersione humoris duritiæ su-
perare possit. Quamobrem aliquando oleo amygdalarum dulcium præpara-
mus & admiscemus, ut simul siccitatem & duritiem frenet. Quod equidem Ae-
tius insinuassee videtur, qui crassiorem chalybem rusticis corporibus, utpote
melancholicis, adhibere iubet. Sed de chalybis præparatione, efficacia & viri-
bus, latius cap. de vtescirrho.

Præterea, in omnibus obstructionibus, quarum gratia dictum est, ante cha-
lybis exhibitionem prius vias præparare oportuisse, hoc vnum adseruare, mihi
per quam necessarium uidetur, nimirum, tenuius & leue aliquod ex chalybe
pharmacum statim initio curationis præmittendum esse: tum præparandi vias
& reliquum corpus gratia; tum verò, ut præcaueamus, ne subita mutatione ex
ualido pharmacho illata corpus mille (ut solet) accidentibus præmatur, quod
uel maioris mali causa est, uel redditus ipsius affectus. Quod præceptum cau-
tius obseruabis in ea splenis aut uteri uel iecoris duritiæ, quæ iam iam in schir-
ri naturam cõmeatum minatur: quo tempore, ut subit locus ad maiorem &
efficaciorem chalybis compositionem, corpus aliquot antè diebus præparabis
eo modo quo paulo inferius referam.

Corpus itaque præparandi uia & ratio, triplex existit: prima quidem omni-
bus obstructis fœminis communis, sed eis præsertim, quæ exercitium aliquod
moliri nequeunt ob impotentiam aut uitium manimarum, uteri aut ex calfacti
iecoris; quas præparare necessum est, ac exercitij defectum supplere potibus æ-
quæ calidioris parum antea chalybis sumptionem: postmodum uerò exerci-
tium imperabis lenissimum, domi quidem & non subdito, facta solum placi-
dissima deambulatione, ac sumpto per interualla calidissimæ aquæ haustu,
quo euidenter constar, vias laxiores fieri, & subinde aquæ calore dilatari, quò
facilius medicamentum permeare possit. Secunda uerò, cum obstructio circa
duritiem ac scirrhosam dispositionem existit, quo tempore corpus purgabis
primo accessu uel per uomitum, qua lege dictum est, uel per expurgans me-
dicamentum, idque leue, ne ad obstructas partes aliunde humores euocet, &
citra ullam syruporum præparationem qui proculdubio humoribus extenua-
tis fluentibusque ad obstructas particulas, pressiores & maiores moliantur
obstructiones: quin potius in hac curatione uice uersa incedendum est: quip-
pe ab assumpto pharmaco, syrupis uel aliquo leui præparatorio ex chalybe
confecto utendum erit. Tertia uerò (cum obstructio scirrhosæ dispositionis
particeps est) præparandi ratio, talis existit, qualis necessaria est, non ad vias
referandas solum, neque ad expurganda excrementa: quæ in uis ductuum ua-
gantur, sed ad humorem extenuandum, modicè, lentè ac paulatim emollien-
dum, quem facilius deinceps grauior & efficacior chalybis forma uel absterge-
re, uel deorsum ferre queat.

Inter alia, quæ hoc præparationis ministerium facillè præstare possunt, expe-
rimeto didicimus, primum locum obtinere leue quoddam auxilium præparatorium,
quod

A quod sic conficies: excipe limaturę chalybis ꝑ.iiiij. quam limaturam ferro aliquo instrumento excipies, & igne candescere permittes, moxque proijce in li. ij. aquę lupulorum, graminis, rubiæ, borraginis, aut per lapideum mortarium percolatę, vel alicuius fontis, qui aquam nanciscatur nitidissimam purissimā, & tenuem, & postea coletur, & iterum igniatur prædicta chalybis limatura, & sic septies facito: ac rursus summe totidem vncias noui chalybis, & eodem modo in prædicta aqua facito, idę, reiterato ter quatuorve facies, donec chalybis lib. j. consumpseris, & facta colatura adde syrupi violarum vel borraginis, aut mellis rosacei ꝑ.iiiij. cuius fœmina facto modico exercitio summo mane capiat ꝑ. iiij. citra frigiditatem actualem, ac deinde perficiat exercitium lentę, paulatim, & moderatę. Postquam verò prædictum medicamentum ter quaterve aut pluries exhibueris prout affectus duritiem postulare cognoueris, ad efficacius (licet hoc plerumque in delicatioribus, ac puellis sufficere videatur) te conferes. Ex quo præsidio varias præparantium medicamentorum formas effingere, cuius facile erit facta plus vel minus chalybis extinctione, uel admixtis decoctis uel infusis, pharmacis referantibus & attenuantibus iuxta affectus indigentia. Verum si aliud (ut non raro accidit) ex obstructione vel scirrho visceris alicuius soluta fuerit, aut viscus aliquod steterit imbecillum, aliquod admiscebis medicamentum aperiendis obstructionibus idoneum, vel roborationi membrorum proficuum, quod chalybis excessum moderetur.

Sed antequam ad comodā & integram chalybis exhibitionem deueniamus, quę experimento in hac re dicimus, aperiere æquum esse diximus: constat quidem obseruatione delicatissimis feminis, ijs præsertim, quibus cum hoc morbi genere aliquid melancholicū adiungitur, vel quid corruptum ex semine viciato cor affligit, summopere profuisse ad aperiendas obstructiones, compescēdosque venenose materię insultus, lapidis bezoar vsū, quę multis modis præstare possē cōpertum habeo. Primum quidē, lapide in subtilissimum puluerē redacto, & in aqua aperiendis obstructionibus idonea liquato: secundō admixto conseruæ adianti, à qua modicum prædictę aquę ex chalybe extincto porrigetur: tertio ipsum lapidem prodesse cōperies in tabellis cum pulueribus seminis agnicasti, rubiæ, cinnamomi, & sacchari confectum: quarto verò & vltimō maximopere proderit, si prædictum lapidem admiscueris alicui ex præparationibus chalybis. Cui consimile beneficium præstabis, si in præparationibus chalybis addideris electari de gemmis quantum sat sit, ut fœmina singulis diebus sumat. ꝑ. i. Caterum lapidis bezoar sat est vno quoque die. g. vj. sumpsisse, vel ad summum. vij. Quod si confectioem alchermes, vel de hiacintho, prædicto chalybi ad. 3. addideris, idem beneficium præstabis. Experimento etiam probatū habeo, radicē schorchionerę vino per noctē maceratā, & summo manē sumptam plerimas ab obstructionibus liberasse. Sed probo magis, ipsam aliqua ex supra dictis aquis & saccharo elixatā deuorare & residuā aquam desuper bibere, uel conditam saccharo parare decocto aliquo aperiendis obstructionibus, plicuo, ut id succi vel mutę (ut vulgari utar vocabulo) quod post cōdituram superest, simul cū ipsa radice & pulueribus cinnamomi ingeratur. Quę sanē medicamentum prædictę fœminarum sorti, & alijs quę ita sunt animo deiecto & contracto, quod maiora medicamenta perferre non possint, cenfeo ex vsu maximē fore.

O 4 Verum

Verum si ventrem & mesereon obstructa esse copereris, præmisso preparato-
torio pharmaco, quale superius adduximus, aliud exhibeto his visceribus ob-
structis maxime proficuum, quod recipit, specierum diarrhodonis, diacurcumæ &
agarici trochiscati. ana. 3. j. medullæ cartami 3. ij. corticis radicis rumicis, ru-
bæ, & seminis duaci. ana. 3. j. & .f. gariophyllorum. 3. j. chalybis minutissimi &
vino præparati. 5. ij. mellis despumati quod sufficiat, ut fiat electarium, cuius ex-
hibe a. 3. ij. ad 3. iij. Quod si eo assumpto, laborans vomuerit, non est prohiben-
dum, nisi aliquod damnum timueris, aut diu vomitus persistat: quod vitium vi-
tare poteris purgata inferna aluo, & ablatis à compositione cartamo & agarico.
Ac si ulterius velis vomitum compescere, ab assumpto chalybe, vini albi odo-
ratissimi modicum ministrabis: partim, ut os abluat repurgetque à recrementis
chalybis, partim verò, ut nauseam compescat. Idque facies eodem ordine serua-
to singulis diebus, præmisso & posthabito convenienti exercitio.

Iecori quidem obstructo eadem componendi chalybem ratio mihi utilissima vi-
detur, ablatis tamen cartamo & agarico, quorum loco addito rhabbarbari. 3. ij. & .f.
& nihil nocebit. 3. j. agari addere. Verum si prima, secunda vel interdum tertia die
fœmina vomuerit, prohibendum non est, ultra id verò, graue & inutile existit.
Sed pretiosior iecori æstimatur alia conficiendi chalybis ratio, quæ recipit: limaturæ
ipsius omni recremento lignoso exempto. lib. .f. quam vase vitreo excipe, addi-
tis vini albi optimi 5. viij. mox vas illud igni molliissimo appone, diligenter hic
& inde chalybem & vinum sursum ac deorsum agitando, tandem decem aut
duodecim ebullitiones feruere finito, quoadusque eius spumofum sursum fer-
ri videas, ac mediocriter crassescere conspicias, tunc spumofam ac pinguosam
chalybis partem, quæ feruore separatur simul cum vino in aliud vas transfun-
de, atque id quater facito ordine prædicto, nimirum, denuo aliam vini quantita-
tem conijce in eandem limaturam, & eodem modo feruere sine, parique ratione sepa-
rari, & pro tertio & quarto idem facies seruato prædicto ordine. Itaque vinum
cum prædicta quadruplici spuma quatuor coctionibus ex chalybe extracta
rursus igni appone, donec leuiter feruens mellis spissitudinem acquisierint: quo
tempore vsui seruari oportet, ex quo electarium hoc modo conficito: excipe se-
minis petroselini, dauci, & specierum diacurcumæ & diarrhodonis. an. 3. j. cinna-
momi. 3. j. chalybis modo dicto præparati. 3. vj. ex melle optimo & despumato
fiat electarium, cuius a. 3. iij. ad 3. v. summo mane præmisso leui exercitio, vel a-
que calidioris potu, præberi potest, & eundem ordinem in reliquis seruabis,
donec fœminam colorem factam esse comperias: at puellis quæ vel ob-
struuntur, vel ob esum terræ aut alterius rei similis decolores fiunt, optimum
efficitur medicamen, maximeque imbecillis & febriculosis.

Melancholicis vero & splene obstructis, vel chalybē cum oleo amygdalarum dul-
ciū cōiter preparatū, vel cū speciebus diarrhodonis, scolopendriæ, foliorū se-
næ, & pulueris corticū capparis cōmixtum crassiori modo, & vulgariter præpara-
tum ministrabis. Verum quia ob viarum, quæ in splenē tendunt, angustiam, anfractus
& distantiam (licet humorum ratione, ut ex Aetio retulimus, crasso modo chaly-
bem præparare & limare oporteat) prædicta præparandi ratio aliquando inutilis fit, ac
in vomitus & alia accidentia fœminas deducit: ob id quidē aliam, quæ subtilior
est, & vsui cōmodior existit, scribere placuit, cuius descriptio talis est: excipe li-
maturæ

- A** mature chalybis lib. i. q̄ semel ablue aceto, & à recremenris expurga, postea facta colatura super pannū inspergito, & pice pulueris gariophyllorū, s. i. q̄ per diē, & noctē eo modo sunt dimittenda, & mox ea excipere oportet vase aliquo vitreo, cui adde vini albi optimi s. x. ac proijce desuper limaturā cū pulueribus scolopendriæ, & alijs supradictis, aut intra ipsos, deinceps q̄ valide concutito cōmota vehementer phiala, mox tñ Soli feruenti expōne p̄ integrū diē, ac si hyems fuerit, in furnaria stupa, aut loco alio calido adserua. tandē octo, aut decē diebus, idē facies, donec limatura ipsa in vinū ferē liquetur, parumq; aut nihil in fundo resideat, sed veluti mixtū quoddā factum sit, cuius summo manē s. ij. exhibeto, seruatis exercitio, & purgatione supradictis. Quod si velis vulgaris chalybem cōponere, ipsum pondere ij. aut iij. cū modico rhabarbaro conserua rosari admiscebis. Itē (& non vulgaris efficaciam) electariū efficies ex dialacha, melle, & chalybe ad mediocrē spissitudinē, exceptis chalybis 3. viij. dialachę 3. vj. mellis quantum sit satis, vt mediocrē nanciscatur consistentiam. Sunt & alij inter peritos Medicos, qui ad robusta corpora electarium diaphenicon, vel aliud cōsimilis efficaciam pondere ij. 3. cum 3. iij. chalybis admisceant. Alios etiā scimus, chalybē potabilē efficere, quē nisi antea experimento cōperiam, quantum profit ignoro: q̄ si id citra vehementis medicamenti admixtionē fieri posset, non displiceret: sed securior & vtilior mihi videtur aqua, q̄ excurrit à lapide, in quo acuntur enses, si centies extinxerit limaturā chalybis candentē, qua scimus magnos lienes liquari. Ceterū ne hiberno, aut nimis calido tēpore nobis desit p̄sidiū quo obstructis mederi possimus, alia licet effingere auxilia, quę eundē ferē vsum p̄stare possint, velut sunt syrapi, qui vel ex scoria ferri, aut chalybis fiunt, aut ex rubea tinctorū, & pseudorhabarbaro. Prima igitur cōpositio syrapi ex scoria ferri hoc modo fit. R. scorię ferri (sed probo magis scoriā chalybis) p̄paratę s. xij. passularum sine arilis. li. ij. infundantur per dies tres in lib. vj. aquę & in fine bulliāt ad cōsumptionē tertię partis, & tūc adde origani, ameos vel iuniperi limati, ana p. j. bulliant parū & colentur, & ex colatura cū sufficenti faccharo fiat serapiū, cui incoquito in ligatura croci sine oleo 3. ij. Secūda fit ex eadē scoria, & eisdemmet rebus, croco excepto, & loco eius addito dialachę rhabarbari electi puluerizati, & agarici trochiscati, ana 3. ij. q̄bus dū coquunt, aut saltē dū ab igne separantur ligatis, fiat eadē rōne syrupus. Tertio vero modo fit ex ruber. radicibus aqua lupulorum in qua scama ferri pluries fuerit extincta, diutius incoctis, & additis passulis, & croco, ad syrapi formā post colaturam redactis. Quarto idem auxilium parabis ex pseudorhabarbaro, hoc est ex rhabarbaro monacorum appellato, nimirū ex radice eius decocta cū eisdem rebus, & facto ē serapio. Ad primam tamen scorię confectiōnē, ipsa lucidissima eligatur, & contundatur, & partes terreę abijciantur; & totiens lauetur donec aqua exeat pura, & mox lauetur cū aceto fortissimo, deinde cōburatur super laminā ferreā, & extingatur in aceto, & cōbustio, ac extinctio fiant 4. vel 5. Verū non sat est in hoc opere quid & quo modo agendū sit nosse, sed expedit ē non parum quousq; agendum sit. Quippe licet fœmina quodāmodo primis diebus rubicundior, agiliorq; appareat, non protinus subsistendū est ab vsu horū auxiliorū, sed eo vsq; perstare oportet, donec vel mēses fluant, si suppressi erant, vel certū sit minutissima adhuc vasa adapta esse, nec sat est semel accepisse, sed oportet

*Chalybis potabilis efficaciam
genuit. Sur et
rune*

*quatuor agere
lib.*

ter bis, aut ter accipere, et si femina sana cōspiciatur, & cū hoc regulatissimā, & A
exquisitam agere vitam, ni velimus iterum obstructionem grauiorem fieri.

Verū ne desit huic malo p̄sidiū ex pillulis, & solidis pharmacis, ea reperies
vsi probatissima lib. 1. c. de mensium sup. §. de his, quæ uterum purgant.

Ceterum ne quid huic tractationi deesse uideat, utilissimū esse duxi lectore
monere, ne utcunq; & citra delectū ad p̄dicta electaria cōfigenda chalybē p̄pa-
rer: quippe iuxta corporū varietatē varias quoq; p̄parandi esse methodos, & ra-
tiones certū est. In primis expendat, ob nimis exquisitā chalybis triturationem
& cōminutionē ipsum commutari nonnunq̄ in argenti viui antiquā naturam:
quod fit, vt non pauca ex fœminis, quæ id sumunt, frequentissimē vomant, aut
aluū habeant turbatā. Quamobrem primò in trituratione diligenter obserua-
re oportet, an degenerauerit eius aliquid in argentum viuū, necne, idq; discas,
q̄ cōis p̄parandi ratio, quæ trituratione fit, leuissimam reddere eius substan-
tiam tenetur, argumentum quidem euident; nihil argenti ibidem adesse, & ar-
gumentum ē non leue, q̄ huiusmodi medicamentum non pondere solū, sed
absterfione, & reliquis qualitatibus operatur. P̄parabis tñ chalybem aceto, si
humores crassi sint: secundò, vino, si fœmina frigidityte, & ventriculi viſio
tissimum affecta sit: tertio quidem, si calidioris fuerit temperamenti, aqua rosa-
cea. Quam ēt legem & methodum adseruabis in admiscendis medicamentis, q̄
cuiq; fœminarum sorti, prout dictum est proficua fuerint. Tamen in hac re ex-
pendat lector chalybem, ita eis obstructionibus iecoris, quæ scirrhi naturā mi-
nantur, aut contrahunt (licet à Gal. & veteribus nulla fiat huius p̄sidi j mentio)
auferendis summopere esse proficuum, p̄sertim, si chalybi admiscueris ea me-
dicamenta, q̄ p̄terquam q̄ cal faciant, vt frigiditytas chalybis compescatur, ne
iecori officiat, aperiant quoque, roborent & visceris naturā respiciant, & tucā-
tur: p̄sertim, si lentē, paulatim, & à mitioribus facto initio, opus perfeceris. Et
vt in summa dicam, tanta est in chalybe vis & efficacia, vt magnos etiā lienis,
& vteri scirrhos, partim discutiendo, partim per aluū expurgando persanasse
visum sit. Atq; hæc sunt auxilia, quæ morbo virgineo proficua esse. ratione &
obseruatione cognoui.

De vehemente pulsatione, quæ in arterijs dorsi in plerisq; fœminarum
reperitur. Cap. 7.



INTER pleraq; & eximia mala, quæ fœminis (licet non rarò in
viris potissimū melancholicis, reperiat) viduis maiori ex par-
te, aut virginibus succrescunt, vnū profectò est, q̄ oēs ferè con-
querantur de pulsu, naturali pulsationi vehementiore, anxie-
tate, ac tristi sensatione in hypochondrijs, & p̄sertim è regione
dorsi, vbi arteria, quæ secundum ipsum sita est, motū tangenti-
bus representat. Huius sanè affectionis parum, aut nihil scriptum reperies (li-
cet Cermison, tractatu de passionibus stomachi. c. 1. de pulsatione arteriæ in fun-
do ventriculi, & Montagnana consilio 143. p̄sidia quædam huic malo, scri-
pserint, idq; breuiter) p̄terq̄ apud Areteum, virum inter Græcos sapientissi-
mum, qui de venæ concauæ acuto morbo lib. 2. de causis & signis acutorū, inte-
grū caput scripsit, quo videtur, huius affectionis quodāmodo meminisse. Docet
quidem

A quidem esse morbum quandam venae cauae maioris rami, qui cor etiam per sinistram eius partem ingreditur, quod dum morbo quouis ex plenitudine laborat, protinus si incalcescat, arteriae secundum dorsum sitae, damnum committat, cuius subinde motus in praecordiis, & e regione dorsi conspicuus fit. Est sententia huius viri in hunc modum, postquam praedictae venae ramificationem scripserat. Siquis enim aliquid de superiore vena caua cordi infixam in eam, quae iuxta spinam protenditur, aut a spina periecit ad cor velit impellere, eundem descensum ascensumque inueniet. Haec igitur vena, ut arbitror (inquit) vniuersa aggritudines. & acutas, & validas patitur: nam tota una est, atque continua, à nonnullis autem Medicis ea pars duntaxat, quae secundum dorsum discurrit, agrotare creditur, quoniam eius, quae cor intrat, notae obscurae sunt, intra pectus enim rei nulli adherens, sed in pectore subleuata protenditur, deinde transversum septum egressa cordi inseritur. Igitur si quod ingens malum hanc venam corripit, pectore ambiente delitescit. In hac itaque vena zymata oriuntur. Sunt autem zymata, diuturni affectus ex defluxu materiae provenientes. Haec denique sunt huius auctoris verba, quae et in parte recenset ex affectionibus huius venae aliquam affectionem ita acutos (praeter diuturnos, quos annumerat) suboriri, ut citissimam, & crudelem afferant mortem: tandem subdit paulo inferius. Quibusdam & arteria secundum dorsum inflammatur, quod pulsatio in alteris praecordiis manifestatur: nam & ipsa venae morborum particeps efficitur iuxta illam in sinistro latere posita, utpote ea, quae in omne corpus deducitur, nihil leuaminis afferente, neque cutim emolliente. Quam proculdubio sententiam si quis altius examinet, reperiet, arteriae huius pulsationem nihil aliud esse, quam specimen & indicium morbi alicuius praedictae venae cauae, vel membri circumstantis, ut Aretaeus profiteretur: quod vitium in praedictam quoque arteriam reiecit, ita ut ex vicinia ipsam vehementius cogat pulsare. Sic eadem prorsus ratione in feminis, quibus aliquod viscus obstructum inflammatumve steterit, idem malum suboritur: quod in melancholicis et viris plerumque reperies. In qua sane re scio Fernelium existimasse arterias quoque mesenterici dum inflammantur, maxime in hypocondriaca melancholia huiusmodi subsultum praese ferre. Cuius viri sententiam solum arbitror veram esse in praedicta affectione. Quippe contingit (in feminis maxime) subsultum illum sentiri in toto ventre, & potissimum iuxta ipsius fundum usque ad umbilicum. Ceterum hanc motus speciem longe esse diuersam à praedictae arteriae motu arbitror, haec enim recta per dorsum vagatur, mouetur & sentitur: arteriae autem mesenterici non sic, sed hinc inde ad hypochondria magis vergentes. Qua occasione censeo Hip. dixisse. Quod si pulsus sit in hypochondriis manians, aut perturbationem significat, praeterquam quod harum artierum motus longe minor est eo, qui iuxta dorsum sentitur. Quamobrem considerandum est duplicem in male affectis corporibus reperiri in ventris artieris motum conspicuum, adhuc in his quae nondum macilenta existunt, unum quidem in melancholicis qui proxime ad deliramenta accedunt, isque maxime apparet in hypochondriis iuxta Hip. & Fernelii mentem: alterum verò iuxta dorsum, cuius mens est in hac parte meminisse. Quem et arbitratur idem Fernelius esse arteriam dilatam, seu varicosam, nam dum in arteria aneurisma aliquod efficitur, praedictum vitium fieri censet quoque: Ego tamen existimo arteriam, quae vehementer iuxta dorsum pulsatur, neque varicosam fieri, neque aneurisma pati, sed potissimum

tissimā pulsationis rationē esse, q̄ nuper dixi, nec desunt q̄ eū morbū arbitrentur **A**
 esse in figura, ob dilatatā plus iusto partē. Sed decipiuntur, quia pars illa nō dila-
 tatur ex morbo, sed ex virtute dilatante, licet irritata à morbida causa: & ob id
 censeo veriorē esse primā sententiā, dūmodo p̄ inflammationē intelligamus sic
 cam inflammationē. flogosim, seu incensionē dictā: nam à reliqua inflammationis
 specie in eis partibus, subsequitur mania, aut deliriū, quod Hip. intellexisse ar-
 bitror, dū dixit: Si pulsus insit in hypocondrijs, maniā aut perturbationē signifi-
 cat. Ex quibus constare iam videtur, huius affectus naturā esse intēperamentum
 calidum, seu inflammationē p̄dictā arteriā. Ceterum inflammationē hanc du-
 plicis naturæ esse cōtingit: alterā quidē essentialē, hoc est, q̄ ipsamet arteria pa-
 titur, non aliunde accepto mali principio, sed ipsa primario affecta, q̄ grauissi-
 morū accidentium soboles est, & mortis proximæ: alterā verò p̄ consensum ab
 affectione venæ magnæ, vel alterius propinqui visceris: cuius sortis esse credit̄
 affectio, q̄ feminas vrget. Rursus eandē affectionē scimus fieri, aut subitò & affa-
 tim, quæ grauissima infert accidentia, qualia Aretens recenset: aut lente, ac sen-
 sim, cuius sortis censeo esse eam affectionem, quam fœminæ, præsertim virgine-
 nes, & viduæ perpetiuntur: ex viscerum obstructionibus, quo fit, vt neque citò **B**
 interimat, neque plurimum affligat, vt paulo inferius monstrabo.

Verū, vtcunq; sit, vno è tribus modis arteriā hanc cōspiciē, & vehemēter
 pulsare, certissimū mihi est. Primū quidē cū vena cava crasso, aut superexcalfa-
 to sanguine plena, dū in grauiora accidentia nō degenerat, arteriæ huic, q̄ iu-
 xta dorsum sita est, vitiū cōcat, vt ex Aretci snia probatū superest. Quā sanē affe-
 ctionē ex hac causa subortā, pludium esse maioris mali mihi non est dubiū: aut
 saltē si in sanguinis fluxum ex pulmone, aut in breuem mortē nō cōmigrat, vt
 idē autor refert, in maniam tñ aut tristē, & immedicabilē melancholiam, dubiū
 non est, quin ocysimē degeneret. Qui subsultus longissimē dissidet ab eo, quē
 in fœminis cōperimus. Secundò autē (quod frequentius in fœminis accidere cō-
 stat) fit, cū ex visceris alicuius calore acri, & mordaci eadem quoque arteria in-
 calefcit, & ob id maiore motum repræsentat: quod nō rarò in gracilibus, & me-
 lancholicis fœminis ex sanguinis, vel alterius humoris, aut excrementi adustio-
 ne conspiciamus. Quippe cū his omnibus in viscerum, & meserei p̄sertim venis **C**
 sanguinis fœculentus, vel humor, aut excrementū quoduis ex interna, aut ex-
 terna causa exuratur, nulli fore dubiū arbitror, qn̄ certum sit arteriā illā simul
 cōpati, atq; exalcfieri, & ad maiores, ac vehementiores motus perpetuò excita-
 ri. Quā quidē in re hac constituenda est differentia, q̄ si causa externa, vel inter-
 na subitò, & affatim huiusmodi calorē succendat, certum est, nō grandē solum
 arteria pulsationē efficere, sed grauius aliud malū, quod grandioris sit pludiū,
 vel citò interimat. Verum si altera, aut vtraque causa sensim, & paulatim visce-
 ra aggrediatur, verisimile est affectum, fieri connaturalē, & habituali cōgeneū,
 quo laborans sanus suo modo viuit, sine cōmuniū actionū euidentī noxa, in-
 dies tamen vel corpore, vel moribus ad eò mutatur, circa euidentem causam, vt
 non minimā inferat sibi suis, ac Medicis admirationem, visceribus distēpera-
 tis, ac perperam propria munia obeuntibus, improspērāq; alimentorū coctio-
 nem molientibus. Quibus sanē mirū nō est, si corpus in dies præter ætatis ratio-
 nem deterius se habeat, ac cor triste, & metuens aliquando exarescat exoptetq;
 mori:

A mori, & in alia deliramenta prorumpat, aut anxietatē, & inquietudinē, vel rerū omnium sine euidenti causa tedium perpetiatur, citra mēbri alicuius conspicuū affectū, præterq̃ pulsantis illius arteriæ. Tertio verò, & vltimò prædictæ arteriæ pulsatio conspicua efficitur, sine corporis gracilitate (quæ, vt Gale. refert lib. de pulsibus ad tyrones, causa est, q̃ arteria, quæ secundum dorsum sita existit, tangentibus abdomē motum repræsentet) ex visceris alicuius, aut venarū, q̃ alicui viscerum proximæ sunt, obstructione conspicua, & manifesta: quod plerunq; maiori virginū, aut viduarum parti accidere conspiciamus. Quā doctrinā intelliges verā esse, & ab alijs duabus causis diuersam, eò quod ex prædictis obstructionibus id malum oritur, modò incalescant humores obstruentes, vel obstructione detēti, modo secus. Quippe si præter id q̃ obstructio adest, inflammatio quoq; sit, dubium non est, quin maior fiat prædictæ arteriæ subsultus, vt in secūda causa nuper diximus. Verū si citra euidentem calorem infarcti sint humores aliqui in mesereo, vel quouis alio viscere, verū quoq; esse arbitror, ex tumore humorum obstruentiū arteriā comprimi, quæ cū durū quid, quale ante obstructionem, non attingebat, modo pertingat, faciliē vehementius pulsare sentimus: qđ fieri pōt vno ē duobus modis. Vno, p̃ rationi cōsonum videatur (licet amplius q̃ secundum naturam non pulset) arteriam, quæ rem aliquam duram, qualis obstructio est perungit, longē apertius motum repræsentare, q̃ antea, dum re molli, & secundum naturam circumscita erat: tum quia naturale arteriæ spatium obstructione impeditur, quam dum pertingit arteria ex continuitate rei duræ, quæ digitos ē attingit, motum quoq; rei duræ digitis repræsentare certū est, quod anteq̃ ibidem esset durities, erat impossibile, eò q̃ ad tam distantissimam partē non peruenisset motus, nisi quid durum in medio esset, cuius cōtinuitate motus arteriæ ad tactum vsq; perueniret, repræsentaretq; maiorem motum: tū verò, quia arteria ob tensionem ex vicina plenitudine durior quodammodo, aut tenrior apparet, cuius motus maiorem semper æmulatur figuram, q̃ re vera præstet. Secundò, eum motum contingit non solum maiore apparere, verū re vera esse, q̃ partes vicinæ obstructionis causa non possint, quantum fat est, ventilari (licet calor non creuerit, vt in secunda causa diximus) cogiturq; subiinde arteria hæc huiusmodi defectum supplere, & ob id vehementius pulsare, præsertim si ipsi detrahatur ab obstructione spatij naturalis aliquid, vt causam reierat, maiorem apponit conatum, & subinde euidentiore efficit motū, eoq; magis, quod aliqua vicinarum partium incaluerit. Quamobrem censeo, in plerisq; virginibus obstructis huiusmodi subsultum ex hac causa reperiri.

Verū si quis certus exactè non fuerit ex prædicto subsultu, & causis, quas nuper diximus, signis amplius id dignoscet. Inquit enim Areteus loco nup̃ citato loquens de ijs, quibus arteria incalescit. Cutis aut̃ sic affectorū squalida, rugosa atq; aspera est, sed in partibus p̃minētibus, atq; olleis, vt in cubitis, genibus, digitorūq; articulis magnis, talis cōspicitur; somni tumultuosi sūt, alius quibusdā nihil reddit, quibusdā exiguum acre, biliosum, lotium acre mordaxq; est, mens vique his cōstat, sed quadam segnitie torpet, & corpus tale consumitur. His et̃ accedit anxietas inquietudo, & omnium rerum insolens tediū, cibi et̃ fastidiū caliditas p̃ totū corpus ad tempus, & per interualla, præcipuè in facie, & circa ipsum ascendens, sius, pulsus palpitans in præcordijs, qui dum nimis crescit,

Signa.

fi in, inncepem plerunq; degenerat, præsertim cum malum aded creuerit, vt & cor per arteriam, & iecur, aut ventriculus per venas, & vasa meleraica cõpatiantur. Haud ab re igitur (vt inquit Areteus li. 2. de curan. acu. pa. c. 7.) existimes eorum viscerum supremas partes maximè ad vitam facientes ægrotare. In quibus feminis sine dubio reperies eadem ferè signa, quæ cap. de Melancholia, & obstructionibus virg. & vid. scripsimus.

*Præsa-
giu.*

Tam grauis est huiusmodi affectio, tamq; timore plena, & grauissimorū affectuū præsaga (quod verbo illo monstauerat Areteus. Supremas partes maximè ad vitā facientes ægrotare) vt necessum sit, id cuiq; monstrare, ne periculi ignorantia morosè, & negligenter eiusdē curationē aggrediatur, aut incautè aliqd agat, quod causa deinceps sit maioris mali. Quo in affectu, vt triplex reperitur causa, ita quoq; triplex existit præsagandi modus. Sic enim dum arteria pulsat ex venæ cauæ sibi adhærescentis plenitudine, aut inflāmatione grauissimū esse malum, & periculo plenum p hæc verba monstrat Areteus. Qñ sanguis copiosus erumpens vitā delet citissimè, p superiora quidē, per pulmones, & arteriam profluens, si in pectore fiat effractio, si iuxta principium in imum ventrem descendens, in intestinis continetur, atq; aded intestina replentur, quum prius q̄ deiectus sanguis in conspectum detur, homines intereunt, & ventriculus sanguine redundat. Nascitur & circa venā phlegmone, q̄ & ipsa, si magna sit, celeriter hominem tollit: ignis enim acer, mordaxq; in ambabus cavitatibus inclusus accendatur, pauculq; duntaxat foris apparet, vt tangenti flamma tenuis esse videatur. Ac paulò inferiùs, vt magnitudinē periculi ostenderet, adducit specia lia huius mali signa dicens; Aeger quidē sese cõburi existimat, pulsatus arteriarū exigui sunt, creberrimi, ac veluti oppressi atq; repulsi: frigus adest extremorū, sitis, aspera oris siccitas, facies decolor, rubet, omne corpus subrubidū est, p̄cordia dura sunt, atq; reuulsa, dolor in dextra parte maior, & cū eo palpitatio in longitudinē ad ilia, vsq; perueniens. Et subdit paulò inferiùs. Decimoquarto die hi plerunq; moriuntur: quibus morbus diutius trahitur, duplo lōgiori tēpore pereunt. Quotcunq; autē aut ab initio pusillam phlegmonē habent, aut magnā paulatim remittentem, mortem quidē euadunt, sed nondū morte liberantur: hi longo sanè tēpore causo laborant, verum oīa periculosa iā desinunt, dolores, præcordiorū distensiones, & pulsuum malitia, & mētis ignauia, adhuc tñ fastidiosi sunt, languēres, consilij inopes: simulq; & ardor, & sius, & lingua, orisq; siccitas agrum discruciant, magnè respirant: verū si frigidam, quā plurimam affatim bibant, breui interuallo molestia leuantur, postmodū ipsis sitis accenditur, & sic in dies deteriores euadunt, donec morte corripiantur. Quā equidē affectionem non rarò in viris, ac feminis accidere existimo, verum iecoris inflammationis effigie decepti non intelligimus: & ob id placuit, oīa quæ in ea reperiuntur, ad vnguem scribere, vt cautiore deinceps facti, attentius eandem intueamur. Secunda autē causa, & species huius mali, licet minoris sit periculi, haud leuis est. Quippe dum ex inflammatione (dixerim phlogosi, seu incensione) vicinarum arteriarū partium, eadem vehementius pulsat, mihi non est dubiū quin laborans, nisi citò præueniatur, in melancholiam, maniam, aut perturbationem agatur, quod lib. 1. progn. his verbis dixerat Hippo. Si pulsus adsit in hypocondrijs, maniant aut perturbationem significat. Præterea periculum est,

ne

Ane in totius corporis consumptione femina citra febre comigret, q̄ cibi fastidia curatu difficillima cū genium, & totius corporis impotentia, q̄ breuissimè accedant. Item mœstitia grandis; & implacabilis sitis, quæ potu non solum non leuatur, sed rursus vehementius crescit, & nullis rebus leuamen suscepta: tandem quauis febricula superueniente, vel mox pereunt, vel in malū corporis habitum decidunt. Tertia verò causa, & species, & cognitu, & curatu faciliior existit, ut quæ semota obstructione leuiter quoque senescat. Verū si diutius obstructions remorentur, nil mirum si uel incallescant, vel duriores, & immedicabiles factæ in aliquod ex prædictis malis affectionem migrare contingat: nā ocysimè in malum corporis habitum, vel hydropem non paucas incidisse scimus. Quippe crudi succi, qui non probè obstructionis causa, purgantur, nutrimentalia, & præcipua membra ad eò refrigerant, ut mirum non sit, si in hæc mala femina promptissimè deferantur.

Pari prorsus ratione in hoc affectu tripartitū esse oportet curandi rationē, si-
cut causam, & affectū triplici diuisione distingi diximus. Sic prima mali species, Curan-
di ratio,
B q̄ ex dorsalis venæ, & arteriæ inflammatione pullulat, ut q̄ grauissima sit affectio, sedulā prærequirit diligentia, & maturum cōsiliū. In quo affectu præter tenuissimā, ac refrigerantem victus institutionem, vniuersam curationem in sanguine detrahendo sitam esse ex professo Areteus fatetur: inquit enim loco nuper citato. Venas itaq; in cubito protinus cedito, inultumq; sanguinis, sed nō semel totum mittito, vno & bis & ter & alio die, quò interim vires restaurentur repetito. Quæ profecto sententia videtur, omnem suam curā in sanguine detrahendo collocasse. Verū quia rationi consonum est, sicut in ardentissimis febribus, vires nimio calore periclitari, & laborantem animi deliquit, optimè videtur cōsultere, per vices, futuras esse sanguinis detractiones. Quo facto diligentia nō leui curandum est, ut & habitus refrigeretur, & reliquæ sanguinis, q̄ supersunt, cōterantur, quia cū perdifficile sit vena scissā consumere, cucurbitulis dorso affixis cū grandiori sacificatione per cutim è regione partis affectæ deriuare opus est: quibus et internæ partes, quæ calore excalescunt, refrigerari contingit. At qui cū sic affecti refrigeratione non leui indigeant, q̄ in corū visceribus veluti quidam ignis exæstuet, secunda indicatio docet in hoc affectu, frigidæ potibus, lactis vsu, & epithematis cauma in visceribus extinguere, antequā aut in acutissimam febrem comigret, aut succrescat, exaspereturve ea, quæ cum affectu præest. Sic affectis et uerendum non est, copiosius frigidam porrigere, licet mox ab assumpto potu uomant. Manè uerò mulieris optimi temperamenti lac ministrabis ex ubere, aut mulctū, aut, ut Areteus consulit, ipsi lacti tertia aquæ parte addita: Nam & alimenti, & medicamenti vires obtinet. Cuius sanè loco apozemate aliquo frigido utendum est, confecto ex aqua hordei, cichorii, boraginis, acetosæ, buglossæ, schorcioneræ cum syrupo aliquo, uel ex frigido, uel ex modicè acidis. Quæ in re non displicebit prædictis aquis momentum succi agrestis, uel limonum acidorum, uel aceti cum saccharo addere, aut syrupū ex prædictis rebus confectum, uel ex acetosæ, aut similibus. Conferunt dorso epithemata, & cordi et ex aqua rosacea, acetosæ, buglossæ, & succo pomorum acidorum, & dulcium, additis pulueribus santhalorū, coralli, diamargaritonis frigidi, & electarij de gemmis sine spēsibus, quibus si aceti modicū adieceris haud parum

parum profeceris: q̄ oīa filtro serico, aut panno molliſſimo excepta p̄dictis pat-
 tibus adhibeto. Caterū in hac affectione rarō, aut leuiter expurgantibus phar-
 macis vtendum eſt, quod hac interna viſcera excalfacere nata ſua ſponte ſint.
 Quamobrē inclinante iam affectione, ſi oris ſupererit amaritudo, ventris mor-
 ſus, cibi faſtidium, vel quoduis aliud ſignū, bilioſi, aut alterius humoris ſobo-
 les, māna, caſſia fiſtula, aqua lactis, ſucco roſarū, aut ſyrupo ex infuſionibus vio-
 larū, vel infuſo aliquo ſenæ, leuiter corpus purgabis, cauens ne aliquod medi-
 camentū acrius admiſceas. Nā tantūm Areteus ea præcauet, vt ēt ſi aliūſ aſtricta
 & arida nimis ſit, blandioribus ſolū clyſmatis ipſam emollire doceat, interdi-
 cens omnino, q̄ calida & acria exiſtunt: ob id ēt refrigerantibus clyſmatis viſce-
 rū caliditate cōpeſceſſiſſimo per anum lacte, aqua hordei cū oleo roſarum &
 violarū. Præſtat item mane ſumere ꝑ.iiij. aquæ ſtillatitiæ radicū altheæ, vel ſemi-
 num maluarum viridium cū ꝑ. i. ſacchari albiſſimi, aut pūſanā optimē præpara-
 tam, vel aquā excremore hordei ꝑ inſtillationem extractā, cum modico ſaccha-
 ro, præſertim ſi portulacæ aquā admiſcueris. Eundem ēt vſum præſtat lac qua-
 tuor ſeminum frigidorū maiorum, ſuccus & decoctū cucurbitæ cū mucilagi-
 nibus ꝑſyllij, & ſeminis citoniorum. Conferunt non minus aquæ dulcis tēpe-
 rata balnea, q̄ vel calorem compeſcant, vel ſudorem huic affectioni vtilē alli-
 ciant: in ſœminis verō nullum vtilius, neq; tutius reperies ꝑſidium, q̄ frequen-
 tioribus crurum lauacris menſes euocare, aut eorum defectu, ex venis tali co-
 pioſum ſanguinē fundere. Sic proſectō in vtroq; ſexu incredibili quadā effica-
 cia prodeſt, ſanguinem ꝑhirudines ex hemorrhoidibus extrahere: nā, cum hu-
 iuſmodi venæ cum venis dorſi, & meſeraicis quodammodo cōes exiſtant, dor-
 ſalis hæc affectio mira quadam celeritate ſubſidet, & quieſcit extracto per he-
 morrhoides ſanguine. Quod ſi iecur compati videatur, non minoris eſt momē-
 ti ſaluatellam dextræ manus ſcindere: & his omnibus factis, dorſum roſaceo
 vnguento, de cucurbitis, vel refrigeranti Gal. inungere.

Verū ſi ex ſola diſtēperie, citra euidentē humorum augmentum affectus
 ſuboriatur, eā omnino admittit curandi rationem, q̄ eſſe ꝑficiam ſœminis ex
 humorū vſtione melancholicis, dictū eſt. In quo ſanē opere (ꝑter victus inſtitu-
 tionē, q̄ attemperet, & optimæ ſit ſubſtantiæ) nulla ꝑroſus, aut q̄ leuiſſima va-
 cuatione vtendū eſt, niſi vel menſes ſupprimantur, vel improſpere ꝑdeat: quo
 tēpore tali venas tundere oportebit, ſin aliter, minimē, vel tantū dextræ manus
 ſaluatellam inſcindere refrigerationis viſcerū gratia. Fugiendum tñ omnino
 eſt in purgationibus ab electorijs, & validioribus pharmacis: quippe aut pur-
 gandū non eſt, aut q̄ leuiſſimis, qualia paulō ſuperius adduximus: nā ea, q̄ cali-
 da, arida, vel acria ſunt, mihi non eſt dubiū, quin graue damnum ſint allatura,
 vt de rhabarbari infuſo, diuturno experimento cōꝑrobatum habeo, q̄ eo exhi-
 bito, vehementiores & maiores arteriæ ſubſultus cōpareant, & nihil ſœmina
 excernat, & ſticuloſa, ac mille querelis plena euadat. Quamobrem in huiuſmo-
 di cauſa fugiendū eſſe ab eius vſu omnino arbitror, ſolūq; blandis agendū: vel
 ſi nihil excrementitium ſuper-eſſe cōꝑeriamus, cibis optimi nutrimentū, & me-
 dicamentis tēꝑerationibus feruorē humorum, ac viſcerum miteſcere oportebit.
 Vnum tñ in hac curatione præcauere oportet, ne vel nimijs exercitijs corpus
 plurimum incaleſcat, vel in furorē ſœmina agatur, aut cruditatibus ſcarens in
 hypo-

hemorrhoi-
 des in uenis
 dorſi, et
 meſeraicis,
 quodammodo
 cōmuni exi-
 ſtunt.

A hypocondriacam melancholiām perquam faciliē degeneret: tandē utilius semper esse duxi, paucis, & probo uitæ instituto feminam moderari, quā grandi medicamentorū turba exhibita, non solum non prodesse, uerum in graniore, & in immedicabiles affectus corpus deferre.

Si autem ex uisceris alicuius obstructione (quod tertiam causam & speciem huius affectus cōplet) id malū suboriat, hoc unum in curatione pōculis habeto, nimirum. nullum auxilij genus quicquā usquam pōtare, ni obstructionem prius curaueris: nā si obstructio illi potissimā causā praeſtat, certū est, veram curandi rationem à causā ablatione principium nancisci. Sic mille auxilijs à medicorum plurimis, tentatis, nullum leuamen feminæ persentiscunt, nisi obstructione curata: quo sanē opere subsultus delitescit, vel parum, aut nihil sensu percipitur. Quamobrē primò cuius nam visceris obstructio sit, expendes, cui opē attuleris, si eis prorsus auxilijs, q̄ c. præcedente adduximus, vsus fueris: qui bus aliquid attemperans admiscere cōueniet, ne arteriæ calor de obstructiū medicamentorum vi, & efficacia in maiorem intensionem agatur. Ac sublata obstructione (cuius hac in parte iterum meminisse non est æquū omnino subsultum, si fortē remanserit, curabis, eadem prorsus methodo, & eisdem medicamentis, quæ reliquis duabus causis proficua esse, superius diximus.

De varijs ventriculi accidentibus ex utero.

Cap. 8.

DVM eò miseræ femina deuenerit, sanguis menstruus, aut semē, vel utrunq; corrūpatur, non solum q̄ hucusq; diximus mala ipsi succrescere assolent, verū & multò plura, ac non minus grauiā. Nā cū (vt dictū est) uterus p̄cipuis corporis particulis confortium nō leue, aut cōtēnendum obtineat, & ob id in cōsensum quoq; fere oēs partes trahat, p̄sertim si aliquid ab eo in ipsas transmittatur, sit p̄fectò, vt ventriculū ēr mille modis lædat, partim appetitū omnino ipsum priuādō, partim eum imminuendo, partim quidē ipsum cogendo ad ciborum abominatiōē, Quippe aliud est, non appetere, aliud diminutē appetere, & aliud quidē cibos abominari, & odio habere: aliqñ etenim præter inappetentiam horret animus viso alimento. Præter quæ vitia, aliud non leue virginibus ferē oībus, & reliquarum non paucis excitare uterus assolet, nimirum, deprauatarū rerum appetentiam. Vtūq; tñ sit, harum affectionum naturā ad eā ventriculi partē, & facultatem pertinere censem, cui appetendi munus incumbit: quò sit, vt os ventriculi affici necessū sit, idq; quatenus facultate appetendi fruatur. Verū sicut diuersa huic parti insunt symptomata, ita quoq; diuersas in ea facultates pati credendum est: nam inappetentia, aut diminuta appetentia ad animalem facultatem referri debent: at verò hoc, vel illud appetere, vel odio habere, proculdubio ad facultatem naturalem appetitiuam. Nam cū similitudine sit naturalis appetitus ad indiuidui cōseruationem, & id sit cuiq; naturale, & insitū, ita quoq; eidem potentiæ perūnere deprauatē appetere existimandum est. Sūt quidem harum potentiarum vitia hæc, in genere nexæ earundem deprauatiōē

P aut

aut ex toto abolitarum, vel diminutè operantium. Proficiscitur tamè hoc symptomatum genus ex oris ventriculi intemperamento solo, vel cum affluxu rei alicuius præter naturam, ab vtero in ipsum ascendentis.

Præter dicta accidentia, ex ventriculo ipso ab eadem causa læso, alia non minoris momenti succrescere conspiciamus, cuius naturæ esse creditur vomitus, & singultus, quos mille modis fieri, & incredibili varietate mutari, euidenter constat: sicut symptomata esse secermentis ventriculi facultatis. Item mirabitur forsàn quispiam, si dolorum ipsius ventriculi varietatem, & vehementiâ diligenter intueatur: nam ab eisdem causis non rarò, vel dolore os eius præmitur aliquñ adeo acri, & vehementi, vt in syncopem fœminam deferat, aliquñ verò, adeo tristi, & molesto citra magnam vehementiam, vt mœstas & omni tædio affectas ipsas reddat, maximè eas, quæ meserei inflammatione, vel obstructione laborant: sic profectò, incredibili varietate ludentes solent perpeti dolores, vt scribi sit p difficile. Verùm cum ferè omnium eadem sit curandi ratio, cum causa, & causæ principium sint idem: ob id hæc dixisse sit satis.

Causa. Vnam cõmunemq; causam hos omnes affectus nancisci cõpertū mihi est: nã halitus ille ex putrido semine, aut sanguine ascendēs, ptingens os vetriculi, appetentiæ vitia progignit, veniens verò ad ventriculi cauum, nausçā, vomitū, ac singultum proculdubio molitur. Verùm cū halitus vnus sit, addubitabit quidē aliquis, quanā ratione in vno eodemq; membro tot exciter accidentiū varietates. In qua quidē re ego existimo dum halitus in ventriculi cauitate inundat, vomitus necessario concitari, q natura halitu irritata alimentū oē superueniens trudit. At dū huiusmodi halitus ventriculi tunicis fixi adhærent, necesse subinde est, fœminā perpetuò nausçabundā existere: affligitur enim tunc ventriculus & assiduo irritamento, nititur pellere, quod sibi approximari molestū p sentit. Sed si prædicti halitus substantiā ipsius ventriculi permeent, & in eius penitiora sese inferāt, singultum necessariū fieri cõperies: quippe ex maiori molestia, q halitus inferunt, maiores cogitur natura conatus apponere, ita vt ventriculū conuellat concutiatq; spe excernendi nocuum. Cæterū si halitus ijdē eò malitiæ tendant, vt humores ventris, aut alimenta vitient, hæc eadem accidētia, sed longè grauiora, & alijs non minoribus admixta facilè cernes. Mouet quoq; idē halitus inappetentiam, ciborum abominationē, & deprauatorum appetitū, verùm diuersa ratione: nam dum halitus, qui ascendit, præterquā q os ventriculi attingit, putridæ quoq; pinguis, & calidæ, sed multum humidæ naturæ existit, cibi abominationem efficere cõpos est: talia etenim sunt suapte natura idonea tedium, & subuersionē efficere, vt de pinguis, & crassis cibarijs cõpertū est. Quod et accidens in potu iam reperimus in illustri quadam fœmina, q potum auersabatur: sicut in alia nullo modo posse potū admittere, quod protinus vomitu, & mille alijs accidentibus excādesceret, instar hydrophobici affectus, (licet hæc potum summo opere expostulasset) ita vt sexaginta diebus sine potu degerit. Verùm dum halitus ascendens, calidus nimis fuerit, sitibundā efficiet fœminam, plurimum tamen fastiditam: deijcit enim nimia, & putredinosa caliditas actum appetitiuæ potentiæ, licet bibendi cupiditatem adaugeat. Quod si aliquam

A aliquam aliā qualitatem deterrime conditionis præ se tulerit halitus, eiusdē nā appetitū suscitari necessum erit: sic proculdubio ex ustus, halitus, carbonēs, sicciſſimus, terram, frigidus & siccus, gypſum appetere cogit, & pari ratione alia fœda & deterrima modò cibaria ſint, modò ſecus, quæ mira varietate fœminas ſic affectas appetere ſcimus. Cuius rei multiplicitem ſive cibi, ſive potus ſit, ad uariam & multigenam halitus conditionem reducendā eſſe arbitror: quibus accedit vitioſorum ſuccorum copia, quæ aut præſuit in corpore, aut occaſione horum halituum in dies magis ac magis in corpore accreſcit. Ex qua ſanè conſideratione prodit cā durationis horum affectuum, nā mirum profeſſo eſt, cur tandiu durent, cum totam eorum cām in halitus reiectam ſcripſerimus: ſed cā ſunt humores prauī ventriculo adhærētes, qui vitium & putredinolaſam naturam ab halitibus ocysſimè mutuuntur, ac diu adſeruant, & malum ſubinde adaugent & tuentur. Sic dum præ nimia copia ventriculus aut aliqua eius pars diſtenditur, mirum non eſt, ſi dolore prematur, ſicut dum acrimonia aut mordacitate eius aut alicuius prauī ſucci morderetur diſſoluiturq;

B Huius affectionis ſigna exquirere ſuperuacuum duxi, ſi quidem ſatis unumquodque ſe ipſum manifeſtat: ſed in hac re ſcire tantum conuenit, nauſeam, vomitum & ſingultum, ipſum ventriculum affectum eſſe monſtrare: at appetitus uitia ſyncopeſ cardiacas, frequentem anxietatem, ac dolorem ventriculi os pati. Habet inſuper hoc peculiare deprauatarum rerum appetitus, quodd arguit intraneam, imbibitam & ſerè habituaſem halitus intemperiem & naturam in ore uentriculi: quod æmuletur conditionem naturalis temperamenti, & ſubſtantiæ partium, quæ ſibi ſimile inſita virtute appetunt. Si tamen fœmina huiusmodi accidentia perpeſſa, nihil omnino inedia uel ſiti contabeſcat, vel imminuatur, ſcito, vniuerſum corporis habitum humiditate nimia ſcatere, ac veluti connaturalem habere non leuem humorum craſſorum copiam: quos proculdubio ſcimus diu citra cibum innoxie plures fœminas adſeruallē: quod diligens medicus attento animo expendat, quippe ad præſagationem & curationem proficuum, ſummopere erit. Humores enim hi diutiſſimè perferre poſſunt vim & actionem caloris, antequam in conſumptionem carnis vel alterius vtilis ſubſtantiæ calor ipſe alimenti defectum irruat: quo fit, vt diu citra euidentem conſumptionem fœminæ ſic affectæ abſque alimento viuant, dolorem uerò eſſe ex flatu vel humore, docet tenſio, ſi flatuſ adſit, aut oris ſapor vel uomitus, ſi humor, & qualis ſit oſtendit ipſe qui vomendo excernitur.

Solent prædicta accideſia tam difficulter curari, vt nullis videantur auxilijs (quantumuis rōni conſona ſint) cedere: quapp Medici conſilio deſtituti, omnino ab eorum curatione deſiſtunt. Cuius difficultatis vniuerſam rōnem pertinere cenſeo ad vteri uitia, q̄ cum præſidijs ventriculo adhibitis auferri nequeant, fruſtrā medicus curationem aggredi tentat. Erit igitur in hoc affectu duplex curandi rō: altera, quæ vtero, membro nimirum primò affecto prouideat, altera vero, quæ uentriculo. Sed expendat lector in hac curatione, ſepe uitium ab vtero mutuatum, fieri in ipſo ventriculo per eſſentiam ex diuturno conſenſu, cui coſtpe omnis cura adhibenda eſt, antè quā vtero auxiliares præſtemus manus. Ad primam igitur curandi rationem perueniendo, ſanguini menſtruo improbe eſſe

P 2 parga-

Signa

Cura
ratio.

purgato, primò prouidebis, sanguine quidem miffo, plerunque tñ ex talo, modò menstruationis fit tēpus, modò fecus: nā vtunque fit, studendum est vteri, plenitudinem deponere, & naturā ad partes confuetas euocare. Nec uerendum est, ventriculo fastidiente uel nauseabundo sanguinem demere: cām enim imprimis illidere oportet, ac de inceptis membris imbecillibus. prouidere. Sāguine itaq; p viribus & suppressionis mēfium rōne euocato, infurgit protinus altera curandi rō, quæ flatus ventriculum ascendentes difcutiat: rursus altera, quæ vētriculum euacuet, & post euacuationem firmet ac roboret. Nā, vt dictum est, vniuerfa diuturnitatis huius affectus ratio, in fupervacuis humoribus vētriculo in hærentibus confiftit. Sic mox à fanguinis detractione leui pharmaco vētriculū purgabis, veluti māna, caſia cū pulueribus diarrhodonis, vel modico agarico: fyrupo itē roſarū ſolutiuo, pillulis maſtichinis vel de hiera. Deinceps tñ adhibitis q̄ humores craſſos inſcindunt, & acres retundunt (quorum abundē meminimus cap. de epileſia) deuenies protinus ad paulatinā purgationē, factam quidē pillulis de agarico, de aloē, aut ipſa aloē lota, de hiera ſimplici, de maſtiche, vel cōpoſitis ex rhabarbaro, maſtiche, agarico, & aloē pari mēſura: vt ſi qd in vētre adhuc in hæſerit, paulatim expurget: quò facilius quæ flatus difcutiūt, locū obtineant. **Q**ua in re in primis vētrē inunges oleo nardino, de abſinthio, de cinnamomo, de mentha, vel de naphtha, aut de abiete, vel baſſamo, additis pulueribus diarrhodonis, abſinthij, mentha, cinnamomi, corticū citri, ligni aloēs, & ſeminis angelicę, cū modico diamoſcho, & diambra. Ex qbus facilē tibi erit, varia cōficere pſidia, q̄ ori ventriculi aut dorſo appoſita, maximi ſint momētū. Preſtat idem beneficiū frigidioribus fēminis decoctū radicis angelicę cum ſaccharo ſummo mane ingeſtū: itē dilutum abſinthij cum aromatico roſacco, vel diarrhodone in tabellis cōfecto, ſic cinnamomi ſtillatitia aqua, vel floris eius, maxime efficacię eſſe credit. Ex vſu quoq; eſt pulueris agnicacti & cinnamomi, corticum citri, aniſi, & cumini momentū ante cibū accipere. Sed efficacius reperies intus & extra adhibitu oleū cinnamomi, aniſi, gariofillorū, & macis, aut piperis, q̄ ſane arte chimica extracta nō parum prodeſſe ſcio. Clyſteribus frequentioribus in hoc affectu vtendū eſſe conſulit rei rō: pſertim ijs, qui aliqd expurget, & flatus ab vtero & vicinis partibus difcutiant: qualia abundē ſuperius reuulimus. Sed pſtabit in hoc affectu bis ſemelue in hebdomada vomere, quod experimento didicimus vtiliſſimū fore, à quo auxilio porrigenda ſunt, q̄ reliquias conterere valeant, velut eſt theriaca, mithridatū, bolus magnitudine fabæ ex te rebinthina cum modico rhabarbaro: itē radix angelicę ſaccharo condita. Viētū item oībus miniſtrabis optimi ſucci, & tenuioris ſubſtantię, potum vetò ex aqua cinnamomi vel aniſi, cum corticibus citri aut radice china, quod magis probo: nec diſplicebit in his quæ frequenter animo deficiūt, aut facile reſoluitur, modico vī vino, vel ſaltem mica panis eo madida ante prandium, quo vires facilē reſciantur, & calor vegetior concitetur in ventre.

Verū, quia adhuc his oībus factis, affectio ſubſiſtere nequit, ex medicis nō pauci à curatione omnino deſiſtūt ignorātes p̄cipuā curandi rōnem (ijs, q̄ diximus, præmiſſis) conſiſtere in ea vteri prouidentia, quæ flatus diſtrahat, difcutiat, aut ſurſum aſcendere prohibeat: interim tamen ſanguine miffo ex talo, quò humoris corrupti minor copia praſit. Quapropter crura, ventrem, & vniucr-

A & vniuersum corpus p̄fricare imperabis, & f̄eminam summo manè lento gradu exerceri, ac ventrem post exercitium inungere oleo anethino, liliorum alborum, chamæmeli, de croco, de baccis lauri, & in quo ferbuerint radices lilij vel angelicæ, vel semen agnicasti conuassatum, præsertim si eis admiscuetis instillationem ex theriaca, quam cap. de vteri suffocatione adduximus. Vtilissimum proculdubio existit tertio vel quarto die cucurbitam vmbilico adhibere, ac postmodum partem illam aliquo ex prædictis oleis cum theriaca & pulueribus seminis vel radice angelicæ inungere, ac deinceps emplastrum pro matrice eidem parti apponere. Tandem ea, quæ semen corruptum extrahunt vel discutunt, vteri osculo adhibenda sunt eo ordine, quem diximus cap. de vteri suffocatione.

B Quod si vitium magis in ore ventriculi præstiterit, frequentioribus pillulis ex hiera & mastiche, vel aloe vtendum est. velut si in fundo vigeat magis, vomitibus frequentioribus, hoc vno in omnibus semper adseruato, ne diu in euacuationibus persistamus: sed, vt Hipp. consulit, permittendum est, naturam aliquando oriri, ac liberam esse à medicamentorum vicinia, quæ non parum ipsam labefactant. Quippe hac ratione aliquantulum ab ipsis pharmacis leuata, ipsa sua sponte deinceps citra aliquod auxilium, maius præstat beneficium: in longissimis enim affectionibus vtendum est præsidii hac lege.

C Verum si ex diutina halituum ab vtero ad ventriculum transmissione, ipse factus fuerit imbecillus, ad eod vt excrementa deinceps sibi generet eo vitio affecta, quo etiam si transmissio halituum cesseret, affectionem insigniter non cessare conspiciamus, vniuersam curandi rationem ventriculo esse adhibendam euidenter constat. Quocirca eo tempore à ventriculi prouidentia eo modo, quem superius diximus, auspicanda est omnis curatio. Tamen si adhuc persistit halituum transmissio, & vitium vteri inueteratum fuerit, fontanelâ aperire in altero aut ambobus curibus, vltimum præstantissimum & non rarò experimento comprobatum existit auxilium. Prodest & doloribus quoque haustum aquæ feruentissimæ summo mane accipere vel vini odoriferi aut decocti, seminis angelicæ, quæ omnia facies purgato ventre, aut vomitu præmissis.

De varijs & grauissimis totius corporis & capitis doloribus ex vtero. Cap. 9.



IROQUE non minùs fœminarum plerasque grauis & intolerabilis capitis, lumborum, & totius corporis dolor: quod quidem & imbecilles & inhabiles ad peculiaria munia existunt, & mœrentes ab omni instituto desistunt & oriantur nequeunt quicquam efficere. Sed in hoc etiam non parua reperitur differentia, licet symptomatis ratio & natura vna sit: nam multis caput cum maxima grauitate dolet, alijs cum tensione, nonnullis tamen cum acuto sensu, ita vt discindi aut perforari caput referant: in multis porrò oculi adeo damnum persentiunt, vt vel proflire à caularia, uel disrumpi uideantur: plerisque tamen altera capitis pars afficitur, alijs totum caput. Sic quoque in crurium, lumborum & totius corporis doloribus contingit: pleræque enim totum corpus grauari persentiunt, alia exulcerari: nonnullæ disrum-

pi, & rursus non pauca referunt ipsa ossa frangi, sicut & alia lassitudine inuincibili premi. Alias autem non paucas reperies, quibus aliquod membrum peculiare affici dolore contingit, ut vel inflammatione, vel grandi humorum defluxu tentari videantur: multis hypocondria & totus venter adeo grauiter & frequenter dolent, ut curuæ incedant, vel distendi citra maximum dolorem non possint. Quæ omnia in tantum solent feminas affligere, ut absque peculiari aliquo auxilio diu persistere nequeant. Atqui cum harum omnium passionum ratio in dolore consistat (qui vel ex distemperie sola, aut cum affluxu materiae, vel ex soluta unitate proficisci habet) consulto, cui morborum generi speciatim referre mereatur, subiiceo.

Licet ex uno uteri consensu hæc omnia accidentia proficisci certum sit, diuersa tamen ratione ab iis, quæ superius retulimus, sunt. Nam vel halitus ascendens putridus ab utero, causam præstat huic malo, ubi per venas ad musculosas nervosas, membranaceas, ac sentientes corporis particulas deuenit: vel ex redundante vitioso sanguine ipsius uteri, ac regurgitante ad singulas vel plures, aut præcipuas corporis venas: quarum ratione facta in musculis ac membranosis & nervosis partibus læsione cruciatus maximos excitari est necessum. Itaque ex utero duplex insurgit causa: altera quidē, halitiosa: altera verò regurgitans ab utero vitiosus humor: utraq; tamen ex vna cōi causa proficiscens, nimirum ex improba sanguinis menstrui vel seminis expurgatione. Ceterum dolorum diuersitas ex natura seu conditione halitus vel humoris, sentientes partes perueniens, proficiscitur, ita ut copiosus humor grauitatē, acris & mordax, vlceris sensum, flatulenta substantia tensionē in parte dolente efficere nata sint. Sic pars dolens membranosa, tensiuo dolori obnoxior existit, sicut quauis partium suarum sortitur doloris differentiā, ut abunde dictum est lib. nō de præsid. indica. in methodo vniuersali. Sed accidunt omnino frequentius hi dolores in cap. potissimum in parte eius arteriosa: quia hæc facilius dilatazione & compressionē hos, halitus trahere & suscipere nata sit. Quod fit, ut maiori ex parte capitis dolores pulsatorii sint, quod experdisse ad curationē maximi semper fuit momenti. Cōtingunt insuper in parte eius postica obuenas & arterias quæ iuxta dorsum eā partē adēūt, ut alibi latius diximus, & Hip. visum est, lib. 7. pop. tex. 64. dicenti dolores capitis ex utero castoreū sedat, & per totā sententiā, mira profert. Idē fatetur, lib. 5. popu. in historia mulieris, cui caput nihil proficientibus auxiliis dolebat, quæ solū subductiuis bene olētibus, utero appositis iuuabatur. Quib. accedit alia causa nimirum immodicus lixiuia, fortioris usus, vel alterius rei quæ vehementius pilorum nigritiē frenet, ad hesus. Quæ sanē occasione immedicabiliter haud paucas salutē perdidisse vidimus. Succedit his causis tertia prædictis grauior, quæ ex habituali cerebri, vel alius cuius membri principalis in caput mittentis, imbecillitate ab humiditate, nimia proficiscēte originē trahit, ex qua sanē dispositione reumaticos à Galeno appellatos affectus fieri proculdubio arbitror, ut ex eius verbis aperte colligit, lib. de sanguinis, mi. c. 7. & 1. phar. ge. c. 6. cuius et mali Hipp. meminisse constat, & li. de gland. & de locis in hoīe, licet verbis oscuris. Itaque constat his tribus modis feminas, capite & toto corpore adeo pertinaciter & moleste dolore, ut vix ferri id malū aut curari possit. Quippe ex quantis harum causarum si adeo persisterit, ut habitum parti inducat, mirum non est si reumaticus prodeat affectus, quæ adeo

egre

A egre curabilem existimat Gal. vt mirum non sit, si nos arbitremur, morbum gallicū de huius reumatici affectus forte depromptum fuisse. Prodit itaque ex hac triplici causa, triplex quoque in cerebro vel dolente parte affectio, quarum vna sicca, adeo fixa, & habitualis, ex lixiuio ac suffumigijs, vt nullis prædijis cedere visa sit: quin eisdem non raro exacerbatur, & crescit. Secunda humida, & habitualis quoque; adeo pertinax, & grauis, vt quam simillima morbo gallico existat, mille fluxionibus plena. Tertia verò eius naturæ & temperamenti facti vel fientis, qualis fuerit halitus qui ab utero in caput effertur: quem adeo variū arbitramur esse, vt scribi ac designari minime possit. Quæ sanè oīa expendisse oportebit ad rectam medendi rationē aucupandam. Denique licet hic halitū, aut humorum corruptorum comineatus ab utero in reliquas partes (vbi alios affectus quoque fieri dictum est) causa existat: differt tñ hæc affectio a reliquis, quia in hac, peculiari quadam conditione, halitus seu humor venas ipsas subingreditur, & partem, in quam vena illa inferitur, prædictis doloribus afficit: etiam si aliquando contingat in partes corporis cauas, hos halitus sese insinua-
B re, subindeque maximos & grauissimos dolores concitare velut in ventriculo, intestinis, utero ac vesica frequenter contingit: sed longè quidem frequentius in vena magna, quæ iuxta dorsum sita est, cuius occasione, dum nimia plenitudine turget, siue ex flatu, siue ex humore sit, cenfeo proculdubio maiorem prædictorū dolorum partem proficisci, cuius et discere prouidentiam conuenit.

Sunt quidē hi affectus talis naturæ, quod sua sponte sese facili ostendunt. Sic enim omnibus simul hoc est cōe, vt menses ex toto auferri, vel sensibilibiter imminui, aut aliter vitari, & subinde infimam ventris regionē nō leui murmurio habeant affici: quod ostēdunt grauiora accidentia, quæ mēsisbus inst itibus, fluxibus, vel nuper egressis succrescūt: præsertim si imminuta fuit facta purgatio. Qd facili innotescet ex dolore uteri, lūborū grauitate, ac deniq; ex alijs signis, quæ antehabitis cap. retulimus: quæ sanè oīa attestantur, uterū esse illorū malorū potissimā causam. Flatū tamē, aut vitiosum copiosumvè, sanguinē esse ed cognoscēs, q̄ flatu citra grauitatē, cū tensione tamē, dolorē efficit: at humor cū grauitate, erosione & acrimonia dolores inducit. Qd si humor terrestris crassiusve, aut melancholicus extiterit, veluti cōfringi dolorē corpus & ossa videtur: quibus haud difficulter causam distingues in hoc malo; si diligenti cōsideratione q̄ diximus, expendis: nā habitum iā cōtraxisse & factum fuisse reumaticum affectum cōperies: tum ex diuturnitate, tum verò quia præmissa adhuc cōueniēti curatione facillimè reuertitur affectio, aut ipsi minime cedit. Itē siccū fuisse habitū, ex vnitatē, accidentiū præstantia atque fixationē: humidum ex diuersitate partū q̄ afficiūtur, & mille fluxionū generibus præmūtur, vel ex mōstruosa halitus natura proficiscente, ob varietatē accidentiū & dolorū, quorū neutrū alteri respōdet. Tā frequenter hæc vitia virginibus ac reliquis omnibus accidere cōspicimus, vt necesse sit præstō illis esse auxilijs, si velimus eas à frequentissimis doloribus, & nos ab importunissimis querimonijs ernere. Quamobrē primò
I curatione expēdere oportet, sint ne humores an flatu, q̄ affectū cōcitāt: qd ex doloris persistētia, aut subita mutatione facili inrerstingues. Quippe dum flatu mali causa ē, vniuersā eius curā di rōnē, utero p̄stabis, frictōnibus toti corpori adhibitis, & præcipuē parti dolēti, inunctionibus et vnguentis, & alijs p̄dijis,

Signa.

Curandus talis.

que flatus discutiedi vim obtineant, quales nunc sunt ex balsamo, ex oleo sancto, **A**
 cinnamomi, de spico, de rore marino, conferunt theriacem inunctiones, vel empla-
 strum aliquod confectum ex gummi thecamacha vel carana, thure & myrrha cum modi-
 co succo angelicæ, sic & potus ex decocto herbarum calidarum & quas carminati-
 vas appellant, & suffumigia & alia eius naturæ. Itæ est regione venarum uel arteriarum, quæ
 magis dolet, summopere confert appositum cerotum ex caranna & aliquo ex
 prædictis oleis confectum: quod temporibus adhibitum scimus non parui esse mo-
 menti, nisi malum ita parte dolente inueteratum fuerit, ut ex habitu pars ipsa etiam
 aliquid paruum generet, quod deinceps à quavis occasione in graues dolores com-
 migret. Quo tempore præmissa uteri prouidentia (quam mox referam) paulatim par-
 ticulam purgare & corroborare conueniet ijs, quæ cap. de purgatione particula-
 ri, & de corroborantibus auxilijs lib. de indic. & hoc etiam opere cap. de epilepsia
 diximus. Vterum itaque respicere oportet, in cuius curatione à sanguinis missione
 aspiciendum est, sed ut plurimum uenis tali incisilis, extractoque sufficienter sangui-
 ne, verum in hac causa parcius quam in alia. Quo facto, utrum inungere conuenit ijs,
 quæ flatus discutiant, oleis, unguentis, fomentis, & emplastris pro matrice, cap. **B**
 de uteri suffocatione scriptis: quem quoque usum præstant cucurbitæ umbilico
 frequenter appositæ. In quo sanè affectu non minus pessarijs utaris, quam in alijs
 hucusque dictis. Sed in huius affectus curatione non minorem sanitatis partem repe-
 rires in clysterii usu: quos carminandi flatus ac purgandi uteri gratia, compones.
 In quibus itæ affectibus purgationes ex mercuriali plurimum prodesse constat: con-
 fert item crura abluere, ac in aquam calidam sæpe immergere pedes. Præ sunt itæ
 & balnea sulphurea uel ex dulci aqua calida. Ex aliquo ex usu est decocto ligni
 guaiaci, sparte parellæ uel radicis chinæ sudare. Sed utilius longè est, omni arte
 menses euocare, ut suo loco abunde diximus. At uerò flatus & à parte & ab ute-
 ro facilius & tutius, quam quouis alio præsidio, moderato exercitio auferes. Quod si
 humorè ab utero ad caput, uel quauis aliam corporis particulam regurgitalle co-
 gnoueris (quod ex grauitate & signis plenitudinis in eadem parte uel in toto facile
 deprehendes) potissima curandi ratio erit, sanguinis detractio ex altero, aut utroque;
 brachio, uel scissa iecoris uena in dextra manu. Tempore tamen quo prorumpere menses
 solent, uel si prædierint, sed diminutè: iterum sanguinem fundes ex uenis tali. **C**
 Ceterum in hoc affectu retrahere deriuare & euacuare per infimas partes, necessum
 est, ante quidem quam plenitudo uteri in totum corpus commigret, nisi dolores in
 cruribus steterint, quo tempore raro & maxima cum præmeditatione, uel nunquam
 sanguinem ex talo fundes. Quo facto, humoris ideam ac naturam inspiciens, ac
 si melancholici sanguinis abundantia caput uel corpus dolere compereris, nul-
 lum medicamentum eligens ita efficax adhibere poteris, quam hirudines hemorrhoidi-
 bus affigere, quæ melancholicum sanguinem alliciant. Quippe inter omnes sangui-
 nis detractiones, hoc habet proprium ea, quæ per hirudines fit, ut more eligentis me-
 dicamenti humorem melancholicum seligat, simulque plenitudinem demat ve-
 narum illarum situ & commoditate, atque natura sanguinis contenti. Quamob-
 rem sanguine hac lege misso, si quod humoris melancholici supererit, paulatinis
 purgationibus minues, ut cap. de virg. & vidu. me' anch. dictum est. Hoc tamen unum
 adseruabis in huius mali purgationibus, quod si in toto corpore dolores fuerint,
 plena omnino purgatione uteris: præsertim si humores biliosi ac tenues fuerint:
 paulatina

- A** paulatina verò & p̄ interualla, si fixi ac p̄manentes in aliquo loco steterint, donec vitiosam plenitudinē depositam fuisse constet: potissimum quidem, si humores crassi, viscosi & tenaces sunt. Deinceps quidem introductam in partē dolentem distemperiem corriges, roborabisq; membrum ipsum: aded̄ enim variæ & omnigenæ naturæ halitus esse solent, vt modò frigidam modo verò calidam & humidam, & quq; siccam distemperiem in parte generent. Sic profectò iuxta cuiusq; conditionem calida, aut frigida adhibebis, sed profunt frequentius calida, quò fit, vt ea, quæ superius statibus discutientis idonea esse diximus, his quoque doloribus proficua esse comperiamus: velut sunt inunctiones, emplastra ex gummi thecamacha, & caranna, balsamo, ac oleis calidis, quæ retulimus. Profunt & leues frictiones, moderatum continuūq; exercitium, & tandem balnea ex sulphure, præsertim si in tumore pars dolore affecta attollatur. Verum, quia millies in hoc opere ea, quæ vtero mandati, & membro cuius ab eo recipienti, prodesse possunt, dicta sunt, eò quidem in hoc cap. silentio prætermittito: nam facillima sunt, si quis exactè legat, quæ hucusq; diximus. Verum si habituales distemperiem caput contraxisse comperias, eamq; siccam esse scias, expende nullis vacationibus esse vtendunt, sed omni arte caput humectabis, tam balneis quam fontibus & aliis linimentis, quæ ex oleo seminum melonum & cucurbitarum fieri possunt, & ex mucilaginis, & aliis quæ hæcticis corporibus prodesse scimus, quæ ob id hac in parte subtriceo. Qd si reumatica facta sit affectio, mihi non est dubiū, quin velut morbus gallicus curari desideret, sudorificis & syrupis ex ligno guayaco confectis, & tandem aliis vacationū generibus quæ huic vsui proficua fore scimus. At si eandē reumaticā affectionem nō ex in temperamento habitualiter humido, seu ex partis alicuius vel totius corporis imbecillitate, proficisci cōperiamus, ita vt vel pars susceptet præ impotentia, vel aliis trāsmittat quod crudū vel prauē alteratū cōficit, tunc proculdubio roborantibus potiū agendū est, quā vllō vacantiū genere, si Gal. credimus. lib. de sang. missione, qui tñ parcā sanguinis detractionē concedit, vel leuem purgationē: cū hoc tñ quia id qd̄ indies aggregatur, credēdū est futurū esse affectionū multarū causā, vacatione aliqua paulatina & quē diu facta prodesse possit ré agere oportet. Qd̄ sit vt dum caput malum habitum contraxerit, ex vsu sit, fontanellam in brachiis aperire, sicut dū vterus per trāsmissionem in caput mandat, eadē cruribus affixere, præsentaneū & vltimū auxiliū existit. Si tamen dolor alicui parti fixus sit vel irradiationis modo caput infestet, experimento fidissimo compertum habeo, ferro candenti partem illam leui vlcere vrere, idq; maximē si pericraneum dolere nobis compertum sit, quippe hoc auxilio facillimē cedere constat, quod multis aliis non cessit.

De pruritu & furore vteri, ac de symptomate turpitudinis. Cap. 10.

INTER eos affectus, quos vterum pati scimus, quatenus pars simplex & similis est, primū obtinet locū distēperies, ea præsertim, quæ peculiarē quendam affectū sibi vēdicat ac efficit: eumq; quodammodo medium inter vteri affectus ipsi pertinētes, vt simplex pars est, & inter eos, qui eidē referūtur, vt membrū agit organicum. Talis proculdubio est vterinus furor cuius natura partim pertinet ad naturalem vteri appetitum ex vitio re-
ramento

ramento laesum, partim verò ad cerebrū ipsū, qđ vterus in cōfortiū quoq; alli-
cit. Est itaq; vterinus furor (vt ab ipso initio sumā, nā eo exposito reliquā ei pfi-
miles affectiones innotescunt facillē) immodicū & effrene coeundi desiderium
adeò validū & inextinguibile, vt in furorē, & deliramentū cōmigrare scēmina
videat ob excedentē nimis & insatiabilē appetitū. In quo affectu cōsiderare in
primis oportet, qualis morbus vigeat, qđ symptomata insint, & à qbus prodeant
causis. Morbū itaq; Aetius calidā vteri distēperie iure optimo cēset, qđ ego existi-
mo nō quālibet esse, sed excedentē, & ferē habitualē, & cū hoc malignā, qđ
ex verbis eiusdē auctoris facillē ē colliges. Quā quidē distēperie in ea parte re-
sidere est cōiectandū, in qua maximē appetitus viget, instar priapismi in viris.
Nā licet tota vteri substantia naturalē habeat attrahendi semen appetitū, testes
tū ipsius, & partes sibi p̄ximas, ac deniq; vniuersum vteri collū, & potissime ei-
osculū appetitu coeūdi pollere, ac eo delectari certū est: quas partes calore ma-
ximo vigere in hoc affectu subinde oportet. Ex quo sanē intēperamento p̄di-
ctis partibus radicato, prodit immoderantia appetitus, veluti in ore ventriculi
ex calore sitis, & ex frigore fames p̄ficisci fert. Cū enim naturalis appetitus in-
surgat mediante calore moderato, ita quoq; crescit idē appetitus ad pensum ca-
loris adaucti, sed nō cuiuscunq; nisi eius tantū, qđ p̄ter id, qđ naturā modū excedat,
cōnaturalis ē factus sit, & more naturalis appetitū quoq; efficiat. Quippe
vti fames canina, aut sitis insatiabilis sūt in ore ventriculi; ita & in partibus vte-
ri ob p̄dictā causam coeundi desiderii implacabile insurgit, qđ nullo coitu sedatur,
neq; quiescit, iuuante hāc actionē certo quodā humiditatis modo simul cū
calore p̄dicto, vt à febrili calore dissidere constet. Cui ē adiūgit (vt integra sub-
sit huius affectus natura) rectorum cerebri potentiarum error, proficiscens qui-
dē ex halitibus ab exusto semine menstruo prodeuntibus, qui dum caput ascē-
dunt, furorem in mente concitant, & irrationalem hunc appetitum: quam-
obrem vterinum furorem huiusmodi affectum medici appellant.

Huic profectò quā simillimas nō paucas reperies in scēminis affectiones,
quarum ē antiqui auctores meminerunt. Inuenies quidem satyriasi per similem
affectum, quem in viris quoq; priapismum appellant: est etenim coeundi insa-
tiabile desiderium cū maximo pudendarū partiū tumore ac dolore. Verū in-
ter alias differentias, quibus satyriasi à priapismo differre scimus, ea potissima
est qđ in satyriasi colis non inuitus & flatulento spiritu, qđ eius arterias neruum-
que fistulosum abundē repleat sed ex lasciuia quadā libidinis tentigine irrita-
tur: quod in scēminis quā rarissimē accidit: atq; id ex falso, vt in viris etiam,
humore, vel acri affluente contrahitur. ob quem adeò magnū in genitali pruri-
tum doloremq; sentiunt vt manum locis naturalibus cōtinuò admoueant, & in-
genti veneris desiderio contabescant. Sed affectus hī ab vteri furore euidenter
dissident, qđ in hoc sola distēperies appetitū excitet cū leui acrim humorum
affluxu: at in satyriasi & priapismo, ex plenitudine humorū ac flatuum adeo tu-
ment partes, vt tentiginē & conuulsionē pati videantur: licet satyriasis ex appe-
ritu, priapismus verò ex vitio arteriā potius & cauitatū, principiū sortiatur. Ex
quo sequitur, cruciari scēminas sic affectas pruritu ac doloribus maximis, ēt si
quodammodo delectari videantur, veluti in furore contingit. Areteus tū cen-
set, veram satyriasi scēminas non obtinere, qđ ego etiam verum esse arbitror,
sed

A sed illi aliqd p simile eis accidere, vt cū p dicta partes adeo turgent, crescunt, & rigent, q̄ extra pminere videant. Quē proculdubio affectū cenſeo ab antiquioribus nymphotomiā appellari: affectionē quidē, v̄rorū ſatyriali p ſimilem, licet nymphotomia nō ſit affectus nomē re vera, ſed curationis affectus manuali incisione facte: cū hoc tñ Moſchio Græcus hoc nomen p affectu vſurpat, forſan, vt ſeparet affectū à nymphā, q̄ partis affectæ nomenclatura eſt. Nī vt ſatyriſis à Satyris, quos poetæ ſingunt, appellata eſt: ita prorſus & nymphotomiā in ſcēminis à nymphis dictā exiſtimo. Apud anatomicos. n. nymphæ appellantur partes q̄dam carnoſæ, q̄ gallorū eritis p ſimiles exiſtentes, ppe os vteri in eius ceruice aſtant: quas poetæ referebant p ſaltus & nemora ſatyros quærere. In q̄bus proculdubio venereorum delitias cōſtare, ac turgere magis aſſerunt: licet Gal. li. 5. de vſu part. p dictā nymphā ad os vteri tutandū ſubreſactā à natura dixerit. Cū hoc tñ vtrunq; vſum obtinere ſcimus. Quas partes dum eo crescunt, q̄ prominere, & extra pelli videant, huiusmodi nymphotomiā efficiere exiſtimo: q̄ affectionē antiqui parte pminente reſciſſā, citra diſtinctionē curabāt, ſed ſalutē longē iudicio noſtro: nā caro illa nō creſcit ex addita carne ſemp, ſed ex humore; & ob id ſcindere alienū v̄ à curandi rōne, niſi cū vitium in magnitudine partis pter modū conſiſterit. Hunc affectū multū ſymptoma turpitudinis appellant: cuius ēt noīs aliā affectionē refert Areteus, q̄ nymphem appellat, alterius quidē partis morbū, nā ſubſtantia q̄dam eſt mulculoſa, aut pelliculoſa, ſupra alium pudendī cōmiſſurā ſita; quo loco vrinarius meatus exiſtit. Quā in quibul d ſcēminis refert ad tantā magnitudinē creſcere, vt deformitatem ac pudorē inducat: eamq; ēt ex contactu veſtium, & ex appetitu tantū erigi, vt ad venerē & coitū ſcēminas ſic affectas turgere maximē efficiat. Ob id quidem antequā creſcat, ſcindi iubet idē autor, & hanc eandē particulam arbitror, antiquos reſcindendū fore, cenſuiſſe, & nō aliā nymphotomiam appellatam. Ego aut hanc affectionē eam eſſe cenſeo, in qua Medici ſcēminas in viros migrare exiſtimant: licet aliter id malum ēt (vt multi fabulantur) fieri poſſit. Quas proſe cū affectiones potius ad vteri prolapſionē, quam ad aliud mali genus ego reducere, ēt ſi barba ſcēminis plerunq; adnaſcatur, ſummū alioqui caloris effeſcentis, & intēpeſtiuz mēſiū ſuppreſſionis indicium. Inquit. n. Hipp. li. 6. po pu. par. 6. In abderis Phaëthufa Pythæ vxor priore quidē tēpore ſcēcūda erat, cū aut maritus ipſius in exilium abiſſet, menſes multo tēpore ſuppreſſi ſunt, poſteā dolores & rubores ad articulos oborti ſunt: hæc aut vbi cōtigiffent, & corpus virile factū eſt, & hyſſuta penitus euafit, & barbā produxit, & vox aſpera facta eſt. Refert et idē autor de Gorgipi vxore in thoſo, eundem ſucceſſum. Cuius rei non lenia reperiuntur apud antiquos & preſtantiſſimos viros teſtimonia, q̄ ob rōnem à me adductam conſultò pretered. Quod ſi quis contrariū credere voluerit, non netoſi quidem in annalibus Licinio, Craſſo, Caſſio, Lōgino, cōſulibus. Caſini puerum ex virgine ſub parētibus effectū, in deſertāq; haruſpi cum iuſſu in ſulā delatum, digniſſimos auctores lectiſſe cōpertum eſt. Atqui Lucinus, Mucianus, Argis viſum à ſe Ariſtontē, cui Areſtuſe nomē prius fuiſſet, nupſiſſe ēt, num mox, & barbā, & virilitatem ſuperueniſſe, vxoremq; fauſtē duxiſſe prodidit. Eiufdē ſortis, & Smyrnæ puerum ſeſe nouiſſe refert. Quin ēt illud ſatis mirari nequeo, quod Plinius in Africa in marē cōmutatum, q̄ pridie ſcēmella

Nymphotomia

fœmella fuerat, nuptiarū die Lucium, Cossitum, Trisditanum ciuem vidisse se **A**
 affirmat. Sed misla hæc facio; & ad institutum redeo. Põr itaq; nymphae Arc-
 thei turpitudinis quoq; symptoma appellari, sed differt profectò ab alia nym-
 pha, seu nymphotomia perperā appellata, loco & vehemētia symptomatis: vtra-
 que tñ differt abvterino furore, quia in ipso solū tum ēt naturali mō genitalia
 nō prominent, neq; erecta crescunt, vt in prædictis duabus dictū est. Sed differt
 ēt vterinus furor à satyriasi, q; in hac partes internæ, vt q̄ ex humore turgeant,
 semper cū delectatione doleant, quia seminis flatus & humoris nō parua por-
 tio affluit, & nō expurgatur, & frictione ac scalptione maior decumbit vteri ve-
 rò furore partes nō dolent, quod in ea nymphotomia, q̄ ex vbertate flatus, semi-
 nis & caloris prodit, solet cōtingere, ēt si promineant pudendæ partes: nā more
 erectionis naturalis, pudēdi virilis partes illæ extēduntur & prominēt. Quippe
 quibusdā fœminis frequentissimū est hoc symptoma, præsertim cū diu à viris
 abstinuerint, & ob aliquā occasionem hoc affectu tētantur: satyriasis enim si qñ
 accidit, semper fœminis præter naturā existit. Est & alia affectionis natura præ-
 dictis simillima, quā matricis feruorē antiqui appellarunt: qñ nimirum vniuer-
 sa vteri substantia & totū subinde corpus eisdem affectionibus premuntur, qui-
 bus pudendas partes in vteri feruore ac satyriasi affici diximus. Tunc enim cū
 dolore & lumborū grauitate, horripilatione, fastidio & vrinæ, aut excremento-
 rū alui suppressione, fœmina turgēt ad coitum, quem summopere desiderat, sed
 ob dolores & accidentia pertimescit valde. Huic quoq; affectioni reduces pu-
 dēdi pruritū, licēt ad sensum tactus potius reduci posse videatur: nā rarò absq;
 coeundi desiderio accidere existimamus: quapropter ad turpitudinis symptoma
 potius referendum esse cēsum. Est. n. pruritus vteri stimulus quidā scalpēdi seu
 confricandi partes pudendas, ex quo prodit, partē ad coeundi appetitū glisce-
 re, q; ex prædicta perfrictione humores & calor ad partem magis euocentur, ac
 seminis receptacula & semē ipsum vehemētius moueantur. Quò fit, vt licet affe-
 ctio ex pruritu incipiat, facile subinde & frequenter in prædictū symptoma de-
 generet, ita vt coeundi appetitus adedò crescat, qd̄ satiari minimē possit, sed tur-
 gens & in verecunda turpiter se degat fœmina: q̄ procul dubio causa me com-
 pulsit hoc accidens ad turpitudinis symptoma reducere: licēt hoc turpitudinis **C**
 symptoma ob aliā causā sic fuerit appellatū. Hēt quidem vteri pruritus tāquam
 peculiare causam, humores biliosos, acres, salso, nitrosos & adustos, qui ad vte-
 ri collū & partes pudendas confluentes prædictū calorē & pruritum excitant.

Causa.

Affectiones verò, quas hoc cap. disputandas suscepimus, causas habent, quæ
 distemperie calidā natæ sunt excitare, eas potissimum, quæ calorem ferē factum
 ac naturali per similem efficere possunt. Diximus naturali persimile, quatenus
 ad stabilitatem pertinet, nō quidem quantum ad conditionem & qualitates, q;
 efficaciorē & acriorē esse necessum sit. Hūc sanē calorem efficit semen geni-
 tale in propriis locis copiosum, calidum vel corruptū existens: nam dū in aliā
 qualitatē mutatur, alia & longē diuersa parit accidentia. Verò furorem efficiat,
 leuis mordacitatis participes esse, opus est, vt acrimonia illa naturali simillima
 (licēt adauctior sit) appetitū excitet ingētē & præter naturā, qualis causa existit.
 Præstat his causis principiū naturalis fœminarum temperies calida & humida,
 cæterū humiditate acri & biliosa, qualē nigrioris coloris virgines obtinere so-
 lent,

- A** lent, quas salaces & lasciuas esse comperimus: item iuuenilis aetas, vita otiosa, loquelis & inspectionibus lasciuis plena: ciborum vitiosorum, eorum praesertim quod semen uberius gignunt, usus; & omnia denique, quae aut semen augent, calfaciunt, irritant vel putridum efficiunt. Prodit quoque ex semine sic affecto ad ferinam appetitum causa: nam ut Acrius optime aduertit, per spinalem medullam & vasa ad cerebrum pertinentia, ab exusto semine aliquid ascendit, quod in furore feminam agere, natum est. Sed cum utrinus is furor aliquando cum desipientia, aliquando citra ipsam, cum sola videlicet impudentia, aut cum pudore succrescat: ideo cuiusque causam considerare oportebit. Fieri etenim cum desipientia appetitum hunc effrenem ex putrido halitu a semine putrido elato, iam diximus: at fieri citra desipientiam, ex solo semine excalfacto contingit: ex quo pudicae feminae id accidens etiam persentiscunt, sed proferre praeter pudorem non audent, quin potius praeter appetitum contabescunt semine excalfacto corpus exsiccat. Praedictum quidem appetitum crescere cum impudentia & audacia, quae feminam pudorem praesertim virgineum excedat, arbitror fieri ex connaturali uteri ipsius & totius corporis calido intemperamento, ex quo ad tantam feritatem aguntur feminae, ut omnibus posthabitis, vitum non solum appetere, verum sectari publice audeant.

Signa harum affectionum, nisi pudore famineo occultentur, manifesta admodum sunt: nam in omnibus alijs uteri affectibus feminae uel mutae, uel taciturnae uel maeae existunt: in his vero contra, garrulae, iracundae, inquietae, nihilque aliud imaginantes aut loquentes, quam de virorum consortio, de coitu & alijs rebus inhonestis & lasciuis, quibus perpetuo delectantur. Quod si pudore impeditur huiusmodi furorem cohibeant, gaudent tamen his rebus auditis, & alijs, quae inhoneste sunt, ac veluti sopite pendunt ab ore narrantis, & licet ipse nihil loquantur, cum hoc tamen gaudent, praesertim si impudicus & occultus tactus accedat, quem uel cum pudore admittunt, uel non fugiunt, urgentque eo tempore pudendae partes, & ex tactu delectatione maxima afficiuntur. Nolentes tamen a putrido semine affectu proficisci, ex desipientia & inquietudine: ab eodem excalfacto, a gestu & vultu uiris grato & amico: ex connaturali temperamento, ab impudentia, & insolita audacia ad lasciuos actus, quos antea praeter pueritiam non gustauerat.

Constitues curandi rationem magna diligentia: nam praeter id, quod haec affectiones inhoneste, indecetes ac turpes sunt, maiorum accidentium praeludium existunt & causa. Sic profecto, si cognoueris praedictis signis feminam calido semine abundare, uita infestum omnino mutabis, uictu tenui, parco, pauci nutrimenti & frigido exhibito. Ieiunium enim & abstinentiam imperare necessum est, non solum a cibis & potu uini, verum & a loquelis & inspectionibus impudicis. Liberos item feminae cinges plumbea lamina, & potum aquae copiosius exhibe, idque paulatim fac totam mutationibus. n. subitis, quod sua sponte salubre foret, morbosum efficitur. Sic profecto plures cum se hoc vitio tetari persentiunt, ex inordinata & inconsiderata abstinentia in grauiora mala dilabuntur hoc symptomate minime curato. Quamobrem paulatim ac sensim naturam habitum & intemperamentum mutare oportebit, ut citra sensibile damnum curationis finem consequaris. In qua sane re feminam decet, se ipsam uis & orationibus dare, solitudini, aut consortio sancto & honesto, a quo uirtutum ac temperantiae exemplum discat, & tandem omnibus

Signa.

Curanda
ratio.

bus modis carnē macerare oportebit, sanguinē minuere & attemperare, ut tēpe
perato ac diminuto semine, affectio sua spōte quiescat. Viētū aut frigidum hac
in parte scribere tāquam notum & importunum nolui: nemo. n. tam insanē mē
tis est, qui corpus oībus modis inanire nesciat, & uiētū refrigerātē porrigere, ac
oēm verborum consortijq; luxum circuncidere. Quē d si uel ex uiētū uel labo
rioso partu, uel aliqua alia cā, quā extrinsecus uel intrinsecus pudendarū par
tium ac totius corporis calorem augere nata sit, affectio hāc suboritur: verē
dum non est, omni arte corpus refrigerare. Primō quidem si biliosus redunda
uerit humor, syrupis ipsū praparabis & cholagogis pharmacis expurgabis.
Verū si citra humoris affluxum aut ubertatem distemperies sola uigeat, apoze
matis, clysteribus, balneis aquā dulcis, fomētis ex eadē, & decocto herbarū fri
gidarum, pudendi calorē uel totius corporis mitigabis, sicut largioribus aquā
potibus: item sanguine pauco per interualla ex talo uel dextra saluatella extra
cto. Id ē beneficium prāstabis inunctionibus dorso adhibitis ex vnguēto rosa
ceo, ex refrigerātē Gal. ex vnguēto cucurbitarū superpositis folijs plantaginis,
violarū & salicis, ac reliquis, q̄ refrigerādi virtutē obtineant. Cauens ne ea ut
ro adhibeas, ne uel menstrua plus iusto supprimantur, uel in aliud malum ex
nimia frigiditate uterus decida: satius enim est humores & totum corpus per
frigerare, ut inde sumpto principio uterus, pudendēue partes refrigerentur,
quā uero ipso frigidiore facto, fēminam in grauius malum deferre.

*Cuius
rei copio
siorē tra
ditionē
reperies
c. de uir
g. scir
rho.*

At si ex corrupto semine appetitus is insatiabilis ac delirus insurgat, eo tpe, li
cēt fēmina desipiat, omnis diligētia, omnisq; cura utero adhibēda est. Primū
enim sanguinē minues ex brachijs, mox ex talo: nā si ita feceris, & habitū refri
gerabis, corpus minues, & si qd in uteri uasis corruptū immoratur, uena scissa
facilē educitur. Quo facto, feruor ocyllimē extinguitur, p̄sertim si uitā institutū
accedat, pauci, frigidi & tenuioris nutrimenti: ieiuniū itē, solitudo, aer frigidus,
solum frigidum, quo decūbat, aqua frigida irroratum. Utatur quoq; fēmina
sic affecta lactucis, scariolis, cucurbitis, & alijs, q̄ sanguinē minuere & refrige
rare nata sunt. Inter quā ad geniturā effluuia & aduersus ueneris ludibria in sō
nis & vigilia, semē lactucē plurimū ualere scribunt multi: sicut de rosa hortēsi
rubra saccharo cōdita ē fertur: cui malo non minus portulaca mansa & come
sta remedio esse solet, sicut melonum frequentior usus. Quibus factis, corpus à
biliosis humoribus ac recremētis & à salia pituita bis aut semel purgabis, dein
ceps tñ dorsum & lumbos frigidis asperginibus & unguētis refrigerabis. Fo
menta item aquā dulcis tepidā primū, deinde frigidā pudibūdis partibus adhi
bebis: post hāc aut aquā dulcis balneis uteris. Adhibet Aetius utero, si ex semi
ne corrupto affectio pdeat, ceratū ex cardamono & nitro, tu uerō simul eis uti
tur, q̄ superius cap. de suffocatione diximus semini extrahēdo & imminuendo
esse proficua. Sic per os ea, q̄ semen minuant, ac refrigerent, adhibeto, donec af
fectionē quiescisse uideas: nam si ex semine corrupto uitū prodeat, haud aliter,
q̄ epilepsia ex utero prodiens, curationem desiderat. Quā itē rōne prodest mer
curialis lumbis & dorso applicita, aut lenticula palustris cum eadem mercuria
li pectini appositā: cerusa etiā cū aqua trita uel succus lenticulæ palustris, cucur
bitarū & eadē cerusa: pessus ex succo plantaginis & portulacē, uel lamina plū
bea lumbis adhibita. Sed inter oīa auxilia primas tenet ad seminis excretionē
& attem-

A & temperamentum balneum aquæ dulcis, aqua ad umbilicum vsq; pertingente, perfricatis leuiter vteri partibus longè à pudendis, ut aquæ tepore pars antè peretur, & madore laxior fiat, decidatq; sua sponte seminale excrementum: cauendum tamen est, ne titillationem moueas, ac pruritum, id enim minimè licet, sed solum quantum aquæ tepor laxauerit, ita ut manus nil aliud præstet, q̃ leuem aquæ subingressum ad penitiores partes, quodd tantum aqua operetur, quantum aliud auxilium ex ijs, quæ semen expurgant.

Pruritus verò ac turpitudinis affectio, curandi ratione à sanguinis detractio-
ne anspicam desiderant, nisi quid peculiare obstiterit: initium tamen sumes à
basilica dextri lateris, mox ad tali uenas deuenies, tandem in processu tempo-
ris ex salnatella dextra sanguinem fundes. At sanguine missò humectantem, &
refrigerantem uictum ac potum institues: præsertim si cibis addideris succum
portulacæ, aut decoctum eius, & agnicasti. Postea insuper syrupis, & apozema-
tis uteris frigidis, quibus addes, quæ acrimoniam retundant, velut est hordei
cremor, amyllum, mucilago psyllij, vel seminis citoniorū, maluarum, & althææ
cum syrupo papaueris, & semine eius, & agnicasti, ac nenupharis, uel decocto
eorum. Idem præstat syrupus uiolarum, uel de portulaca cum aqua lactis, aut
hordei, uel succus foliorum salicis cū aqua portulacæ, & saccharo. Quibus præ-
missis, ad humorum purgationem accedes, quam facito rhabarbari infuso ex
aqua lactis, uel portulacæ cum syrupo ex infusionibus rosarum, aut uiolarum,
manna, & frequenti cassiæ fistulæ usui cum decocto hordei, vel aqua cichorij.
Quo facto pro succi redundantis copia, & natura, partes pudendas aqua tepida
frequenter abluere oportet, quod presentaneum esse auxilium arbitror. Cōue-
nit quoq; balneis aquæ dulcis totum corpus committere, ac per interualla pau-
latim purgare. Præterea, dorsum unguentis rosaceo, uel refrigerante inungere
proficuum est, sicut refrigerare lamina plūbea, & clysmatis refrigerantibus uti,
cum femina dormitura est. Interim etiam, in uterum infundere oportet deco-
ctum florum salicis, & lentium sine cortice cū trochiscis de camphora, uel col-
lirio elbo Rasis, quod dissolues in lachryma uitis, uel eandem lachrymam solū
infundes: est autem lachryma id, quod nitibus amputatis instillat. Prodest non
minus decoctum foliorum oliuæ, & radicis lapati. Ablues quoque uterū, & pu-
dendum lauacro, quod recipit lactis ꝑ. iiii. aquæ marinæ ꝑ. ij. mellis ꝑ. j. confert,
& lac ipsum, uel acaciæ succus, aut lentis, aut granati, uel foliorum uiolæ: item
malum granatum aqua portulacæ decoctum, & cataplasmatibus forma impositū
cum succo aristolochiæ, & decoctum ex omnibus his factum, quo pudendas
partes abluere est opus. Quod si hoc minime profuisse constet, doloresq; &
symptomata cessent, signum erit euidentis deformitatem illam ex carne crescen-
te fieri potius quàm ex affluente humore: quo tempore ad scissionem illius par-
tis ueniendum erit, ut Actius optimè scripsit.



*Affectus
natura*

MORBO S quoq; in situ vterū pati, & mille modis à sua sede di-
moueri diuturna obseruatione cōperimus, non minus q̃ que-
uis alia particula, quę aut alijs alligatur, aut in aliarum medio
fita est, nulli alteri continua, licet multis contigua existat. Mo-
uetur itaq; vterus, & à propria sede prolabi videtur in omnē
situs dimensionem: sursum quidem, vt in vteri suffocatione di-
ctum est: ad latera: antrosum & retrorsum: & vltimò deorsum prolabitur, ita
vt extra promineat factus strutij camelli ouo persimilis. Quas viciati situs diffe-
rentias in duo tantum capita diuidere est in animo, atq; in hoc primo solū eius
meminero mutationis, quę deorsum vergit, & foris pender: aliarum verò seq.
cap. nam diuersas habent à prædictis causas, & diuersam longē curationē ex-
quirunt. Quum igitur vteri corpus per fœminę pudendum erumpit, & pendēs
prædicta figura affectum fuerit: vteri procidentia appellatur. Quem situm non
adipiscitur vterus, q̃ ex toto (vt Aetius quibusdam vitio uertit) à ligamentis so-
lutus procidat, sed quia ligamentis laxioribus factis, facile sua sponte labi vsq;
ad illam partem permittitur. Inquit enim Hip. lib. de natura mul. Si vteri in lo-
cō non manserint, quò prolapsi fuerint, dolores exhibent, & incōspicui fiunt.
Quando verò imminet velut sedes prolapsa, & cūm quidem supina decubue-
rit, in loco manent, cum autem surrexerit, aut se inclinauerit, aut aliàs se cōmo-
uerit, exeūt. Cuius doctrinę gratia expendere oportet, vterum vinculis vndiq;
alligatum esse, ante nimirum, retro, supernè, infernè, dextrā, sinistrā, obliquè ad
colla, & inguina, ossi pubis, ilio, & sacro, per tunicam à peritonæo dextra, &
sinistra parte quoq; connexū: magnis vasis per arterias, & venas, p̃sertim sper-
maticas, & apophysim peritonæi, spinali medullæ per nervos, recto intestino p̃
fibras quasdam tenues, vesicæ per alias, sed plures, & laxiores, ossi pubis, p̃ vin-
cula laxa. Quibus sic premis, in memoriam reuocare oportet Platonis fragmē-
tum de motu animali, vtero adscripto, quem tan q̃ animal vorax moueri putat
in omnem situs dimensionem. Scimus tamen, vterum naturaliter, vt semē exci-
piat, hiare, & naturaliter quoq; ipso suscepto constringi: sursum ēt moueri, nō
tamen sponte, sed vasis plenis renelli, ac inflari, vt in suffocatione diximus. Cō-
torqueri similiter interdum assolet ob abscessum, vel inflammationē, vel vim
aliquam illatam, vt post partum quibusdam fœminis accidere cōperimus. De-
orsum autem mouetur, vel (vt rectius loquar) procidit, cum peritonæū, ac vin-
cula à peritonæo, vel quę ad dorsum tendunt, laxantur, vel rūpuntur, vel fun-
dum vteri inuertitur, vt extra pudendum prolabatur: Sunt igitur tres affectus
vteri præcipui ex deprauato motu, vnde varia admirandaq; symptomata subse-
quuntur, suffocatio, contorsio, & procidentia: ceterum de procidentia mens est
hac in parte tantum agere. Cuius nomine ēt intelligimus prominentiam vteri,
cūm videlicet, ad alas vsq; pudendi sese vterus extendit, ac prominet, extra ve-
rò non pender: quę sanè duæ affectiones consimilem obtinent curādi rationē.
Verūm in hoc affectu iam constabit tres procidentię species reperiri: vnā, qñ
collum in vuluam procidit: alterā verò, quando ipsius vteri fundum, ac to-
tum corpus in collum excidit, & videtur velut glans viri rubens sese ostendēs
in ore

B

C

A in ore pudendi cum conspicuo foramine: tertiam, quando membrana eius interna euerſa, extra prominet, quo tempore rugoſa apparet pars appendens, nō nunquā verō ſtrutiſſi camelli ouo perſimilis. Atq; hæc eſt vera vteri procidentie ratio, quā morbum in ſitu perſistere exiſtimandum eſt.

Procidit quidem vterus à multis cauſis, vt Hipp. teſtatur lib. 2. de morb. mul. nā inquit. Porro omnis occaſio vteros propellere pōt, ſi quid malè hēant. Nā & à frigore pedū ac lumborū, & à ſaltatione, & terrore, & lignorū ſectione, & curſu ad accliuē ac decliuē locū, & ab alijs multis propellunt. Sed his externis p̄termiſſis, prolabi contingit laxatis vinculis, quibus vterus alicui mēbro adiungit, mouet, nutrit, idq; vel refrigerato vtero, aut collecta tum in corpore, tū in acetabulis iſſis mucoſa ſubſtātia, vñ grauior factus in propria ſede vinculis cōtineri nō pōt. Qd̄ vitiū ſenibus ſubinde magis accidit, & ijs, q̄ ex inſtituto vite (quales ſunt lotrices, mulierculæ) nudos diu in frigida pedes continent, aut in frigido lapide diutiùs ſedent, vel aerē frigidiorē excipiunt, maximè in puerperio aut menſtruo fluente, qd̄ eo tpe vteri vtrāq; pars magis hiet. Procident quoque nō minùs praua fœtus extractione, violenta ſecundinæ depulſione, ſpiritus cohibitione, immenſi oneris ſublatione, plaga, partuū frequentia, animi affectibus, p̄ſertim ira t̄i vehementi, vt in peritoneū aliqd̄ diſrumpat, laxeturve aliqd̄ vinculorum ad oſſa pubis. Ariſt. enim. 7. de hiſt. animal. c. 2. ſcribit, quibuſdam coeundi deſiderio, aut longiore veneris abſtinentia vterum excidiſſe. Ego autē exiſtimo in viraginibus, & viro orbatis id accidere, in quibus non vteri fundū ſed collum tantum prominet, ex quo viros fuiſſe factas multi autumant, vt ex Hipp. mente de Phaethuſa ſuperiùs retulimus: q̄ diximus, ad vteri procidentia eſſe referendā. Cuius affectiōis cās lib. 2. popul. recenſet aliter Hipp. dicēs;

B Si extra pudendum os vterorum exciderit, vtpote ceruicē vterorum prope pudendū ſita & ampla exiſtere, ſit aut̄ hoc magis ſterilibus, cōtingitq; maximè ex defatigatione, cum mulier laborauerit, & vteri calfacti fuerint, ac exſudarint, tunc euerſitur os ipſorum p̄ ceruicē, ut quod in humidiorē ac lubriciorē & calidiorē ſit loco, q̄ in priori tpe, & ubi hoc cōtingerit, p̄cedunt vteri foras ad frigus, & oſculū ipſorum auerſum prodit. Has quidem cās ad vnguē tenere oportet, ut iuxta cuiuſq; vim & naturā cuiq; auxiliū peculiare, & p̄ficuum adhibere poſſis. Sed dimitto iſtā inflammationē aut ſolutā eius unitatē; nā alteri⁹ ſūt cōſiderōnis.

C Studebis plurimū in dignoſcēdis principijs, ne ī hoc affectu decipiaris. Itaq; ſanguis plurimus erūpit, deinde dolor magnus partiū, quibus cōnectit̄ uterus, illū nimirū, lumborū, oſſis ſacri, hypogaſtrij, & pudendi ſubſequitur. In quo grauitas & tumor oui forma, ſed magnitudine varia pro affectus vteri, & colli eius amplitudine uiſui & tactui apparet. Stercus & urina ſæpe ſupprimunt̄ à tumore vteri, rectū inteſtinū & veſicæ collū cōprimēte: febris interdū comitat̄, interdū cōuulſio ex ipſius partis frigore: grauitas ſeu glomerix fili ī pudēdo muliebri ſentiūt. Si ligamenta itē humore multo laxata ſint, indolenter excidit: p̄ceſſit uictus rō humidior, & uſus largior fructuū aut piſciū recētiū, uita otioſa & pudendū humore multo ſemp̄ mader. Quod ſi ligamēta putrida ſint, ſanies putris & uirulēta ſimul effluit. Recēſet quoq; Hip. Huius mali ſigna li. 2. de mor. mul. dicēs. Si vteri extra naturā p̄greſſi fuerint, febrilis calor hēt pudendū & imū uētrē, & urina frequēter & paulū inſtillat, & pudendum uehementer mordeat.

Q Tri-

Cauſa.

Signa.

Curandi
ratio.

Triplex in hoc affectu insurgit curandi ratio. una quidem, quæ uterum ad proprium locum reducere docet; altera, quæ reductum tueritur, & efficit quominus iterum decidat ablata causa, quæ prolapsionem excitabat; tertia uero & ultima, quæ ipsum uterum reduci astringit, roborat, ac in propria sede firmat, à quacunque causa prolapsus oriatur. Primum itaque ad commodam reductionem si quid urinæ, uel excrementorum in uesica, aut intestinis induratum retentumque fuerit, protinus euacubis. Nam cum inter uesicam, & rectum intestinum sedet uterus fortuitur, si partes illæ tensionem, aut plenitudine afficiantur ad pristinum locum remeare neque uteris, renitente partium duritie. Quod facto, apte collocanda mulier est, sublatris coxis inuicem dilatatis, & reflexis poplitibus. Iubet quidem Hipp. lib. 2. de mor. mul. pedes ad scalam alligari, ut caput deorsum uergat. Caterum si tensa fuerit pars prolapsa, emollienda prius, si frigida, calfacienda, fouendaque est, ac uicino si inflammata, ante curandi. Oleo itaque tepido, ac butyro intescenda est, & calido decocto ex beta, malua, althea, & fenugrecum, ac semine lini, aditis cymino, aniso, baccis lauri, chamæmelo, & similibus. Ac postquam prima, aut altera die calida steterit, & tractabilis uteri pars prominens, hac lege in sinu manibus reponenda est. Lanam accipito conuolutam figura, & crassitudine muliebri pudendo respondente, quæ tenui lino circundabis, intingesque uno diluto hypocistidis succo, & in uterum mittes, reprimens totum uterum prolapsum blandè, ac leniter, quoad tota moles intra sinum recipiatur, postque in proprio loco, quæ curatione adduxisse Hipp. constat lib. 2. de mor. mul. per hæc uerba: Hanc quæ maxime quiescere oportet, & non moueri lectum ad pedes altiore stratum, & ipsè uti uelut in superioribus, & cum acerbis infusis inspergere, & grati colentia si siliire, sub nares autè quodorata, & malum punicum in medio per umbilicum perforato, & in ipso picæ, quæ maxime congruat, cum uino tepescito, & non ualde premens, quæ penitissime apponito. Rursum de eadè re lib. 2. de mor. mul. hæc refert uerba: Quum igitur sic habuerit myrti, baccas, & loti ramenta in aqua coquito, & aqua per noctem sub dio exponito, atque sic frigidissimam pudendo affundito. Quam sanè curationem moliri, dubitare plurimum, nisi ardore immodico femina infestaretur. Quibus factis, imponendum est de super lana inuolucrum uino astringenti madidum, à quo totum percutimè spongia ex posca compressa integito. Tandem sic reducto utero, mulierem reclinabis, crura extensa, & coaptata habentem, ita ut alterum alteri cruci incubat. Antè tamen quæ uterum in suam sedem reposueris, astringentibus, aut glutinantibus (si ex causa procatartica, quæ continuum soluat, affectio prodeat) ipsum inspergere, ac inungere, uel fouere oportebit, ne protinus decidat. Cuius generis, perculdubio est aluminis decoctum ex uino astringero, oleum scyoniæ myrrinum, & puluis gallæ, balastis, malicoris, glandis, nucis compressis, rosarum rubearum, mastichis, acaciæ, hypocistidos, & sanguinis draconis. Sine cathartico uteris ex posca, aut ex aqua, in qua decoxeris lentiscum, myrtum, coria mali granati, & rosas. Post quæ illinienda est pars prolapsa acacia uino soluta, & gallarum puluere. Quibus perculdubio uteris, dum nuperegressus fuerit uteris, nam si diu preidit, & pars frigida, uel pallida iam steterit, tepidè fouenda prius est. Postmodum uero uterum repones elatis, diductis, & succussis cruribus, & clunibus, ut in calculo urinæ suppressere docet Gal. 1. de locis affect. uel manu gracili, oleo mastichino, aut alio astringenti, uel graucolenti inuncta. Reduces quoque uterum siliibus, umbilico, aut sub mammis cucurbitas cum multa

A multa flammâ afflictae nec desunt qui lumbis & regione umbilici eadem affligant. Consultit, & Hip. lib. 2. de morbis mul. diglus altius in os immittis vomitum excitare cum aqua lentium, melle, & aceto, ut sursum reuellantur vterus. Qui vnguentis præstant vincula ad brachiorum articulos dolorifica. Item grati odores, qualis spirat ambra, muscus, gallia muscata, alipta muscata, & his similia variis continenter admota, donec vterus, ut affolet, moueatur. Sic in partibus putredinis profunt admota, quæ fetida sunt, & ingrati odoris, ut suffusus ex vugue tarrino, ex sagapeno, galbano, & huius naturæ alijs. Consequuntur non minoris commodi vnguento, cerata, & emplastra, quæ inguinibus adnoscenda sunt, ad lica terebinthina, ladano, mastiche, spica, gariophyllis, ambra, & musco. Cõfert è regione umbilici lana succida aceto in cocta, vel sacculus ex methastro super regulam ignitam exalfectus, vino austero paulo interim affusus. A quibus corpus (cruribus, parum elatis) locatum nonnulli dierum spatio, adseruato, curans ne alius pigrescat, aut dura, nec nimis lubrica, quæ illa vterum per se præcipitet: hanc verò membranas vterum colligantes laxet. Deinceps quidem emplastrum diapheuticum ventri adhibebis. Verum si pars quæ exiit, corrupta putridave extiterit, abscessa parte mutili reliquam curatione veluti in ethiomeno administrabis. Verum si prædicta abscessio non suffecerit, ut corruptio vterius non serpare, caustico medicamento partem putidam vres, quod citius secedat aut ferro candenti, idque quæ rarissimè & caute facies: ne si imprudenter vtaris, in consulsionem aut aliud grauius malum, feminam deferas: & quia vterus varijs partibus communis efficitur ob nervos, & vasa, quæ hæc. Alimentis vtatur minima siccis, calidis, tenuibus, & boni succi profunt, & lenes ex corticate cum astringentibus in cocta. Scribunt in e, vterum statim in suam sedem reuocare cum vino austero sumptam, cornu cerui vsti, foliorum lauri siccorum; & myrti an. 3. j. Allium è tritum aqua solutum foris vterum repellit: & vrica recens trita emplastro ventri imposita, vterum retrahit: althea cum oleo & adipe coturnicis cocta huic, & alijs similibus prodesse plurimum fertur.

C Prolapsum vterum in suam sedem retractum præcauebis quominus iterum prolabatur, ablata prolapsionis causa. Quapropter mox à dictis auxilijs promouendum est, vel corpori vniuerso in uterum mandati, vel ventriculo, aut vtero ipsi præhumido, aut sua sponte male affecto. Quod si sanguinem redundare comperitum sit ex pleno pulsu, febre, feminæ habitu, suppressa vacuatione, vitæ instituto, & faciei rubore, sanguinem ex brachio protinus mittes, præsertim si quod ex vtero decidit, calidum fuerit, & vterus ipse inflammatione, dolore, calore ac tumore tentatus. Sed quia plerumque vteri ligamenta madore imbuta laxantur medicamentis, quæ aquosos, & pituitosos humores repurgent, exsiccare corpus, & vterum oportebit leuiter tamen, & blandè, ne medicamentorum, aut corporis vi vterus excidat. Cuius auxilij loco, multis rationibus proficuum est, frequentioribus vomitibus vterum, quia vterum sursum retrahunt: tum quia humores ab vtero reuelluntur: verò quia pituitosos, & fluidos faciliè expurgant. Quod profecto bis in hebdomada tunc facies exhibitis leuioribus vomitorijs, quale est decoctum raphani, seminis eius, anisi, aut feniculi cum modico oximelite, aut syrupo ex nouem infusionibus: præsertim si inter medijs diebus adhibueris clysteria, quæ calfaciendi, & exsiccandi vires habeant, qualia ex uino, aut decocto aquæ,

Q 2 cum

cum dauceo, aniso, chamamelo, cumino, anetho, menthastro, & similibus cum melle rosaceo citra pinguiori admixtionem. Infectiones item parabis ex eisdem herbis, & alijs similibus cum vino feruifacitis: vel sacculos eadem materia constantes, & calidos actu, vino irroratos aut aridos. Exteriùs supra vteri regionem, & inguina adhibebis cerata, emplastra, inunctiones, & oia alia, q̄ superiùs retulimus, additis folijs, & baccis lauri cū ligno aloes, cinnamomo, pulegio, & similibus in puluerē redactis. Inunges quoq; imū ventrem balsamo, oleo de Aparicio apud nros sic appellato: de cinnamomo, de absinthio, de baccis lauri, vel alio, in quo ferbuerint lignū aloes, anisum, daucū, cinnamomū, & flores roris marini. Suffumigabis pari rōne fœminam eisdem rebus, vt & fumo, & virtute cōbustorū, pars exsicceatur, & ad nativum statū redeat. Si tñ hæc oia minùs proficere videantur, balnea aquarū sulphurearū consulto, hæc n. efficacissima sūt. Aut, si mauis, consentiente toto corpore, vel transmittente humida excrementa in vterum, fontanellā in altero brachiorū adaperies. Caterū vtero primaria affectione inadido, & ob id prolapsio, in altero cruriorū poteris aperire. Ego aut in vteri prolapsione ex nimio vteri vel totius corporis madore, aut ex albis vteri purgamentis, vel ex frigore aut humiditate externa proficiscēte, nullū aliud vtilius, & tutius præsidium adinuēni, q̄ decocto radicis chinæ, ligni sancti, vel sparte parellæ corpus lētē & diu sudare, quominus corpus cōtabescat, & citra damnum magis exsicceatur. Quē quoq; vsum præstat largioris decocti ex p̄dictis citra sudorē vsus. Prouidendū, his omnibus factis, adhuc est, ne iterū decidat: difficulter etenim curatur, dum huic vitio assuescit. Ob id necessum est oī arte vteri osculum roborare, astringere ac firmare, ne ocysimè iterum dilabatur. Cui vsu pessus conficiendus est ex lana, vino austero madefacta, & pulueribus ex radice balausti, nuce cupressi, rosis, & cypero: vel ex eisdem, additis pulueribus mastichis, thuris, ladani, & picis: aut ex eadē lana cū albumine oui, & pulueribus sanguinis draconis: q̄ si odores fœtidos in summitate pessi reposueris, facilius rē ages: Reperies et apud Græcum Moschionē pessarium huic munerī cōfectū, qd̄ recipit croci, & syp̄i. an. 3. ij. medullæ ceruinæ 3. ij. resinæ terebentinæ 3. j. adipis anseris, gelaminū ouorum elixarū 3. j. olei irini, & rosarū quantum sis satis. Aliud et efformat idem autor, qd̄ recipit ceræ punicæ obolū. j. adipis anseris, & medullæ cerui ana. obo. j. & s. & syp̄i, 3. iij. quibus vtendum præsertim est, cum vterus duritie, vel tensione dilet. Sed vtilitatis non contemnendæ est ad firmandū vterum pessulus, q̄ excipit assæ fatidæ, myrrhæ, thuris, mastichis quantum sit satis, postea misceantur cū oleo laurino, & adde lauendulæ 3. j. & s. baccarum lauri. 3. f. Pectinem quoq; ac lumbos, lana, bōbace aut spongijs imbutis oxicroto contegemus, & ne concidat, alligabimus. Cui itē vsui confert emplastrū, qd̄ recipit galbani. 3. j. & s. myrrhæ, thuris an. 3. ij. terebentinæ. 3. f. seminis lauēdulæ, & sanguinis draconis. an. 3. j. pulueris rosarū, coralli, & myrtilorū. an. 3. ij. moschi. 3. f. misceantur, & extendantur in linteo vel corio tenui. Consimilem huic vsum præstat emplastrum contra rupturam, vnguentum Comitissæ, emplastrū de mastiche rubrum, desiccauitum cum radice cyperi: vel emplastrum diaphenicon. Sed prodest non parum confectum peculiariter ex lauēdula, bistorta, folijs, & baccis lauri, adiecta protūcula myrrhæ, thuris cū cortice, & mastichis, & alijs q̄ consimilem facultatem habent. Profunt item infectiones, quę excipiāt

corū

A corticis piai. .ij. corticis thuris. 3. corticis querci. .ij. hordei, absynthij. ana. m. j. rosarū rubearū, balauſtiarum, florū ſtrechados. ana. p. j. ſi ut decoctū in aqua ferrata & vino aſtringenti, cuius aliquā portionē cum ſyringa in vterū inſundes, ſi minari caſum perſenſeris: ſed inſtrumentū ex lana conſectū prædicto decocto madidū in eandē partē inferes. Ex quibus, & alijs emplaſtrum conſice, & vteri regioni ac inguinibus apponito, parabiſq; id hoc modo: excipe foliorū myrti, lentisſci, ſummitatū rubi, quercus vel pyri agreſtis. ana. m. j. corticis quercus & maligranati, ana. 3. ij. gallarū, ſpongiæ, biſſortæ & pentaphylli. ana. 3. ij. centauri minoris, rosarū rubearū, florū anthos & ſalutæ. ana. p. j. ſi ut decoctum in aqua & vino rubro vel aceto, ex quo ſumes quantū ſit ſatis, ut cū farina volatili, farina lentium, puluere thuris, chamemeli & ſanguinis draconis fiat emplaſtrum, vel cataplaſma. Item emplaſtris pro matrice vtendū eſt, ut ipſam roborent ac firmant, qualia ſunt, quæ recipiunt aliptæ muſcatæ, galliæ muſcatæ, ana. 3. ij. ambre, muſci. ana. g. v. vtriuſque ſtyracis. ana. 3. j. ſ. refinæ electæ. 3. ij. miſceantur cum oleo de ſtyrace, & fiat emplaſtrum. Quæ omnia ſi nō profuerint, extricemini, & vltimum præſidium erit zona Hipp. quæ acingulo zonam habet a parte poſteriori per perineum adductam in anteriorem partem ad idem cingulum iuxta pubē arcū. Alij quidem e ſubere ouales formas inductas cera, & quaſi pediculo alligatas immittūt in ſinū pudendi, alligantque coxis inunctas oleis & vnguentis aſtringentibus. Atque hæc dixiſſe ſi ſatis. Nec mirandū proſectū eſt, me in hoc cap. ei uſdē indicationis varijs in partibus remedia attuliſſe: nā morbi conditio id in præſidiorū uſu docebit proficiū & neceſſarium fore.

De auerſione, ſeu recurſu vteri ad varias partes. Cap. 12.

DICTVM eſt præcedenti cap. vterum ad ſuperna ferri, aut extra ſinum pudendi prolabi, vel intra corpus manētem ad varias partes inclinari, retorqueri & auerti. Quem ſanè motum; ad varias partes factum, vteri auerſionem Hipp. & medici omnes antiqui appellarunt. Cuius idem Hipp. mille in locis meminit, ſed ſpecialius lib. 2. de morb. mul. per hæc verba, Dico autem cum vteri ex loco moti fuerint, alio alias allabuntur, ad quæcunque verd locum allapſi fuerint, dolores ingentes incumbunt. Et ſi quis veſicam contingat, dolorem exhibet, & vrinam non ſuſcipiunt, neque genituram in ſeipſos trahunt, & ambo dolent, & ſi non celeres ſolutiones fiant, vteri poſtea ſuppurantur iuxta eodē locos, ſi ad ipſos recurrerint. Contingit autem hoc & in laterum mollitudine & in inguinibus & ſupra peſtinem. Refert etiā eodē loco & lib. de natu. mul. varias partes, ad quas vterus irruere poteſt, quas pauld inferiorius recenſebo. Vtūq; in vterus deſlectatur, morbuſ conſtituit in deprauata figura, aut ſitu: vterum ſymptomata, varia admodū ſunt pro cauſæ varietate & loco, in quem irruit vterus. Conſtat enim ex Hipp. nō ſolū verſus inſtrumenta reſpirationi ſeruiencia vteri inclinari, ſed in iecur etiā, in ſplenē, ventriculū, veſicam, inteſtina, præſertim in colon rectū, acileō, in coxēdices quoque & in crura, lūbos, ac in omnes partes his vicinas. Hæc etenim retractiones intelligēdas eſſe arbitror eo modo, quo diximus Gal. cap. de hyſterico affectu intelligere. Quippe credendū non eſt, vterū

Q 3 illuc

illuc recurrere derelicta propria sede, sed in seipsum conuelli, & partem in quam simulat adire, in consensum trahere, aut versus illam partem, flatu aut humore impleri, eamq; summopere ledere.

Causa.

Causas huius deprauati motus, qui vteri situm vitari simulat, primus omnium recenset Hipp. lib. 2. de morb. mul. per hæc verba. Porro omnis occasio vteros propellere potest, si quid malè habeant: nā & à frigore pedum ac lumborum & à saltatione & terrore, & lignorū sectione, & cursu ad accliuē locum, & ab alijs multis propelluntur. Proinde hæc considerare oportet, ad totū corpus respectu habito, cum præsentēs morbi affuerint, propter talia enim omnia necesse est, plus aut minus ægrotare, & postquam hæc reluxerint, maximè hac parte repentini morbi manifesti fiunt. Quum igitur hæc aduenerint, penitus ex tota homine deprehendere oportet: nam quæcunque perfrigerationes crurum, aut stupefactiones ex frigore fiunt, hæc omnes etiam in vterorum morbis vteros eleuant. Qua equidē sententia constare videtur, solas externas causas Hipp. numerasse: cæterum Gal. lib. 6. de lo. aff. cap. 5. & Aetius à Gal. transcriptis verbis: specialiores causas per hæc verba referunt. Suppressis membris necesse est venas & arterias ad vterum tendentes repleri: nam sanguis vsque ad vasa oscula accurrit quidem, verum intra vterum prodire non potest, aut eò quòd nimia crassitudine osculis impingitur, & grumofus fit, aut q̃ ipsæ oscula clausa sint, & transitum impediunt, ita vt venæ humore repletæ extendantur, & vicinos vteri appendices humectent, quorum extensione vterus retrahitur, si itaq; ex vtraq; parte æqualis retractio fiat, reclinatio aut reuulsio recursus vteri æqualis contingit, & ad superna vergit: si verò in alteram partem maior retractio fiat, alterū ē visceribus his causa est, splen videlicet aut hepar, quorum venæ superfluo sanguine extantæ à suis partibus vterū retrahunt, hepaticæ venæ à dextris, splenicæ à sinistris, prout alteræ magis fuerint repletæ, quippe dū non fit æqualis vtraq; repletio, sed maior in vna quæ in altera apparet, quæ magis repleta est, illa magis intenditur, contrahiturq; & mox partem aliam quæ melior est, ad se rapit, ad eò vt vterus versus illam distorqueatur. Quibus proculdubio sententijs externas, & internas causas huius affectionis euidenter constare arbitror, sicut rationem etiam, quæ vterus cū afficitur, magis in vnam quam in aliam partem reuelatur. Constat igitur ex omnibus causis, quæ alteram vteri partem, & vasa ac ligamenta ad illam partem pertinentia, tensione aut conuulsione afficere possunt, modò frigus rigens ac densans partem sit, modò labor tendens, modò humorum vbertas distendens, affectus prædictos posse proficisci. Addit insuper Gal. lib. 2. de cau. pul. cap. 11. alias distorsionis vteri causas, qualis est inflatio, scirrhosus tumor, tuberculum, aut abscessus, siccitas aut frigus nimis corrugantes aut tendentes vterum. Frequenter enim conspiciamus, & puerperis ex frigore, & virginibus ex mensium defectu, ac omnibus alijs ob prædictas causas hæc mala accidere.

Signa.

Signa quidē affectus in genere, recensuerat Hipp. li. 2. de mor. mul. loco citato per hæc verba. Ad quæcunq; verò locū allapsi fuerint, dolores ingentes incūbunt, & si quis vesicā cōtingat, dolorem exhibet, & vrinam non suscipiunt, neque genitura in seipsas trahūt, & ambo dolēt. Cui cōsimilē sententiā adduxerat dolores exhibēt, & incōspicui fiūt. Ceterū specialius oportet, ad quā partē vterus decubuerit,

A debuerit nosse, qđ pulchrè mille in locis docuerat Hipp. quę oĩa ego referā, in-
 tio sūptō à recurſu in caput. Inq̃t enim lib. de natu. mul. Si ad caput cōuerſi fue-
 rint vteri, ſignū hoc eſt. Venas in naſo & ſub oculis dolere vī. Et iterū ſubdit li.
 2. de mor. mul. Quū ad caput cōuerſi fuerint vteri, & hac parte ſuffocatio defi-
 nit, caput grauatur, verū alijs alicubi, aliàs finis hī, ſignū autē eſt. Venas in naſo, &
 partes ſub oculis dolere dicunt, & ſopor altior tenet, & ſpumat vbi lenius ha-
 buerit. Ad iecur quoq; recurrere idē docet Hipp. lib. de mor. mul. dicēs. Si verò
 ad hepar cōuerſi fuerint vteri, mulier de repente voce deſtituitur, & dētes con-
 ſerti ſūt, & color liuidus fit, de repente verò hęc patit̃ ſana exiſtēs: cōtingit autē
 maximē virginibus antiquis, & viduis, q̃ pepererunt aliquā, & viduitatē agunt:
 maximē verò contingit oĩno nō ferentibus vterū, & ſterilibus ex partu. Ad la-
 tus aliquā vterū procūbere ex eodē autore diſces lib. de natu. mul. his verbis. Si
 vteri ad latus aliaſi fuerint, tuſſis detinet, & dolor ſub latus, & vterus durus ue-
 lut pila inſidet, & ad contractū dolet velut ab ulcere, & cōtabeſcit, & vī perip-
 neumonia eſſe, & cōuellit, & gibboſa fit, & menſes omninō nō apparēt q̃ buſ-
 dā verò prius conſpecti euaneſcunt: cui conſimilē ſententiā adduxerat. lib. 2.
 de morb. mul. Verū ſi in lūbos uterus irruat, ſignis adductis prædicto loco ab
 Hipp. diſces: inq̃t enim, Si verò in lūbis fuerint vteri, aut in lateris mollitudine,
 & ſpiritus ſublimis inerit, & ſuffocatio habeat, & anhelatio deſa ipſā corripit,
 & moueri nō vult. Cuius ēt mali ſigna adducit Aetius dicēs. Si verò retro aut in
 frā inclinatur, torpor ac difficilis vtriuſq; motus ſequitur: ſape ēt motus penitus in-
 tercipitur, & ingens nexat dolor: alius quoq; ſupprimi, neq; clyſterē admittit,
 niſi genibus innitatur agra. ſtatus itē retinent, & dolores inter ſedendū actuan-
 tur, p̃ſerim ſi verſus anum reclinatio contigerit. Quòd ſi ad coxendicē uterus
 deuenerit, cognosces fac̃ lē ſignis, quæ Hipp. aſſert lib. 2. de mor. mul. dicens.
 Si circumuerſi fuerint vteri ex parte ad dextrā partē, & puerperij purgamentā nō
 ſiant, & dolor imū uentrē habet & lūbos & laterum mollitudinē, & dextrū crus
 grauatur, & torpor occupat, & non tremit. Et ſubdit paulò inferius. Si vteri ad
 ſiniſtrā partē, aut coxam declinauerint, dolor acutus ac vehemēs habet lumbos
 & laterū mollitudines, ac ipſum crus claudicat. Idē fareſ lib. 2. popu. pa. 4. tex. 5.
 dicens; Stymargi ſamula Idumea erat, cū peperit ſet filiā, os vteri contortum eſt,
 & in coxam & crus, dolor. Quam etiā ſententiā Aetius per hæc uerba retulerat.
C In utrā uerò partē uterus declinauerit, digitorū admotione, & ſeq̃ntibus ſignis
 agnoſcemus. Si. n. in obliquū declinauerit, propinqui femoris diſtenſio, dolor,
 perfrigeratio, impedimentū, & torpor indicio erit. Irruere in uentrē uterū quo-
 que cognosces ex uerbis eiūſdē Hipp. lib. de natu. mul. quę in hūc modū ſe ha-
 bent. Si vteri ad uentrem nutauerint, dolor acutus & uehemens coxendices, &
 lūbos ac laterū mollitudinē habet, & crus claudicat. Cognoscere docet etiam
 idē autor eodē lib. ad ſedē irruere, dicens. Si vteri ad ſedē cōuerſi fuerint, & ſe-
 ceſſus ſecedere p̃hibuerint, dolores habent ad lūbos & imū uentrē & ilia. Cui
 conſimilē ſententiā adducit lib. 2. de mor. mu. dicens. Si uerò ad ſedē conuertit̃
 vteri, ſecceſſus recrementa impediunt, & dolores occupā lūbos, & imū uentrē,
 & inteſtinū rectū ac podicē. Quòd ſi ad inguina, plapſi fuerint, idē quoq; autor
 internoſcere docet eodē loco dicēs. Si uerò incubāt ī inguina & meatus urinae,
 dolores fiunt fortes, & torpor in cruribus, & urinae meatus obſtant, & urina

Q 4 non

non emittit. Solet etiam vterus ad pedes & crura conuelli: quod Hipp. his ver-
bis manifestat. Si ad crura & pedes conuersi fuerint, ex hoc cognosces: magnus
pedum digitus conuellitur sub ungues, & dolor crura ac femora tenet. Verum
si vteri os obtorqueri contingat, menses, ut Hipp. inquit lib. de natu. mul. occul-
tantur nunc prius apparentes, & non similes fiunt, sed deteriores, & pauciores
quam antea & genitura non admittitur. Atque hæc sunt proculdubio signa,
quibus vnamquamque vteri peruersionem rimari oportet: in quibus equidem
& Hipp. locis expendendum est, huiusmodi retractiones intelligendas esse, si-
mul & Hipp. loca, non quod vterus illuc peruadat, sed ea lege, quam in huius
cap. principio, & cap. de vteri suffio. adduximus.

*Curan-
di ratio.*

Quantum facessant negotij prædictæ affectiones, quam et sint frequentes, &
perperam intellectæ, nemo sanæ mentis dubitabit, si attento animo feminarum
querimonias & affectus intueatur: multa etenim referunt se pati accidentia, quæ
ad vterorum peruersionem reducenda essent, si medicus ea diligenti animo expe-
disset: quod fit, ut ex ea negligentia pendeat ipsas pati & cõqueri mille modis ci-
tra vllum præsidium, præsertim cum tanta diligentia, & cura has vteri peruersiones Hipp.
tractauerit. Ob id profecto oportet primò quacumque vterorum peruersionem
Hipp. scribit, docere, ut ab eius documentis sumpto principio, curandi ratione fa-
cilius ciuilibis inuenire liceat. Inquit. n. lib. de natu. mul. loquens de vterorum in-
clinatione ad caput. Hanc calida multa lauare oportet etiam in capite, lauro &
myrto in aqua incoctis & caput vnguento rosaceo illinias, & odorata subter suf-
fiatur, & brassicæ edat. & succum absorbeat. Quas et curare docet lib. 2. de mor.
mul. velut ex vtero suffocatas. Sic cum ad iecur vterus allabatur, loco nup citato
hanc refert curandi rationem. Quum sic habuerit, tumorem ab hepate cum manu in-
frà leuiter detrudito, & præcordia cum fascia deligato & os aperito, vinum verò odo-
ratissimum infundito: quoniam sanè et graueolentia ad nares adhibere ac suffire con-
uenit, ad vteros verò odorata, & suffimenta. Et postquam sic curaueris, pharmacum
deorsum purgans bibendum dare oportet: si quidem biliosa fuerit, quod bile
purgat: si verò pituitosa, quod pituita. Et dum ad latus vterus procumbit, hæc re-
fert loco nuper citato. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibere
dum dato, & multa calida lauato, & reperfectorijs quicquidq; admiserit adhibeto. Quam
sanè curationem iterum retulerat lib. de natu. mul. Eadem ferè curandi methodum,
dum ad lumbos vergit, adducit lib. 2. de mor. mul. dicens: Quum sic habuerit, phar-
macum bibendum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur, magis verò deorsum,
& totum corpus fouero, præsertim vteros leniter, & calida bis indie lauato. Sed pa-
rum antea eadè lib. de eadè affectione loquens hæc verba refert: Sulphur aut bi-
tumen, aut cicuta, aut myrrham terito, & melle cocto affusso glandulam longam
efformato atque crassam, eamque in sedem indito. Itè eodem loco paulo inferius,
consimilem in lumbis recenset affectionem, sed longè dolorosiores, & quæ cõ-
uulsionem aut contractionem crurum affert cum acutis alui doloribus, & vrinæ stil-
licidio, atque animi debilitate. Quo casu, oleum in vteros infundere iubet, & fo-
mentum adhibere, & multa aqua calida lauare, & in oleum & in aquam desidere,
& suffire graueolentibus per inferna: ac post hæc omnia iubet, sedato dolore, pharma-
cum sursum purgans dare, quo casu interdicat ventris purgationem donec ex toto
affectio quiescat. In coxendicium verò reclinacione lib. 2. de mor. mul. inquit: Quum
sic ha-

- A** sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, & postera die sufficere, recensetq; & frigidum & attringens suffumigium cum oleo. Et eadē ferē verba refert lib. de nat. mul. in curatione reuulsionis vteri in ventrē. Sed li. 2. de mor. mul. loquens de prolapsione in coxā, hæc refert. Si vteri cōtingit coxā, & incubāt, dura ac solida sit coxa ad lateris mollitudinē, & dolores in venteris ad ipsam lateris mollitudinē, & lumbos ac crura dolor incidit, ac extēdit, & suppuratur, & lineamētis opus habent, & pereunt, nisi quid feces aut vras. Verū cum in sedē vterus irruit, curari iubet Hipp. lib. de mor. mul. lauacris, & fomētis, dicēs; Quū sic habuerit, calida ipsam lauare oportet, & lumbis fomētum adhibere, & postea graueolētia subter suffire, & apponere q̄ purgāt & impellūt vteros, & bibenda dare q̄cūq; libenter admiserit ex maximē cōserētibus. Quo ēt modo curare iubet fēminas, q̄bus ī pectinē vterus incumbit: in quauis enim obliquitate & vteri extorsione lib. de natu. mul. consulit pharmacū sursum purgans p̄bere, & vterū fouere, nisi dum in coxendicē vergit, & ibidē suppurat, vt Hipp. refert 5. Aphor. inquit. n. Si vterus in coxā vergens ad suppurationem veniat, necesse est emmoton fieri: ego etenim periūssimorū in græca lingua consilio, interpretor verbū illud, emmoton, hoc est, vlcus sinuosum fieri: quo tpe nō pharmacis expurgātibus, sed ijs. q̄ pus ad extimas partes euocēt, & postmodū q̄ vlcus repurgēt, adhibēda sunt. Verū enimūero, si ad pedes aut crura prolābatur, multa calida lauare iubet, & fouere, ac fūllire modo dicto. Hęc itaq; sunt in vniuersum circa vteri auersionē, Hip. curationes, quas cōsulō scribere studui.
- Actius quidem ex his omnibus vnā colligit curandi rōnem, cunctis cōem, q̄ in hunc modū scribit; Quomocūq; igitur vterus retractus ac inclinatus fuerit eodē modo velut inflammationes in exacerbationib. curare oportet: in remissionibus at & declinationibus magis emollientibus vtendū est. Perseuerātē verō affectione, ijs, q̄ ex alto trahere, & corporis habitum mutare possunt. Sed his missis triplicē in hac affectione peritus Medicus tenet obseruare curandi rōnē: vnā q̄dē incipiente affectu, q̄ tū mitigationē accidētū & vteri reductionē docet: alterā, cessantibus symptomatis, q̄ emollientibus, & ijs, q̄ blandē partē dolentē & cōuulsam laxent, vt cedat obstetrici vterū tractāt: tertiā verō, q̄ cām retractionis ex toto auferat. A qua quidē, si interna fuerit, velut plenitudo aut cacochimia, principiū curationis auspicari oportet: nā sanguinis plenitudine existente in vtero, citra cunctationem ex talo sanguinem fundere oportebit, p̄sertim immorātibus aut imminutis mēsis. Si vtero totū corpus affectioni cōsentiat, ex brachio sanguinē mittes. Sic prorsus cacochimia p̄ualēte in vtero, p̄ infernā aluū purgabis, sicut vomitū excitabis, vtriculo malē affecto. Verū si citra euidentē plenitudinē aut cacochimiā affectio suboriatur, a mitigatione ordiēdū est. Mitigare quidem accidētia ijs poteris, quæ Hip. scripsisse diximus, & ijs ēt, q̄ nos subinde c. p̄cedenti adduximus, prouidentes partū dolētī fomētis ex oleo liliorū, amygdalarum dulciū, de semine lini, & angelicæ, ac pinguedinibus galinæ, vituli, & cruriū cerui. Itē decocto althææ, seminis lini, fœnigræci, chamæmeli, melilori, artemisiæ & similiū. Laxabis quoq; tēsam partē frequentioribus balneis, in scellionibus, fomētis & inunctionibus p̄dictis. Cæterum si hæc nō p̄fuerint, instituta p̄ba victus rōne, parca & optimi nutrimenti, tū cū modico vino, p̄sertim si ex cā aliqua procacitica affectus oriat, potissimū frigida, ad alia

te protinus conferes, & animo considerabis feminae habitum, vitae institutum, & A
tandem omnia ea, quae praecesserunt. Quod si ex his cognoueris, sanguinem re-
dundare, aut menses non probè fluere, vel minus fluere (vt de Stimargi famula
lib. 2. pop. par. 4. text. 5. scripserat Hipp. dicens liberata est iuxta talum secta ve-
na) sanguinem ex talo mittes, nisi vteri retractio ad intestina, ac vesicam vel ad
pedes fuerit: nā per id tps tutius est, ex brachio ipsum extrahere, p̄cipuè si tēpus
menstruationis non instauerit. At si ex ijs, q̄ diximus, certum tibi fuerit, prauis
humoribus femina abundare, purgationem protinus instituere teneris: in pitui-
tosis pharmaco exhibito, qd̄ pituita purget, & in biliosis quod bilem. Seruabis
tamen hac in re legem testimonijs Hipp. adductam, nimirum q̄ in ea vteri auer-
sione, q̄ ad infimiores sit partes, semper q̄ per vomitum purgent adhibeamus, vt
& vterus retrahatur, & quod tensionem auersionēq; efficit, expurgemus: in ijs
verò, q̄ ad supernas partes magis fiunt, q̄ per infernam aluum purgant, sunt ad-
hibenda. Vteri etiam osculo appones pessaria ex mercuriali, theriaca & oleo li-
liorum alborum, & post inunctiones superius adductas, cucurbitam grandem
parti laesa aut umbilico affigito. Dum aut lumbos & mediā ventris partem vte
rus irruit, ea pharmaca porrigere oportet, q̄ per vtramq; aluum expurgare na-
ta sint, vt in multis vteri auersionibus Hipp. consuluisse constat: qualiter verò
id fieri debeat, dictum est superius. Vtūq; tñ sit, tensam partem vteri, blandis
obstericis manibus oleis perficādo ac comprimēdo emollire, soluere stu-
dendum est, donec tensionem ac dolorem quicuisse comperiamus, vel digitis
per pudendum immissis si fortè os vteri distorqueatur: aut cucurbitis umbilico
appositis & emplastris pro matrice, ac suffimentis odoratis per vterum, & fœti-
dis iuxta nares: quod quidem suffumigiū maximi esse momenti experimur. Sic
etenim vtendum est omnibus alijs, q̄ vterum tēsum laxare habent & emollire:
tandem ad experimenta obstericū veniendum est, ex quibus saepe nō parū vti-
litatis in medicina reperitur. Præterea in omnibus retractionibus umbilico ap-
ponere q̄ rebur & firmitudinem, vtero p̄stāt, uelut sunt emplastra pro matrice,
q̄ ea lege conficies, q̄ retractionis cā p̄scripserit: nam flatus & frigiditas calida
& tenuium partium exoptat: plenitudo, post euacuationem discutientia humo-
rem: malignitas alexipharmaca vt theriacam, tandem omnis vteri retractio ad
suum locum facillime refluit magnetis usu, maximè si umbilico affigat. Sed in
hoc specialem feminae conditionē intueri oportet quippe ex his nōnulla styra-
celiquida, alia galbano, alia thecamaca, plures carāna, & pleraq; odoratis gau-
dēt & latent: quibus si alia adhibeas ēt pro rōne cāe ex usu uideant, nil proficies.

*magnetis u
sulphaciliol
uum locum
uicini reuert.*

De vteri imbecillitate. Cap. 13.



ULTIS modis posse uterum imbecillitati, ijs omnibus com-
pertum esse reor, quibus notū est, quae sint vteri ipsius officia
& quales actiones: nā iuxta quemcūq; actum, mille occasio-
nibus à debito deflecti ac deficere cōspicimus. Sic primò qua-
tenus pars simplex est, conficiendū ac commutandū proprium
alimenti munere, labefactari solet: quò fit, ut multis humidi-
tibus & superfluis purgamentis abūdet, potentijs naturalibus lāguidioribus
iactis.

A factis. Deficit et in communibus officiis, & quatenus instrumentale membrum est, præ impotentia earum facultatum, quarum munus est opera illa exequi. Inprimis continens vasorum vis, impotens redditur, quo tpe vel menses assidue fluere dilabuntur, vel frequenter, & per crebra intervalla, vitio eiusdem facultatis nequeuntis onus continere, vel secernentis potestate irritate. Prolabitur quoque vel proprium semen, vel a viro susceptum: at si concipisse videatur femina, post aliquot dies semen explodit, vel tenuiter efformatum fetum continere nequit, sed primis mensibus, dum aliquam gravitatem genitura nanciscitur, primo, secundo, aut tertio ad summum mense excernitur. Pari quoque ratione femina sic affecta virorum concubitum aut non amat, aut fastidit, quod si coacta viro iungatur nec delectatur, nec per sentit quicquam. Itaque, et affectionem, uteri imbecillitatem appellamus, in qua uterus sua munia vel debilitat, vel omnino non operatur. Tamen licet in plerisque uteri affectionibus, ipsum in aliquo suorum munerum labefactari contingat, non tamen ob id uteri imbecillitatem, eum affectum nuncupamus, sed dum nullo affectu in utero sensibilibiter existente, facultates temperamentorum vitio potissimum labuntur.

B Sunt quidem huius imbecillitatis duæ speciales causæ, una, quæ naturam uteri temperiem evertit versus aliquam quatuor qualitatum primarum: altera vero, nimius uteri labor, & spirituum vitalium ac caloris innati resolutio, velut in laborioso partu, aut frequentia abortu vel partu contingere solet, ut Aetius optime *Causa*, advertit: & ob id soluto nativo calore, robur quoque naturale deficere necesse est. Sic sanè primæ quatuor qualitates, ubi modum naturæ, & debitæ temperiei excederint, robur uteri proculdubio deiciunt. Nosse tamen in hac re convenit non omnes distemperies quavis imbecillitatem posse efficere, sed unamquamque propriam, & determinatam. Quippe caliditas plus trahit ad uterum, quam conficere possit: ac si minus trahat, non conficit quidem, sed adurit, vel quovis alio vitio conspurcat. Frigiditas ne minimam quidem alimenti quantitatem conficere potest, & ob id crudis humiditatibus uterum abundare cogit. Siccitas porro sanguinem retinet, vel menstruum, vel semen plusquam oporteat, & ob inclementiam caloris siccitati ad iuncti nil conficit, sed exsiccat ut Hip. §. Aphor. dixit text. 60. Humiditas autem neque sanguinem, neque semen contineri permittit, neque fetum adhuc: præterque quod feminam viris ingratam ac citra ullam delectationem affectam reddit: & tandem in reliquis uteri officiis alia non pauca accidentia molitur.

C Dignosces proculdubio affectum in genere, ex fastidio veneris, ex flatu excretionis pudendum, ex errabundis mensibus, ex seminis prolapsione, & abortus frequentia. Menstruorum et tempore, pectinis, lumborum, & crurium gravitas adest, & venter male habet, ex quo vaporibus ad caput delatis, aliquando deliria accidunt: & in summa similes vexationes istas, quæ ab uteri strangulatione prodeunt, sustinent. Cæterum cognosces ex laborioso partu vel abortu imbecillitatem proficisci, sumpta ab assistentibus, & laborante relatione; ac simili modo, si ex partus frequentia succrescat, quod ostendit non minus totius corporis languor, sed potissimum laborum, & crurium. Caliditate malo causam præstare cognosces, quod partes pudende præcalide existunt, & reliquum corpus caliditate pollet: menses sunt quæ paucissimi, & cum dolore, & nimia caliditate prodeuntes, ita ut pudenda mulieris exulcerent, quæ vero per uterum excernuntur, fetida, & nigriora existunt, & ob nimiam acrimoniam nullum servant ordinem, irritata, ab erosione, natura.

Fit

Fit quoq; fœmina ex hoc intemperamēto sicca & calidissima, & cū cōt, nō delectatur, q̄ vterus doleat. Frigiditatē verò prædominari discet obstetrix ex tactu oris vteri & pudendorū, mucore enī & pituita plena existunt, & os vteri veluti solidū sit ac sine sensu, ita vt obstetricis digitū persentire nequeat. Torpēt quidē inguina & partes prope os sacrū, & lūbi ac fœmore & crura: fœmina etiā pigrē incedit & tarda sit ad omnē motū: flatibus abundat, quos frequenter per vteri osculū excernit, ex quo proditex toto ablatas vel diminutas videri facultatum actiones, ita vt menses præ crassitudine omnino supprimantur, & prorsus sic affectæ, non concipiant: nā vt inquit Hipp. 5. Aphor. Quæcunq; frigidos & spissos habent vteros, hę non cōcipiunt. Verū fœminæ, q̄ humiditate purissima pollent, madidas flaccidasq; habēt pudēdas partes, mēses decolores & aquosi pdeunt: coitū non appetunt, nec, si cogantur, delectationē vllā sentiunt & semen statim projiciunt. Quæcunq; enim humidos habent vteros, inquit Hip. nō cōcipiunt, quod si semen retineant, mox abortiunt. Mœstē etiā sunt huiusmodi fœminæ, taciturnæ, ad omnē motum laxæ & impotentes ac veluti contractæ. Siccitatem quidē, ex his contrarijs facillē dignoscēs: quippe fœmina gracilis est, laboribus plurimū dedita, & menses q̄ paucissimos habens: hirsuta & ad venerē tardissima, & parū primo accessu delectatur, postmodū verò dū excitatur, difficulter quiescit ac subidet cocundi desiderii. Quæ oīa considerasse oportebit, vt seruata naturali vteri tēperie & ad pristinū statū reducta, vires facultatū elucescāt.

*Curan-
di ratio.*

Etiā si tanq̄ causam imbecillitatis vteri recēserim caloris, aut siccitatis intemperamentū, credendū cū hoc est, id me potius fecisse, vt earū qualitātū, cū in vtero à medio recedūt, curationē adscriberē, quā quod existimē prædictas imbecillitatis species hæc intemperamenta posse primo & per se efficere, licet alia non leuia accidētia quotidie inferant: præterquā q̄ & nativo calore resolutō & spiritibus vitalibus dissipatis: calor plerunq; adeo vteri vires labefactat, vt deinceps ppria munia exequi minimē valeat, sicut cōstat conceptū impedire dissipato suscepto semine, vel laxatis meatibus statim pfuso, aut mēstruo nimis crasso facto, pp inuersionē, vel apertis nimis venis prolapsō. Erit itaq; imbecillitatis triplex modus: vnus quidē agente aliqua distēperie, qua propriæ virtutis actus deficiat, cui primò subueniendū est: alter facultatibus ipsis languidioribus factis ex diminuto calore & resolutis spiritibus: vltimus verò, cū vteri corpus & substantia, laxior, mollior & infirmior ad ppria munia exequenda existit. Quæ sanē vitia & alia nō pauca vt quis mitigare possit, sūpto initio à caloris excessu, imprimis victū frigidū porrigere tenet, qualis ex lactucis, scariculis, borragine, cucurbita ac melonibus parari multis modis potest: pullorū irē carne, & potu aq̄ hordeo seruata. Cui vsui fore proficuū existimo, sanguinē ex venis tali, aut ex saluatella dextræ manus fundere, parcē tñ, ne præsidio & morbo vires dissipent. Itē gratia cōpescendi calorē, frenandiq; humores calidos, studendū est singulis diebus exhibere syrupū cichorii, rosarū, portulacę, & violarū, ac decoctū hordei cū saccharo, tandē ijs, quę bilē purgant, corpus inanire, vel paulatim exhibitō rhubarbari diluto eū aqua lactis, hordei aut cichorii, vel exhibitā cassia fistula, vel electario hamech sine scāmoneo & colocintide confectō, q̄ maximi p̄rij in hac re & similibus arbitror esse. Quo facto, dorsū inungere oportebit vnguento rosaceo, vel refrigerati ex Galeno, aut eo, q̄ ex cucurbitulis paratur: eadem

Adem ratione confert, vterum illinere oleo violarum vel de semine cucurbitæ, aut fouere decocto maluarū, hordei, rosarum, & violarum lana, vel spōgia, aut vesica excepto. Prodest quoq; mercurialis cū lenicula palauistri, lumbis, & pectini imposita: item cerusa aqua trita, vel cum mucilagibus pvlj liquata. Cauiere tñ oportet, ne vterus nimium refrigeretur, ob idq; necesse est sensum, paulatim, & per interualla hæc adhiberi. Balnea item aquæ dulcis hunc vteri calorem plurimum cōpescere scio: quem nō minus extinguit pessus ex albumine oui, adipe anserino, & oleo violarum cum g.v. opij. Quod si solā caliditatem vigere cognoueris, vt ex nimia pudendarum partiū frictione, exercitio, vel alia causa euidenti contingere solet, alterantibus solis vtendum est, citra sanguinis detractionem, aut expurgationem. Verū si diu durauerit huiusmodi distemperies, etiam si ex prædicta causa contrahatur, coniectandum est, humores quoq; calidos euocasse, aut effecisse, & vtendum est prædictis auxilijs.

B Siccitatem calori finitimam (quæ ex alimenti consumptione, vteri duritie ipsum ad concipiendum inutilem, & imbecillum reddit) corriges per humida alimenta optimi, plurimi ac facillimi nutrimenti: ac per fatus, & infusiones aquæ dulcis, aut decocti alicuius humectantis: & per inunctiones ex oleo amygdalarum dulcium & sesamino, vel de semine melonum: ac per metrenchitatas ex eisdem oleis, ex lacte, vel decocto aliquo pingui.

C Verū tamen si frigiditas imbecillitati causam præstiterit, considerandum primò est, an sola existat, vel cum humorum frigidorum præsentia: quod frequentius accidere conspiciamus. Quod si hoc vltimum fortè sit, prouidendum est, ne ex calidorum adhibitione maiorem humorum copiam à toto corpore ad vterum euocemus, ac rursus ne eos, qui per vterum vagantur, fusos tenuioresvè factos, in maius malum prorumpere contingat. Quamobrem primò vniuersum corpus vacuare oportet ijs pharmacis, quæ pituitam expurgent, exhibito prius per aliquot dies melle rosaceo, à quo vniuersum corpus summo manè fricari ac exerceri conuenit. Si tñ ex ventriculo vterum humores susceperit cognouerimus, vomitibus illi prouidendum est origani aut thymi decocto ante, & post cibum, ac deniq; oī studio ab eo pituita euacuare bis tervè in hebdomada vomendo, studendum est. Verū sine hæc quidē profuisse videantur, vterum ipsum purgabis p ea medicamenta, quæ id munus per epicrasim præstare nata sunt. Cuius naturæ sunt aloes, agaricus, hiera simplex Gal. cartā pulpa, vel pillulæ ex prædictis pharmacis cōfectæ. Quem et vsum præstant incredibili efficacia terebinthina abietis lota cum modico rhabarbaro. Quibus factis, ad ea medicamenta confugiendum est, q̄ vterum, & ventriculum calfaciant, simulq; humoris frigidi reliquias conterant ac digerant, veluti decoctum cumini, anisi, pulegij, piperis, epithymi, danci, perroselini, castorei, & seminis ac radicis angelicæ. Præstat et puluis ex eisdem confectus, ac facta leui super ventrem inunctione, sparsus. Ex usu quoq; est theriaca, mitridatum, & pleraq; alia ex ijs, quæ cap. de epilepsia ex utero, præstare diximus. Confert, & puluis corticis citri, aranciorum, & gariophyllorum, uel pastilli ex eisdem confecti cum modico saccharo, & cinnamomo. Post q̄ uentriculum foueto ex uino, uel aqua calida, in qua ferbuerint artemisia, ruta, saluia, cinnamomum, ciminū, pulegium, cyperus, acorū, & radices ac semina angelicæ. Ex usu quoq; est uentriculū pecti-

nem

pē, & inguina inungere oleo irino, amatyano, cyperino, de angelica, liliorum, ruta, & de baccis lauri: sed pretiosius est, qđ ex cinnamomo cōficitur, aut qđ ex angelica herba viridi cū radicibus, & pauco semine paratur: vel de aniso, de gariis, de hyllis, de nuce muscata, oleo piperino, vel macis, q̄ oīa extracta duplici vase, facta prius aromatū in aqua, & vini pari portione, sufficēti maceratione, mirū in modum prodesse scio, verū si ex his vltimis cum modico vino aliquid sumatur maius te prāstiturū beneficiū existima. Quibus inunctionibus aliqñ admiscere oportebit aquā mulsam, aut marinā cum modico aceto: q̄ omnia molli lana, vel spongia, aut vesica sunt excipienda, calidāq; actū adhibenda: quorum sanē quantitātē, aut efficacīā adaugebis, vel minues, prout affectus grauior, vel diuturnior, aut faciliior, vel nouiter factus fuerit. Postquā aut hāc adhibueris, nō erit abs re suffumigijs, & euaporationibus vti, sumptis per arundinē, aut infessionē. Quas conficies ex eisdem herbis ac rebus, quibus pulueres, & fomenta consistare diximus: additis ex styrace, & alijs aromatis calidis quantū sat sit. Item pessaria ministrabis, q̄ ex calfacere, & expurgare vterum possint, qualia conficiuntur ex succo mercurialis cū aliquo ex prādictis pulueribus, styrace, theriaca, aloe, & agarico cū modico melle. Regioni ēt vteri, & vmbilico ad mouere oportet emplastra, cerata, & sacculos, q̄ & vterū calfaciant, & roborent, qualia antea recēsuimus, & mō referā, si prius dixero quid aduersus humiditātē agēdū sit. Antē tñ scito, balnea ex sulphure incredibili efficacīa vteros frigidos sanare.

Humiditātē quidē, & maderem vteri haud dissimili mō curabis: quippe totū corpus purgare prius, fricare, exercere, & tenuē, & exsiccatē victū, atq; parū cū potū ex decocto sparte parellae, aut radicis chinae, vel cinnamomi, aut anisi cōfectū porrigere procul dubio oportebit. Purgabis quidē primō hiera, pillulis aggregatiuis, agarico, rhabarbaro, aloe, electario indo, vel diaphenico. Quo facto, vomere, sed frequētius, q̄ in frigida distemperie, opus erit: rariū tñ fomētis & balneis prāterquā sulphureis, vti cōceditur: liberalius tñ licet suffire, vel sicca fomēta, & sacculos adhibere: quos cōficies ex sale, millio, chamæmello, anetho, pulegio, artemisia, thymo, cinnamomo, ruta, baccis lauri, & stercore caprino. Ex quib. emplastra cū vino, & melle cōficere poteris, & cerata cū oleis supradictis, ladano, therebinthina. Cauēdū tñ est, ne statim à principio pharmaca hāc astringētia, & resiccātia adhibeamus: nā corpore impuro existēte, nō parū lædent humoribus pter naturā modū detētis, & ad principales sedes irruētibus. Quare prius purgādū est, & mox prādictis, & astringētibus vtendū, quale est decoctū lētisci, & myrti, rosātū, summitatū rubi, & polygoni: quo sanē decocto & pos sūpto, & exteriū adhibito nō parū pfeceis. Itaq; vltis medēdi rō erit, intūdātē à toto corpore, à vētriculo, & ab utero ipso humiditātē prius minuere, postea resiccātibus, qđ superest discentere, ac ebibere. Tñ quid sepe sufficere nequit, cōprimere, qđ ad os nuluē cōfluit necessū subinde erit. Quod si aliūde in uterum humiditatem cōfluere noneris, astringētibus potiorib. post dictā methodū uteris, veluti est myrti bacca, vel malicorium cū vino, & alia nō pauca, q̄ li. i. c. de mēstruo fluore diximus. Prodest quoq; exteriū uterō adhibere adipē anserinū cū aniso triū, lana exceptū: theriacā itē, mitridatū, vel suffumigia, quę ad mēses sistendos illic retulimus. Sed ultimō in frigida, & humida uteri distemperie nil tutius, aut uilius reperies, q̄ sulphurea balnea: quanquā corpus uni-

uer-

A nerium sudare ligno guayaco, sparta parella, radice china, uel syrupo ex eisdem, aniso, & semine angelica confecto, summopere proficuum comperimus. Si tamen hæc non prodesset videantur, ad fontanellas confugiendum est, quas cruribus esse aperiendas censeo.

Sed ultra ea, quæ aduersus qualitates, & causas, quæ uterum imbecilliant, pugnare habent, multa quidem sunt, quæ uterum ipsum roborant, vel præstantia, quod illi defuerit, vel adimplentia eius munus, & officium. Sic uterum roboramus eius caloris calore, sanguine, & spiritibus, & firmata ac stabilita uteri substantia: cuius naturæ creduntur esse omnia aromata, quæ & modicum calorem, aut parum ultra modicum habent, & quodammodo firmare, comprimere, & stabilire uterum sunt nata. Cui sane usus reperies utiles esse omnes gummi species, siue quæ ex Indijs asportentur, siue quæ apud nos nascentur, & cerata item ac emplastra pro matrice, quæ vulgariter in officinis parantur, & nos cap. de epilepsia abunde adduximus, & ferè reliqua, quæ ex gummosa substantia, ladano, pice, resina, vel terebinthina cum pulueribus aromatum, & oleis ex raris siccis, narcisso, cinnamomo, de baccis lauri, de lilijis, de angelica, de mentastro, de styrace, de iasminis, de naphtha, & alijs, quæ cõsimile habent virtutem, passim cõficiuntur, & ipsam liquidam styracem. Sed maxime quod recipit olei iasminorum, anisi, & cinnamomi, ac gariophyllorum, arte chimica extracti, ana ʒ. j. ceræ, & ladani. q. s. ut fiat cum resina, ceratũ. Roborant item theriaca, mithridatum cum diamoscho, diambra, gallia muscata, alypta muscata: moscus, ambra, zibetum, & denique ea emplastra, quæ pro matrice ex his, & pulueribus supra dictis cõficiuntur, & in plerisque huius operis c. variè cõposita reperies: maxime quod recipit, pulueris granæ, & gariophyllorum, an. ʒ. j. pulueris rosarum, coralli, & angelicæ, an. ʒ. j. pulueris mastices, & sanguinis draconis, an. ʒ. ij. ambre, & musci, an. g. x. ladani depurati, & ceræ. q. s. ut fiat emplastrum: roborat quidem mirum in modum, & genituræ retentioni opitulatur, renibus adhibitur, & prope inguina, ac umbilico. Robur quoque utero addunt faculi ex herbis siccis, ex aromatis, & pulueribus. Sed efficacissime id beneficiũ præstat cucurbitula, frictio, fomentum, & suffusio: & ultimo astringentia prædictis aromatis admixta, quæ comprimunt facultatis, & cõtentricis deiectionis munus suppleant, & exequantur. Quorum omnium maximam siluam, c. de sistendis mensibus reperies, ex quibus & nuper dictis facile tibi erit varia effingere medicamenta. Hoc in unum in omni corroboracione adseruabis, quod si imbecillitas in distemperie, quæ actum facultatis præsternat, sita precipue sit, ijs maxime utendum erit auxilijs, quæ aduersus distemperie iuxta cuiusque naturam pugnent, eo quæ diximus modo: verum si debilitas in spirituum resolutione, aut caloris innati dispendio cõstiterit, ut defessus, & laboriosis feminis, & ijs, quæ frequenter pariunt, accidere scimus: ijs, quæ calfaciant caloremque, & spiritus ad uterum euocent, aut vicem caloris innati gerant, utendum est. Si verò uteri substantia laxior facta fuerit, minusque firma, ac robusta ad actiones, quam par sit, astringentibus studendum est id munus adimplere. Quas equidem medendi rationes qui exactè nouerit, facile prædictis discet uti pharmacis, & ex eis, quæ usus propria fuerint, eligere, & cõponere, aut mutare, vel addere, aut demere, iuxta femininæ, aut uteri affecti, vel affectus conditionem: quod si hæc ignorauerit, fateatur se non posse, etiam si mille noscat medicamenta utero proficua, aliquod utile, aut necessarium effingere.

De



IN CREDIBILE profectò est, quali & quanta dolorum varietate circa vterum, & eius partes conqueri fœminas conspiciamus: ita vt sine alterius affectus à quo dolor oriatur, qui peculiarem prærequirat curationem complicatione, solus ipse dolor suam curandi, aut (vt rectius loquar) mitigandi ratione expostulet. Frequenti enim obseruatione nobis còpertum est, et si dolorie vehementissimi sint & grauissimi, affectionem tamen, seu solutionem contnsui leuissimam, aut q̃ paruissimam, doloribus solùm proficiscētibus fœuissimis ex partis dolentis natura, vel ex causæ malitia, quæ hac potius ratione, q̃ vt continuum dilacerante, dolorem excitat, leuissima facta solutione. Cui consimilem dolorem in hemicrania & alijs importunis capitis doloribus, frequentissimè reperimus: qui sanè ex leui humoris, vel halitus portione sola ipsorum malitia grauissimos cruciatus excitat. Quod proculdubio in vtero frequentius adhuc contingere est æquum: nam & causæ maligniores, & venenosiores ibidem existunt, & particula non obtusioris sensus. Itaq; de his tantū doloribus hoc in loco agere, mihi est in animo, qui vterum affligūt citra affectus complicationem, qui peculiari sui rationem requirat prouidentiam, uelut est inflammatio vteri, ulcus, inflatio, & alij consimiles morbi, quorū inferius meminero, & dolorum, qui ab eis proficiscuntur.

Causa.

Doler quidem vterus citra manifestum affectū, ad quem dolor reduci possit (præter dolorē ex sanguine menstruo non fluente, aut improbè expurgato, cuius curationem adduximus lib. 1. cap. proprio) ex halitus à semine, sanguineve menstruo corrupti malitia, vel ex eorundem copia, quæ aut distendat vteri vasa, aut abradat, & mordicet eadem & vteri corpus. Non quidem vtcunque, sed addita et venenosa affectione, quæ doloris malitiam adaugeat, & animi quoq; passionem maiorem inferat, ita vt nullis videatur auxilijs cedere. Doler itē vterus ex grumoso sanguine, qui dolorem proculdubio duobus modis inferre habet: primò ratione corpulentia, qua angusta vteri vasa permeare nequit: quo fit vt in via manens, fixos, & acutissimos inferat cruciatus: si uerò permeet, non minores, caterū uagos, à quibus aliquando quiescit, præsertim grumoso sanguine excreto: secundò lædit grumofus sanguis uitio & malitia non leui, quamobrem dolore simul & animi accidentibus & anxietate fœmina premit. Alijs quidem uterus ex inæquali plenitudine dolet, eò quòd in diuersis partibus diuersam obtineat plenitudinis rationem, & copiam, quod plerunq; acerbissimi doloris causa existit. Sunt quoq; fœminarum nō pauca, præsertim inter uiduas, & eas, quæ ante uiro assueat, nunc se abstinēt, quibus dolores, & cruciatus ex coitus priuatione succrescant: quippe semen præter consuetudinē retentum corrumpi, & uasa plus iusto dilatari ac tristiari, delectationis et defectu contingit, quòd semen illud uterū ledere malitia & copia necessum sit. Item plerisq; dolor accidit ex acerbis & erodētibus humoribus cū sāguine mēstruo dilabētibus, q̃ aut copia & acrimonia mordacitate illata, cū uteri aut pudēdorū pruritu, dolores ingētes, potissimū mēstruo instante, inferunt. Nec minus dolore

Alore afficiuntur feminarū quædā, dum viro accedunt, si uterus à qualibet causa intumuerit. Quod Moschio lib. Gynæciorum, c. 19. exprimit dicens: Si mulieris loci doluerint, aut vulua p coitum punctiones senserit, sciant, sibi vuluā in timore esse, magis tñ in interiore parte, q̄ foris (& subdit) Huius rei signum est talis oculorum anguli dolebunt, & facies ignea plusq̄ pallida, & hoc vitū erit beseunt medico fateri. Qd sanè malum existimo plerunq; fieri in fœminis, quæ obstructione vteri, p̄sertim colli eius, laborant, ob plenitudinē quidem pudendarum partium, & vteri ex sanguine propter obstructionē ibi dē immorantem: quippe dum quiescunt partes illæ etsi plenitudine premantur, non dolent, cæterum mote coitus exercitio, dolent: haud secus q̄ in lassitudinibus, in quibus maiores sunt moto corpore cruciatus, q̄ quiescente. Sic etenim in huiusmodi fœminis plerunq; sanguis profluit, vt refert Hip. lib. de sterilib. dicens: Si verò à coitu inum ventrem dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semen tuls i & muscum mollem, & adipē anserinum, mixta ac molli lana excepta imposito. Quod vitium, dum sanguis prosilit, censeo in extimis corporis partibus esse potius, q̄ in intimis. Eandem prorsus affectionem humores acres, sed in parua quantitate, efficere cōperimus, quos dum virile pudendum mouet, certum est graues dolores excitari. Solent quoq; cruciatus haud leues efficere externæ causæ, veluti frigiditas aeris, vtcunq; uterum subingrediatur: itē infessus in loco frigido, aut nimis humido, ablutio pedum intēpestiua ex aqua frigida, uel nudis pedibus in loco frigido stare: maximè dum menstrua fluunt, aut mulier à partu purgatur. Nā ut 14. de usu partium Gal. testatur c. 3. uteri ceruix recta, & adaper ta est, cum aliis temporibus rugosa, & plicata existat, quod ut 3. de facul. na. c. 3. ait, plurimum facit, ut facilius sit frigori aditus. Porus et frigide intēpestiuus, maximè si fœmina calidior ex tempore, aut exercitio, uel igne steterit. Aceti & acidarum rerum usus, aut lactuce, uel acetariorum immoderantia. Quibus proculdubio causis, & alijs non paucis, quas breuitati consulens prætermitto, dolores, qui iure sibi curationem exposcunt, fieri comperimus.

C Nolle q̄ studet huius affectionis causas, primò doloris modū expendat opus est: mox durationē: ultimò symptomata, q̄ illi accidunt: nā ex his tribus facile in causæ cognitionē deueniet. Dolores ex copioso flatu dignosces ex tēsiua doloris cōditione, ex rugitu inferioris ventris, & ex cruciatibus, ac exacerbationibus p̄ interualla factis. Qd optimè Hipp. insinuasse cōstat, p̄ hæc uerba: Si dolor solum fuerit vehemens, & uiolentus, caligo in uteris inest, & flatus nō exit, sed iste hic manet, malum. Qu i et causam cognoscere docet idē autor li. 2. nuper adducto dicens: Si uentus in uteris fuerit, flatus exit, & stridet, & tota intumescit, & febris habet, & ardor, & adhuc ualde exilit præ dolore, & uirū nō admittit, & ægrè fert coitū, & erigi non pōt, & uelut onus graue ipsi in uteris iacet, & caput dolor, et anxia est, et loqui non pōt: si uerò dolor accesserit, clamat, et dolet oīa, et lumbos, et pubē, & sedē, et urina supprimitur, et uenter suffocatur, et mori cupit, et p̄cordia distenduntur, et stomachus mordetur, et os amarum est, & uomit acida, et pura, ac metaca, et frequenter ructat, ac melius habet, sin minus intumescit, et si attingeris, renititur, et dolet. Proficisci et huiusmodi dolores ob malam flatus qualitatem scimus, & ex animi aliquo uitio, inquietudine, anxietate, iactatione, et exolutione. Grumosū esse sanguinē inter alia signa, dignosces

Signa,

R ex

A quæ superius retulimus vtendū est, pmissio tñ enemate, qd cōsimiles hēat vires. Alterū verò anodynorum genus eorū est medicamentorū, q̄ contra doloris causam ē directo pugnare habent: n̄ euacuant, digeruntq; quod in parte cōtēn-
tū est, & dum quantitatis, aut qualitatis, rōne dolor excitatur, certant quidem
aduersus vniūscuiusq; excessum, frigidū calfaciendo, & calidū refrigerando: ac
si venenosa steterit, malā qualitātē corrigendo. Quā nobrem nōllē oportet cu-
iusq; doloris causas, vt iuxta cuiusvis naturam proficiat auxiliū adhibeamus.

Sic dū ex flatus copia nobis cōperū fuerit vterum dolere, p̄dictis verò ano-
dynis ea cōmiscere studendū est, q̄ aduersus causam pugnant: & sensum immi-
nuta anodynorum copia, solis q̄ causam superant adhibitis, p̄dicta ratione in-
stitutes, donec aut ad expurgans medicamentum, aut ad sanguinis detractionē,
si affectus postulerit, deuenias. Quæ sanē opera iuxta eas partes facies, q̄ vte-
ro sint p̄ximiores, vt Hip. vī cōsulare li. 6. pop. par. 6. tex. 4. dicens; In doloribus
p̄ximum ventrē aperire: n̄ eo tēpore, nisi quid aliud phibuerit ab his venis, &
p̄ eas partes, q̄ vtero sint viciniores, euacuādum est. Primum itaq; clysterē in-
Bicies ex decocto althææ, anethi, seminis lini, chamæmeli, seminis, & radicis an-
gelicæ, menthæstri, & artemisii, additis melle, & hiera picra cū oleis anethi, li-
liorū alborū, chamæmeli, de semine lini, de baccis lauri, & alijs huius cōditio-
nis. Vel in ipsum vterū inicies decoctū origani, petroselinī, nigellæ, cumini, sin-
sichi, iuniperi, danci, helenij, apij, anethi, anisi, sp̄cæ nardi, nucis, cinnamomi,
smyrni cū modico vino. Mox a clystere injecto, si affectu nō quiescerit, fo-
netis ex p̄dicto decocto vtendū erit spōgia plurimū expressa, aut velica exceptis. Itē
inunctionibus vteris ex eisdē oleis cū oleo cinnamomi, vel amygdalarum dul-
ciū, in quo semina, & radix angelicæ ferbuerint: p̄stat & oleū de naphtha, de ias-
minis, de styrace, & balsamo. Præter hæc, emplastra vtero adhibebis ex p̄dictis
herbis in puluerē redactis, decocto aliquo flatus discutiente ex cumini, aniso,
anetho, galanga, gariophyllis, & similibus cōfecto. Idē quoq; beneficiū p̄stabis
si ex pulueribus nup̄ dictis, & ouorū vitellis cū oleo liliorum alborū cataplas-
ma cōfeceris: quē vsum p̄stat euaporatio ex p̄dicto decocto excepta: itē cucurbi-
tula cū multa flāma ventri imposita, si menstrua purgationes nō instent, neque
fluant. Maximi ēt semper fuit momenti, vmbilico emplastrū aliquod p̄ matrice
Caffigere, cōfectum quidē ex tecamacha, & caranna, styrace liquida, balsamo, la-
dano, cinnamomo, & pulueribus radicis, & seminis angelicæ cū oleo de baccis
lauri, de cinnamomo, & cū gallia, alypta, terebenthina, & cera. Vel vtrunq; ven-
trē inunges oleo de angelica, de aniso, de cinnamomo, de gariophyllis, & de pi-
pere: vel p̄dictorū aromātū, aquā arte chimica instillatā porriges. Præstat nō mi-
norē gratiā siccorū fomentorū vsus ex lineis, & laneis pannis sup̄ calfactis, ex
sacculis quoq; cōfectis ex puluerib. herbarū, seminū, florū, & radicū, quas nup̄
diximus. Qd si hæc prodesse nō videantur, vtitur consilio Hip. li. de nat. mul. di-
centis: Si vterus dolet alij caput integrū, & nitrum tostū, & cuminum teritū,
& melle subacta subdito. Cuius ē p̄cepto paulò inferius suffiabus ex p̄cedē-
no, aristolochia, panace, & similibus vtendū est, vel euaporationib. ex decocto
ligni guayaci, qd maximi esse momenti arbitror, p̄sertim si femina morbi galli-
cinā nūā redoleat. De yride quoq; ferri, i. sām p̄ r̄ are pessō impositam, ac eius
dolores sedare, vel emplastro adnot. menses itē euocare, & abortum facere.

R 2

Quia

Quia tamen ex pituitosis recrementis, vel flatus eleuantur, vel vterus dolet, ob id ea clysteria sunt adhibenda, quæ cap. de vteri hydrope scripsimus, maximè si addideris vinum, vel in decoctione, cortices fabarum, & lupinorum, aut lixiuiæ aliquid, si laborans valde sit humecta, fugiendumq; ab his quæ sal recipiunt, ne ocysimè ad excretionem virgeant.

Si tñ febris accesserit, quæ neq; calore proprio id mitigare possit, neq; remedijs effectio cedat, ad sanguinis detractionem confugiendum est, præcipuè ex partibus superioribus, si menses nō instauerint: nam eo tpe ex vena tali mitiendus est, ne dolorū vehementia vterus inflammatione periclitetur. Quod si neq; febris neq; ardor, neq; menses imminētes instauerint, ad purgationem ex hiera simplici Gal. pilulis de mastiche, aut syrupo ex infusionibus rosarū cū modico agarico deueniendū esse consulit curandi ratio: q̄ docet plus præualere crassos, & viscidos humores, à quibus flatus eleuantur, q̄ calidorum, & discutientū phar macorū vehemētiam, q̄ sepe maius damnum, q̄ incommodum sequi soleat, corpore, aut vtero impuris existentibus; Si verò aliquid eorum, q̄ flatus discutunt præbere volueris, nil subinde nocebis, veluti est vini optimi parum, vel decoctum seminis anisi, cumini, dauci, gariophyllorū, cinnamomi, & similiū, maximè si calidū actu sumatur. Prodest, & puluis prædictorum seminū, vel diani son, diaciminō, & aliorum, q̄ his sunt simillima. Sed ex vtu inter oīa potissimū est aquæ vitæ modicum, vel aqua cinnamomi, q̄ à Lusitanorum Indijs asportatur, ex flore ipsius arboris, aut ex cortice instillata: quæ est apud nos chimica arte ex cinnamomo extrahitur. Verūm si ex flatus acrimonia, aut malitia dolores concitentur, veris anodynīs vtendū quoq; est, admixtis tñ alexipharmacis calidis, cuius naturæ est theriaca, mithridatū, semen angelicæ, vel eius radix, & huius naturæ alia, quæ superius cap. de hysterice affectibus à nobis dicta sunt. Quem quoq; vsum præstat oleum cinnamomi, angelicæ, garyophyllorum, piperis, & anisi, quæ etiam deuorata ex vino, prodesse scimus; Sed maximè aquam ex theriacā extractam, cuius meminimus, lib. de febre maligna.

Si tñ ex grumoso sanguine cōcretōve, aut efficiēte inæqualē plenitudinē vterus doleat: præter quā q̄ huius causæ quoq; meminimus, lib. 1. ca. de menstruo cū accidētib. id proculdubio semper est in curatione obseruādū, vt partes vteri laxētur, & viæ patētiores fiāt, & sanguis tenuior, ac plenitudo æquabilis reddatur. Qd fieri oportet, vt Aetius cōsulit li. 4. Ser. 4. c. 63. p. ea medicamēta, q̄ cū vapore humido calfaciāt, & modicè attenuēt: ob id fēminā in loco calido reponi iubet, & femora ac vteri regionē vaporib. fomentis, inūctionib. & balneis modicè calfacere. Ceterū si prædictæ plenitudinis aliquid superesse cognouerimus, sanguine prius missō, vt c. adducto diximus, ad eadē auxilia cōfugiemus cōnantes euaporationib. partes dilatare, laxareq; eadē inunctionib. & modicè attenuātib. pharmacis grumofum sanguinē attenuare, & insecindere. Quamobrem adhibitis decoctis, q̄ mox attulimus, veniendū est ad inūctiones ex oleo de croco de spica, de vitellis ouorū. de lilijis, amygdalarū dulciū, & de semine lini, maximè si in his duob. vltimis ferbuerint methastrū, anethū, semen aut radix angelicæ, cortices citri, aut cinnamomū. Conferunt euaporationes ex prædictis herbis aqua, & oleo decoctissimè fementa, & sacculus, ex eisdem. Theriaca quoq; prodest vmbilico, & imo ventri illita cum oleo sesāmino, naphthæ vel de croco.

Sed

A Sed euaporationes huic vsui cōmodiores conficiuntur ex iure pingui galli veteris decocti cum multo croco, & cinnamomo, gariophyllis, semine lini, althea, & fœnu græco, qd maximi fore momenti existimo. Præstat possumere haustum aquæ feruentissimæ, vel decoctū seminis angelicæ: itē theriacæ 3. j. aut 3. l. cum vino, vel p̄dicto decocto, vel iure galli veteris ex croco, cinnamomo, passulis, & ciceribus cōfecto, vel aquā theriacalē, aut cinnamomi, anisi, gariophyllorū, & dauci, quas arte chimica in duplici vase extrahes. Rutā quoq; (inquit Actius) trita, ac melle excerptā & panno lineo inductā pubi, ac pectini impositā, p̄desse cōperimus: sicut & clysteria ex p̄dictis decoctis, ruta, fœnu græco, & aliquo ex p̄dictis oleis admixto. Cōferunt potissimū in plenitudine in æquāli cucurbitulæ citra scarificationē inguinibus, ac femoribus adhibite, vel si hæc nō p̄fuerint, cum scarificatione ex vlu erunt: sicut hircudines parti scarificatæ affixæ, sed p̄cipuē hemorrhoidibus. Verū si huic affectioni aliquid animi pathema succrescat, per alexipharmaca superius adducta mitigare oportebit.

B Dolores autem, qui ex erodentium, & mordacium humorum præsentia suboriuntur, nullo alio auxilio citius mitigabis, q̄ potibus & fomentis humidis, & calidis, earum p̄teritū rerum, q̄ mulcebrē, & mucilaginosam obtineat substantiā. Ob id quidē prodesse scimus infelliones decocti fœnugræci, seminis lini, althææ, ac radicū maluarum, & althææ cum semine citoniorum, & psyllij. Itē fomenta ex eodē decocto: inunctiones ex pinguedinibus, & oleo amygdalarū dulcium, sesamino, de semine melonum, & cucurbitæ, potissimum si in eis mucilaginem seminis citoniorum, & psyllij extraxeris. Conferunt et clysteria ex p̄dictis, potius item aquæ calidæ, aut vsus amyli. Quoddā hæc minus q̄ par sit, p̄sint, ad purgationem citò te conferes, quam institues iuxta ideam humoris peccantis: qua facta eisdem vitur auxilijs, & per interualla iterum corpus purgabis, sed præstat pessus, qui recipit opij aliquid dum diu ibidem nō immoretur: prodest qui paratur ex decocto capitum papaueris in p̄aso, vel oleo rosarum cum medulla ceruina. Itē vnguentum rosaceum cum succo plantaginis, & intibi. Deniq; vniuersa mitigandi ratio in hac causa stat in ac temperamēto humorum, retussa eorum acrimonia, ac in mixtione alicuius optimæ substantiæ cum humore acri, & mordaci, ac vltimò in expurgatione superabundantis succi. Sic profectò in hac & reliquis dolorum causis victum institues, in flatibus tenuē, & calfacientē, in hac verò causa, optimi & multi nutrimenti, ceterum fluidioris substantiæ; reliqua verò ad victum pertinentia, causæ natura monstrabit.

C His tñ, quibus uterus dolo ob viri accessum, subuenire oportet iuxta naturā causæ dolorē, aut tumore excitant's. Sic etenim si ex tumore intus recōdito dolor suboritur, p̄ter generalē prouidentia, peculiariter huic malo medeberis, vt Moschio libro Gynæcorum docet his verbis. Mulieris lac, q̄ masculinum peperit, cum oleo rosaceo æqualiter misce, & calefacito, & hinc fac pessarium de lana molli, & appone vsq; ad caput vuluæ. Verum si sanguis à coitu exeat, p̄ceptū Hip. seruare oportet, qui lib. de sterilib. vt superius retulimus, inquit; Si verò à coitu immū ventrē dolet, & sanguis recēs ipsi apparet, lini semen trium & muscam mollē, & adipē anserinū mixta, ac molli lana excepta imposito. Reliqua verò p̄ causā rōne ministrabis, sed nullum aliud auxiliū efficacius reperies, quā sanguinis detractionem ex hemorrhoidibus, vel ex talo, maximè cum san-

R 3 guinis

guinis abundantia in uteri collo, malo causam præstiterit, à quo quæ emol-
liant, & digerant pefaria administrabis, vel ea quæ vterum leuiter expurgent.

Curabis verò eas, quæ ex aliqua externa causa dolent, si pugnaveris aduer-
sus cuiusque causæ naturam oppositis auxilijs. Calfacere enim vterum per cly-
steria, inunctiones, & fomenta, ex usu omnibus fuit: & ob id inspecta causæ
natura, facillè cuius erit, proficua auxilia excogitare.

Veruntamen si his omnibus factis, adhuc perstare dolores (ex quavis causa
prodeant) videantur: tertio anodynorum genere uti erit necessum, quo narco-
tica auxilia contineri dictum est. Eò enim vehementiæ dolores sæpe veniunt,
ut nullum aliud subsit refugium, quàm ad hæc stupefacientia pharmaca deue-
nire: & ob id ad philonium Persicum, aut Romanum, vel syrupum papaveris
confugiendum est, ea lege quam nos adduximus, lib. 2. nostro de præsid. indi-
ca. ad quem locum confugiendum est.

De uteri hydropis.

Cap. 15.



INTER omnes antiquos viros specialius Aetium uteri hy-
dropis meminisse constat. Quam sanè affectionem finitimam
ei, quæ in ventre fit, esse proficitur, eamque fieri ex aquoso
humore, à sanguine menstruo retento, procreato censet, ac
generationis modum explicat, dicens. Vesicas in utero præ-
dicto humore aquoso plenas gigni, quibus vterum in tumo-
rem eleuari necesse est. Ego amen hydropem uteri diligenter considerans cen-
seo, in extremitatibus vasorum, quæ ad vterum terminantur, aut prope ipsa os-
cula ex humore illo aquoso per vasa sanguine menstruo obstructa, instillante,
fieri pelliculam quandam, unam aut plures, quæ tunicæ uteri adhærescentes,
postea mucore quodam implentur, indiesque a prædictorum vasorum osculis
maiores huius humoris, aut excrementi copiam recipiunt, & vterum ac infi-
mam ventris regionem in tumorem hydropi similem eleuant. Quem equidem
tumorem aliquando in toto ventre apparere, aliquando in altera eius parte
conspicimus, iuxta locum, cui prædictæ pelliculæ adhærent. Item posse fieri
ex Arabum sententia inter tunicas ipsius uteri, aut (ut rectius loquar) modo tu-
moris pituitosi, in tunica ipsiusmet uteri, sicut fit in testibus aquosus tumor,
evidenter constare arbitror. Est sanè morbus in magnitudine, qui & difficulter
curatur, & multorum accidentium causa existit, quem etiam scimus constare
ex inundante humore pituitoso, crasso, viscido, & in vasis uteri copiosius ad-
hærescente. Quippe obstructis vasorum osculis ex prædicto humore, nil mirū,
si ob eius redundantiam totus uterus in tumorem eleuetur: maximè in fœmi-
nis, quæ aut pravis cibis utuntur, aut ex partu malè corpus gubernarunt. Alijs
quoque accidit pseudohydrops, cum videlicet in rugis, aut sinibus uteri pitui-
tosum aliquid & viscidum adhæret ea copia, quæ in tumorem maiorem ute-
rum eleuari cogat: quod vitium in ijs, quæ a partu, vel a mensium immodico
fluxu plurimum potus, & alimenti ingesserunt, contingere scimus.

Causa.

Causam Aetius arbitratur tñ esse diuturnam mensiū suppressionem citra cō-
ceptum: quā proculdubio potissimam esse inficiabitur nemo. Cū hoc tamen
confi-

A considerandum est, suppressos menses huic malo non utcumque causam prestare, sed dum humiditates abundant viscidæ, quæ in uteri tunicas instillantes adhærescentes, quæ in pelliculæ naturam degenerant, quam postmodum aquosa substantia replet. Cui quoque malo causam prestat femina in victu, & potu intemperatissima, cuius iecur caliditate pollet, quanta necesse est inesse, ut resolutis partibus tenuibus illius humoris, concreseat predicta tunica: quippe raro, et si diu menses in feminis supprimantur, hanc affectionem reperiri contingit, quod non semper hæc omnes causæ in unum coeant. Fit et (ut dictum est) hoc malum ex inundate humore frigido intra uteri vasa ea copia, quæ uterum in tumorem eleuare possit: ite ex eodem humore in rugis, & cauitatibus uteri redundante. Dimitto ex flatu quoque fieri posse, quia id non ad hydropem, sed ad inflationem pertinere creditur. Contingit non minus ex vera hydropem fieri, aqua ex sinuosa, & abdominalis regione, exco, & latente itinere in uterum prolabente: aliquando ex iecore, aut splene vitiat, velut vera hydrops: ac frequenter à vena cava in uterum sanguinis serum instillante principium sortitur.

B Docet quidem Hipp. lib. 1. de morb. mul. signa, quibus in cognitionem huius affectus facile deuenire possumus, simulque causas recenset: inquit enim; Si aqua intercus uteris adnascatur, menses pauciores, & prauis fiunt, & ante tempus deficiunt, Signa. & imus venter intumescit, & mammae solidae, molles fiunt, & lac nullum, & putat se in uentre habere, & ex his cognoscet quod aqua intercus est. Sed & in uterorum osculo significationem de se præbet, ad tactum enim gracile, & humidum apparet, & rigor ac febris corripit: quanto magis tempus processerit, tanto magis dolor habet imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem ac inguina, (& subdit.) Hic morbus ex abortu fit, sed ex alijs causis, & cum menses fuerint occultati, contingit et non raro pregnantibus, cuius affectionis eodem lib. hæc uerba refert; Si hydrops in uteris fiat, menses pauciores fiunt ac deteriores, & per longius tempus, & pauciores quod oportet, aut paulo plures, & uenter intumescit, & locus supra pectinem, & tibiæ, & lumbi. Vbi uero multum temporis processerit, & in uentre habuerit, corrumpit ac eiecit, & aqua cum ipso fœtu affunditur, & mulier perit; moritur, sanguis autem corrumpitur, & aquosus redditur. Predictis quidem consimilia uerba idem autor refert lib. 2. de morb. mul. dicens; Aqua intercus si in uteris fiat, menses prodeunt arenosi, & aquosi, & non ualde cruenti, intumescit, & uterus, & uenæ, & propinquissimæ partes, & pregnans fit, deinde suffocatur, & mammae fluunt, & imus uenter durus est, ac intumescit, & omnis circum circa locus, & dolet, si quis ipsum attingit, & febris ac stridor dentium corripit, & dolor uehemens laterum mollitudinem ac lumbos, & semen in somnis effundit, & peius habet. Tamen præter hæc signa, quæ ab Hipp. afferuntur, distinguens etiam uteri hydropem ac cognoscet, quod femina sic affecta, plerumque boni est coloris, & in cæteris sana, quia iecur in ea affectione non patitur: uerum si id compati et contingat, mirum non est, si & color mutetur, & ipsa deterius se habeat, tanquam ex complicato malo. Vterius item cognoscet non ex tumore solum, sed et quod imam uentris regionem occupet tumore extenso iuxta uteri amplitudinem, ad differentiam tumoris ex fœtu, qui acuminatam efficit figuram. Est præterea is tumor latus ad differentiam tumoris, qui ex scirrho, aut qua uis alia uteri duritie proficiscitur: status quidem si præsumunt, murmur in utero uagatur.

R 4 Cæterum

Ceterum, ut dissideat ab uteri inflammatione, gravitate ambulando infert, A
& non leuē spirandi difficultatē, & alia non contēnenda cordis, & cerebri accidētia, & aliqñ aquosum quid p pudendum instillat. Itē in hac affectiōe alui excrementa, graueolētia sunt, & menses aut oīnō supprimūtur, aut inordinatē procedunt: & nonnunquā, maximē vehementia aliqua præcedēte, corpuscula quādā prodeūt albā, fetida, mucosa, aut aquosa, syncera, aut sanguini pauco, tenui, aquoso, aut subalbido admixta. Differt ēt à vero ventris hydrope, tumoris loco, quia in eo venter primò intumescit superiore eius parte: in hoc verò, primo in parte inferiore: atq; ex illo ad imas partes descendit paulatim, in hoc verò sensim crescit, & ad supremas partes irrepit: in illo præcessit aliqua causa, quæ iccori vitium intulerit: in hoc, citra ipsam: ēt si (ut dictum est) à vero hydrope nonnunquā proficiatur. Quod si color vitietur, sanguinis quoq; fontē vitari constabit. In illo ēt color mutabitur ad pallidum aut plumbeum, vel subalbidū, in hoc verò femina boni sæpe est coloris, & aliquandiu rubicūdior existit ex sanguinis reſeti copia. In illo itē pedes in tumorē eleuātur, in hoc verò manus, & māmē intumescūt: ēt si in illo nō solū crura, sed & totū corpus motui, & reliquis actionib. ineptū, & languidū ac deiectū efficiatur, in hoc quidē crura præ uteri pondere ad motū veluti impedita existunt, quia supra inguina incūbit tumefactus. Dissidet ab inflatione uteri, quia, in inflatione vter us tactui tēsus apparet, in hoc verò mollis, & flaccidus. Distinguitur ēt à tumore inflammationis uteri, dolore, febre, & alijs innumeris accidentibus. Vltimò tñ in aliquibus plurimū aquæ p vterum effunditur: qua excreta affectio subsidet, & venter detumescit. Curandi rō in huiusmodi affectu apertē monstratur ab Hip. lib. de nat. mul. p hæc verba; Si aqua intercus in vteris suboriatur, menses pauciores, & deteriores sūt, deinde repente deficiunt, & venter intumescit, & mammae sicce fiunt, & reliqua malē habet, & in ventre sibi habere vř; & ex his cognosces qđ aqua inter cutē laborat. Sed in ore vterorum significationē de se præbet, tangētib. aut gracile apparet, & calor, & aqua ipsam corripit. Quam autem tps amplius processerit, dolor inum ventrē, & lūbos ac laterū mollitudinē occupat. Ac postmodū eadem parte inquit. Hic morbus maximē fit ex abortu, accidit itē ex alijs. Præter hæc aut signa, & causas, curationē docēs, sic inquit; Cū sic habuerit, calida lauare oportet, & tepēfactoria adhibere, donec dolor sedetur: C
pharmacum aut deorsum purgans bibendū dare oportet, post pharmacū verò, vteros bubuli stercoreis fomento fouere: & postea medicamentū cū cantharide præparatū apponere; & interpositis tribus diebus, id qđ cū felle paratur. Quib. proculdubio verbis bellissimē exprimit peculiare curādi rōnem, eam reducēs ad mitigationē doloris, purgationē eius quod redundat, ac discussionem eius, quod ventri hæret: à quibus itē mēses pronocare iubet, & mercuriali plurimū vii. Verūm ex hac methodo indicatione sumpta, dū incipit, docetur primò sanguinem mittere: siue ex suppressis mensibus oriatur (quo tpe ex talo fieri est necessum) siue plenitudo subsequatur vtero prædicto mō obstrueto, ac si plenitudo magna fuerit, nullū erit inconueniens ante tali scissionem sanguinē ex brachio mittere, dū id parcius fiat: instituta prius optima victus rōne, exsiccatē nimis, modicē cal faciēte, & tenuis substantiæ. Potus sit ex decocto cinnamomi, feminis angelicæ, vel saxifragiæ nre, aut indice, quā assafratam appellant, aut indum

Curandi
ratio.

assafratam
in Hydrope
uteri

- A** indū feniculū. Quibus factis, modicè corpus purgare oportet ab ijs excrementis aut humoribus, q̄ per primū corporis regionem vagantur, manna, cū fistulari cū puluere anisi, lūtera simplicī. Gal. aut syrupo ex infusionibus, vbi subit deinceps locus pleniori curationi. Quam diuidere (deposita vī dīctū est, vtrāq; plenitudine) in duo nū membra æquū est: vñ quidem conuēta auxiliā, quæ vniuersi corporis pituitā, & humores crassos sensim, & paulatim vel coquere, vel euacuare, vel resoluerē habent: secundū verō ea, q̄ vteri timorē aut aperiuunt, aut disentiunt. Circa primū itaq; vbi subit phlegmago g̃s medicamentis locus, administrabis primò mel rosaceum, oximelitein. Syrupū de artemisia, de duabus aut quinq; radicibus, & aquis gallitrici, geniste, gentiane, angelice, saxifragie, feniculi, myricæ, & similibus, a quibus pillulis de malliche, de agarico, de hiera vti poteris, vel ipso agarico trochiscato cū diacatholice, vel dissoluto in syrupo infusionū rosarum, aut in ipsa infusione antequā cōficiatur syrupus. Cui quoq; vsui adhibere poteris electariū indū, vel diaphaniconis aliquid, iuxta laborantis naturā, & vires: quibus inspectis, aliquā māsī ex supradictis pillulis succo ireos efformare poteris. Prædictos itē humores p̄ interualla vomēdo purgabis semel aut bis ī hebdomada, exhibito leni aliquo vomitorio: quo fortassis vī, & impetu factō, nō erit ab re pelliculas rūpi, & per vterū, aquosum humorē prolabi. Purgare quoq; p̄ vrinā, & vterum ipsū prædictos humores curandū est, velut facies exhibito medicamēto, qd̄ recipit pulegiij. 3. j. cum modico piperis, aut gentiane vel origani 3. ij. seminis danci, vel smyrnij. 3. j. cum aqua multa formentur bucellæ, quarū summo manē sumat, 3. ij. aut. 3. j. In cibis tñ admiscere oportet aliquid huius, qui recipit hyssopi. 3. j. pulegiij. 3. ij. origani, cumini, an. 3. j. seminis amii, spice nardi, ana. g. xij. salis rosti. 3. j. misce, & vtere pro cibationū salsamento. Id quoq; bonū præstat mane singulis diebus sumere decoctum calamenti, pulegiij, rubræ tinctorū, sabine, leuistici, & artemisie cū saccharo, & melle facta leui ebullitione: ceterū sabine q̄ paucissimū inijcito. Conferunt non minus pleraq; ex ijs, q̄ in hydropicis aquas educunt, velut aqua raphani, saxifragie, gallitrici, & medicū decoctū radicis ireos in hydromelite leuiter facti. A quibus sanē medicamentis ad robusta exercitia laborantē deduces: nā hæc nō solum qd̄ in venis, & in ambitu corporis frigidū, crallum ac viscidum hæret, calore dissoluere p̄nt, verū, & totum id, qd̄ in vtero continetur, ruptis exercitij vehementia pelliculis, fundunt penitus. Balneis tñ naturalibus ex sulphure uel alumine laborantem cōmites: qd̄ si ad manum nō sint, ea domi parato decoctis ex lauro, cardamomo, pulegio, thymo, calamintha, cucumere asinino, genista, saxifragia, angelica, gallitrico, pilosella, milio solis, dauco, ruta, artemisia, mercuriali, & similibus. Interim tñ dum hæc fiunt, imo ventri adhibeto q̄ aquas, & frigidos humores dissipant: quæ proculdubio secundā indicationē cōplere diximus: veluti sunt emplastra ex radicibus aut folijs ebuli, vel inunctio ex oleo irino aut laurino, in quo incoquatur ebulus ipse: itē unguēto ex succo eiusdē ebuli, uel sambuci. Sed peculiari efficacia prodest emplastrum de baccis lauri, & de stercore caprino, aut bonino: conferunt, & inunctiones ac fomēta præcedenti cap. adducta, additis oleis de radicibus lilij, aut ebuli, de cinnamomo, de pipere, de aniso, de angelica, de gariophyllis, quæ sanē arte chimica probè extracta mire prodesse scimus, sicut

vr: vñ.

Balneor. An.
Hic in vñ.

per

per os sumpta pondere. 3. j. cum vino, aut stillatitia ex eisdem aromatis aqua. In vterum infundenda sunt, q̄ menses ciunt, & sanguinem euocant, vt sunt decocta granorum gnidij, vel ipsum granū gnidiū cū modico melle, & oleo irino, vel ipsum oleum cū aluminē ac si in vteri sinu pituita redūdauerit, addere decocto oportet gnidij g. x. cū modico melle, vel agarici aliquid: nam dū in venis prædicta pituita inest, per ea, q̄ menses, & vrinas, & vomitum aut aluū mouēt, tutius vacuabis: eam verò, q̄ intra vterum alicui parti adhæret, per pharmaca, quæ abstergunt, & abluunt: cæterū si in pelliculis conclusa maneat, per ea, q̄ rūpunt, vel apposita, q̄ exteriūs humorē ebibunt, qualia sunt, quæ nuper adduximus. Itaq; ablues vterum aliquo ex prædictis decoctis cū melle, aut saccharo, si putredinē, aut calorē in ipso præesse comperiamus. Clysteria ēt, quæ apud pleurosq; scriptores hydropicis proficua habentur, maximi momēti fore arbitror, potissimū si ab ipsis pessaria adhibeas, q̄ ex semine mercurialis cū modica myrrha, sale ac melle cōficiūtur. Fiunt, & alia maioris momēti ex colocintidis 3. s. salis 3. j. carnis pinguiū caricarū. 3. j. Alia item fortiora cōficies ex ciclamine, euphorbio, nigella, esula: q̄ sanē omnia alijs mitioribus esse admiscēda cōsulo. Ferunt insuper nō cōtemnendi auctores, 3. s. ellebori albi lana exceptā, & vtero impositam, protinus plurimā aquā extrahere. Sic, & aliud pessariū cōficies, qđ recepit, seminis mercurialis masculi q. s. myrrhæ modicū, salis, & mellis modicū, & lana excipiātur. Reperies profectō alia nō pauca apud Aetiū, quib. liberē vū poteris, si aut reperaueris, aut alijs mitioribus admiscueris, aut eorū quantitātē imminueris. Vltimo tñ si neq; hæc oīa prodesse videantur, fontanellam altero, aut ambobus cruribus adaperies, p quā natura aquosum illū humorē paulatim instillādo expurget, qđ protul dubio proficū, & necessariū sūm opere auxiliū fesse arbitror. Qđ si ante placuerit tibi optimē preparati g. iij. adhibere: ex vsu acies, at si probē cesserit, iterato eo vteris: nec mirū erit si solo hoc præsidio, vter dissoluatur, si femina anhelosa nō fuerit, & pitui tē plurimū redundauerit.

De vteri inflatione.

Cap. 16.



CONTINGIT quoq; fœminis non paucis vterum inflatuosum tumorem eleuari, qui (præterquam, quod morbus est in figura ex quantitate adaucta) ab vteri hydrope, & ei consimilibus affectionibus non leui differentia dissidet, vt ex Gal. 14. metho. apertē videtur constare: nam inquit; Inflationes verò ex flatuoso spiritu collecto nascuntur aliàs sub cute, aliàs sub membranis, quæ ossibus circundantur, aut musculos viscerumve aliquod includuntur. Porro colligitur aliquando etiam non parum in ventriculo, & intestinis, itemq; in medio spatio horum, & peritonæi. Quò fit, vt constet differre ab hydrope, cuius locus est inter omentum, & peritonæum. Differt quoque inflatio ab œdemate, quòd appressa digitis non retineat vestigium, sed sonitum veluti tympanum reddat. Erit igitur vteri inflatio tumor prætor naturam ventris inferioris ex vtero in tumorem seu magnitudinem maiorem, à flatibus ibidem inclusis eleuato: qui sanē spiritus, aut in vteri cavitāte, aut in poris, & vasis eius recondi, & immorari habet.

Causa. Causam verò huius tumoris esse flatuosā substantiā ambiget nemo, præterquā q̄ Hip.

A q. Hip. id ex professio docet, li. 7. popu. dicēs; Plurimas vteri affectiones flatus faciūt, signū sūt ructus, & strepitus circa vētrē & lūborū, tumores & dolores circa renes & coxas. Ex qua snia haud obscure cōstabit, si verū est plurimas vteri affectiones flatus efficere, quantō rectius inflationē. Sed posse flatum ipsum varias nācisci causas euidenter pbat Gal. li. 3. de cau. sympt. dicens: Flatū generatio est in ipsis, q̄ in vētre sunt, locis, succis, q̄busdā pituitosis, vel cibis inibi de ficiēte calore in halitū solutis: q̄ppe sincera frigiditas prorsus halitū non facit, qd̄ scilicet ea oīa, neq; attenuat, neq; cōficit, neq; alimentū dissoluit: fortis autē calor cum lōgo intervallo nutrimentum superet, amplius q̄ p̄ halitu generando id attenuat, nisi tñ flatuosum sit natura. Et vt clarius, reddat suæ doctrinæ institutū, adducit exēplum dicēs: Quēadmodum. n. externis rebus videmus, vt frigidissima cōstitutio, maximē spirante borea, aerē sereniorē reddit, ac calidissima p̄ astatē constitutio ambientē nos aerē purum efficit, mediæ verō constitutiones nebulas pariunt: ita in animantibus accidunt. Neq; n. calor p̄ extremam imbecillitatē, neq; cū vehementer sunt ei vires, sed cū mediū inter has affectiones obtinet, flatum gignere pōt. Et subdit paulō inferiūs. At calor, q̄ in cibos agit quidē, ceterum diminutē, is eos quod imodo soluit, nō tñ prorsus conficit, atq; hinc oritur flatuosus spiritus. Atq; is cū p̄ os excernitur, ructum creat, cū p̄ sedē, sonorum silentemve flatū, cum verō neutra parte emittit, symptoma creat, qd̄ inflatio vocatur. Itaq; ad eduliorū naturā, et ad caloris impotentū flatū causam reducendā fore censet. Quō fit, vt in vtero quoq; eadē rōne flatus ipsum distendentes, et in tumore eleuantes gignantur: facto nimirū vtero ab aliqua causa externa, vel interna solitō imbecilliore, vel humore crasso, et frigido ibidem p̄ter naturā retento. Quibus etenim causis accedunt quoq; externæ. nā vulgatū est medicis, p̄cussione, aut ictum vterum imbecillitate. Sic ambientis frigiditas, q̄ menstrualē, vel quotidianum effluxum phibeat, p̄sertim, si incautē a partui viuat fœmina, & vtcunq; frigiri se exponat, qd̄ tunc magis accidit, cum in vteri orificio sanguis grumolus impingitur. Itē partus frequentia, vel nimius labor, aut vteri ad aliq̄ suum cōuersio, vt naturalis effluxus prosperē fieri nō possit. Præterea menstruorum retentio diuturna, si tantā copīā regulare nequeat natura, aut retentorū crassities, et frigiditas, quibus naturalis calor sufficere nequeat id quoq; d̄ inum moliri proculdubio possunt. Q̄d ē non minus alimentorū crallorum, frigidorum et flatulentorum vsus efficere poterit: vel intempestiuus aquæ frigidæ potus. Neq; oīno tradendum est obliuioni, posse quoq; id malū fieri ex iccoris vitio, sicut tympania, quod ex hac causa prodire cōperies ex iccoris vitiatī signis, q̄ superius adduximus. Sunt et huic affectioni cōcausæ q̄dā, q̄ potissimē ad inflationē efficiendā concurrunt, velut est retentio huius flatus ex quauis causa genitus sit. At retentionem hanc moliantur dux aliæ causæ, nimirum dēstas, seu spissitudo partis, vbi flatus intercluditur, aut ipsius vaporis, seu spiritus crassities, quarum causarum altera discussionem interdicat, altera verō rennit. Quæ proculdubio dogmata Gal. loco citato a. 1. 3. metho: et flau. li. 4. his verbis manifestant. Membrorum densitas, cum spiritus simul crassities efficit, vt idem spiritus non dissipetur, quo fit vt inflatio parri accidat.

Docet Hip. p̄dictam affectionem cognoscere lib. de nat. mul. hæc referēs verba. Si inflati fuerint vteri, et venter attollitur, ac inflatur, et pedes intumescunt,

&

*sincera
frigiditas
cum dū*

*retentio
flatus
ex huius
causa
causa est*

& caua faciei partes. Color verò iniocondus fit, & menses nō fiunt, & genitura hoc tēpore nō fit, & anhelat, & anxia mœret, & cum surrexerit, ac progressa fuerit, erectæ cervicis respiratio ipsam tenet, & quicquid ederit, aut biberit, ipsam molestat, & gemit, & magis agrè tristatur, q̃ priusquā ederit, sæpe verò et suffocatur. Cui consimilē snām li. 2. de morb. mul. in hunc modum refert. Si vteri inflati fuerint, venter attollitur, & inflatur, ac sonitum edet, & pedes, ac caua faciei partes intumescunt, & dolor iniocondus fit, & menses occultantur, & genitura hoc tēpore nō manet intus, & anhelat spumatq; ac anxia est, & cum experscitur ex semno, recta ceruice spiratio ipsam corripit, & quicquid ederit, aut bibit, ipsam molestat, & suspirat, ac tristatur magis. q̃ priusquā edat, & suffocat, & nerui contrahuntur, & vteri, ac vesicæ dolent, & manus contactum non admittunt, neq; lotium emittunt, neq; geniturā admittunt. Sed præter hæc signa, sufficere quodammodo videbantur, prædictam affectionem cognoscere ex ventris inferioris, & pectinis tumore, quæ si tetigeris, sicut in tympanite, sonitū percipies cum dolore, extensio in, & qui ad pectinē, & inguina, & aliquando ad septum transversum, & ventriculum pertingere solet. Qui dolor præterq̃ quod non semper eadem vehemētia viget, pungenti similis existit, & ad varias partes permutatur, ita ut lūbos, & caput et perieie visum sit. Quod si in caua vteri parte steterit flatus, rugius in ipso sentiuntur, perinde ac in intestinis, & aliquñ cum crepitu per pudendū excernuntur: vrina itē accidit suppressio, & vigilia, præsertim vigente menstruo. Verū si in angustis perositatibus ac rugis sit, dolores vehementiores fient, diuturniores, & agrè curabiles existent. Studendum ultra est, hanc vteri inflationem à tympania distinguere. Contingit quidem in hac mitior sitis, quam in tympania, & vires minus labuntur, & corpus minus deiectum est, ac præsidia magis prosunt; & superiores corporis partes non ita extenuantur ac in vera tympania. Item hæc per intervalla crescit, aut decrescit, & quodammodo videtur posse curari, illa verò minimè.

*Curan-
di ratio.*

In hoc quidem affectu præmittam Hip. lib. de natu. mul. adductā curandi methodum, quam paucissimis verbis depinxisse constat, dicens; Cum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & calida lauato, ac fomētū adhibeo: interposito verò tpe quodam, apponito ea, à quibus purgetur, & non mordeatur. Frequentissimè verò totum corpus fouero, tum aut, & sub pudēda & odorata si ficiantur, sub nares aut graecolentia, & potiones dato, quæ vteros purgant, & ad locum compellunt. Qua sententia vī primò docere, opus esse crudos succos, à quibus flatus eleuantur, ex purganti pharmaco euacuare, mox fementis flatus ad partes extimas euocare, ac resolvere; & si quid humoris in vtero superest, ipsum per vteri regionem educere, & calidis si sitibus flatus in vtero cōtentos resolvere. Verū ne quid huic tractationi deesse videatur, specialius curationē hanc expendere oportet, initio sumpto à quodā Gal. documēto in curādis inflationib. 14. metho. adducto: inquit enim; Inflationū oīum diversa ab ædematis curatio est: & paulo inferiūs subdit; Indicatio autem curationis oīum est, ut qd præter naturā est, vacuetur, in quocūq; id cōtineatur. Propria verò post hæc cōe est, ut tenuissimis, & calidissimis potestate medicamētis: atque ventriculo quidē, & visceribus oleū, qd tenuiū est partiū, quodcūq; hētinco-


etam,

- A** ſcā, aut aliquid calidorum ſeminū, cuiuſmodi ſunt cuminū, & apij, & petroſeli
ni id preſtabit. Aliqñ verò, & cucurbita magna bis ter ve ſine inſciſſione medio
ventre affixā. Ataq; hæc eſt Gal. medendi rō. Cum hoc tñ ſi quis velit recta cu-
radi methodo vti, primò expendat, qualis pceſſit ſtatus cauſa, q̄ triplicē a prin-
cipio huius ca. cōſtituimus, videlicet, oculutionē eorū, q̄ expurgari ſolēt, & hu-
midorū copiā, ac vteri ipſius impotentiā. Sic proculdubio curationis ſcopus erit
caloris ſubſtantia roborare, craſſam materiā, & eius vaporē extenuare, & mea-
tus vteri, in quo vaporofus ille ſpiritus cōtinetur, aperire. Porro poſteriora duo
nepe, denſi corporis rarefactionē, & craſſi ſpiritus attenuationē, iſdē oīno au-
xilijſ allequemur: medicamētis ſanē tenuitate partiū pollētib. ſive extenuatib.
& calfacientib. iuxta partis affectū & dignitatē, & ſpiritus craſſitiē. Quamobrē
pro cuiuſq; natura curadi methodū ſcribere opus erit. Sic dū ſola vteri imbecil-
litas, & caloris innati paupertas ſtatus cauſa extiterint, ſolis ijs, q̄ ſtatus carmi-
nādī ac digerēdi vires habēt, mox à principio huius affectus vtendū eſt, velut
ſunt calidæ inunctiones, fōmēta, cucurbitæ, clyſteres, & huius cenſus pleraq; q̄
B cap. præcedenti, & aliās ſæpe diximus. Expurgantia etenim medicamēta, præ-
ualente huiuſmodi cauſa, plus habent vires deijcere, & ſtatus augei, q̄ benefi-
ciū aliud præſtare. Ob quam ēt rōnē in prædicta cauſa modicē calidis, & mu-
to tpe adhibitis vteris, ne facultatibus factis imbecillioribus ex immodica cal-
facientiū immoderantia creſcat indies affectio magis. Verū ſi ex frigore ambiē-
tis, aut potius, id malū oriatur, audacius calfactorijs vti poteris, qualia paulò in-
feriūs referā. At ſi ex ſuppreſſione menſiū vterū inflari contingat, mihi non eſt
dubiū, quin vniuerſam curandi rōnem à ſanguinis detractioe auſpicari oport-
reat: parçē tñ, ne malū ob id augeri cōtingat. Tandem depoſita, q̄ ex obſtructio-
ne pullulancerat, plenitudine, ad ea, q̄ ſtatus diſcutiunt, deueniendū eſt, admix-
tis ſubinde, quę laxare, & obſtructas vias aperire nata ſint, vt ſimul affectiois
cauſam, & affectū auferamus. Quod ſi ex craſſis humoribus, frigidis ac difficul-
ter coctilibus affectio ſuboriatur, prius leui facta purgatione ex hiera, pilulis
maſtichinis, vel agarico, elephanginis, aureis, & reliquis huius naturæ, item &
clyſterib. frequētiōrib. ex hiera cōpoſita cū ſucco mercurialis, & alijs, q̄ ſtatus
C diſcutiāt, vtēdū deinceps eſt iſdē pharimacis, q̄ ſtatus diſcutere nata ſunt, admix-
tis tñ, vel prius adhibitis (q̄ rectius eſt) medicamentis, q̄ inſcindāt, attenuent, &
abſtergant, vt ſimul humorē, & ſtatū ad vltioriē euacuationē præparemus. Sed
ſedādi doloris gratia multi probarūt, 4. 5. olei amygdalarū, præſertim amaranū
à quibus humorū præparationi innitendū eſt. Qua in re vtendum erit decocto
cicerū alterato cū cepis, apio hortenſi, qd vulgò petroſelinum appellatur, cila-
mintha, ruta, & cumino. Cui ēt vſuſ, & corroborāda virtutis gratia utendū eſt
quibusdā ſpeciebus aromaticis, & cōfectionib. ac electarijs huic rei dicatis, vt
ſunt diaciminū, dianiſon, aromaticū roſaceum, & ſequens conſectio, q̄ recipit
pulueris aniſi, maratri, carui, dauci, cimini, baccarū lauri, ſingulorū, 5. l. gario-
phylloſū, cubebarū, piperis longi, ſeminis rutæ, ſing. 3. j. liquiritiæ, 3. l. galægæ,
zingiberis an. 3. ij. niſi ſaccharo incruſcati, 3. ij. ſacchari li. ſ. fiat cōfectio in ta-
bellis. Seruabis tñ hoc unum in oībus cauſis, vt ſemper in quibuſq; medicamē-
tis anodynorū aliquid admisceas: quippe hæc præter alia bona, q̄ præſtant, par-
tem ſtatu diſſentā, æquabilem reddunt ac diſponunt, vt dolori ſit minùs obno-
xia.

xia. Ad flatus igitur discussionem deueniendo, q̄ vna est & cōis prædictis oībus A
causis, seclufa causarum providentia, eo, quo dictū est, modo: in primis vterum
inunges oleo chamæmeli, liliorum alborū, anethi, rutæ, vel eo, quo incoxeris
ciminū, anisum, hypericon, costum, cassiā, gariophyllū, cinnamomū, & his si-
millima: itē prodest, & infusio corū. Parabis eadem rōne fomenta ex eisdē oleis
vesica exceptis, vel ex decocto rutæ, dauci, menthastri, seminis angelicæ, artemi-
siæ, gariophyllorū, pulegij, calamēti, aut seminū prædictarū herbarū. Lixiuam
quoq; ex cineribus parare poteris, & spōgia exceptā vtero frequenter adhibe-
to. Aut inunctio ex oleis cinnamomi anisi angelicæ, gariophyllorū, & pipere,
vel baccarū iuniperi, aut vinū q̄ ardens chimistæ, ex iuniperi, sabine, edere, aut
lauri baccis conficiunt, q̄ ego in hac re magni momenti fore censeo. Cui ēt ma-
lo, & huic simillimis parari olea p̄nt, aut vina, vel stillatiua aque ex ligno gua-
yaco ex corticib. eius, ex ebena vel loto, & nō minoris efficacia ex gūmi aliquo
aut cōcretis lacrimis, vt succino, ammoniaco, thure, styrace, terebētina cōfectū
pretiosius arbitror. Sic, & balsamū præstat: & aqua vitæ, aut aqua theriachalis,
cuius meminimus lib. de cur. feb. mali. q̄ mille modis chimistæ artis periti pa-
rāt, ceterū hac in parte duas tm̄ eius cōposiōnes scribā: vt & huic affectioni, &
similib. præstare possint. Prima itaq; recipit cardamomi, piperis albi, & longi,
an. 3. f. galag. æ, macis, gariophyllorū, granorū paradisi, an. 3. v. ligni aloes. 3. ij. zin-
giberis. 3. ij. cinnamomi cubebarū, an. 3. iij. maioranæ, roris marini, menthæ,
pulegij, rutæ, saluiæ, nardi, asparagi, rosarū, rubearū, an. m. f. seminis cumini a-
grestis, 5. f. anisi, feniculi, an. 3. j. seminis coriandri, sinapis, a. 3. ij. seminis peoniæ
& cumini Romani, an. 3. j. seminis radicū enulæ cāpanæ, yridis, an. 5. j. foliorum
angelicæ, pimpinellæ, daronici, an. 5. i. dittami, 3. iij. sacchari candi albi, li. 2. sin-
gula conterantur, & ex vino generoso quinquies distilato, macerentur, in fimo
vel aqua calida diebus. 14. Deinde in alembico vitreo diligēter argilla cooper-
to, instillantur: & aqua instillatione extracta, iterum super feces mittatur, & in-
stilletur, quod quinquies facito: & postea adijce croci orientalis, 3. j. musci, &
ambra, an. ij. foliorum auri, 3. iij. Cuius guttulas tres, ex aqua buglosæ adhibe-
tō. Alia verò sic paratur: excipe radicū angelicæ, tormentillæ, zedoariæ, pim-
pinellæ, enulæ cāpanæ: dittami, an. 3. ij. cinnamomi, 5. f. santhali rubei, & lutei, C
corticū citri, an. 3. j. theriacæ, & mitridati, an. 3. ij. mosci, 3. j. f. q̄ omnia modo præ-
dicto macerentur, & ter solū instillantur. Quarum sanè aquarū in feminis frigi-
dis, flatulentisq; affectionis, vt in hydropē, imbecillitate vteri, & similib. magn⁹
est vsus. Itē cucurbita singulis dieb. vmbilico affixa incredibili efficacia iuuat:
quam consilio Aetij aliqui scarificabis, quod mihi haud innutile vī. Profunt, &
cataplasmata ex carycis, hyssopo, & nitro, vel ex eodem hyssopo, baccis lauri,
stercore caprino, & alijs, q̄ cap. præcedenti diximus. Utendum præterea est em-
plastro, qd̄ recipit bdellij, gūmi arabici, an. 5. j. seminis rutæ, seminis agnicasti,
centauri, abrotani, origani, calamēti, cassiæ lignæ, ameos, an. .j. & terebinthi-
næ quantū sit satis, vt fiat emplastrum duplex, quorū aliud parti antice: & aliud
postice, adhibero. Prodest, & emplastrū ex trifera cū theriaca, & pulueribus dia-
ciminii, & dianisi cōfectū. Idē quoq; beneficiū præstat decoctū, quod recipit ani-
si, maratri, & cinerū lignorū tauri, quantū sufficiat, & fiat decoctū exceptū spō-
gia, aut filtro, & ventri inferiori, adhibeto. Pari modo sacculos madentes eodē
decocto,

- A** decocto, vel siccos appones, quos cōficiēs ex parietaria, ruta, absinthio, artemisia hedera terrestri, abrotano, nepeta, foliis agnicasti, origano, calamēto, pulegio, sampſuco, thymo & serpyllo. Ex quibus et herbis balneum parabis nō parū profectū vtile: sicut eadem rōne sunt naturalia ex sulphure, vt Aetius aperire consulit, calidū primò adhibitu, mox verò frigidū, vt calorē retrocessione resolutio fiat maior, dūmodo sensim in frigidā aquā femina ingrediatur. Sumat itē sic affecta mulier diaciminon, dianison, diacalaminthe, dialpermatō, & diacircumā: sed vtilius est placētulas, aut morſulos hac lege conficere, accipe specierū diacircumā, diacimini, an. 3. iij. sacchari albiſſimi li. f. liquētur saccharū succo rutæ limpidiori, & in morſules digerito, à balneo vel summo mane vnū ingerat femina cū modico vino. Ex vsū quoq; est theriaca cū vino, vel aqua cinnamomi, anisi, radicis angelicæ, gariophyllorū, & macis, tā extracta per alembicum, q̄ per decoctionē parata. Vtatur, & summo mane decocto radicis angelicæ cū aromatico rosaceo, vel vino ex artemisia decocto, aut semine agnicasti, vel origani. Itē maximi pretij est potus hoc mō paratus, accipe malorum persicorum nucleos. xx. pistillo tunde cū ouorū duobus luteis, quibus adde galāge, cinnamomi, piperis lōgi, zingiberis, gariophyllorū, croci, nucis myristicæ, ana. obolum. j. adde demū saccharū, & vinum tenue meracissimū, & oīa feruere paululū finito, & calidū præbero, præsertim facta leui residētia. Pelluli deniq; vtero adhibiti viles existunt ex ruta, & melle ac nitro formati, item ex ficibus pinguibus cū cimini, & spuma nitri. Item alij, qui emolliendi virtutem habēt, hoc mō parati: bdellij, 3. i. & scyllobalsami, carpobalsami, colti. an. 3. j. origani cimini. an. 3. scōfice pessulos cū oleo nardino, & rutaceo, q̄ nocte integra in locellis persistāt. Per metranthitā verò in vterū infundendū est decoctum origani, foliorū viticis, rutæ, an. m. scōquito in vini albi, & olei, lib. j. ferueatq; vsque ad consumptionem vini, in colatura dissolue hieræ prieræ. 3. j. Refert et Dioscorides, apiū, & intus immisſum, vel exterius adhibitu, aut cōmanducatu, omnibus prodesse inflationibus, repurgato utero, & flatibus discussis. Quod et ferur de asparagis, addito in eorū cōdimētis cumino, & aniso. Sic, & de roris marini semine cum pipere, & vino epoto scribitur. Velut de ruta et siluestri, cuius folia trita, oleoq; liliorum incocta cum adipe gallinæ, vel anseris, si calida antroſum, & retrorſum vtero in modum emplastri apponatur, sicut bibitu maluarum semē, aut exterius vino illitu. Quibus sanē auxilijs in exacerbationib. vt necessitas poposcerit, vti poteris, sicut purgationibus, sanguinis detractiōe, & alijs, dum affectus aliqñ subsidere cognouerimus: nam vtrāq; curandi rō per interualla fieri desiderat. Verum ante oīa, omni exercitio moderato feminam cōmittes, & illi alimenta attenuantia, & flatūs discutiētia adhibebis, paucissimosq; potus, eosq; discutiētes porriges. Quod si hæc prodesse non videantur, balneis sulphureis, bituminosis, aut salſuginosis feminā cōmittes, tādē si malum vrgeat, & flatum intra uterum inclusum comperias, grandem cucurbitam cum multa flāma adhibebis, citra sacrificatiōē: quod si in vterum aliquid crassius sanguinis, præesse cognoueris, consilio Aetij vteris, qui ipsam scarificare iubet. quod arbitror proficuum summopere futurum, præsertim si prius cucurbitā aliqua violētia detraxeris bis aut ter, vt maiori efficacia flatūs discutiantur.

De



VM inflammationis nomine apud Galen. lib. 2. de arte cur. ad Glau. duo constet posse subintelligi, humidam nimirum inflammationē, & siccam: quarum porro, quæ humida est, ex calida fluxione vterum occupante, ortum ducit; sicca verò, quando nullo humore influente calor naturalis illius partis effervesceat, donec febris partis dici iure optimo mereatur. ob id profectò distinxisse prius oportet, cuius earum meminisse hac in parte sit in animo. Quæ in re asserimus, vteri inflammationem hac in parte nos appellare tumorem illius partis ex affluente humore in substantiam eius, à quamvis causa prouenientem: nam vterum ipsum in tumorem eleuari posse, vel ex hydropē, vel ex flatu, vel ex collectione, antea dictum est: quas equidem non esse inflammationes euidenter constat. Itaque dum vteri substantia ipsa plus iusto à fluente humore impletur, non equidem in vniuerso vteri corpore, sed in aliqua eius parte, inflammationem fieri, & appellari, censemus affectum sanè ad deprauatam figuram, & magnitudinem pertinentem, cui ob id soluta vnitas, ac distemperies associantur. Denique nomine inflammationis hoc loco eam dumtaxat intelligi volumus, qui fluxionis sanguineæ soboles est, in vteri corpus, & substantiam maxime incidens: in qua dolor est vehemens, rubor per summa uigens, calor velut deurens, tensio, renixus, & cum malum creuerit, pulsationis sensus: quem sanè affectum phlegmonem græci appellarunt. Neque credendum quidem est, solum ex sanguine vterum in prædictum affectum deuenire posse: nam id quoque contingit redundante cum ipso sanguine flaua bile, vel pituita, vel melancholico succo, ita vt & nomen, & accidentia humoris, cum sanguine exuperantis, accipiat. Præterea considerandum est, an humor, qui fluit (quicumque ille sit) iam computruerit, an in membro confectus vitietur, corrumpaturve: crassum, aut tenue, optimum, aut acre, vt Galen. libro secundo, de arte curandi ad Glau. optimè distinxisse videtur. Contingit etiam verum inflammari parte eius antica, qua vesicæ adhæret, vel postica, quæ recto intestino coniungitur, vel in parte quidem superna, & fundo, ac vltimò in cervice, eius osculo, & prope pudendum. Sed collectionis harum partium Moschionem, & Cleopatram meminisse quoque constat libro gyneci, cap. vigesimoprimum, dicentes; Ex præcedente nimio fervore aliquando in pinaculis ipsis, aliquando in sinu mulieris, aliquando in orificio matricis, vel intus in ipsa matrice collectionis emergitur cum febribus, vigilijs, dolore, horrore, & cum horrore punctiones, & grauedines pro locis, in quibus emerferit, collectio, & neque vrina, neque stercorea impediuntur. Pedes etiam cum corpore difficillimè moventur: nam & aliquando magnitudine collectionis tumor supra pectinem inuenitur digito obstetricis. Illæ verò, quæ in alto sunt, minus quidem doloris habent, & digito apprehendi non possunt: frequentius tamen organo patefacto mulierum, oculis videntur, & sudores in fronte, & in cervice calidi, & abundantes occurrunt. Quæ sententia constat cōplexos fuisse causas, signa & partium affectarum differentias: quæ omnia plurimum ad curationem profutura arbitramur.

Cause

A Cause tñ partim interiores, partim exteriores in hoc malo reperiunt. illę qui *causae*
 dē, pter ipsius impotentia, qua facilis ad recipiendum efficitur, velut tenuis est
 ac feruens sanguis, ex caua vena p exiles eius propagines in ipsam met vulvam
 pfusus: non quidē in eius cervicē, aut cauum, ardoremq; & putredinē expus,
 vt cōiter oēs inflāmationes fieri assolent, quas ex sanguine, demum pituita, bile
 flaua, aut atra gigni solere scimus. Sed in vtero specialius fit, cū multus sanguis
 affluit ad mensium purgationes, vel post partum retentus, q inflāmationē, p-
 culdubio, & putredinē parit. Cum hoc tñ credendum nō est, semen quantūnis
 retineatur, & putrescat, inflāmationē efficere posse, etiamsi conuulsiones, &
 suffocationē, ac grauissima alia accidentia pariat: quippe semen nō defert, neq;
 viget in ea parte, in qua licet putrescat, altereturve, collectionē, seu tumorē pter
 naturā efficere non pōt. Constat igitur, plerunq; hoc malū fieri ex mēstruo san-
 guine, q in maiori quantitate abundet, & vtero sit nutrimentū, res alioqui ad
 inflāmationes necessaria: siquidē p easdē uenas defertur ad partes excrementū,
B p quas alimentum, aut id, quod superest, deuehitur. Sed tñ duob. modis fieri hac
 in parte inflāmationē constat: ex sanguine nimirum, q ab alimento redundat,
 aut uitiat, vel ex mēstruo improbē purgato, aut intēpestiuē, & plurimum re-
 tento, sicut ex alijs vteri purgamentis (q salubriter uterus excernere assolēt) dū
 pter modum supprimuntur. Altera uerō inflāmationis causa est, q pdictis prin-
 cipium motus, & occasionē p̄stare habet, uelut est plaga, ictus, aut mensiū sup-
 pressio: frigus itē cōprimens, & coarctans uteri uasa, & eorum oscula, uteri quo-
 que inflatio, vel laboriosus partus, uel abortus, vt Gal. li. de humor. apertē doce-
 re vī. Quod et fieri contingit ex frequentiore cōcubitu, qui vteri virium metas
 ex cesserit: durior itē sedes, longissima & intenta ambulatio, p̄sertim mensibus
 instantibus. Verum quia ex causā, & loci affecti diuersitate frequentissimē ac-
 cidit tumoris naturā, & conditionē uariari, & in alias tumoris species inflāma-
 tionē degenerare, iuxta humoris peccantis ideā, ob id coniectandum est, inter-
 dum ex ea tumorē durum sensusq; expertē fieri, rarius cancerum, sepius tñ ab-
 scessum, vel fescipelas, aut oedemata, aliqñ in extimis, nonnunq in intimis, ac
C ceruice, osculi, uel eius corpore, vel in latus, vel plures partes, aut anticam, vel
 posticam supernam, q verticulum conscendit, vel infimam, quę in rectum in-
 testinum vergit, partem, quorum omnium signa expendisse oportebit.

Primò statim accessu in fēminis hoc affectu laborantibus pcipies muliebriū *Signa*
 locorum, pubis, imi ventris, ac lumborū dolores ardētes, q ad inguina, coxas,
 latera & costas et porrectus, vsq; ad clauiculas persentitur: ac ob septi transuersi
 cōpressionē, si magna fuerit, vteri suffocatio accedit, sin aliter, magna spirandi
 difficultas, q aliqñ imperitos medicos decipit, existimantes pleuritidis naturā
 referre, ob ignorationē consensu vteri cum septo transuerso, & clauicula. inte-
 gitur. n. peritoneo, & eo solo firmatur, ac retinetur à parte superiore; quare dū
 vltra modum distenditur, hæc et mēbra comprimi necessum est. Verum anteq̃
 hinc discedam, referendū mihi est, qualia huius affectionis signa attulerit Hip.
 qui lib. de mor. mul. 2. hæc scripta reliquit: Si vteri inflammati fuerint, menses
 obiorquentur, & ceruix multis tenuibus venulis ad telarum aranę similitu-
 dinem variegatur, & febris est acuta, & mentem præcellens, & menses parui, ac
 pauci ipsi comparent: quum uerò quid comederit, reuomit, & dolor occupat.

S imum

inum ventrem, & lumbos, & animo linquitur, & per totum corpus perfrigeratur, venter aut nunc durus, nunc mollis est, & incenditur, & attollitur, & putat se in ventre habere. Quoque vero ventris moles vacua apparet (quod ego intelligo dum affectus in hydropem mutatur) & aluus aqua impletur, & umbilicus prominet, & osculum gracile fit, & de repente apparent menscs stridentes, & pauci ac prauis, & attenuatur circa clauiculas, & collum, & pedes intumescunt, & praesertim pedum extremitates: horret et partes circa pudendum, pungitur, caput dolet, & sinciput, caligo adest, & sudor frontis, extremæ partes refrigerantur ac tremunt, & sopor profundus aliquando occupat, & audire non potest, neque reliqui sensus operantur. Quibus proculdubio simillima signa adducit eodem loco paulo inferius, studens monstrare vteri erysypelas. Nec mirum videri debet, tam esse varia huiusmodi signa, siquidem id proficiscitur ex vteri natura, & ipsius vario consortio, ac diuerso, & omnigeno corporis apparatu. Lib. tñ de nat. mul. dum ex partu occasione sumit inflammatio, hæc verba scripta reperiuntur. Si ex partu vteri fuerint inflammati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest, ex ventre vero nunquam deficit calor, & sitit, & coxas dolet, & venter imus fortiter intumescit, & aluus turbatur: scetellus, aut est malus, aut olidus, & calor vehemens corripit, & cibum auersatur, & dolor iuxta sinciput est, & venter stomachus non potest trahere cibos ac potus, & concoquere nequit. Qua in parte paulo inferius eandem affectionem refert, & curationem suo more scribit. Verum præter hæc Hipp. signa specialius rem expendere oportebit. Sic profecto huic affectui perpetuo febris succrescit ardentissima, sicut in alijs inflammationibus, ceterum in hac peculiariter per maximum consensum cum corde per arterias. Quod et lib. de humor. testatus est Gal. sed præcipue, lib. 6. populi. part. 1. com. 2. dicens. Cum tñ in vteri phlegmone haud ita multum accidere cernitur, licet febres validæ vehementes, & calidæ concitentur, ob quas lingua veluti à fuligine denigrescat: & subdit, Calidas aut vehementesque febres ex vteri phlegmone accendi, neminem in artis operibus versatum, præterit: ac reddens rationem refert id fieri, quia vterus plurimas grandissimasque venas habet, in quibus, aut prope ipsas si sanguis putrescat, febrem succendi, de synocharum genere necessum est. Sequitur & in hoc affectu gravissimus capitis dolor, isque maximè in sincipite, quod lib. et de hum. dixerat idem Gal. sed clarius lib. 6. populi. parte 1. com. 2. nam referens id fieri ex vaporibus à putrescente sanguine elatis, inquit, Verum capite quavis de causa horum vaporum pleno, gravitates maximè in sincipite, hominem vexantes apparere illis, quibus artis opera curæ sunt: & subdit. Primum igitur vapores illos calidos proximè dictos, per arterias in caput subuolare, ratio ostendit, ipsasque arterias per collum ab utraque vocati infundibuli parte, recta in sinciput discurrentes videre licet. Ac postmodum rationem cõtexit, per quam varij, & acerbissimi fiant dolores, nimirum per varietatem ac sensibilitatem partium capitis internam structuram efformantium: vnde oculos quoque dolere contingit, sicut ceruices conuelli, & pedum ac manuum articulos. Alui item, & vesicæ excrementa ob calorem, & siccitatem, & cavitatem, compressionem, coactionemve retineri contingit. Ventriculus ex consensu grauiter dolet, ita ut aliquando cardialgiam inferat. Pulsus parui fiunt, crebri, & ab exsolutione debiles. Verum in principio inflammationis errantes, & vibrantes, & aliquando ob febris vehement-

A vehementiam magni celeres, & crebri, quibus diluitur in Gal. dictis controuersia, lib. de cau. pul. & alibi. Quod si in penitiorib. locis uterus inflammetur, acutissimis doloribus excruciarum cum anxietate, & ex solutione contingit; si tamen in conspicuis, & externis partibus affectio succrescat, omni ex parte pulsatorie dolet; quæ sanè signa diuersis inflammationis temporibus, diuersimodè apparere contingit, vt paulò inferiùs docebo. Posteriore in super uteri parte inflammata, partes circa umbilicum dolere, & aliquando in tumorem eleuari cernimus, sed dolor circa lumbos excruciat magis, & alui excrementa ægriùs excernuntur, canini stercoreis (speciem referentia). Sic ubi cavitatis, aut fundum inflammatur, imi ventris acutus dolor ostendit, vt ne contactum quidem foris admittere videatur, atq; uterus plerumque ad inflammatum locum retrahitur; & ob id, os & collum eius auertuntur, differtque ab uterina suffocatione, ex febre ardentissima, & intenso partis calore. Si uteri anterior pars inflammatione tentetur, vrinae difficultas, aut stillicidium subsequitur, & grauis in partibus umbilico finitimis, & inferioribus dolor, & si digitus in os uteri submittatur, occurrit ad tactum durum, clausum, feruens, ac retractum, præsertim si in ipso, aut in collo fuerit inflammatio: quod etiam dolore, duritiæ, & calore à conceptu distingues. Lateribus verò uteri inflammatis inguina tenduntur, & crura grauitur, & ægrè mouentur, & quibusdam crus ipsum, quod è regione est, per incessum claudicat, quin etiam in coxam dolor transit, & in eadem parte cum grauitate sentitur, vt ex Gal. constare videtur, 6. de lo. aff. cap. 4.

B Cæterum fieri inflammationem ex sanguine cognosces, q̃ lingua nigrescat, delirium sequatur, vrina rubescat, aut subrubra existat cum liuore, pulsus magnus, plenus, vndosus, & venæ oēs tument. Flauam aut bilis dominari, ex oculis, qui colorem corticis malicini referunt, cognosces: sitis quoq; ingens adest, inquietudo, & anxietas maior. Verum tñ dum pus fieri incipit, dolores pulsantes, & febres augeri, est necessum: q̃ frequentes cum horrore sub vespere incurfant, & accessiones inordinatas habent. Accidit, & singultus, & prædictorū accidentium intensio, atque ipsa inflammatione augetscente, sequuntur animi deliquium, ex solutio, torpor pedum, genuū perfrigeratio, & extremarum partium sudor, conuulsio colli, pulsus exigui, & crebri, tandem delirium, & dentium ruginis. Quæ sanè omnia, pure confecto aliquantulum cessare videbuntur, & iterum inualefcere, ubi abscessus rumpitur: ac tunc quidem modò vrina mō alius, modò vtrique supprimitur: nonnunquā pubes intumescit, & profluentis cuiusdam rei, inundatio percipitur, ubi abscessus maior fuerit. Si tñ hæc eadem perstiterint viribus vtrunque labentibus, pulsibus inæqualibus ac debilibus, mortem potius quàm suppurationem vereri oportet. In scirrhum tñ inflammationem migrare cognosces, quia febris dolorque, & symptomata leuiora existunt, sic tamen vt tumor, & renixus grauitasque permaneant, totumque corpus non solum crura ad omnes vitæ functiones segniter moueatur.

C Ex quo proculdubio affectu his grauissimis accidētibus cōiuncto, vereri oportet moriē, vt Hipp. protulit, lib. 1. de morb. mul. dicēs pernitiosum esse morbū, & a quo vix aliqua euadit fortuna, aut in graue aliquod malum degenerat: nā decretum est, apud omnes autores, grauissimas esse uteri inflammationes, cum hoc tamen, quæ eius ceruicem obsident, facilius curari possunt: quæ verò

S 2 totum

totum affligunt vterum, nullo modo: sicut quæ fundum siue sinum eius occupant, periculose admodum sunt, quia ægrius, & tardius curationem admittunt in quibus omnibus conuulsiones superuenientes periculose sunt, & graves. Quod si erisypelatis particeps sit inflammatio, & fœmina grauida, lethale esse Hipp. lib. 5. pop. text. 43. refert: quanquam text. eiusdem, lib. 20. de vera inflammatione dubitatum sit, viuere ne possit fœtus: quod intelligendum est, de grandi, & venenosa, idq; ob febris, quæ succenditur, vehementiam.

ENIAN-
diatio.

Cum statutum firmatumq; sit in recta medendi rōne, et si affectus eiusdem sit naturæ, in eius curatione, partis situm, locū per quem adhiberi auxilia, aut fieri euacuationes debeant, monstrare, & partis naturā auxiliorū materiā seligere, & ab alijs partib. affectis distincta exposcere: ob id profectō licet inflammatio vnius naturæ sit in oībus partibus, in vtero tñ si steterit, non à quauis parte indistinctè exposcit sanguinem fundi, aut quamuis aliam vacuationem fieri: quæ prima, & comunissima omnium phlegmonarum, curandi via, est. Quamobrē in hac curatione præmittere partis cōsiderationē oportet, & mox affectus indicationē rimari. Vniuersa etenim curandi phlegmones rō, in prohibitione eius, qđ sit, & ablatione eius, qđ factum est, cōsistit, licet alijs verbis id quoq; Gal. proferat, dicens; Prohibemus quidē futurum, si corporis apparatū euacuationibus iuxta eius naturā factis minuerimus; ac rursus si id, quod ab eo iā in motu & fluxu ad partē est concitatum, ad diuersam, & maximē contrariam partē traxerimus. Quod verò factū est, & in parte receptū, ab ea repellimus, & per eā discutimus: aut in eadē suppuramus. Primum quidē sit frigidis, & cōprimētibus secundum calidis, & digerētibus: vltimum verò calidis ē, sed emplasticis medicamentis: quibus omnibus admiscēda sunt, q̄ mitigandi vires obtineant. Quæ propter, prohibita in principio *omni* immoderantia (vt à prima indicatione initiū sumā) ne furiosius humores intro irruant, vt Hipp. est præceptū, li. 4. pop. part. 4. ac. prohibitis ē crurum frictionibus, omni tñ quiete imperata, & alui excrementis leuiter depositis, victum omnino tennem porrigemus. Transactis tñ primis diebus, oua sorbilia, aut amygdalarū ex cremore hordei, vel amyllum, aut panem lotum, vel pullorum carnem imperabimus: sic in potu aquam hordei, vel sacchari, aut decoctū radice scorcioneræ, vel aquā auro ignito sepius feruēfactā porriges. Quibus, vt par est, administratis et si affectio sit in partibus inferioribus, à basilica alterius, vel vtriusq; brachij primò sanguinē detrahare oportebit iuxta vires, ætatē, habitum, aut anni tēpus. Quod sanē dogma perpetuū sit in hac curatione, nisi aut ex abortu, laborioso ve partu, vel nimia sanguinis profusione (à quacunq; parte sit) inflammationem prodire nobis cōpertū fuerit. Huius rei rō est, quia cōiectabile vī à supernis partibus, & sanguinis fonte fluxionē concitari, aut plenitudinē præesse, quam si prius nō deposueris, vel longissimē à parte affecta retraxeris, maiorem proculdubio in eadem parte fluxionem concitabis. Itaq; retractionis, & plenitudinis deponendæ gratia, primò brachiorum venas tundere oportebit: deinceps verò habito respectu ad id, quod ad partem inflammatam fluxit, vel fluere iam iā minatur, quod in venis insit parti affectæ proximis, sanguinē fundere ex malleolis opus erit. Quo sensu Gal. intelliges, qđ li. de sang. misc. c. 18. & li. 13. meth. c. 11. cōstāter affirmat in vteri inflammationib. venas, q̄ in talo sitæ sunt, scindendas esse. Cui decreto dicimus aliud

A aliud esse derivationē intēdere, q̄ ex proximis partibus fieri desiderat, aliud retractionē aut plenitudinis euacuationē, q̄ vel ex distantioribus, vel eis, quæ originī ac magnis venis propinquæ sunt, exercenda venit. Quā snīam hoc mō intelligendam esse Gal. consuluī lib. 2. ad Glau. ca. 2. dicens, Veluti in locis muliebribus in contrariū trahas, si eas, quæ in cubito sunt, secueris venas, aut m̄milibus cucurbitas apposueris, vel manus calfeceris & fricueris atq; ligaueris. Deriuabis aut, si eas, quæ poplitibus aut tali, venas dissecueris, & cucurbitas coxis applicaueris, & crura calfeceris atq; perfricueris & ligaueris. Verum si aut parua fuerit inflātio, vel corpus non plurimū plenum, aut menses instauerint, sat erit uenas tali insecundare. Est quoq; Aetiū decretum, cucurbitulas cū scarificatione dorso affigere, quas tunc adhibebis, cū dorsum plurimū doluerit; quæ coniectabile est, per uenas dorso adhærescentes, sanguinem ad uterum delabi.

Verum quia cuiusvis partis inflāmationes assolent aliorum humorum p̄ter sanguinem, non parū sibi admixtū obtinere, ob id facta sanguinis detractioe sufficiente, pensandū est, an alijs etiam auxilijs pugnandū sit aduersus humoris redundantiam. In quo planē casu nil tutius aut commodius reperiēs, q̄ rarū aut nunquā expurgantibus vti nā ad infimas partes, ubi affectus vigent & dolores, euocant humores alibi existentes. Quod si efficere tunc tēporis aliquid uolueris, leuissimū aliquo pharmaco purgabis. Nec displicet hac in re Auic. snīa, qui vomere h̄mōi seminas iubet: quod duplici rōne factum esse cenſeo, & retractionis, reuulsionisve gratia, & ut humores superuacui per distantissimā ab affecta parte regionē excernantur. Ceterū si aliqui syrups & potionibus vti ex mali vehementia cogaris, fugiendum omnino est ab ijs, quæ menses mouere possint, sed eos tantū porriges, qui aduersus humoris cum sanguine redūdantis conditionem pugnent. At si facta affectus inclinatione, cognoueris aliquem ex p̄dictis humoribus dominari, aut p̄esse, seligenti pharmaco, mitiori tñ facto, cū purgabis, cauens ne pharmacum sit ex ijs, quæ scimoneum uel colocintidē recipiunt: sunt enim hæc plurimū huic affectioni aduersa. Nosti iam ex ijs, q̄ antea diximus, quæ biliosis aut pituitosis uel melancholicis prodesse possint.

C Sanguinis igitur detractioe, uel lenioris pharmachi exhibitione premittā, ad ea auxilia ueniendum esse consulit rei ratio, quæ quodammodo vltiorem affluxum ac augmentum impedire nata sint: & si quid factum est, per insensibile halitum discutiant. Imprimis enim si erisypelatis inflāmatio particeps fuerit, quod ex igneo calore percipies cataplasmate uteris, quod recipit uitis pampinos, plantaginē, polygonum, portulacā, intibum, & umbilicum ueneris, quæ omnia pistata mediocriter calida & panno excepta, prodesse non parui solent. Insundes etiam in uterum succum aut stillatiōem aquam prædictarum herbarum, & postmodum inunctionem ex oleo rosarum & myrti cum pauco aceto parabis: cui si addideris succum plantaginis, summitatum uitis, semperuini jati consimilium, plurimū profueris. Quod etiam beneficium præstabis clysterium usu, dum eorum quātitas quam minima sit, ne uteri compressione actiores cōcites dolores. Id facies, si acceperis radicem altheæ ꝑ.ij. maluę, uiolarum, florum cucurbitæ, cucumeris uel peponum m. j. lactuca vel solam foliorum, m. j. prunorū numero xij. seminis lini ꝑ. f. florum uiolarum ꝑ. ij. decoquantur secundum artem, & ex decocto accipe ꝑ. vj. olei uiolacei uel rosarum

S 3 ꝑ. iij.

3.iiij. & infunde. Quo facto vtendum est cataplasmate à Gal. lib. 2. ad Glau. cons-
 tructo ex succo semperuiuij, sapa, vino austero, farina hordei & balauftijs, vel
 ex cortice maligranati. Prestat quoque incipiente phlegmone, auxilium, quod
 recipit succi plantaginis, folani ana. 3. vj. aceris 3. sanguinis draconis, boli arne-
 ni ana. 3. f. olei rosarum 3. ij. quæ omnia paruo excepta calida parui affectu impo-
 nenda sunt. Verum si astus maximus fuerit, prestat emplastrum diacullon cu
 rosaceo liquefactum in vase plumbeo, addito plantaginis, aufercos & inti-
 succo, facta ebullitione vsque ad spissitudinem. Item antiquiorum sententia e-
 stat, forum ex decocto cupressi, oleo rosaceo, & modico melle vtilem esse. Con-
 fert etiam mitigandi doloris gratia vnguentum, quod recipit cere alba 3. iij.
 medullæ cerui 3. j. adipis anseris 3. j. & croci g. x. Quem quoque vsum prestat
 forus confectus ex decocto, quod recipit radicis altheæ, maluarum & violarū
 ana m. j. florum violarum, chamæmeli & meliloti ana. p. j. fiat decoctum, & con-
 tundantur herbae, ac per cribrum transmittantur, facto foru, predictis adde farī-
 nę hordei, & seminis lini, & olei rosarum quantum sit satis, vt fiat cataplasma.
 Sed mitius id conficies ex micca panis cum lacte & oleo chamæmeli. Præter
 hæc autem, si nihil aut parum erisypelatis phlegmoni in esse cognoueris, adhi-
 bebis cataplasmata ex farina hordei, seminis lini, sænigræci, vitellis ouorum af-
 satis cum rosaceo, & decocto capium papaueris & meliloti, addito modico vi-
 no vel modice illico adeto: cui consimile efficies ex palmulis vino incoctis, fari-
 na hordei & oleo rosaceo. Item ex rosis, lentibus sine cortice, balauftijs, planta-
 gine, mucore pulicaris herba, solano, labro, veneris, sedo, ramentis encurbitæ,
 cum hordeacea, farina & oleo myrino ac rosaceo. Quibus omnibus admiscere
 oportet, si affectio vigorem adire cognoueris, quæ modice discutendi & dirigē-
 di vires habeant, velut est farina volatilis, seminis lini, sænu graci, chamæmeli,
 vel ipsius oleum, & ouorum lutea.

Quod si dolor plurimum eo tpe vrgeat, mitigare omni arte studendum est,
 maxime vnguento, qd recipit farina hordei & fabarū ana. 5. f. malua & uiola-
 rū post coctionē pistatarum ana. 5. j. caphura 3. f. macerentur oīa succo aut stilla-
 titio liquore labri veneris, & facta expressione adde olei rosarum 3. iij. bulliāt
 ad consumptionē expressionis, & addita axungia anatis & cera fiat unguētum.
 Cui consimile efficies, si acceperis chamæmeli, radicis altheæ, seminis lini, fē-
 nugræci ana 3. j. caricarū pinguium numero viij. dactylorum nu. vj. terantur q̄
 pollunt, & quippe ouorum luteis admisceantur, quibus adde uiolarum deco-
 ctum cum rosaceo, & facto emplastro, pubi apponito, digerit. n. & dolores mit-
 tigt. Verum si adhuc doloris urgentia persistierit, uteri osculo apponito pessā-
 riū hac lege cōfectū. Papauer viride tūdes & exprimes, cuius 5. iij. admiscebis,
 5. x. sapa, & coq; ad medietatē, & linteo exprime, & adde myrrhę & galbani, a-
 na 3. j. retrio, & postmodū adde medullæ ceruinæ & adipis anserinæ ana partes
 æquales, & iterū coque, & pessarium confice. Vteri etiam osculo adhibenda sūt
 pessaria, q̄ præter id, quod dolores leniant, quodammodo aut repellant aut dīge-
 rant, iuxta ipsius phlegmonis ætatem, in primis quidem ex polygono, sedo, inti-
 bo, umbilico ueneris, portulaca, plantagine, ac pampinis contulis cum rosaceo
 aut lentiscino oleo, uel de vitellis ouorū, anlesis pinguedine & exiguo croco.

Carerum si sedare dolores præter id studeris, hoc modo facies, sænigræ-
 cum

A cum mellefacito & prima ac secunda aqua diffusa, cum tertia pura ac dulci coquenda & excolato, & adipem anserinum addito, quod omnia ad prunas liquari finito, & ubi frigefacta fuerint, pessarium confice & butyro recenti inunge. Quod si dolor plurimum creuerit, lachryma papaveris exiguum cum lacte muliebri & succo fenugraeci apponito: alii et id admisceant rosaceo, ouo, & adipi. Fiunt praeterea huic usus utiles dilutiones per metraquitein, maxime ex decocto, quod recipies rosarum rubearum, lentium cortice reiecto, plantaginis, labri veneris, solani, & intibi ana m. j. & lentium p. coquito ad tertias, & in uterum protice ʒ. iiii. Idem quoque facies ex lacte muliebri cum rosaceo uel ex decocto hordei cum syrupo rosarum, portulacae aut saccharo. Praestat eundem usum oleum rosaceum solum, vel cum albumine ouium aquarum arnoglossae, coriandri viridis, aut hordei infundes, uel decoctum papaveris aut oleum eius, praesertim si id adhibueris, prope os uteri. Confert non minus collyrium album Rasis cum lacte mulieris, uel aliquo ex praedictis succis. Virgineis tamen sedere facito in praedictis decoctis, uel in eo, quod conficies ex decocto fenugraeci, seminis lini, maluarum, capitum papaveris ac hordei: verum in his, quae acriorem habent calorem, maxime circa morbi initia ex aqua modice calida cum oleo rosaceo infusus fiant.

B Quod si, ut dictum est, inflammatio inclinare coeperit, etiam per uterinos chlysteres, pessaria & infusus, ad ea venies, quae laxare & discentere possunt. Quia inter praedictis decoctis addito fenugraecum, altheam, semine lini, mucaginem psyllii, & seminis citoniorum, pulegium, sisimbrium & saluam, quo immergere feminam usque ad inum ventrem aliquando opus erit: & a balneo uentri appones hordeaceam farinam cum fenugraeco semini lini aqua mulla incoctam. Quo facto ad ea, quae magis digerunt (caute tamen & sensim) veniendum est, cuius naturae est cataplasma, quod recipit radices liliorum & bisnallae ana ʒ. iiii. maluarum m. j. artemisiae m. f. florum chamemeli & meliloti ana p. j. coquantur, & ut supra dictum est, pistentur & contendantur, quibus adde farinae fabarum & hordei ana quantum sufficiat, pinguedinis porcinae & butyri recentis ana ʒ. ii. olei chamemeli & liliorum ana ʒ. j. misce & cataplasma confice. Item huic usus utile est pessarium ex carycis pinguibus cum modico oleo & pinguedine gallinae ac pulueribus chamemeli, sisimbrii, sampsuci cum medulla crurium utriusque & ladanum ac styrace. In vera tamen declinatione emplastrum ex meliloto, vel addito diaquilone adhibere poteris.

C At si neque his omnibus, neque aliis, quae passim proficua experimur, in declinationem affectus venire comperiamus, rationi consonum est suppurationi naturam intentam esse, ut ex antedictis signis facile colliges: quibus accedit inaequalis horror & doloris exacerbatio, iuxta illud Hipp. dum pus conficit. Postremo vero ad suppurationem perducto tumore, impetus accidentium aliquantulum remittitur. Quo tempore ne in schirrhosam duritiem & aegre curabilem affectus degeneret, aut ne puris virulentia maius malum accersat, post maturitatem ruptionem quoque breuiter moliri oportet: ne diutius ibidem persistens pus maximam uteri partem corrodat. Quod facies adhibitis imo uentri cataplasmatibus ex fenugraeco, semine lini, farina triticea, sicibus elixis & terebinthina. Sed artificiosius conficies hoc modo: excipe chamemeli, meliloti, fenugraeci, seminis lini & radices altheae ana ʒ. j. caricarum pinguium, ana ʒ. iij. daetylorum, ana ʒ. j. redigatur in puluerem

q̄ possunt, & adde vitellos ouorum nu. v. & cum aqua decoctionis violarū fiat A
cataplasma, addito oleo rosaceo: qđ si immorari suppurationē cōperiamus, cō-
lumbini stercoris 3. viij. addere oportet. Itē iuuandæ suppurationis gratia, en-
chatismatis, & infessionibus vtendum est, p̄sertim pudēdi sinu adhibita spōgia,
aut suscepto vapore p̄ infundibulum ex decocto, cui vires insint trahendi, &
emolliendi qualia superius abundē diximus. Si tñ caloris tantum perferferit,
ut calidorū usum uerearis, emplastrū cōficiēs ex unguento rosaceo, maluis, &
radicibus althææ incoctis, & extractis p̄ fetā cū puluerib. scenu græco, uel solū
ex butyro, & maluis, aut ex rosaceo unguento, & carne radicū althææ. Quibus
suppuratione facta, abscessum dirumpere studebis, uel motu aliquo uehementi,
uel si ad pudēdum irruat, ruptorio instrumēto partis situ idoneo, cuius chirur-
giā, & modum pulchrē docuit Aetius li. 4. Ser. 4. c. 86. quāobrem illuc recurrēdū
esse censui. Dignosces aut diruptionis tēpus, q̄ cruciatus sæpenumero aciores,
stimulosi, & quasi cum aculeis inscindere videantur, caloresq; vehementiores
molestant: urina supprimitur, interdum & oletum: aliquñ tumor circa pubē ap-
paret, & tanq̄ exudationis sensus cum abscessus grandior fuerit. Neq; alia uia B
diruptionē curare oportet, q̄ corporis motu, uel adhibitis pessarijs, quæ rum-
pendi vires habeant, uelut est illud, quod recipit adipis asinerini 3. ij. resinæ, te-
rebinthinæ, ana 3. j. pulueris rutæ, & nitri, ana 3. siridis illiricæ 3. j. & cum lana
fiat pessarium. Cui simillima ex prædictis alijs parare poteris.

Rupto uerò abscessu, qđ ex eo cognosces, q̄a pus excerni cōpit, & dolores,
ac tumor subsidere, uidendum primò est, ad q̄ partē ruptio facta fuerit: nā con-
tingit nō rarò ex vesicæ uicina ad eum rumpi, & cum urina pus excerni. Sic ex
cōsortio cum recto intestino, p̄ ipsum quoq; pus excerni conspiciunt, maxi-
mè si inflāmatiō uteri, partes extimas attingat. Dum uerò pus urinae admixtum
excernitur, lacte utendum est asinino, & emulsionibus seminum cucumeris &
melonum: itē decocto hordei, & quatuor seminum frigidorum maiorū, muc-
lagine & serapio ex his cōfecto; sero lactis cum saccharo & syrupo uiolaceo.
Neq; erit ab re uti cassia fistula p̄ interualla cum semine melonum, & saccharo.
Si tñ p̄ rectum intestinum pus excerni uideas, frequentibus utitur clysterib. ex
aqua mulsa, uel ex aqua hordei cum saccharo, si caloris sensus p̄fuerit, aut ex
aqua plātaginis cū alumine & saccharo, cauēs ne aliqđ oleosum admiscēs. Cū C
hoc tñ cōficiēs alium ex decocto lentium, & malorum punicorum cum rosis,
& saccharo, aut olei momēto, si exosionē ex puris acrimonia fieri cōpereris. Vl-
cus uerò uteri p̄ ea, q̄ abluant, & calorē attēperent curabis. Ablues quidē aqua
mulsa, aqua hordei cum saccharo, lacte cum dupla aqua ordeī, aut mulsa por-
tione, uel lacte ipso cum aqua lentium, aut seminum maluarum & saccharo: Itē
tremor hordei, quē maximi momenti, cum aqua aluminosa admixtum, esse cē-
semus, aut ipsa aqua aluminosa, uel aqua portulacæ cum sero lactis, aut aliqua
instillata p̄ duplex vas ex his rebus nuper dictis. Verum si fors tulerit abscessū
rumpi inter intestina, & utrum ipsum, euocanda ad extimas partes materia est,
& cuius attenuāda scalpello, ferroq; ignito aperienda, & ut Aetius cōsulit, post
apertionē ea figura locabis sceminā, qua residuum puris commoditate situs, sua
sponte defluat: deinceps uerò aqua mulsa sectionem lauare oportet bis terve in
die, & uelut alia ulcera deinceps curare, ut c. de uteri ulceribus discēs.

Quòd

A Quodd si inflammatio œdematis particeps sit, aut pituita plurimum abundet, verendum quidem est, sanguinem detrahere, vel cum præmeditatione faciendum: postmodum verò ad emplastra, insersiones, fatus, ac fessos veniendum est, quæ cap. de vteri hydrope retulimus. Caterum frequentius purgabis, idq; magis per vomitum, quàm in vera, & exquisita inflammatione.

De scirrhuso vteri timore.

Cap. 18.

B VM perdifficile sit huiusmodi affectum curare, si factus iam sit, & uterus ex propria natura, ac menstruationis officio ei maximè sit obnoxius (quod cito eiusdè crassa existat, & fluxiones semel acceptas tenaciter seruet) ob id, pfectò non leui diligentia, neq; oscitanter feminas sic affectas tractare oportet. Scirrhii igitur natura durities quædã est vix sentiens, vt ex Gal. constare vñ 2. ad Glau. proindeq; scirrhum nominamus tumore durum, q sine dolore est, non tñ omnino sine sensu, vt ex eodè constat 14. medicum hoc tñ exquisitus, sensu oño doloroso caret, vt Gal. refert lib. diffinit; dicens: Scirrhus tumor est corporis cum duritie, & grauitate, & mouendi difficultate. Ex quibus finitionibus constat, scirrhii duplicè esse naturã, vt li. 1. c. vlt. abudè dictum est: alter quidem est exquisitus, & non exquisitus alter. Vtunque tñ sit, duobus modis vterum scirrho affici obseruauimus, nempe cum totum eius corpus in duritiem degenerat, vel altera tantum pars; ex quibus morbi natura, & particula affecta faciliè innoscit. Huic èt modo aliud non dissimile Paulus adiunxit, quod scleroma appellat: & ob id scirrho adiungere placuit, q̄ consimilem obtineat curã di rōnem. Scleroma (inquit) cōforme est scirrho, circa vuluæ ceruicē magna ex parte consistens, tumorem quidē habens eodē pacto, sed minus durum cum dolore mediocri. Est sanè vterq; affectus morbus in magnitudine, cum in genere tumorum pter naturã consistat: cui èt conuenit, morbu esse in intemperie frigida, vt apud Gal. 5. simp. c. 6. & 8. legitur, ac in soluta etiã continuitate. Verum si quis re penitus examinet, reperiet faciliè, duos uteri tumores longè inter se differre: quippe eorum nonnulli statim ab initio naturam scirrhii referunt: alij ex mutata, & indurata inflāmatione ortum habent: q̄ sanè differentiã ex humoris conditione contrahunt, ut mox probabo. Cōstat pterea alios differre loci affecti ratione: nam aliqui vteri ceruix quodãmodo (ut Paulus docet) induratur: qñq; verò vterus ipse in scirrhū intumescit, vel ima eius pars, quam frequentius affici, scimus: quandoq; pars eius interna: quæ pfecto affectio molam vteri emulatur: nonnunquamq; extima eius superficies.

Huius porro affectus duplices existunt causæ: quædam. n. sua sponte ex quavis materia scirrhum veluti manu faciunt: alia verò materiale principium præstant. Sic etenim ex inflammatione, q̄ longè à scirrhii natura dissidet, Medicorū imperitia duobus modis induratos tumores proficisci cōperimus: vno, vt Gal. refert 2. ad Glau. cum vehementer inflammationes, aut erysipelata astringunt, & refrigerant: induratur etenim hac via humor, & frequentissimè in immediabilem duritiem cōmigrat: alio verò, cum vehementer calida, ac discussoria medicamenta intempestiuè tumoribus adhibent: quibus proculdubio tenne, ac vaporosum faciliè euolat, crassum verò & terreste cōpactum, ac durius efficitur. Itaq; vt Paulus scribit, obdurefcit vterus qñq; sanè repente nulla p̄p̄cua

occa-

*duplex vñ
natura*

Causa.

*duplex itern
medici ex
inflāmatione
inducitur scirrhū.*

Crassa materia in corporibus fit quoniam a ter

occasione plerumque verò ex inflammatione, quæ processit & soluta non est, neque A
dissipata, neque in abscessum permutata. Materiam tamen habet humorum crassam, le-
vis, terrestris, ac difficulter solubile, qualis existit melancholia naturalis, quæ verum &
exquisitum scirrhum efficere nata est: tandem ex quavis alia quæ crassa quoque &
terrestris sit, scirrhum fieri, ceterum illegitimum, constat. Fieri etenim hæc crassa
materia in nostris corporibus, quatuor modis apud Gal. & veteres oēs comper-
tum habemus: primo quidem, dum melancholia naturalis ex aliqua occasione
admittitur, aut putrescit, & fit tunc teporis exquisita, bilis atra. Quam sanè eam ple-
rumque reperies in feminis melancholico sanguine abundantibus, & improbe
à mēstruo purgatis. Probat quidē Gal. hanc sententiam 14. metho. & lib. de atrabile,
& possimū 4. Aphor. comm. 21. & eodem 14. metho. dicens: Siquidem hic hu-
mor, ubi amplius incaluerit aut per putredinem, aut febrem, inflammationem-
ve nigram efficit bilem: quæ quidem frigida est, quia terrestris, sed tamen caloris
non expers, quemadmodum cinis, & acetum, ut in dysenteria ab eo humore or-
ta, conspicimus. Itaque, facile est hoc malum feminis, quibus ex feculento san-
guine vterus non purgatur, accidere, quia ibidem cōculcatus, sanguis incalcescit &
facile in duros humores sensim & paulatim migrat (quod deterius est) in universi
vteri duritiem: quia universi uteri venas eodem humore abundare contingit,
indē necessum est: secundo etenim modo, succrescit eis crassus humor in corpori-
bus ex aliorum humorum adustione, velut ex flauabile contingit, quæ cæscit re-
periri biliosis feminis, iis præsertim, quæ diutius & vehementius se se estivo exi-
stente Sole exercitijs dederunt: in quibus biliosum humorem aduri oportet, ac
febres & alia vitia concitari, quæ postmodum in scirrhosos tumores degenerant,
illique maxime in vtero, tū quia ibidem maior copia biliosi sanguinis ex mēstrui na-
tura redundat: tū verò, quia vterus ocyssimè incalcescit ab exercitio: & cum non ex-
purgetur superfluo sanguine, nisi singulis mensibus, & fortasse improspere, ob
id facilius adurit, & in scirrhosam duritiem commigrat. Quod pari lege contingit,
si sanguis aut pituita in corpore redundauerint, & eodem incaluerint, donec ferro-
re aut putredine contraxerint. Tertiò verò crassus humor in corpore accrescit,
dū ex frigidityte in lapidosam duritiem mutatur: ut cum ab imperitis Medicis, vel
Chirurgis erysipelata & inflammationes, aut quivis alius tumor ex naturali-
bus humoribus factus, ad motus extrinsecus præsidij, vehementer refrigerant,
astringunturque. Tunc enim totum id, quod in eis subtile erat, dissipatum vi valèter
digerendum; reliquum plus in isto desiccatum, lapidosam duritiem postmodum
ex medicamentorum frigidityte consequitur. Quod sanè non minus feminis
accidisse constat: nam dum uteri calore aut sanguinis, aut bilis abundantia labo-
rant, frigori sese imprudenter exponentes, aut potu utentes frigidiori, uterum
subito indurum tumorem elevari conspicimus nulla alia ratione, quæ superabundantibus
humoribus (à quibus fortasse resoluta erat tenuior pars ob dictum calo-
rem) conerescit, densis crassioribus ac frigidioribus factis. Quartò denique & ul-
timò melancholia non naturalis insurgit, quando alijs humoribus ipsi melancholia
naturalis permisceatur, maxime pituita, cuius adhefu melancholia, tenacior
& crassior efficitur. Quod item non raro feminis accidere scimus ex vitæ in-
temperantia & ciborum, frigidorum, usu: quæ lege mixta melancholia in
 prædictum affectum non modo degenerat. Atque hæc sunt in universum qua-
tuor

A tumor materiales causas, quas ad veram medendi rationem expendisse oportet. *signa.*

Nosces autem morbum ipsum in genere ex tumore duro tactui conspicuo ac citra dolorem: indicat. n. tumor solum manifeste. Præter id si femina sic affecta, ad motum tarda existit, non quidem solum cruribus vitio, sed & universi corporis, quod delidia ad exequenda munia corripitur. Accidit insuper ficatilis (si se recte non gerant) malus & huiusmodi corporis habitus: & plerumque in principio mensuris ex toto privantur, aut diminutos habent, & crescentem huiusmodi magno sanguinis fluore, saltem per intervalla vexantur, apertis plus iusto venarum ostiis, aut vieto nequeunte suscipere & continere consuetam sanguinis copiam.

Ceterum an à crasso glutinoso; huiusmodi ac pituitoso origine dicatur, vel ex nigro, quod veluti fex sanguinis existit, ex partis colore, videntur. Gal. lib. de jure m. præ. nat. e. & facile distingues: quod si nigrum signum huiusmodi tantum existit, quod obesse ex corporis colore facilius dignoscitur: namque si ex bile nigra oriatur, color totius corporis ad nigritiem declinat: habitus vero ex crasso ac lenta pituitate ad subalbidum, vel ad plumbi colorem vergit. Iteur etiam in quales in se habet humores, tales quod de tota corporis præstat, & tales in affectam partem delabi necessum est. Sic, procul dubio Gal. lib. de lo. aff. ex solo colore refert cognovisse splenem an iecur affertur.

B Cui equidem affectioni non raro adiungitur foetidissimus odor, aut ipsius exulceratis vel genitum impotentia, quod omnia in stomachi, & vel sceleris splenis & ventriculi gravissima affectione, plerumque succrescunt, ex halitibus rebus & vitiosis ab adusta bile aut vitiatum iecur vel squalido corporis habitu illud ascendebus. Quibus signis adtingere oportet ante acta vite ratione, ciborum usum, cuiusque humoris redundantis propria signa, ætatem & peculiare femininam naturam, & habitum, ut omnium facta coniectura in humoris redundantis cognitionem facilius deuenire possis. Sed in huius affectionis dignoscione non parum contingit medicos decipi, quippe cum affinis ei sit uteri mola vel scirrhus splenis tumor, ob id diligenter interno sciendum est, ne in curatio aberremus, verum horum sit, sed distingues humoris affectum à mola saltem ab ea, quod utero adheret, quod in calicet menses præcæ, non in ordinatè, ut in hoc affectu, in qua aut supprimuntur, aut ordinè habent si fluant, eo quod ex utero venis non paucè tumore obturent, ita ut non ea tuto possint expurgari: in mola vero aut non fluunt, aut inordinatè, idque aut copiosius, aut parvis quod par sit. Itum mola dum femina stat, in os pubis incumbit & mammae turgent lacte, in scirrhus vero, exrenuatur, & tumor non procedit, licet hinc inde mutetur ad uteri quoque mutationem. Præterea ab splene indurato distingues, quia licet ad varias partes splen decedat, variosque situs mutet amuleturque aliorum viscerum obstructions, ut non raro in hoc uteri affectu contingit, non tamen ob id credendum est, splenis tumorem esse, quia is vel corporis vitiat colorem, quod si id non faciat, quia solum iecoris affectiones id de iure habent, lædit tamen vel mentem, vel alium ex melancholicis generat affectum, quo monstrat splenem prave suo officio uti: affectionem vero esse in uteri corpore & non in ceruice distingues, quod in coxam & dorsum plerumque uteris incumbat; ibidemque dolorem ferat, at in ceruice esse, quia à viri accessu plerumque offenditur, & obstetricis digito attingitur malum, & apparet osculum duritatem quia frequenter ab incumbente vel comprimente tumore vesica, si in superiori colli parte sit tumor, lædit: aut rectum intestinum, si infima eius pars, vel alterum inguē, si in altero latere affectio existat.

Sed

ex colore
corporis cognoscitur tumor
hepatis.

obstructione.

distingue tu
signa scirrhi
mole

apud induram
hepatem.

Sed præter hæc, in quocunq; latere decubuerit laborans, illic quoq; tumorem adire citra dolorem, signum est non lene huius mali, vt Hip. refert, s. popu. in historia vxoris Gorgiæ, in qua equidem, etiam recessionem, & quod magis mirandū est, cum hoc concepisset: ceterū postea ex diutina profusione sanguinis a partu, male habuisse, tandem molā postea proiecisse, postquam sana facta fuit.

Curatio

Etiam si scirrhus vnicam obtineat morbi rationem, vnamq; naturam, non id credendum est, vnica solū via curari posse: nam pro ratione causæ mouentis, & naturæ materie, & generationis modi, variare etiam medendi rationem opuserit. Sic in legitimo, & vero scirrhu triplex insurgit curandi scopus: primus quidem viuendi formam præscribit: secundus materiam antecedentem, quæ morbum frequenter adaugere solet, tollendam nobis insinuat. Qd̄ sanè opus, quia affectio in utero est, nō solū medicamentis extrinsecus adhibitis perfici debet, verū eis, q̄ in potu sumuntur, vim habentibus aperiendi atq; extergēdi eū, qui in viscere continetur, humore, vt de scirrhu iecoris, 14. meth. c. 4. Gal. refert. Ad primum igitur scopū deueniendo, eam vitam scēmina degat, quæ nihil melancholici congerat: ob id summa diligentia curandū est, vt eos sucos gignat, qui ex toto sint, melancholico succo contrarij. Quamobrē, victus rationem eis, q̄ scirrhu laborant, sobriam, moderatam, humidam, & q̄ ad moderatē calidā inclinet instituito: porrigens alimenta boni succi, & probū sanguinem gignentia: panem non plurimū coctum, vinū vel tenue, vel admodum dilutum, aut nullum, sed lupulorum aquā, vel schorchioneræ, aut ferratā, vel in aqua aurum sæpius extinguatur, oua itē sorbilia, pullos, capos, gallinas, & oīum iura p̄bero. Exsunt quoq; viles capreoli iuuenis, & viuli lacteūs carnes: ex oleribus lupulū, borraginē, buglosū, atq; id genus alia p̄bere poteris.

Quibus præmissis, secūds scopus docet, mox ad materiæ antecēdis purgationē deueniendū esse, ni prius sanguinis nigrioris abundantia nos compulerit ex saluatella sinistra sanguinem fundere, aut ex talo, si mēses deficiāt, vel ex hæmorrhoidibus quod magis probō: nā præterquam q̄ hirudines per has sanguinem scēculentum euacuant, a parte quoq; affecta, saltem à uenis utero proximis plurimū deriuare natae sunt. Quo facto medicamēto purganti, qd̄ bilē atrā educat, vteris, prius tñ præparatis uis & humore. Sunt aut hæc epithymum, senæ folia, polipodium, fumaria & lupulus. Item casia fistula, myrobalani indi dilutū lapidis lazuli præparati pōdere. g. vj. cū syrupo ex nouem infusionibus niolarū, diasenæ, diacatholicon, hīera Rufi, sed præcipuē cōfectio ameeh sine scāmoneo & colocintide: vel si affectio inueterata fuerit ac melācholia plurimum & crassū in corpore redūdauerit, g. iij. p̄parati Ribij tuo porrigere potes. cōsideratis prius scēminæ uiribus & habitu ad patiēdū robusto. Et facta semel pleniori purgatione, tūssimū erit cōsiliū paulatim humorem expurgare: nā in scēminis plenius hūc humore purgare, raro usu uenit. Sic. n. ex aqua lactis uel lupulorū facto decocto senæ, mirū in modū pdest, uel ex p̄dicto decocto saccharo & prunis damascenis facta cōserua. Alia qd̄ plurima cap. de melan. uirg. & uidu. reperies, q̄ huic usui p̄ficua fore spero, iterq; primū locū tenet syrupus de scorpiæ ferri cōfectus, uel aliqua ex p̄parationib. chalybis, ut paulo inferiūs sū mōstratur.

Sed

- A** Sed monet tertius scopus interim dū hæc fiūt, ad cōmunissimam præcipuūq; omnium tumorum curationem deuenire: q̄ sanè consistere in vacuatione eius, quod in parte continetur, nullum ambigere arbitror: circa q̄ maximè attentum te esse oportet. Quippe si id opus oscitāter aggreffaris, facilè in dūritiem veluti lapideam, tumorem deduces, si temerè resoluētib. vtaris. Verūm si plus, q̄ par e ē, tumorem ipsum emollieris, periculum proculdubio imminet, ne aut materia intus contenta corrumpatur, aut scirrhus in malignū cancerum degeneret: q̄ sanè mala vteri scirrhus q̄ ciuili nē accidere solent. Insequi enim hæc in re Gal. & antiquorum dogma oportebit, nimirum q̄ scirrhosis tumoribus nullum vehementer exalfaciens siccasque medicamentum, applicetur: neq; solū, id qd emolliendi atq; humectandi vires habeat. Quod. n. (inquit Gal. 2. ad Glau.) superfluum humorem habet, nihil omnino dissoluit, qd verò minimū, plus quā oportet, exsiccāt. Sic Autē. alternatis vicibus, modò emollientibus, mō digerentibus per halitum vtendum esse, in his humoribus asserebat. Scripsimus autem nos lib. 2. de indica. auxil. qua via, & ratione induratos tumores emollire oporteat. Interim tamen à principio ijs vti oportet medicamentis, quæ aduersus dūritiem pugnent, iuxta ipsius conditionem, & naturam.

Sic scirrhosam dūritiem ex melancholia contractā emolliunt, q̄ verè emollientia non sunt: nā duris ex cōgelatione tumorib. proficua esse cōstat: sed mixtā, vt inquit Gal. lib. 5. simpl. facultatē habentia: hoc est, constantia ex tenuibus partibus, vt locus affectus in abscondito situs, & induratorū ratio exposcere videntur: nā emollientia sola permeare non pnt: calida, & tenuium partiū plurimū dissipabunt tenuioris humoris partē: quo fit, vt ea miscere cōueniat. Sic Rasis, 7. ad Alman. ad scirrhosam dūritiem vtilissimū parauit, medicamentū, qd recipit bdellij, ammoniaci, galbani, singulorū partes æquales, terantur in mortario cū oleo de ben, & liliorum, deinde adijce mucilaginu fœnugreci, seminis lini, sicutum quantum sit satis, vt fiat linimentum, vel addita cera, emplastrum. Cōmendat quoq; Gal. li. 1. 4. meth. radicē arborescentis malux, anserino, vel gallinaceo adipe liquatū, contusam, & cataplasmatiss forma impositā. Cōfert etiā aliud, qd recipit butyri recentis, pinguedinis porci, anatis, & anseris an. 3. j. olei amygdalarū dulciū, & liliorū an 3. iij. mucilaginis seminis fœnugreci extracte cū uino albo, 3. j. terebinthinæ, & ceræ quantum sit satis. Verūm antequam aliquo ex his prædijs vtamur, fouenda pars est decocto, qd recipit radicū liliorū, his malux, & althææ, an. 3. f. maluarum m. j. artemisiæ, vel nepetæ m. f. caricarū pinguium, nu. x. seminis lini, fœnugreci, ana 3. ij. florū chamemeli, violarum, meliloti, an. p. j. fiat decoctio in aqua, & oleo dulci, qua semel aut bis in die vtitor: ex cuius ē subsidientia pistata, & per seīā extracta, vtilissimum parabis cataplasma. Idē beneficiū præstabis fomento ex oleo liliorum calido, amygdalarū dulciū, de myrrha, & de styrace. Vtilissimum quoq; est insedere in prædicto decocto, ibidemq; aliquantulū permanere: sic ex prædicto decocto, & oleis clystera parabis, q̄ maximi fore momenti arbitror. Hoc tñ in his prædijs seruare oportebit, vt initium facias ab his fomētis, in sessionibus, vnguētis, & emplastris blandioribus: ob idq; hunc ordinem seruare oportet, vt primò adhibeas qd recipit olei liliorum, & chamemeli, an. 3. ij. adipis anatis, medullæ cruris vituli, & cerui, an. 3. j. bdellij. i. vino liquatū, 3. iij. luteū oui affati, quibus adde ex posca, 3. f. cuius

*cur e molliet.
si, que sunt te
nuis partiu
sit admixta.*

scuius p metranthia in uterū aliquid infundes. Quo facto, alio uteris, pituita A
 præsertim dominante, qd recipit thuris, ammoniaci, an. 3. j. mastichis, castorei,
 stactes, adipis anatis, & olei chamæmeli, an. 3. ij. gūmi in hydromelite liquen-
 tur, & in vterū inijciantur, aut extrā applicentur. Nec placet in hoc affectu
 pellos adhibere, et si ab antiquioribus commendentur: nam aut suspectos es-
 se, si efficaces sint, censeo, aut nullius momenti, si mitiores. Quibus factis, si ni-
 hil tumorē durū remitti videas, iterū ad vnguenta, & emplastra te conferes,
 præsertim ad illud, qd recipit opopanax, bdellij, ammoniaci, an. 3. j. styracis,
 myrrhæ, an. 3. f. propoleos, 3. j. radices iridis, 3. j. croci, 3. f. dissoluantur lacrimæ
 in oleo liliorum, amygdalarum dulcium, & vino decoctionis maluarū, & de-
 purentur: quibus adde ceræ, & terebinthinæ quantum sit satis, vt fiat vnguen-
 tum. Post aliquod verò tps, emplastrum conficies ex diaquilon cum gummis,
 vel vnguentum filij zachariæ cum plumbo vsto, aut aliud ex eodem plumbo,
 & radicibus altheæ coctis, pistatis, & extractis per setam, additis pulueribus
 marchasitarum: ex lythargirio itē, oleo rosaceo, & prædicta carne radicū al-
 theæ cū modica cera, & alia quæ lib. 2. de indic. huic vsui proficua adduximus.

Quod si scirrhus tumor ex illegitimis fuerit, tunc quidem q fundunt, & le B
 uiter calfaciunt medicamēta adhibenda sunt, admixtis, q tenuium sunt partiū.
 In primis. n. vteris illiniatur oleo sabino, qd omniū est tenuissimum, vel iasmi-
 norū, aut naphthæ: post q ammoniacum aceto dissolutum adhibebis, & adipēs,
 ac pinguedines calidiores, vt simul qd congelatum est, soluant, & qd solutum
 fuerit, digerant: quippe q ex frigideitate induruerunt, sic curari exposcunt. Cui
 vsui proficuū est, vnguentum, qd recipit folia capparis, q infundantur in aqua,
 donec emollescant, & terātur cū eis folia caulis cū hydromelite decocta, & ex-
 tracta p setam, & cū cera fiat vnguentū. Veruntū si scirrhus ex admotis medica-
 mētis, vehemēter digerētibus temerēq; adhibitis factū fuisse cōperies, ea medi-
 camēta proficua erunt, q plurimū humectent, emolliant, & modicē calfaciant,
 veluti est oleū dulce, vel amygdalarū dulciū, decoctū maluarū, liquatis in eo-
 dē pinguedinibus, vel adiectis oleis p̄dictis, quib. frequēter partē fouere opus
 est. Idē beneficiū præstat oleū, in quo ferbuerint maluræ, violæ, aut radices al-
 theæ: vel adiectæ fuerint mucilagines, ex quib. & pinguedinib. conficere apta C
 huic affectioni pharmaca. facile tibi erit: præsertim si locū ex lib. 2. nō nuper
 adductū curiosē legeris. Quib. adhibitis, reiteratisq; fomētis, nō erit admodum
 difficile induratos scirrhos emollire, possimū si induratorū affectio diuturna
 nō fuerit: na eo statu tutius est, totū negotiū optimo vitæ instituto cōmitterē, q
 ex importuna curatione, affectionē in cancerum mutare. Veriti. n. sunt Gal. Pau-
 lus, & Auic. ne ex inconsiderata auxiliorum administratione, granius aliquod
 & incurabilius malū accedat. Consulunt quidē scirrhosis affectionibus nullū
 vehementer ex calfaciens, siccansve medicamentū esse adhibendū: mihi tū ad-
 dere placet, neque diutius, et si leue sit nullum itē, quod solū humectandi, &
 emolliendī vim obtineat. Verū si femina biliosa fuerit habitus, & exusti rēpe-
 rant, etī, aut melancholica, p adustionem facta, ad aquæ dulcis balnea cōfugiē-
 dū esse consulo, nisi status copia vetuerit: quo tpe in scissinibus vtendū esse de-
 coctis aquæ ferratæ cū herbis, quæ vim habeant temperadi, & emolliendi: fu-
 giendū quidē a suffumigijs, aut pessarijs, quæ uterū purgent, licet ea, quæ emol-
 liant

A liant ac leuiter digerant, proficua esse constet. At in eo scirrho, qui aut pituitæ particeps est, aut ex melancholia naturali factus, verendum non est, ad aluminosa balnea confugere, licet mihi magis ex vñ videantur quæ ferrea sunt, vel eorum loco infusiones aqua ferrata, & prædictis herbis decocta. Quia tamen hanc affectionem difficilis esse curationis experimento didicimus, ob id ad maiora auxilia confugiendum esse consultit rei difficultas. Interea profectò, quæ scirrhosam vteri duritiem emolliunt, nil citius eam conterere inuenies, quam chalibis vñ, quo sanè vel magnos lienes, & lapidosas vteri durities, promptè liquari vidimus. Ceterum quia plerunq; observatione potius, quam ratione, hoc præsidio pleriq; vtuntur: ob id quidem (licet lib. 2. de præsid. ind. & cap. præcedenti, de virg. obst. eius meminere iam) hac in parte, paulò latius eius vim, & operandi modum ac differentias recensere.

Vulgatum est apud pleròq; Medicos, in curandis obstructionibus, vt antea diximus, chalibis s'maturam cum leui aliqua præparatione, quæ eius substantiam non mutet, præbere. Alij quidem, ipsum aceto præparant, donec in tenuissimum pollinem commigret: alij rursus oleo, & multi aqua vel vino, & ferè omnes mille alijs medicamentis admiscant: tandem quisq; suam parandi ratione laudat, contemnitq; reliquas. Quod censeo proficisci ex ignorantia legu, & rationis, qua ferrum obstructis mederi possit: & quid vnumquodq; corpus, & affectionis varietas, iure sibi exoptulet. Quæ profectò omnia si dixerò, constabit, quibus hæc, & cui illa præparandi, & conficiendi forma, ex vñ sit.

Ferrum itaq; & chalibis, non ob id, quòd pondere obstructas partes permeet infarctui liberat, sed vt saepius à me dictum est, qd vim habet non leuè abstergerendi, & repurgandi obstructos meatus, cui èt operi addenda est vis purgandi nò leuis, qua fruìtur ob maximam copiam sulphuris, & mercurij quam habet: quia hæc sunt omnia metallorum principia. Et cū ferrum sit rudius inter omnia metalla, hêt ob id plurimum de materia horum principiorum: quib. profectò habet liquandi, fundendi, & attenuandi quod viscidum, & crassum est (ac materia existit obstructionum) maximam vim, & efficaciam: quo fit vt facillè purgandi vires habeat: non quidem quales medicamentum trahens, sed ratione, & modo supra dictis, licet dum id copiosius efficit, per vomitum, & infernam aluū abunde purgare visum sit. Quod sanè dogma euidenti argumento probari pòt, qd chimice artis professores, vt ex ferro, adstringendis fluxibus, idoneum parent medicamentum, qd crocum Martis appellant, illud, igne sæpius adhibito, ab oī sulphureo recremento, & mercurio, bellissimè expurgant, quib. alioqui existentib. mordacis, & venenosa est conditionis, & non parū purgat, aut vomitū mouet, haud secus, qd quoduis aliud medicamentū: non quidem qd trahat, sed quod liquet, & fundat prædictos humores: quo fit vt facillè ipsis per vrinā, vomitū, aut aluum euocatis, lente, & paulatim, ab infarctu liberet ac deobstruat.

Quo tanquam verissimo chimistarum, & eorum qui de re rustica scripserunt fundamento supposito, aliud non minoris momenti licet præmittere: nimirum in ferro duobus modis sulphur, & mercurium, in propria substantia obtineri: uno quatenus est iam uera eius ferri substantia: alterum uerò, ueluti futurum (ut sic loquar) alimentum, quod crudius, crassius, & perniciosius est, ex quo non leuia scimus suboriri accidentia his, qui eo utuntur.

Tertio

Tertio expēdēdū est, eā sulphuris, & mercurij substantiā (q̄ cocta, natia, & A
ppria facta est) verā vim, & efficaciam purgandi (vt dictū est) obtinere, reliquā ve-
ro nō nisi corrumpendi, & alterādi, idq; non parū: qua profectō rōne, rei natu-
ra duce, qui hoc præsidio primitus vti fuerunt, chalibem præparare antea stu-
duerūt, ut separarēt à chalibe ipso, quod crudū, & alienū est, vt mox docebo.

*Chalibis cur
pro paratur.*

Quibus iactis fundamentis infertur, aliud esse ferrum præparare, vt fluxū alui,
aut alterius partis sistere possit; aliud verò, ut partes obstructas ab infarctu libe-
ret, ac repurget. Nā chimistæ, ut aluum sistat, ex toto nituntur uim sulphuris, &
argenti uiui auferre, extinguere, & separare, & ob id ipsum grandi igne, aut a-
qua ualida conterunt, donec in crocum Martis cōmutent: quo sanē præsidio ua-
lidissimē fluxus quiuis sistitur, & flascidæ partes roborantur. Verū q̄ meatus
repurgare, & aperire obstructiones nituntur, non hoc, sed partem eius, q̄ repur-
gat, exquirunt: quod si aliquis dixerit, ob id integris suis uiribus esse adhiben-
dum, & non utcunq; mutatum, aut depuratum: huic dicimus, plus damni subse-
qui ex parte illa excrementitia, q̄ ex maiori purgatione beneficium: præterquā
quod forsan minus purgabit, quia ocyus descendit, & nullum habet ad operā-
dū locum: quapropter, sic chalibem oportet præparare, ut quod excremen-
tium, & extraneum est, separetur, manente parte purgatiua, & abstergente.

Crocus Martis

*Aqua Galibea
pro his
rebus
de purgatione*

Sic proculdubio, tribus modis chalibē præparamus, uno collecta in alio me-
dicamento p̄dicta parte purgatiua, citra aliā chalibis substantiā, ut fit, chalibis
limaturis candentibus sepiissimē in aquā, uel liquore alium immillis, cui p̄cul-
dubio, vim purgandi, & repurgandi non leuē præstant, maximē si aqua prius
ferbuerit aliquo medicamento affectioni, & parti proficuo. Monere tñ hac in
parte lectores oportet, ut cum aquā fluxibus sistendis, ex chalibe extincto, para-
re student, primam aquā abijciant, utq; uim purgatiuam non minimā sortiāt,
& reliquam usui seruent. Præparatur secundo modo citra ignis vim aut actio-
nem, comminuta liquata, & abscissa recrementitia illa parte, aqua vitæ, aut ace-
to, donec ex toto vniuersa limaturæ substantia cōminuatur, quippe acetum, totū
illud quod extraneum est, ocyssimē conterit, relicta parte natia: nec obstat
erugo quæ acquiritur, quam igne faciliē separabis, aut aqua feruentissima, &
oleo, vel oleo solo, maximē cū admiscemus purgatiua medicamēta, & alia quæ C
vim chalibis adaugent. Tertio verò igne sepiissimē cōburente partē illā super-
fluā, manente puriore, & uiliore, corrigimus, vt fit ex limaturis acuum, aut ar-
morum, vel alterius chalibis qui vim ignis sepius experitur, maximē si post li-
maturā iterū pluries succendatur, & extingatur, oleo amygdalarum, aut vino
quod magis probo. Quo fit vt semper magis probem chalibis limaturam, in
delicioribus: in alijs verò ferri, præmissa aliqua ex dictis præparationibus

His suppositis, iuxta has tres præparandi vias, & rōnes, cōsiderandū est, quā
harū s̄minæ laborantis corpus expostulet. Nam s̄minæ quibus obstructio-
nes in vijs ductuum (dixerim in extremitatibus vasorum, q̄ in ipsas tendūt) exi-
stūt, aut quæuis alia durities cui hoc p̄sidio opus sit, chalibis limatura leuissima
præparatione, & diadragacanto admixto cum melle adhiberi pōt, præferim si
corpus robustū fuerit, vt Actius consulit, aut præcesserit, aliquod ex leuioribus
pharmacis, chalibe ēt confectis: tūc potissimum, cum scirrhusa affectio est. At
vbi in penitioribus venis, & abditis corporis sedibus obstructo fuerit, chalibē
minu-

A minutissimè, & vel acerrimo aceto præparare oportet, & alijs medicamentis, q̃ vim habeant purgadi, & attrahendi admiscere opus est, vt & vis chalibis citius, & penitus permeet. & ipsemet substantia (salte per vias prope iecur) puadat. Quo quidem fit, vt ipso liquante fundenteq; & abstergente, ac trahentibus reliquis medicamentis, q̃ expurgant admixto, qd obstructũ est, facile aperiatur, ab infarctu q̃ liberet, humore obstruente ab eisdem partibus secedete. Præterea in scirrhis earundem partium affectionibus & antiquatis obstructionibus, vinũ aut aqua, in qua sa pius ferrum extinctum sit, vel mirè prodest, vel saltem viam disponit ceteris chalibis p̃sidijs. Qua pp in scirrroso vteri tumore, primitus, p̃dicta aqua vti cõuenit, decocta quidem asplenio, mirica, asparagis, corticibus capparis, folijs lena & cinnamomo: cui decocto addere poteris medicamenta, q̃ partem in qua obstructio aut scirrhus dispositio viger, respiciant. Postea vero ferri limatura ed vsq; extinguat, quò pinguedinem q̃dam supernatantẽ conspiciamus. Cuius si non suffecerit vsus, ad syrupũ de schoria ferri deveniendũ est: nam cum in hac affectione non liceat laborioso vti exercitio (vt postulat p̃sidijs cõditio) ob partis affecta situm, & ne nimio exercitij calore in cãrosam naturam commigret, vttiliora sunt liquida pharinaca. Ac sine id quidem suffecerit, ad chalibem aceto præparatum peruenire oportet: & ultimo ad crassiorem, admixtis alijs medicamentis, vt dictum est capite de virginum obstructionibus.

De vteri cancro. Cap. 19.



Infortunium quidem miserabile est, dũ eò mali vterus deuenit, vt cancerũ cõtraxisse, iam compertũ sit, maximè si vteri collo innascatur: exulceratur enim citius, qd in omni desperatione negocium esse situm, ostendit. Cancrum tñ esse duplicẽ, eui denter norunt oēs. vnum sine vlcere, alterum verò vlceratũ. Ille quidem nil aliud est, q̃ tumor durus, inæqualis, rotundus, venosus, id est, venas habes in circuitu turgidas, lineescẽs siue fuscus: & vt Paul. refert, colore nigis, q̃ inflammationes nigricans: calidus, sed non adeo vt inflammationes, subitò accrescens, laborantes maximè fatigans, & perpetuo ferè dolore affligens. Vlceratus verò cancer est vlcus, qd p̃ter dolorem tumoremq; inæquale conspicitur, plurima ex parte sordidum labris p̃tumidis cõstans, aspectu horrendum, & concreta humorum colluie nigratum. Quod quidem, vt inq̃t Paul. videtur fo culentum, liuidum atq; interdum et subnigrum, & cruentũ apparet: sanies inde manat continuò tenuis, aquosa, nigra aut fulua, graniter olẽs: appellatũ aut huiusmodi affectum lupũ, quia carnes auiũ, si illi aponat, absumit.

Hæc igitur est horum affectuũ natura, quos in foeminarum vteris plerũq; su
boriri scimus, si materia ibidem vratur. Sed vterq; affectus principium nanci
tur à mēstruo sanguine copioso, diu in vtero retento, cuius crassa pars, dum in
vteri substantia senlim & paulatina congestione aggregatur, in scirrhũ dege
nerat: ex quo humore ibidẽ exusto, vel aliunde torrido, & ex calfacto adueniẽ
te, cancer orit̃: nec non ex eodem sanguine serosiore, tenuiore, & actiore facto
ad superficiem tumida partis illabente, venis circumstantibus exulcerationẽ fo
uentibus. Cuius si plura scire velis, caput vltimũ lib. huius operis primi, legito.

T Primo

Causa:

Primò diligenter examina, an scirrhus in cancrum degenerare nitatur, qd fa-
cile discas, si cum prius esset sine dolore tumor, dolorem denuò sentiat femina
ob caliditatem, & acrimoniam humoris in cancrum iamiam defluentis. Cui ite
adiungitur dolor circa inguina, inum ventrem, abdomē ac lumbos: moles in-
tus, veluti pondus aliquod gravius esse videtur, febrisq; ei adiungit, remissior
tamen, quàm in phlegmone. In his etiā fœminis tumor circa hystera ostium
durus, varius, tumens, colore fœculentus, rubicundusq; deprehenditur. Red-
ditur insuper in hoc malo fœmina nauseabunda, fortasse ex retro ipsius odore,
ventri communicato, & exacerbatur locus manuum attritatione: ac, ut Celsus
refert lib. 5. circa locum cancro affectum, quidam ictus quasi punctim illati, sen-
tiuntur: interdum etiam eadem pars torper, interdum quidem dolet, & interdū
dolore vacuat. Cæterum exulcerati cognosces ex his omnibus accidentibus in-
tensioribus factis, ac diu perseverantibus: nam coniectabile est (si quidem alia
signa rimari non concedit loci affecti situs in imo ventris reconditus) acrem,
mordacem, & copiosum humorem, qui hæc concitat accidentia, id iamiam ef-
fecturum. Verum exulceratum esse solum cognosces ex sanie, quæ emanat te-
nuis, aquosa, nigra, fulva, & grauitè olens. Fluit etiā nonnunquam sanguis,
& si vas aliquod grande abraditur, sæpe tam copiosè profunditur, ut mortem
maturius afferre posse credendum sit. Cognosces id malum insuper ex lenta fe-
bricula, ex fastidio, ex inquietudine, ex animi angore, ex maxillarum rubedi-
ne, pudendorum ardore, fetore ac dolore: quæ sanè omnia facile ostendunt
maligni huius affectus naturam & conditionem.

*Curan-
di ratio.*

Quantum difficultatis secum ad curationem afferat cancri conditio, nemo
perfecto, qui artis operibus studium dederit, ignorare poterit. Quam diffi-
cultatem ex propria affectus natura proficisci scimus, & quia in principiis fre-
quentissimè multi id malum negligunt, quod dum incipiat, nullam, aut levis-
simam inferat molestiam: quo sanè tempore eius incrementū prohibere haud
difficile esset. Quamobrem cum huiusmodi affectus ferè ex propria natura &
loci incommoditate incurabilis videatur, & omnino incurabilius, si exulce-
rationem sortiatur: satis me fecisse arbitror, si prohibuero non vlcerati exul-
cerationem, & vlcerati incrementum. Occultos etenim cancrum, quales exi-
stimamus qui in vtero sunt, tutius esse duxit Hippo. non curare, quòd curati
citius pereant: ob id quidem blandè & leniter ipsos tractare opus est, quippe à
medicamentorum intempestiva adhibitione facillimè exacerbantur, & omni-
no immedicabiles fiunt. Hac equidem ratione incipientem cancrum sic pri-
mò curabis, ut & melancholici adustique succi generationem inhibeas, ac si
quid genitum est, minuire sensim & paulatim studeas: secundò verò, & vlti-
mò, quòd in duro tumore continetur, vel paulatim digeras, vel quominus ad-
augeatur, cures.

Circa primam curandi rationem, quā in hoc affectu potissimè esse arbitror,
ea alimenta ministrari iube, quæ refrigerandi, & humectandi vim sortita, pbū
ac tenuem succum generent, inhibeantq; omnem succi serositatem, calfactionē
& inustionem. Quæ victus ratio instituta, simul cū eo viuendi mō, qui quie-
ti omnino deditus sit, considerandū mox est, an affectio ex aliqua suppressa na-
cuatione principium traxerit, velui à mēstris aut hæmorrhoidibus suppressis, à
qua-

A quarum prouocatione principium curationis auspicari oportet, ni tanta in corpore fuerit, ex hac, uel quauis alia causa, sanguinis copia, q̄ primò cogat ipsum ex dextra, uel sinistra basilica fundere: si atas, uires, ac melancholicus habitus non uetuerint. Quo facto paulatim, ac sensim menses, aut hæmorrhoides hîrudinibus euocabis, quod præsentaneum est in uteri cancro auxilium. Mox tamen humoris acrimoniam, & inuulsionem frenare opus erit, & ipsum sensim, ac leniter euacuare. Quam gratiam præstat seri lactis usus, & serapium ex borragine, ex buglosso, ex portulaca, ex lupulis cum eisdem aquis, inter alia tamen pharmaca, quæ ad melancholici succi curationem proficua esse antea diximus illud à Gale. 14. metho. maximè probatur, quod ex epithymo conficitur: nam epithymi 3. iij. in sero lactis, nullave si tertio quoque die exhibeas, plurimum prodesse comperies: maximè si dilutum præpares ex pari quantitate epithymi, & foliorum senæ, ita ut cuiusque 3. iij. infundas, & cal fieri sinas in 5. vj. aquæ borraginis, facta postmodum uehementi expressione. Ex quo etiam decocto cum saccharo prunas damascenas condito, & earum vj. quibus sex dragmæ senæ respondeant: tertio quoque die laboranti porrigito. Purgabis insuper hos humores cōfectione amech sine scammonco, & colocintide, pondere 3. vij. cū 3. j. & .ss. pulueris epithymi, uel senæ, & utilius quidem erit, si loco epithymi bibbat desuper seri lactis ex infusione epithymi 3. iij. uel tantundem syrupi ex infusionibus uioletarum. Quibus purgationibus innitendum est, donec succi melancholici exuperantiam dempsisse constet. Tumori subinde prouidendū est, ut disentiatur, uel saltem non crescat: adhibitis in principio affectus extrinsecus, & per uteri osculum, quæ moderatissimè refrigerent, & astringant, minimèq; mordacia existant: talia etenim solum huiusmodi affectibus idonea sunt: nam quæ imbecilles uires habent, omnino ab humoris uehementia uincuntur, quæ uerò ualentiora sunt, tenuiores sanguinis partes, uel digerunt, uel trādūt, crassioribus ibidem factis impactioribus. Quamobrem primo partem inunges oleo rosaceo, myrtino, omphancino, & aquis plantaginis, & solatri, uel facto ex prædictis fomento, uel emplastro cum farina, aut unguento cum modica cera. Cui et usui Gal. li. 2. ad Glaucl. scripsit medicamentum ex pōpholige, & succo solani, & emplastro diapalma confectum. Paratur, & aliud, quod recipit olei rosarum 3. v. succi granorum rubrorum solani 3. iij. ceruse lotæ 3. ij. plumbi usti, & loti, tuiæ præparatæ, ana 3. j. thuris 3. ss. ceræ albæ 3. v. misce, & lento igne fiat unguentum. Mirabilis et efficacit̃ censetur id, quod recipit olei omphancini, aut rosacei 3. viij. agitentur sub sole in mortario plumbeo, donec nigrescat crascescatq; cui adde lythargij lib. ss. ceruse tantundem, & cum cera fiat unguentum. Verum quia non raro hanc affectionem exacerbari conspiciamus, à leuissimis quibusdam causis, prouidendum quidem est exacerbationi, & doloribus. Consolatur quidem feminas exacerbatione affectas malua, aut althea in mulla macerata colliquataq̄ne, dum paucis rosaceo cataplasmatis instar, parti adhibentur. Lenit etiam cataplasma ex dactylis passis incoctis, ouorum putaminibus, atque farina adiectis, uel aliud ex papauere cum coriandro, & eadem farina, ac fereos confectū. Itē mitigant maluæ folia cum lacte mulieris trita, & rosaceo cerato, uel ungueto excepta. Deinceps uerò ad ea, quæ superius diximus, iterū erit et deueniendum, consiliū rei ratio, & facta sufficienti purgatione, iterū

T 2 unguen-

vnguento ex lytargirio, & cerusa cum rosaceo confecto vti-
 aliud sic parato: excipe olei rosarum, vel nenupharis, aut papaueris, ℥.j. ceræ,
 ℥.l. camphoræ, ℥.j. & siliques fiat cera, & camphora puluerizata, vltimo loco ap-
 ponatur, quibus adde aquæ rosarum modicum, & concrelescere finito. Est, &
 efficacissimum oleum ouorum frequentius ductum, & agitatum in mortario
 plumbeo, donec spissitudinem acquirat: item cinis cancrorum flumiatilium lo-
 cus in aqua solani, admixtis pulueribus ex plumbo, vel antimonio cum cera,
 & oleo rosaceo efformato vnguento: quod sanè medicamentum, vlcetatis can-
 cris prodesse omnes fatentur: sicut succus solani, aut plantaginis solus, vel cum
 oleo omphacino, in mortario plumbeo ad spissitudinem agitatus. Quod si vl-
 cerari durities ceperit, metallicis pharmacis liberalius vtendum est: sed miti-
 gationis gratia infusiones ministrabis ex aqua decoctionis psyllij, papaueris
 albi, nenupharis, & violarum: præstant, & omnia pharmaca, quæ huic vsui
 proficua scripsimus lib. 1. cap. vltimo de cancris mammarum. Tamen in hoc
 malo prædictorum pharmacorum aliquid iniicere in vterum, ad mitigationem
 & vlcetis medelam, necessum plerunque existit: tale quidem est aqua decoctio-
 nis camphoræ, nenupharis, papaueris albi, & rosarum rubearum, maximè si
 prædictam aquam in mortario plumbeo antea agitaueris: ac si dolor id videat-
 ur exposcere, addito hyoscyami modico: nam sæpe ne rabientes fiant laboran-
 tes, vtile fit præsidium, & non mediocre leuamen præstat. Confert, & lac mu-
 liebre, aut asininum, ac plantaginis cremor tepidus, & si sanguis prodierit,
 plantago cum pauco thure: Omnium autem efficacissimum est, quod recipit
 spumæ argenti lotæ, ℥.vj. thuris, hyssopi, adipis porcelli, butyri recentis ac ce-
 ræ, ana ℥.ij. rosacei, ℥.iiij. spumam argenti contritam in cremore sereos, lique-
 factis reliquis iniice. Sed probatissimi vsus existit medicamentum, quod reci-
 pit succi solani purioris, aut ipsius liquoris stillatiij, ℥.vj. muiæ præparatæ,
 plumbi vsti ana ℥.j. & scamphuræ, ℥.l. moueantur cum pistillo in mortario
 diutissimè, & proiciantur in vterum. Fertur quoque maximi momenti esse
 præsidium, quod recipit scabiosæ, caprifolij, anethi, plantaginis, oleti humani
 æquas partes, vtantur omnia; quorum cineris, ℥.iiij. excipiantur, & ℥.vj. liquoris
 stillatiij solani, ducanturque in mortario, & proiciantur. Quod si hæc pro-
 desse non videantur, ad chimica auxilia veniendum esse consilii rei magnitu-
 do, & malignitas, inter quæ mirabile censetur oleum subij, cuius extractio-
 nem docet latè Andernacus libro, eius operis 2. fol. 722. quem vsum quoque
 præstant aquæ, & olea ex alijs mineralibus extracta, dum lentè, mixtura alio-
 rum prius facta, & scissimè fiat; ne grauiori facta exulceratione, oculus
 malum crescat. Atque hæc sunt, quæ mihi videntur sufficere in
 tam graui malo, ad maioris præcautionem: nam de chirur-
 gi operatione aliquid dicere non studui, eò quòd
 conspicuæ tantum partes cam admit-
 tant, & hæc, à quibus in to-
 tum cancer ab-
 scindi po-
 test.

De vte-

A

De vteri vlceribus. Cap. 20.

VTERI exulcerationem proculdubio constat, difficillimæ esse curationis, non solum ratione humidioris, sordidiorisq; loci: quæ omnia vlceri curando, sunt aduersa: sed ex loci etiam incommoditate, reconditaque vlceris sede, ac vltimo ex abdita causæ ratione, & vlcerum varia differentia. Cuius difficultatis diluendæ gratia, prius hæc omnia expendisse opus erit. Reperitur igitur in vtero vlcerum diuersitas, à causa, & ab accidentibus sumpto principio, & à loco. Ratione quidem causæ, vlcus in vtero succrescit virulentum, sordidum, corrosiuum, cauernosum, fistulosum, aut carnosum. Quæ verò ab accidentibus, sumuntur differentia: sunt velut vlcus diuturnum, dolorosum, cum tumore aliquo præter naturam, cum contusione, vel carne superflua: quibus multi addunt vlcus cacoethe, vel malignum, ac sordidum etiam. Quibus accedit alia vlceris differentia, nimirum incipiendo, vel ex suppurato, ac disrupto abscessu: ex quo, & alijs, quæ nuper reuulimus loci etiam differentia emanat, vt in scirrho, & inflammatione dictum est. Verùm animaduersione dignum iudico, ad quam partem abscessus apertione molitur: quippe nonnunquam ad ipsum ventriculi fundum, & cauum, & pus eo tempore per vteri osculum excurrit, aliquando ad vesicam, nimirum quum eius antica pars præfuit inflammata, & tunc cum urina pus excernitur, sicut aliquando per rectum intestinum, dum videlicet postica pars inflammata præfuit. Constat etiam ad intestina aliquando pus defluxisse, inter ipsa quidem & peritonum.

Causæ tamen, quæ has vlcerum differentias efficere nata sunt, lib. de humo. à Gal. summam colliguntur: inquit. n. Et vlceratur sæpe vterus ex difficili partu, aut partu extracto, aut corrupto, vel ab acris medicamentis, aut à fluxu, aut à ruptis abscessibus, atq; interdum in cancerum delinit. Quo sanè loco, & vlceris, & eius diuersitatis causas recenset: quippe partus, & cætera, quæ Gal. annumerat, continuuim soluere nata esse constat. Verùm ob excrementum ex natura loci redundans, & ob humorum affluxum, vlcus versus humoris qualitatem diuturnum fieri contingit: dolorosum ex acrimonia: cum tumore ex humoris copia affluente, cacoethe, fistulosum, corrosiuum, aut sordidum, ex loci spurcicia, vel ex humoris malitia, aut partis impotentia. Quæ tamen vitia ex abscessu improbè repurgato, oriri non rarò contingit, sicut ex medicamentis, quibus erodendi, atque exulcerandi vires insunt. Sic quoq; ex lue venerea originem haud rarò trahunt, ac frequentissimè ob excrementa retenta, & putrefacta circa vteri locellos, & rugas. Quarum sanè causarum mille in locis Hip. meminisse constat, præsertim lib. 1. de morb. mulier. qua parte inquit; Si verò puerperæ aliqua pudendi pars obturata fuerit, iam enim etiam hoc cognoui: si exulceratum fuerit os pudendi, vbi sanè vlceratum fuerit in partu à pueri exitu violatum, simile quid sit vlceri superficiali, ac feruenti. Clarius tñ lib. eodè hæc refert dicens: Morbus corripit ex abortu, si q̃ corrupto, aut putrefacto intus puero non fuerit expurgata, & calor totum corpus tenet. Corripit et ex fluxibus, & si in ipsis acris fuerint, & biliosa mordeant. Itè eodem lib. refert. Mor-

T 3 bus

bus autem maxime corripit ex partu, si quid in ipsis diuulsum computruit: ite
ex abortu, & aliis sua sponte. Refert quoque idem autor alias causas lib. de steri-
lib: per hæc verba: Si vlcus vteri factum fuerit ab affectione aliqua ex relatis
(remulerat enim omnes superius adductas) & non statim sanatum, sed impurum
factum fuerit, permanet vlcus ad multum tempus.

*Signa
ulcerum,
& cau-
sarum.*

Non est admodum difficile, vterum esse exulceratum, nosse: nam id palam osten-
dunt recrementa, dolores, ac pus reiectum. Sic etenim in plerisque loci ratione
punctorius apparet dolor, qui est in sincipite molestus viget, & in ligamentis, ac
radicibus oculorum, & in manibus quoque, ac digitis. Quæ tamen ab vlcere prodeunt
putrida, quæcumque ierint, dolore afficiunt, calfaciunt, exulcerant, aut pruritus
mouent. Verum cognosces qualis fuerit causa, qualisve vteri natura, ac status,
ex ijs, quæ prodeunt. Cuius rei gratia præmittere oportet, sordida prodire, quæ ab
vlcere ex frigido abscessu facta, instillant: quæ verò post inflammationem à san-
guine, & post erisypelata supersunt, virulenta, & depascentia sunt: quæ post scir-
rhum, gangtenosa, quæ post morbum gallicum, dissepulotica, & chironia. Qui-
bus cognitis, expendisse oportet, vlcus inflammatum, exiguum quid sanguino
lentum, & feculentum cum ingenti dolore plerumque excernere: si tamen sordidius
fuerit vlcus, ichores cum minori labore excernuntur: at si depascendo serpit,
detrimenti odoris fluxum emittit, atrum & cum maximis laboribus. Itæ si exul-
ceratio ex sanguine, vel flauabile perueniat, dolor erit acerbissimus, pungens
cum ardore, & febre: ex falsa pituita si prodeat, pruritus intolerabiles parti acci-
dunt, & paucum, aut nullum excrementum ab vtero profluit, idque cum fetore,
acrimonia, & paucò sanguine; quod si ex inundante humiditate ichori per simile
vlcus fiat, maior subinde spirabit fetor, & purgamenta erunt tenuiora, & copio-
siora. Verum si quæ excernuntur, sicut fex vini sint, vlcus cancriforme esse con-
iectandum est, si exit sanies, sicut lotura carnis recens macerata, menstrua suppu-
rari. conijcimus, vlcusque ob id fieri. At si quod excernitur, liuidum, viride, ni-
grumve fuerit, & cum dolore exierit, vlcera esse cacoethæ, corrosiua, ac fistu-
losa certum est. Causæ verò externæ facile sui notitiam præbent: nam si ex aliquo
acri pharmaco vlcus prodeat, statim aliquo præfidioleni injecto cessant affec-
tio, & dolores. Reliquas verò causas ex interrogatione perdisces. Vlcus tamè
esse purum coniectabis, cum humor paucus, candidus, æqualis, crassus, & mi-
nimè foetidus exierit. Quæ procul dubio signa omnia varijs in locis Hip. cõple-
xum fuisse constat, maxime verò cum lib. 1. de mor. mul. de vlcere ex partu ver-
ba facies inquit: Cum purgatio ipsi prodierit, velut spina per vteros transire vi-
detur, & calor ipsam corripit, ac maxime ventrem inuadit: & si attingatur pars
infra umbilicum dolet, velut si purum nervosum vlcus attingat, post dolores
fortes aliàs, atque aliàs in vteros incidunt: & febris aliquando ad contactum ma-
nus debilis, & aliàs atque aliàs puerperij purgamenta prodeunt maligna, purulen-
ta, & graueolentia: & subdit. Si verò puerperæ aliqua pudendi pars obturata
fuerit, iam enim hoc cognoui, si vlceratum fuerit os pudendi: ubi sanè vlcera-
tum fuerit in partu à pueri exitu violatum, simile quid sit vlceri superficiario,
ac feruenti, & ualde inflammatur, & labia præ inflammatione inter se conci-
dunt, & se mutuo contingunt, vipote quæ sunt exulcerata: sed & frigus fit, &
ambo labia clausa sunt, constringentia purgationem relictam: Si verò prodiret
purga-

A purgatio, vlcera non conclusa essent. Quibus consimilia verba, ceterum generaliora eodem lib. refert dicens; Si uteri fuerint exulcerati, sanguis, & pus purgatur, & fœtor grauis oboritur, & dolor acutus corripit lumbos, & inguina; & inum ventrē, & dolor sursum procedit ad laterum mollitudinem, & ad costas, & ad scapulas, aliquando et ad clauiculas peruenit, & mordetur, & caput vehementer dolet, & delirat. Progressu verò temporis tota intumescit, & debilitas ipsam corripit, & animi deliquium, & febris tenuis, & perfrigeratio, intumescunt autem maximè crura. Quo etiam loco paulò inferius de eadem re verba faciens, sic profert; Si uteri exulcerati fuerint, & sanguis, & pus, & serosa sanies fluit, putrescentibus enim vteris, morbus ab ipsis fit, & uenter imus eleuatur & attenuatur, & ad contractum dolet, uelut ulcere præsentē, & febres, ac fremitus ipsam occupat, & dolor acutus ac uehemens inuadit pudenda, & pubem, & inum uentrem, & lateris mollitudinem ac lumbos. Vehementis tñ exulcerationis signa referens, inquit; Si uerò uehementer exulcerati fuerint, sanguis & pus purgatur, & dolor fit grauis; & cum dolor apprehenderit, uelut à partus dolore, fiunt ea, quæ circa fluxum contingere solent; & cùm tempus affuerit, crura, & pedes intumescunt. Docet quoque Hipp. per consensum ne, an proprio uteri affectus morbus oriatur, eodem lib. dicens. Cognosces aut, an ab ipsis uteris sint, hoc modo, q̄ enim exulcerantur, purgationem exhibent purulentam, & compactam; q̄ uerò non ab ipsis, tenuem & saniosam. Lib. tamē de sterilibus inquit, Si ulcus uteri factum fuerit ab affectione aliqua ex relatis, & non statim sanatum, sed impurum factum fuerit, permanet ulcus ad multum tempus, male olet mulier, & quandoq; sanies male olens; ipsi ex pudendo fluit, & quādiu sanè ulcus habuerit, in uentre non concipit, non enim concipiunt uteri genitum; hinc autem menses sano modo procedunt, uerum ex contactu, & interrogatione, maximè clarum fit de relatis. Atq; hæc sunt quæ uteri ulcus, & eius causas ostendere sunt nara: quibus similia nō pauca affert Hipp. lib. 3. de mor. mul.

Quantum facessant negotij in curatione uteri ulcera, ostendit euidenter nec uacca ipsius uteri substantia, quæ semel exulcerata, difficulter coalescit ac regeneratur, & ipsius etiam natura, & conditio, quam in susceptandis totius corporis recrementis idoneam fecisse naturam constat: quamobrem nulla uteri ulcera contemnenda esse arbitror, ea maximè, quæ in occulto loco sita existunt. Qd etiam Hipp. magnificisse legimus, lib. 1. de mor. mul. per hæc uerba; Oporteret autem curationem ulcerum in uteris exactè facere, ut quæ in tenera, & subtili sensu prædita sint parte, & in neruosa canitate. Verum antequam rationalē mendedi uiam aggrediar, placet aliquot Hippo. loca hic scribere, quibus uideatur uniuersam huius mali curationem complexum fuisse: inquit. n. lib. 1. de mor. mulie. Quæcumque exulcerationes in uteris fiunt ex abortu aut alia quauis causa, eas omnes respectu ad totum corpus factō, curare oportet, quacumque curatione opus habere uisum fuerit, siue ex uniuerso corpore hominem curandam esse putaueris, siue ex ipsis uteris. Qua sententia constat, ab uniuersali corporis prouidentia principium curationis esse autpicandum. Eodem tantum libro specialius loquens, hæc scribit; Curare uerò oportet ulcera, uelut etiam ea, quæ in reliquo corpore sunt: nimirum ut inflammatione atceas, & repurges, & repleas, & ad cicatricem perducas.

T 4 Danda

Dada autem est aqua in potu, vinum minimè, cibos item paucos ac minimè multos exhibeto. Sed ad particularem causæ considerationem deueniens, eadem parte sic scribit; Quum igitur tenues sunt fluxiones, cum pharmacos eas curare oportet, & dare quod sursum, & deorsum purget, primum autem sursum. Tandem eadem parte adamussin curationem scribit, repetitam consulens purgationem, præmissa victus institutione conuenienti: ac si fluxio his non quæuerit, mitescendam esse consulit dicens; Si verò ad hanc diætam fluxiones non discedant, pauciores tamen fiant, & vehementer mordeant, & ea, quæ fluunt, bilis fuerit, ac falsugo, & non solum internas partes, sed etiam externas exulcerent, diætam transmutare oportet, & totam humectare, quo fluxiones, quàm aquosissimæ fiant, & minimè mordaces, balneis multis calidis: aliaque his consimilia eodem loco recenset. Postea verò ad curationem vlcis solo vteri vitio prodeuntis rediens, corpus non esse pharmacis purgandum consulit, sed colluendum tantum. Quod si sordidum extiterit vlcus (inquit) & proserpant, ac proximum locum mordeant, purgato, & nouam carnem producto, & carnem ad cicatricem perducto: facile enim resoluuntur, & maligna fiunt, & frequenter lauato. Sed lib. de natu. mul. plurima recenset medicamenta huic vsui, & prædictis proficua, quæ sanè diligenti, & studioso medico exquirenda prætermitto scribens interim, quæ vsui probatiora comperio, initio sumpto ab ea communissima curandi ratione, quam Hipp. scripsisse diximus.

His præmissis, expendendum primo est an abscessus qui suppuratur, ad intestina, & peritoneum vergat: nam eo tempore, dum pus in hoc spatio continetur, vnanimi omnium autorum consensu constat, abdomen esse incidendum scalpello, aut cadenti ferro, à quo opere, & doloribus, ac sanguine sedato, vlcus velut simplex curari debet, vt mox docebo. Sic profectò pure vergente in vesicæ velut vesicæ vlcera curationem exoptat: cuius ratione Aetius, & Paulus lactis vsu, & seminum frigidorum expressiones summopere laudant. At si ad rectum intestinum pus defluerit, ablui, & quodammodo roborari, & adstringi in principio intestinum opus erit, mox vero, sicut dysenteria auxilium expostulat. Verum si vlcus fiat in vteri sinu, tunc communis vlcerum indicatio exercenda venit.

Est igitur vlcis cuiusq; loci duplex ad curationem indicatio: vna illi propria quæ vlcus est, cuius postremo loco meminero: altera verò, quæ vlcus curare docet habito respectu ad causam, vel accidens quoduis vlceri adiunctum. Porro duplex in huiusmodi complicatis dispositionibus consilium est, vt Gal. docet 14. metho. nempe, vt vel huiusmodi affectus è corpore prorsus eximas, vel incommo- dum, quod inferunt vincas. Verum hoc (inquit) vbi exiguus planè affectus est, fieri licet: vbi magnus est, duci ad cicatricem vlcus prius non poterit, quàm illi affectui remedium, attuleris. Ob id profectò instituta victus, ac viuendi ratione, vt expostulauerit humoris superabundantis natura, redundantes succos, si sanguini adiuncti fuerint, scissa in brachio vena, vt vires perferre visum fuerit, & vlcus, ac vteri ardor poposcerint, minues. Quo facto, præmissis serapijs humori redundanti proficuis, protinus, & per internalla purgabis cholagogis si bilis flaua, phlegmagogis, si pituita redudauerit, & sic de reliquis pro cuiusque natura. Cum tamen necessum sit in principio curationis, longè à parte affecta humores distrahere, vt Hipp. est consilium, vomitibus ipsos oportet persu-
perna

Aperua expurgare, ab uteroq; distrahere vinculis: & brachiorum vel partium superiorum frictionibus. At si uteri intemperies causam imbecillitatis utero praestiterit, ob quam facillime humores erodentes ipse susceptus medicamentis utero proficuis adniscenda sunt, quae aduersus distemperiem pugnent, ut mox docebo. Solet quidem influxione quavis ad uterum, peculiare esse praesidium sudorem mouere, ni femina admodum fuerit squalida, vel humores nimis exedentes, maxime si, gallice luis admixtum quid cognoueris. Sinaliter, balneis aquae dulcis ipsam committes, ut sudore excitato distrahatur, euacueturq; materia, quae redundat, simulq; mitescat: atque haec est aduersus morbosum apparatus curandi seu praecauendi ratio. Quibus factis, ad curationem vlceris deuonies, quam facito iuxta naturam accidentis ei coniuncti, ut Gale. magna cum diligentia consulit, & exequitur lib. 4. metho.

Quod si vlcus squalens, siccumq; esse ex recrementorum defectu cognoueris, bis die ipsum ablues aqua tepida per metrenchitam infusa, cui addes sacchari parum, pituitae etiam cremorem infundito, aut aquam hordei cum saccharo, vel aquam, aut succum portulacae. Verum si ex copiosa humiditate,

*Si vlceri
adiungatur
de-
stempe-
ries.*

B quae per uterum excidat, compereris, vlcus debito esse humidius, contraria omnino instituenda est curandi ratio, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda: aqua vero nullatenus ad mouenda est: verum quia lauare est opus, vinum vel decoctum austerae alicuius herbae praeparandum. Quem usum praestabit aqua ex ligni guaiaci decocto, vel similacis asperae, aluminis, malicorij, & huius census plurius, quae sicciora esse constat: quippe uterus ea duplici ratione expostulat, nimirum, ob propriam naturam, quae membranacea est, & propter vberissimam humiditatem alluuiem, quas exsiccare vehementius oportet: & consequere enematae quod recipiat hordei, vsti amyli, thuris, singulorum 3. j. trita diluantur in lacte asinino, & in uterum immitantur. Quod si adiuncta sit vlceris vel uteri durities, oleosum aliquid admiscere oportet ex his quae ca. de scirrho dicta sunt. Cuius census est id quod recipit radicis althaeae, liliorum alborum, ana 3. j. pulegij vel origani ana m. l. seminis lini, & fenugreci, ana 5. l. rosarum p. j. coquantur in pari mensura aquae, & vini, & adde adipis anserini 3. j. Item diluatur uterus lacte bubulo cum praedicto adipe, aut oleo liliorum. Quam sane medendi rationem in alijs uteri intemperamentis adseruabis, habita contrarietatis cuiusq; ratione. Exulceratus etenim uterus, si calidior frigidiorve fuerit, medelam utiq; exigat, quae in tantum calfaciat, refrigerareve, quantum ipse a naturali habitu recessit.

C Quod si fluxionem humorum acrimum & abradentium, vel putreficientium causam, vel fomentum vlceri praestare copertum sit, alia prorsus ratione, ut ex Hip. constat 1. de mor. mn. agendum est. In qua sane re distingues primo, an ab vniuerso corpore, quod ex puris tenuitate haud difficulter discas, an a particula aliqua quod monstrant eius peculiaria symptomata, uel ex solo ipso utero, quod puris crassitudo insinuat: quibus expeditis, si ex parte aliqua profluat, illi prouidendum est, iuxta cuiusq; vitium, & in temperamentum. Verum si ex totius corporis vitio occasione nascatur ab vniuersalibus purgationibus auspicandum est, ut Hip. consulit, qua autem medicinali forte, subticuit, quia id humoris idea, & corporis conditio euidenter monstrat. Cui operi non est innitendum subito, & confertim, sed paulatim, & repetitis vicibus. Ac si ob humoris malitiam, aut vberem copiam id prodesse non possit, eis utendum

dū est auxilijs, q̄ habiū in meliorē mutet, sudoribus ex guaiaco, & exercitijs, q̄ A corp⁹ deficcet. Post modū verō vterū exiccabis hisq̄; inferius referā, & suffumi-
gijs alternis diebus adhibebis, & iterū ad vomitū veniēdū, ad victūq̄; exiccātē.

Si tamen dolor vlceri adiungatur, protinus hic vel auferendus est, semota eius causa, aut saltem quoad licuerit mitescendus: nam prater id quod dolor vires summē prosternit, maiores subinde concitat fluxiones. Atq; licet ea, quæ do-
lori profunt, vlceri quodammodo aduersentur, neglecto interim vlcere, dolori tanquam vrgentiori, primò maximēq; innitendum est. Qualiter verò dolorem sedare oporteat, cap. de vteri doloribus abundē dictum est. Proderit etiam prater dicta, succum plantaginis, portulacę, & coriandri, vel ptisanam, lac, vel amy-
lij aquam tepida omnia in vterum iniicere. Quem vsū quoque præstant infes-
siones ex decocto absinthij, maluarum, rosarum, violarum, capitum papaueris, & aliorum, quæ loco nuper citato retulimus.

Et si dolor superiores etiam partes tetigerit, credibile est, nullā materiā dolo-
ri fomentū præstare, ob id pmissa vacuatione, non solū vterus fouendus ex aqua calida erit, sed & corpus vniuersum modò vires, aut quidpiā aliud nō obstat. Si
autē id acrimonia fluentis succi eueniat sero lacti, aut lacte probē, cocto ieiune-
dato, medeberis, sicut & victu humectate ac refrigerare, post habita vlceris in-
dicatione: sic cucurbita, lactuca, ptisana, & alia id genus cocta, & quęcunq; pin-
guia, & pisces qui non sunt saliti administrandi sunt, sicut pullorum, & hedo-
rum carnes elixæ, ac lactis copia, modò nec delirū, nec capitis dolor adsit, post
modum verò, vlceri est prouidendū anodinis, & his quæ c. citato adduximus.

*Si vlcus
sordidū
sit.*

Verū si sordidum apparuerit vteri vlcus, abstergentibus re agere oportebit: huius naturæ est hydromel ex decoctione hordei: item passularū decoctū,
vel hordei cum melle rosaceo. Præstat etiam decoctum ireos cum hordeo, &
glans confecta ex farina lupinorum cum melle rosaceo: confert, & ptisanæ cre-
mor cum melle vel mulsæ ex decocto fenugræci, maluarum, fursuris, & lentiū.
Ac si hæc non profuerint, ad validiora confugito, velut est aqua marina vel alu-
minosa cū vnguento ægyptiaci: itē marrubiū, aut eruū, vel erui farina cū mel-
le adiuncta, & pessario aliquo in vterū immissa, puluere sup sparsō aluminis vel
iridis: si tñ vlcus, pfundē sitū fuerit, cerati, aut emplastri forma, hæc eadē extrin-
secus adhibita, proderunt. Fit quoq; vtile medicamētū hydromel, in quo iris,
absinthiū, & agrimoniū incoxerint. Itē ad profundiora vlcera ex vsu est, iniicere
medicamētū, qđ conficit ex lib. s. vini albi, & 3. j. aluminis vsti: cui adlice aliud
qđ conficit ex melle, terebintina, rosaceo, & butyro, vel solū pijce. Maximi pfe-
ctō pñ est vnguentū illud, quod Auic. laudauerat hoc mō confectum: excipe ly-
thargirij cerusæ, sarcocollæ an. 3. j. adde cere, & olei rosacei q̄tum sit satis, vti fiat
vnguentū, qđ stamula aliqua ex linteo facta exceptū, in vterum immitte, maxi-
mē si in eius collo vlcus extiterit: sicut si in penitioribus recondat id, & reliqua
oīa aqua vel vino liquefacta p vterinum clysterē immittes. Cui etiā vsui vtilissi-
mū est, aristolochiæ, & iridis illiricæ decoctū cum melle, donec vlcus purū fiat.

*Si vlcus
erodens
existat.*

At si vlcus depascens & erodēs esse comperiamus, pmissa totius corporis, p-
uidentia, ad ea auxilia veniendum esse consulit rei rō, qđ frigida, stiptica, & de-
siccantia sint, ut partim repellas qđ influit, partim verò calorem eius, qđ fluit, &
partis affectæ attemperes, ne vterius erosio serpat, ac ultimò humorem, & for-
des

- A** des abstergas. Quapropter cōmodè feceris, si ulcus ipsum, & vniuersum uterū aqua aluminosa ablueris: quam equidem huic vlceri magni momenti esse scimus, q̄ influentes humores valenter repellat, & siccandi facultatem obtineat. Poteris insuper prædictam partem irrigare aqua plantaginis, vel rosarū, vel chalybeata tepida, etiam decocto cypri, myrobalanorum, cupressi, plantaginis, malicorij, balauisti, baccarū myrū, palmularum, lentium, rosarum, aluminis, & agrimonie. Ceterū quia rarò unguenta, quibus Chirurghi ad prædicta vlcera utuntur, in hoc affectu, ob partis incommoditatē administrare possumus, alijs præsidijs curandum est, rem ipsam agere. Sic. n. in fessiones, & fomenta profunt ex aqua mulsā, in qua lentes excorticatæ decoquantur, vel eruū, marrubū, & absinthium. Neque minoris est momenti terum saccharo, & aqua plantaginis admixtum, vel pisanę succum cum melle per uterinum clysterem infundere. Quod si neque his adhuc malum quieuerit, uterum ablues lacte asinino, vel caprino, addita rhodomellis, vel serapij rosacei sexta parte, additis etiam iridis ʒ. ij. consimile huic beneficium præstat aqua mulsā ex absinthio, lentisco, & calamo aromatico confecta. Sed in hac affectione pessarijs non est plurimum innitendum, q̄ sordidus reddunt ipsius osculum, & partem affectam minimè pertingant. Ob id profectò probantur mihi magis, quæ exterius utero apponunt, vt quæ per latentes vias: & occulta foramina in ipsum vires suas ingerant: tale quidem est, quod recipit rosacei optimi ʒ. iij. ceræ albae ʒ. j. & s. liquefacito, ac refrigerato, & in mortarium coniecit, lacteq; muliebri, asinino, aut caprisso affuso cum pistillo subigito, donec totum albescat: deinde, diffusio priori lacte, aliud denuò coniecit, idq; ter quaterve facies admixta croci ʒ. j. mitigat enim, & humorum acrimoniam, ac partis calorem restinguit. Cui simile est aliud, qd recipit tutiæ ablutæ partes duas, lythargij, sarcocollæ, & cerusæ, ana partē j. cum oleo rosaceo, & cera fiat unguentum: quorum aliquid in uterum immitte re modo superius dicto, non erit ab re. Verum quia sæpe uteri vlcera ob loci pudorem, & sorditiem cō mali deuenire solent, vt ne hæc quidē sufficere possint, p̄dictis medicamentis aliquid ex flore aris addere conceditur: ac si vlcera conspicua fiant, ad arsenicum, uel candens ferrum deuenire oportebit. Cū hoc tñ cauere consulit Aetius ualida, & plurimum erodentia: nā in uterum immissa maioris mali solent esse causa, in nos plurimū coegerit urgentissima necessitas.
- C** At ulcere iam à fluxu, distemperie, sorditie, aut corrosione vindicato, ea quæ puris ulceribus proficua existunt, ueniendum est, qualia sunt, quæ leniter abstergunt, & exsiccant, uelut est decoctum rosarum, aut lentium, uel plantaginis succus, aut poiigoni decoctum cum saccharo, uel syrupo rosaceo. Sunt etiam (neque displicet) qui tetrapharmacum infundunt cum butyro recenti, aut rosaceo: a quibus non multò post abluere vlcera opus erit, quo factò, ut utilius paremus præsidium prædictis succis, aut decoctis puluerem aloes, tutiæ, hematis, chartæ combustæ, aut cucurbitæ siccæ, & adu. hæ admiscere contineat. In qua curatione hæc sufficere uidentur, quòd loci incommoditas non patiatut alia excogitare auxilia, quæ ulceribus in conspicuo positis, proficuè adhibentur: præterquam quòd ex ijs, quæ diximus, uaria confici possunt decocta, expressa, instillata, & mille modis utilia.

*Si ulcus
purum
sit.*

De



AVD secus quàm in ano fissuræ, seu rhagades in vtero quoq; suboriri cōperimus. Sunt quidē illius partis ulcuscula, q̄ rimæ à plerisq; nuncupantur: sunt etenim rimæ, quibus partes musculosæ ueluti procinduntur, sicut labris qñq; & manib⁹ ex uehementi frigore contingere scimus. Quibus et vteri osculū ueluti p̄cissum efficitur, hiantibus his ulceribus, haud secus, q̄ labra, & manus ex p̄dicto frigore. Fiunt quidē plerunq; ulcuscula parua in longū, & angustū protracta. aliqñ p̄funda, & labris callosis cōstātia: sepe uerò superficialia, ac sine callo: alia rursus humida existunt: saniosa plurima: nonnulla canerosa, & feruida. Callum tñ contrahunt, ut Aetio, & Paulo uisum est, cū diuturna sunt, & in eis labra indurantur, ac intumescunt. Est quidē hoc malum importunissimum ulceris genus, in quo neq; caro exeditur, neq; cutis utcunq; sed ad nutum plicaturarū partis, q̄ alicui muneri dicatæ sunt, contrahi tur, ita ut pars deinceps officio fungi, citra dolorem, & grauissimā molestiā nō possit: nam si ante integram cicatricis ob ductionem, utcunq; extendantur, ulterius dirumpuntur, lacerantur ue, & duriores, ac angustiores ob diruptam cicatricem supersunt fissuræ, ita ut extendi deinceps citra dolorem, non possint.

Causa.

Habet quidem in utero hoc ulcerum genus duplicem causam, unam laboriosum partum, qui ex magnitudine capitis infantis proficiscitur: grāde etenim caput uteri os tantum distendit, ut multis partibus dirumpi necessum sit: quas continui solutiones sordidas mox fieri contingit, ob excrementorum cōtinuū defluxum, qui uitari nullo modo potest. Huic quoq; causæ accedit alie huius mali occasio; nempe uiolentus coitus, & pudendo grandiori factus. Secundam uerò causam censeo esse humorum acrium, & erodentium affluxum, maximè si lentoris nonnihil obtinuerint: quippe cum tales sint, partibus adherēt, & ob tenuitatem, & acrimoniam faciliè easdem exulcerant, ac erodunt. Quibus causis alia non minoris momenti addi potest, ingens uidelicet uteri siccitas, & condyloma inflammatum, quod cutim dirumpere possit.

Signa.

Docet hunc affectum distinguere, & cognoscere lib. 3. c. 75. Paulus, dicens; Primum sanè rhagades latent, cum recentes adhuc ex partu sunt dolores, postea uerò paulatim percipiuntur, aliàs manus tractu, aliàs in coitu, quando & p̄pter affricationem crucem reddunt. Deprehenduntur autem sinu aperto, in cuius ostiolo in circuitu diruptiones, & scissuræ oculis apparent. Præterea ex ijs, quæ præcesserunt, internanine causam, an externam, seu euidentem malum esse cerit, faciliè percipies: item elucescit id malum eo tempore magis, quo fœminæ uiro accedunt: nam plurimum à pudendo uiri dolet & exacerbantur. Quod si neque partus præcesserit, nec uirilis pudendi magnitudo, inspiciendum tunc est, an condylomatis tumentis ratione præcedentisve inflammationis, cutis scissa fuerit. Quod faciliè erit intueri sinu fœminæ aperto, ac si ne id quidem affuerit, coniectandum est, humores acres, erodentes, ac mordaces id malum præstare: quorum biliosum ex calore deprehendes, ceteros citra calorem mordicantes esse, existimabis: præterquam quod ea, quæ per uterum profluunt, palā quoq; ostendunt, cuius naturæ sint humores illuc confluentes.

Docet

A Docet primò curandi ratio videri in hoc affectu humidiores esse instituendum fugiendumq; à cibis acrioribus, asperis & alium comprimentibus: ob idque (ut Celsus consulere vñ) liquida, leuia, glutinosa, pinguis, & huius census reliqua vitiosa esse conlati: velut sunt gallinarum, pullorū, vituli ac hædi carnes elixæ, & præcipuè earum iura pinguis. Conferunt ex oleribus malua, iutubus, buglossa, scariola & borrago: ite pīfana, lac amygdalarum dulciū & ova forbilia. In hac tñ affectione cauendū est ab omni violeto motu, vociferatione, saltu, & maximè ab eccellu viri, nam eo potissimū affectio exarcebatur.

Cut. 1. 1.
P. 1. 1.

Quatenus verò ad reliquam auxiliorū rationē attinet, si rimæ obacres, mordacesque succos in vterum cōfluentes oriantur, prouidendum est, ne fluant, ac si fluxerint, ut temperatiores facti, nil mali efficiant. Quamobrè primò corpus purgare oportet, facta conuenienti præparatione eo pharmaco, q̃ humoribus peccatis proficuum sit, iuxta adductam à me rationem cap. præcedētis: in quo quidem præsidio & in sanguinis detractione ea præcepta seruabis, quæ in curandis vteri vlceribus adduximus; Quo facto, eisdē succos distrahēre opus erit frictionibus, aqueducis balneis, quibus non parum commodi scissuræ persentiant. Expendes tamen hac in re purgantia medicamenta, acris & vehementia esse admodum aduersa, q̃ succos plurimū perturbāt. Sunt verò huic vsui proficua pulpa casia fistula, māna, syrūpus ex infusionibus rosarum & violarum, catholicon, cōfectio Amech sine scāmoneo & colocintide, & rhabarbarū aqua lactis expressum. A purgatione verò reliquos attēperare necessum est serapijs, apozematis, & alijs, quæ temperatam ac mulcebre faculatem sortiantur.

Quod si ex condylomante scissuræ prodeant, eadem omnino medendi ratio ascribenda erit, facto tamē curationis initio à sanguinis detractione, à cubito, reuulsionis gratia, ac mox à crure, si affectio p̃stiterit: quo facto, corpus pari lege purgabis, & ad chirurgicā operationē te conferes, ut paulò inferius docebo.

B Verum si ex laborioso partu, vel pudendi virilis magnitudine affecto suboritur, statim à principio mali clysterē vtendum est vterino ex sanguine draconis, holo armeno, aristolochia, myrrha, thure, plantagine, & capitibus rosarum infusis, de coctis, & expressis aqua rosacea: vel ex prædictis in puluerem redactis, cum albumine oui & lana, pessarium conficito, quod maximi momenti præsidium comperies.

C At si scissuræ cum siccitate, calore & pruritu complicatæ fuerint, vel ab ijs causis proficiscantur, sæpe in die locus fouendus est, & humectandus aqua decoctionis cicerorum, limacum, ranarum, piscium saxatiliū & maluarū, aut lenticulæ palustris, hordei decorticati, & seminis lini. Quo facto, vteriosculum inunges vnguento de cerusa cum camphora, aut mucilagibus ex semine citoniorum & psylli, ac seminis maluarū: quam quoque partem recreare oportebit lacte caprino, aut butyro vaccino, aqua rosacea sæpius loto. Quod si & ardor & dolor præualuerint, parti prædictæ adhibere oportet vnguentum, quod recipit camphoræ ʒ. ij. vnguenti populeon ʒ. j. cerusa abluta aqua rosacea ʒ. j. vnus oui albumen, misce absque igne.

Hæc autē sunt præcularis cuiusque causæ curandi rationes: ceterū topica auxilia, q̃ sub ratione vlceris illius generis proficua esse possunt, varia à plerisq; recensent: ego tñ selectiora hac in parte scribam. Rimæ itaque huius loci ea medica-

dicamenta desiderant, quæ citra morsum, asperitudinemve astringunt, maxime si ex defluxu, vel ex causa extrinsecus rumpente, affectio prodeat: quod Gal. cōsuluisse constat, lib. 9. de compo. phar. sec. lo. Preterea Aetius eandem tuctur sententiam dicens; In harum itaq; curatione chirurgiam, & omnia mordētia phar maca reprobare oportet: talia enim inflammationes, & conuulsiones inducūt: & infellionibus simplicioribus, ac pessis uti, & medicamētis ad sedis rimas descriptis, præcipuē eo, quod ē pompholige, stibio, & plumbo vsto paratur. Quā huius viri sententiam subaudire oportet, dum rimæ (vt ipse refert) callosæ non fuerint: nam eo tempore ad maiora auxilia veniendum esse consulit. Itaq; pro simplicis rimæ curatione illud auxilium mihi tutius videtur, quod simul vlceri prodest, & dolori prouidet: cuius naturæ est oleum de semine lini, ad mutationem coloris in mortario plumbeo agitatū: item aliud, quod ex butyro, vitello oui, & prædicto oleo in eodem mortario conficitur: prodest & id, quod ex oui vitello, & rosaceo in dicto mortario agitur: succus etiam plantaginis aut portulacæ, aut vterque in dicto mortario ad mutationem coloris cum axungia anatis admixtus, mirè prodest. Eandem quoque gratiam præstat quod ex mucilaginis, & plumbo vsto efformatur: item ex oleo omphancino, aut rosaceo, vel de salicibus & plumbo vsto ac vitellis ouorum: lac etiam muliebre cum saccharo vtile esse comperimus, sicut cerotum ex lythargirio. Sed præter hæc passim apud Gal. varia & vtilissima reperies non pauca, quale est illud Apollonij, quod recipit olei rosacei 5. ix. quas in pilam plumbeam infundes, & plumbeo pistillo tandiu agitabis, donec crassum & subnigrum oleum reddatur, deinde seorsum spumæ argenti lib. j. & cerusæ tantundem tertio, oleoque admisceto, & vtere: prius tamen lacte probè eloto, & siccato, decocto hordei, plantaginis, & rosarum, aut aqua chalybeata cum modico vino. Confert item oui assil vitellus vino dissolutus, & cerato rosaceo exceptus. Vtile quoque est aliud vnguentū, quod recipit pompholigis lotæ, & plumbi vsti ac loti, ana. d. ij. cerusæ, & spumæ argenti ana. 3. j. gūmi tragacanthi. 3. iij. thuris & radicis symphiti, ana. 3. ij. omnia probè tertio, & rosaceo cerato admisce, ac locum affectum illinito: qđ si caliditatem in affecta parte vigere comperit, addere oportebit succi plantaginis, portulacæ, & centauree minoris. ana. 3. j. Huic quidem consimile aliud reperies, quod recipit argenti spumæ, & cerusæ ana. 3. i. pōpholigis lotæ. 3. j. & s. seminis rosarum 3. ij. succi plantaginis 3. ij. oui assil vitellum, vnum, adipis anseris 3. ij. excipiantur omnia rosaceo, & vtere. Quod si his affectum cedere comperiamus, abstergentibus abluere partem ipsam oportebit ea lege, quā adduximus c. præcedenti. Verū, quia ex his vlceribus quædam esse callosa dictum est, illis proprium & proficuum unguentum conficies ex cōsypo humida, radice lilij, iride Illyrica terebinthina exceptis: item aliud conficies ex medulla ceruina, oleo liliorum & cera. Si tamen saniosa sint vlcera, ea sero lactis abluēs, aut mullā. Item si ferueat vlcus, & canceri suspiciō adsit, confert succus cancrosum, plantaginis, portulacæ, lactucæ, psyllij vnguentum de cerusa, de plumbo, de lythargirio: certatū itē rosaceum Gal. cū succo solatri, & alia huius naturæ. Qđ si in his omnibus factis ea conditione redditum sit vlcus, qđ cōsolidare, vni-req; tantū id studeas vino calido abluēs, vel rubro decoctionis myrrhæ, thuris, myrti, nucū cupressi, aloes, tutiæ, ac mumie. Verū cū carnē supereminere com-

A re conipereris, adhibe quæ carnem exedant, ut alumen vstum, & reliqua huius vsum proficua. At dum rimæ diuturniores sunt, induruerintque, ad chirurgiam deveniendum est, quæ condylomata terat, & callum extirpet, si prius vsum fuerit mus medicamento illo toties Gal. commendato, ex charta nimirum combusta, & alijs consimilibus, quibus periti Chirurghi tutò vtuntur.

De vteri condylomate. Cap. 22.



VM nõ sit vna omnium autorem de condylomate sententia, necesse subinde erit, quid propriè dici condyloma mereatur, prius docere. Condyloma igitur (inquit Celsus lib. 9. c. 14.) nil aliud est, quàm tuberculum quoddam, quod ex quadam inflammatione oritur. Verùm si quis Paulum legat, reperiet profectò, tantum condyloma appellari ipsum tuberculum obcallefcens, siue ex inflammatione, siue ex fissuris supersit. Quamobrem recens, tuberculum, non condyloma, quia nondum obcalluit, sed simpliciter tuberculum, non condyloma, quia nondum obcalluit, sed simpliciter tuberculum appellari consuevit: specialiori tamen nomine condiloma appellauit, quod ex rimis in callosam eminentiam degenerantibus proficiscitur. Aetius verò, sicut & Celsus, quemuis tuberculum ex inflammatione ortum siue callum contraxerit, siue recens fuerit, condyloma appellat, dum rugosa sitani, aut vteri eminentia. Cùm hoc tamen, iudicio nostro, has eminentias indurari quoque, & crassescere teneri, ut condylomata sint, & fateatur. Itaque cùm vterus, sicut & anus, rugas non paucas habeat, vbi earum aliqua præter naturam intumuerit, tunc sanè sit condyloma, aliquando citra inflammationem existens, sed factis rugis maioribus, & prominentioribus obrimas callosas: Interim verò cum inflammatione durum ac dolorosum, ad similitudinem nodorum qui in digitis pugno clauso sunt, effectum. Quapropter a thymijs, qui in eadem parte oriri consueuerunt, condylomata differunt: nam thymia, tuberculose quædam eminentiæ sunt, doloris expertes, præter naturam auctæ, ausperæ, oblongæ, subrubræ, interrim albicantis coloris, maximè vbi mansueta fuerint, a cacuminibus eiusdem nominis herbæ in montibus nascentis sic appellata: quæ eminentiæ ubi paruæ fuerint, thymij, vbi verò magnitudine excedunt, ficus appellantur, si Aetio credendum est loco nuper citato. Generantur quidem hæ actiones frequentissimè in alis pudendi, aut in pudendo ipso, vel intus in osculo, aut collo. Fiunt tamen omnes ex causis nuper dictis, ac præcipuè ex crassis, exustis tamen & faculentis humoribus, & ex lue venerea: quarum affectionum signa subicere placuit, quòd visui manifestissima sint.

C

Præmissa quatenus pertinet ad victus, & viuendi rationem prouidentia, ut præcedenti cap. dictum est: ita quoque humorum purgationem, & præparationem iuxta peccantis succij ideam institues. Mox verò ad peculiarem condylomatù curationem, deveniendum est: in qua quidem duo cõsiderabis, primùm an inflammatum condyloma existat: quo tempore mitigationi tantum innitendum est, oleis anodynis & lacte, ac reliquis, quæ mulcebrè habeant naturam: similem quæ omni-


Cuticula
ratio.

omnino institues curationem ei, quam Hipp. consuluerat in columella inflama-
mata: inquit enim lib. de natu. mul. Si in pudendis graueolentia fuerint, & co-
lumella nascatur, & dolor habeat, dolorem quidem sedabit apij semen ieiunè
in vino datum. Secundum considerabis, an condyloma callum contraxerit, in-
ueteratumve ac durum fuerit, an nouiter genitum. Quod si nuper generatione
sortitum sit, ijs auxilijs vtendum est, quæ reprimendi & exsiccandi vires habeant.
Cui vsui Celsus commendat infusiones ex decocto verbenæ, lentium, & melle
& fertula cāpana ex vino cocta cum rubi folijs tritis, & rosaceo cerato: vel ma-
licorium ex vino coctum cum hyssopo. Quibus & alijs, quæ huic vsui parantur,
addere oportebit aliquid disussorium, vt thymum & chamæmalum, aut si ma-
gis placuerit, lixiuia partem perfundes. Facit & pessus ex malicorio, & butyro
paratus, & qui ex asyopo conficiuntur. Verum si condyloma iam induruerit, callūve
contraxerit, ad chirurgicam operationem deueniendum esse consiliat ipsa affe-
ctus natura, quæ vllis auxilijs cedere nunquam visa est. At quia timida femina
non nisi maxima urgente necessitate, sectionem aut vstionem admittere audet,
tentandum prius est prædicto condylomata emollire, & mox conterere ac di-
scutere. Primum itaque emollientibus herbis aqua incoctis infusiones, & fo-
menta parabis, quibus bis terve in die vtitur, & postmodum ea cataplasinata
imponito, quæ quod emollitum fuerit, conterant, & condylomata contrahant:
huius naturæ est illud, quod hac via conficitur. Myrsatum terebinthina exci-
pe, vt emplastri compagem habeat, & adhibeto: quo sanè remoto, super partem
hunc puluerem spargito: testas onorum vstas ac tritas lauato, & siccitas asper-
gito. Præstat, & aliud vnguentum, quod recipit thuris 3. j. aluminis scissilis 3. ij.
cerusæ 3. iij. spumæ argenti 3. v. quibus dum teruntur, aquam rosaceam, & vinū
admisce. & postea eadem rosaceo excipe, ac ceratum confice. Ex vsu quoque est
medicamento ex charta combusta confectum Gal. & Pauli testimonio: quod si
eius vim experiri non libuerit, itidem Illyricam terebinthina exceptam appo-
nito. Caterum sine hac quidem prodesse uideantur, vt Celsus consuluit, ad se-
ctionem veniendum est: ac si plura fuerint condylomata, ad partis vstionem. Se-
ctionis autem modum docuerat Aetius lib. 4. serm. 2. c. 13. & Paulus lib. 3. c. 7 c.
Sed clarius idem Aet. lib. 4. serm. 1. cap. 3. Referunt quidem, per bolsellam esse
excidenda condylomata: inquit enim Paulus; In his igitur cum morbus remit-
tit, bolsella modò fieri queat, prehenfas amputare oportet. Censeo quidem bol-
sellam esse ferramentum, quo aliquidprehendimus: quod etiam Celsus bol-
sellam neminauit, dicens; Neque quicquam commodius est, quàm bolsella pre-
hendere, sub ea quæ quod volumus excidere: sic enim vnas immodicè laxatas,
bolsella prehenfas excidimus. id quoque consuluit Hipp. lib. de natu. mul. qua
parte columellam rescare docet. Sed iubet etiam Celsus causticis vti pharma-
cis: quæ sanè prudenter adhibenda sunt, ne ob partis laxitatem plus, quàm par-
sit, cedant. Chirurgia tamen facta, vniuersam curationem circumscribere o-
portet suppuratorijs, reurgantibus, demum cicatricem inducentibus: inter
quæ cerorum ex lythargirio, scopum omnem complere experimento dicimus.

De

A

De vteri, ac pudendi, verrucis, thymijs, & ficu. Cap. 23.



LS t quidem tam importunum morbi genus verruca vteri osculo, & pudendo adnascens, vt saepe in curatione maius facessat negotium, quàm grauior alia morbi species: ob id profectò, proprium illi caput dicare studui. Verrucarum naturam tã variam esse constat, vt curationis vnã præscribere legẽ, sit perdifficile, ni prius earum differentias, ac naturam exacte perpenderis.

Sunt igitur verrucæ, tumores ex scirrhosa tumorum sorte, qui instar mótuculorum quorundã in cute insunt, vnde & uomen sortuntur. Ad hoc quoque tumorum genus reduces myrmecias, ac si formiculas diceret, & acrocordones quæ vulgariter verrucæ pensiles dicuntur. Itaq; ex varia verrucæ figura vario quoque nomine insigniri potest: sic enim thymios, vel thymeos, verruca appellatur, dum thymi herbæ caput repræsentat: quæ nihil aliud est, q̃ tuberculosa quædam eminentia præter naturam aucta, doloris expers, aspera, oblonga, sub rubra interim albescentis coloris, præsertim vbi mansuetior fuerit: q̃ sanè eminentiam, dum parua fuerit, thymian appellant, vbi verò magnitudine excesserit, ficum nuncupat Aetius. Cuius sanè tumoris duplex natura constat: prior quædem maligna, quæ thymos duriores, asperiores, maiores, fœculentos, & colore liuidos continet, necnon & dolorem inducentes: qui sanè exacerbantur maximè ad manuum contactum, & medicamentorum adhibitionẽ, sed præcipuè in partu, aut menstrualia purgatione. Altera verò mansuetior existit, & ijs constat, qui mitioribus insigniuntur accidentibus. Cæterum in vtriusq; pot' concubitũ, exercitium, & quemuis laborem accidentia maligna excrescunt, & sanè moro maturo assimilantur, quò fit, vt à multis eodem modo appellentur. Cornua iuè (affectio quidem ex verrucarum genere) ex cornu figura mutuata, sic nuncupantur: item myrmecia dicuntur verrucæ, quæ latiore sunt vase: inter quas eminẽs thymus vocata verruca, fœminarum pudendis adnata pessima est, maximè vbi sanguinem fundis: quòd verrucæ genus tarsicum vocauit Auic.

C

Causam habent omnes verrucarum differentie vnã, vniusq; naturæ, dissidentem quidem in diuersis speciebus, iuxta maiorem, aut minorem crassitiem humoris: ac prout aliũs, vel superficialiũs radices habet insertas. Sapit autem humor easdem efficiens naturam humoris melancholici, vel crassioris, & terrestrijs piritib; præter quam quòd mala plerunq; qualitas ex gallico morbo contracta ijs, quæ pudendis partibus adnascuntur, adhæret, quæ easdem difficilius efficit curationis.

Causa.

Hac profectò ratione ijs verrucis, quæ fœminis deuirginatis prope os vteri, aut pudendum adnascuntur, præcipua & communis curandi ratio erit, vniuersalis totius corporis prouidentia, quòd nunquam sanitati restitutas conspiciamus, nisi per sudores, & ea pharmaca, quæ vniuersum corpus purius reddunt: Quapropter præmissa vniuersali prouidentia in victu, & reliquis, ad peculiare curandi rationem deueniendum est: verum id fieri oportebit iuxta cuiusq; verrucarum speciei sortem & naturam: prius tamen adhibita diligentia in expurgandis corporis excrementis.

Curandi ratio.

V

Myr-


Myrmecia igitur si in utero adnascantur, quia altissimas habent radices, exci-
di sine magno vlcerē non possunt: ideo cautē tractare oportet, & in hoc genere
& in reliquis verrucarum generibus frequenter, & aliquā copiosē purgabis, &
corpus sudori ex ligno guaiaco committes, & nonnunquam vntionibus si ex
morbo gallico, principium traxerint, maximē vnguento nostro scripto lib. de
morbo gallico, & sic sectionem facito. Thymia, clauusq; et si exciditur, iterū ra-
diculas spargunt, & ad antiquum statum facillē redeunt. A crocodo verō si se-
niel excidatur, nullam radicem relinquit, & facillē sanescit, neq; amplius rena-
scitur. Haec quidem expendisse conuenit, vt constet quales verrucae vehemens
medicamentum, quales ve lene exposculent. Paulus verō li. 4. c. 15. plura annu-
merat, quae verrucas, praeterim festiles, & pensiles tollunt conterunq; velut est,
succus cucumeris agrestis cum sale, thuris cortex cum aceto: ficus primae, quae
uelut proceres non maturescunt cum aceto, farina, & nitro. Eandem efficaciam
habet haec, sicut succus fici arboris illius: arugo etiam sulphure uiuo: ocymi folia,
cum atramento suorum aqua quae instillat ex uitibus cum amputantur, addito
sale: simus ouillus cum aceto, hircinum fel illitum, nitrum cum urina pueri,
& stercois bouis cum aceto. Neq; est parui momenti capita salitorum piscium in-
coquere aqua, quae ex farmentis instillat, & verrucas ablucere. Confert & aqua,
qua argentarii ad deaurandum utuntur, medicamento aliquo mitiori admixta
& uerrucis adhibita, quas procul dubio extirpat. Itaq; in uniuersum cois oīum
curandi ratio est, ea adhibere medicamenta, quae adurendi, & erodendi vires
habeant: quibus in utero quoq; utendum est, dummodo eas, quae circa affectū lo-
cum sunt partes, folijs, uel quouis alio cooperimento cōtegantur, ne ipsae quo-
que uim medicamenti experiantur: quod procul dubio, in pudendis partibus
frequentius, ac facilius contingere cernimus, q̄ quibusvis alijs. Quod fit, ut pe-
ritiores Medici ob eandem causam, circumiacentes partes illiniant unguento
ex bolo armeno, terra sigillata, aqua rosacea, & aceto: non quidem solū preca-
uendae partis gratia, uerum ne humorum aliquid ui medicamentorum ad affectū
partē euocetur. Acrocordones uerō, myrmecia, & thymia non modō aduren-
tibus medicamentis conteremus, sed & candenti ferro frequentissimē opus est
inurere, quae sanē omnia nonnunq̄ excidimus ligatura apte illis coaptata, uel
ferreis dentibus, aut forcipibus euellimus, ac radicinis extirpamus. Ceterum si
aut excideris, aut ferro inusseris, prius partes circumstantes, uel ferrea lamina,
uel utcunq; aliter contegere oportet, ne ignis aut ferri vim persenscant: Post-
modum uerō crusta butyro soluenda est, & ulcus curandum. Verum si uerru-
carum aliqua species in exulcerationem migrauerit, metallicis medicamentis
ante scissionem, aut uisionem, curationem tentare conueniet. Quod si thymia
in utero adnascantur, considerare primō oportet man suetorum curationē, quae
facilis est, ac (ut refert Aetius) per abscissionē ex bol sella fit, mox adhibitis phar-
macis sanguinem sistentibus, ac inducentibus crustam: sic medicamento flori-
do ex homomate, rosarum flore, & citinis siccis parato utemur: nam haec cōtra-
hant, & quadamtenus repurgant, ulceraq; ad cicatricem ducunt. Verū ante
scissionē tentare oportet eorum discussionē, q̄ primō praestat saluia sicca, tusa
cum pinguibus caryeis: item soleas ueteramentarias humidas urito, ac terito,
& uino preimbutas imposito. Praestat & serpentis exuias tritas carne caryca-
rum

A rbori reiectis granis, emplastri formam imponere: item gallam, aut alumen tritum inspergito: aut origani & rute radicis aequales partes: quas ure, tere, & insperge: Quae si non profuerint, preueniendum est chirurgia, ante quam maligna fiat, quo tempore, frustra existimant antiqui praesidijs uti ante sectionem, quin potius uestione tantum esse curanda, ob periculum sanguinis eruptionis, uno eo sensu fatentur. Cui consimilem curationem ficius exposcere mihi visum est. Ad verrucas autem huius partis, quas fornicarias nuncupant, summe confert hoc praesidium. Capite recenter iugulare oculos compungito, & humore inde profluente assidue illinito. Bubulum item stercore calidum illitum confert. Velut aliud quod vtilissimum est, & hoc modo paratur: origani festucam ad lucernam accendito, & fornicarijs verrucis admovento, non quidem ut urat, sed quoddam fumum parti praestet.

B Id proculdubio, in omni curatione observare oportebit, nimirum, humectia, pingua, & laxantia pharmaca ex usu non esse. Item in praedictarum curatione circa uteri partes exedentia medicamenta diu immorari, non est permittendum, ne subiecta caro, quae tenerrima est, ocysime exedatur: ob id quidem bis terve in die partem abluere oportebit, maxime astringenti aliquo lauacro, si fluxionis suspicio adsit, sin aliter, abstergenti.

De scabris uteri, & pudendi pustulis.

Cap. 24.



A Vt non raro equidem in foeminarum pudendo, & uteri osculo scabre, pruriginosae, & furfurum plene pustulae adnasci solent, ijs potissimum foeminis, quae morbo gallico affectae, uirorum quoque eodem malo infectorum, consortio utuntur. Ex quo proculdubio malo in sordida, corrodentiaque ac maligna ulcera decidere foeminas frequentissime conspiciamus. Sunt igitur pustulae exigui quidam tumores, quos & botiores appellant Medici: in quibus substantia, ex qua prodeunt, qualitate magis, quam copia molesta esse solet: imo & plerumque in eis uenenositas inest, maxime cum scabre, & pruriginosae pustulae fiunt, & furfuraceas squamas ex se proijciunt. Quo tempore coniectandum est, humorem esse mali moris, & ex gallicae infectionis sorte, quod non solum in pustulam degeneret, uerum & aegre sanabilem reddat affectum, pruriginosum quidem, ac scabrum, quod maioris mali praesidium existit, siquidem potissimum in partibus, ubi faeculentis, & sordidi humores affluunt, & immorantur.

Causas quidem habet huiusmodi affectus plurimas, nempe humorum non naturalium exuberantiam, quos esse biliosos, & adustos cum crassitie arbitrantur. *Causa.* Qui sane dum in corpore redundant, & pars aliqua imbecillior facta, in apto loco existit, illuc sese in partem carnosam per porositates insinuant, & huiusmodi affectus progignunt, eoque maxime in foeminarum pudendis, ob partis naturam, & situm. Huc etiam causarum generi accedit alia ex morbi gallici natura contracta, quae easdem pustulas reddit curatu rebelles, contumaces, diuturnas, dolorosas, contagiosas, ac denique maioris mali praesagas.

V 2

Requi-

*Curandi
ratio.*

Requirat profectò huiusmodi affectio, non solum optimam vitæ rationē, & A
studium, verum maximam, & diuinam in artifice diligentiam. Quapropter in-
stituta ea victus ratione, quæ alimentis optimi nutrimenti constet: præcauebi-
mus cibaria acris, sanguinem item ex brachio mittemus non semel, sed bis, &
aliqn ex talo. Præterea lentè, & paulatim humorum malitiam frenabis syrupus
ex borragine, violis, rosis, cichorio, fumaria, & similibus, cum decocto lupulo-
rum, radicis schorcioneræ, similacis asperæ, aut ligni guaiaci. Et eadē lege non
solum bis, sed pluries prædictos humores purgabis pillulis scetidis, cōfectio-
ne amech, agarico, diacatholico, ac diaphænico, & alijs, quæ aduersus gallici
morbi naturam parantur: in minori tamen dosi, quàm viris offeres, vel tempe-
ratis, aut commixtis alijs mitioribus, vt casia syrupo ex infusionibus, cōfectio-
ne amech simplici, decocto senæ, prunorum, & polipodij: à quibus non erit ab-
re aliquando vomere, vt Hip. est consilium: vel si maioris, decocto guaiaci sudo-
rem mouere, aut vnguento nostro li. de morbo gallico scripto inungere: quod
huic malo summopere esse proficuum arbitròr. Quibus, educta maiori humo-
rum copia, reliquam curandi rationem tribus scopis circumscribes.

Primitus quidem id, quod iecori huius mali origini, & toti corpori, quasi B
habitualiter inhaeret, radicatus extirpabis. balneis nimirum sulphureis, vel si pru-
ritus fuerit maximus, aquæ dulcis, aut sudoribus ex decocto ligni guaiaci, vel
similacis asperæ, aut vtriusq; vel prædicta inunctione. Quo facto sufficenti die-
rum numero, quia plerunq; aliquid in iecore, & membris solidis, adhuc post
sudores reconditum, ac fixum superesse comperimus (cuius ratione iterum affe-
ctus pullulat) mihi & plurimis doctissimorum virorum compertum est, prodesse
non parum, diutius vt syrupo cōfecto ex decocto ligni guaiaci, & similacis
asperæ, aut paulatim, ac sensim si quid superest, conterat, ac dissipet.

Secunda verò indicatio, his factis, & interim dum fiunt, consulit, corpus p-
stantioribus succis grandi diligentia renutrire, tum vt partes in antiquum, &
natinum statum optimo alimento restituantur: tum verò, vt alimenta ipsa attē-
peramento sint vitiosis humoribus.

Tertia, & vltima indicatio prouidet parti affectæ, vt si quid pustulosum ibi-
dem præest, facile auferatur, & procidat. Quod profectò facies, si aqua calida C
freq. uenter pustularum scabritiem temperaueris, & balneis, ac infussionibus.
Postea verò partem affectam vino calido cum nitro eluito, & mox à lotionē,
iterum aqua calida perfunde. Confert etiam butyro cum sulphure pustulas
inungere, aut ceratum ex oleo myrtino, rosarum, & spuma argenti, ac cera con-
ficere, & parti apponere. Præstat amurca cum sulphure, aut eadem argenti spu-
ma: alumen item cum melle, & myrrha. Ex vsu quoq; est, oui vitellus cū amur-
ca in plumbeo mortario ad coloris mutationem agitatus: itē malicorium cum
myrrha & melle: aqua et Lanfranci vulgò appellata. Sed inter oīa auxilia id mā-
ximè, & semper conferre, peritis in arte est cōpertum, quod recipit aquarū plā-
taginis, & rosarum, ana 3. iij. salis gemmæ, nitri, & aluminis, ana 3. iij. sublimati
3. j. & .s. bulliant ad tertias, & fiat colatura, cui adde viridis æris 3. j. à cuius medi-
camenti vsu, vno aut altero die exhibito, ad mitiora medicamēta progrediendū
est, & iterum ad id redeundū, donec pustulosam carnē separatā cōperies, & noui-
ter facta clucescat. Huius celsus auxilia nō pauca apud peritos chirurgos repies:
sed

A sed mihi nunc hæc sufficere videntur, ni affectio eius fortis videatur, quæ nos cogat vel ad ferrum, vel ad aquam argenteorum, quam censeo in malignis esse proficiam devenire.

De vteri fistulis. Cap. 25.

Num hoc certum esse scio, ex inveteratis, difficillimis, depascentibus, & perperam ac negligenter curatis vteri ulceribus (sed præcipuè ex tumore, qui difficulter rumpitur, ac virosum pus effundit) facile fistulosa ulcera & cauernosa maximè fieri. Fistula igitur est artus, oblongusque & callosus sinus aliquatenus indolens: &, ut alij censent, cauum est, profundum, sinuosumque; vlcus, callo obductum, & angusto foramine patens, quo à sinuosis vlceribus dissidere constat. Huius sanè affectionis differentias non paucas reperies, siquidem aliæ sub cute extensæ sunt: aliæ altius penetrant, aliæ rectæ, aliæ tortuosæ sunt, plures intra carnem desinunt: aliæ ad ossa aut cartilaginem permeant, vel venam, arteriam aut nervum attingunt: & tandem omnes ab uno ore exorsæ, aut simplices sunt, aut duplices, triplicesve. Quas porro differentias expendisse ad curationem convenit.

Inter eas corporis particulas, quæ fistulosis vlceribus maximè obnoxie sūt, non infimum habent locum os vteri & pudendum ipsum: nam præter plurimas, acres, & erodentes humiditates (quibus hæ partes abundant, quas scimus esse huius affectionis potissimas causas) carnis substantia & mollissima compago facillè monstrant à quavis causa posse exedi, ac postea difficulter coalescere, quod calli est potissima occasio. Fiunt itaque in vtero fistulæ cum pus in abscessu aliquo, qui promptè non rumpatur: sic excoriat prædictas partes, ut continetia à subiectis separet ac diducat, deinde, eo uterunque vacuato, distantia inter se pristinum statum recuperare nequeunt, ut ex Gal. constat lib. de tumo. præ. na. Quem proculdubio sinum si protinus diligenter non curaveris, callo obduces ita duro ac denso, ut nec glutinari quidem deinceps possibile sit. Huius affectionis rationem adducit Gal. lib. de humo. Sed expressius & fufius Hipp. lib. de fistulis: qui profectò ex contusionibus, æquitatione, aut re quavis contundente extrinsecus accedente, fieri testatur: sicut ex tuberculo diu maturefcente prodire etiam fatetur. Ita quoque ex omni causa, quæ carnem, vel subiectam substantiam exedat, facillè fiet, nisi antea præveniatur, ne obcalescat prius quidem, quæ partes coalescant, modò tuberculum, modò humor exedens depascentisque sub cute carnem, modò contundens aliquid sit: dummodò partes inanes carne supersint, & antequam coalescant, obcalescant.

Dignosces quidè affectū & eius differentias: primò ex figura fistule: factitiæ persimilitem ex callo forma fistulari obducto, quæ fistulæ essentialis differentia existit. A virulentia quoque horribili aliquando excreta, ex detento insinuatibus illis recremento malè perflato, ibidemque corrupto. Eodem etiam modo extenui sanie, ac fluxibilibus & tenuibus humiditatibus dignosces: quas neque coquere partis imbecillitas valuit, neque crassiores per callosam substantiam, densam alioqui ac solidam permeare posse, est credendum. Item id ostendit nullus aut leuissimus dolor, nisi fistula nervum attigerit. Simplicem verò aut

duplicem esse fistulam, ex puris maxima copia, quam fortamen vnum capere A
maximè potest, facile intelliges: item si in diuerso corporis situ, vtcunque sit, purus exierit certum, proculdubio est indicium, non vnicum, sed multiplicem esse sinum.

Præterea carnem esse fistula perforatam, pus rubescens ostendit: & sic de reliquis subiectis substantijs iuxta cuiusque naturam: licet de signis nervi de sumptis ex pure variè sentiant. Celsus & Aetius: verum ex dolore id facilius colliges etiam si quàm minimum fistulæ fortiantur. Quod si venæ intimum abradatur, crassus & plurimus profluet sanguis: si arteria, paucus & tenuis. Et hæc de signis sufficiant.

Cutis
7. 110.

Verum quia ærumnosam, calamitosamque vitam & multis perculis obnoxiam huius affectiones accersunt: siquidem ad intestina & ad vesicam adeo profundè aliquando perineant, ut vrina & alui excrementa per fistulam faciliè instillent: ob id quidem, antequam natura habitum contrahat, assuescatque per partem illam à recrementis prædictarum partium aut totius corporis expurgari, curandum est: fistulosa ulcera ad coalitum ducere, quippe si diu curationem protraxeris, corpus mille miserijs obnoxium proculdubio facies. Primum itaque videtur & uita optime instituis, quæ non eris redundare humorem præparabis; quo extracto continenti pharmaco, ut superius dictum est, ad totius corporis prouidentiam deueniendum erit, frictionibus & moderatis uinculis partium superiorum, maximè si affectio ex fluxione dependeat. In qua sanè re conducit, non parum usus balnei sulphurei: sed utilius longè est corpus sudare decocto ligni guaiaci, aut similacis asperæ. Quo facto, iterum syrupis & apozematis utendum est, quæ interiora viscera exsiccent ac roborent, ut prohibita fluxione facilius fistulosa ulcera curari possint. Præstat potissimum hæc gratiam syrupus ex ligno guaiaco confectus, cui in decoctione addere oportebit agrimoniam, centauream, & senam aliquid. Benefacit quoque potus, qui recipit filicis maris à Dioscoride appellatæ 3. j. & gentianæ 5. j. centauri 3. vj. portulacæ 5. l. hordei mundi p. j. decoquantur in aqua secundum artem, & facta colatura, adde serapij rosacei, quod sufficiat ad conciliandam dulcedinem. Confert etiam potus, qui recipit agrimoniam p. plantaginis p. l. foliorum oliuæ 5. l. polipodij 3. vj. decoquantur contussa ad tertiæ partis consumptionem, & colatura adde syrupi de rosis siccis, aut minuat citoniorum quantum sit satis, ut citra molestiam bibi possit.

Quibus porro corpore præuenito, ad localia præsidia tutius & audaciùs peruenire poteris: in quibus administrandis prima indicatio, quatenus ad effectum pertinet, docet callum prius conterere; nam cum ea, quæ disuncta sunt, uniri minimè possint, callo in medio existente, curandum primò est, eum extirpare. Verum quia peculiaris fistulæ conditio est, osculum summe arctum & angustum obtinere, ipsum primo dilatabis, caute tamen, ne vesica aut rectum intestinum, quod propè sunt, damnum perferant, & subinde conuulso, aut aliud grauius noua fluxione concitata subsequatur. Primò itaque id tentabis immisso aliquo collirio, quod constet ex radice gentianæ, uel aristolochiæ, aut brionæ: sed probo magis spongiæ ellychinum immittere, & ibidem immorari sinere octo aut decem horarum spatio: quo auxilio, tutius foramen dilatari conspiciamus, quantum sit, ut facilius medicamentum immitteri possint, vel pars iuri. Orificio lauis parulo, callum uno è tribus modis extirpare pote-


A poteris medicamentis nimirū acrioribus, & callum conterentibus, scissione, ac auulsione calli: & ultimò partis inuisione. Quas etenim actiones non indistin-
ctè, & utrunq; cuius fistuloso vlceri præstabis: sed si recens fuerit fistula, in qua
callus non induruerit, aut flexuosa non extiterit, vel plurimum maligna nō fue-
rit sordida, ac virulenta, solum quidem medicamentis acrioribus curari deside-
rat: sicut dum callosa est, sinuosaue, scissione, ac dum sordida vel maligna, vstio-
ne. Ergo si recens fuerit fistula citus callum conteret radix gentianæ, radix elle-
bori nigri, spondilij radix circumrassa, & in collutione cum modico puluere
Ioannis de Vigo immissa: succus etiam radice laserpitij. Prodest, & unguentū
ægyptiacum: item aliud, quod recipit æruginis 3. xij. ammoniaci 3. ij. vino exci-
pe, & penicillo aliquo immitte. Præstat, & collirium ex trochiscis asphodelo-
rum, vel ex calce, & sapone. At si laborans, non admodum imbecilla fuerit, nul-
lum aliud medicamentum facilius callum conteret, quàm penicillus aqua ro-
sarū madidus, & modico arsenico intinctus. Si tñ fistula sinuosa fuerit, oīa hæc
decocto aliquo liquefacito, & pmetrāchitā inijcito. Pleraq; alia apud oēs auto-
B res ad fistulas pharmaca reperies, qb⁹ vñ ē poteris, si quas adduximus, seruane-
ris leges. Verū si fistula antiquior, durior, & callosior facta fuerit, laborans tñ
sectionem vel vstionē formidauerit, ad efficaciora medicamēta veniendū esse,
cōsuluit rei ipsius necessitas, cuius naturæ est illud, qd recipit unguētū ægyptia-
ci 3. f. sublimati 3. f. arsenici 3. j. lixiuat, & aquæ plantaginis ana 3. iij. aquæ rosa-
rum, 3. iij. bulliant ad cōsumptionē tertiæ partis: cuius medicamenti pusillum
aliquid inijcito, ac foramē obturato, ne ressuat. In eadē quoq; & insinuosas fi-
stulas, ex aridis medicamētis per fistulā aliquid insufflabis. Sunt et qui audeant
aquā argētorum in fistulas, immittere, qd cautē in uteri, ac pudēdi malis effi-
cere oportebit, ac non nisi dum corruptionē vereamur. Cum hoc tñ, si in pudē-
do malū extiterit, facilius & tutius valida quoq; offerre poteris: verū si in ute-
ri osculo, debiliora proficua sunt, reliqua verò citra damnum pars non admittit.

Quod sine hæc quidem omnia sufficere uideantur, ad secundam curandi rē-
nem deueniendum est, uel pronuntiato periculo discedendū. Fit autē hæc in scis-
sione vsq; ad fistulæ finē facta, & callo unguibus aut scalpro radicitus auulso,
C seu excoiato. Quo facto, ulcus detergentibus curato, quale est, qd recepit tere-
binthinæ in aqua uitæ lotæ 3. iij. succi apij. succi cynoglossæ ana. 3. vj. mellis ro-
sati. 3. j. & saristolochiæ rotundæ 3. ij. farinæ lupinorum. 3. f. coquantur succi cū
melle rosaceo ad medietatis cōsumptionē, deinde reliqua misceant. Præstat quo-
que aliud qd recipit aquæ hordei 3. viij. mellis rosacei 3. ij. myrrhæ, sarcocollæ,
radicis peucedani, & iridis ana. 3. f. Itē aliud qd recipit radicū lilij prū crematorū
3. j. mellis rosacei 3. iij. misce, & vtere: ex vsu itē est idē puluis sol⁹ immixtus. Vti-
lissimū qd ē experietis aliud, qd recipit chameleontis nigri radicē, pini corticē,
thus masculū, aristolochiā pari pōdere, tertio, ac p fistulā, aridū ifunde, aut mel-
le rosaceo admixtum. Est item aliud, quod mirum in modum prodesse fert: re-
cipiens aquæ vitæ 3. ij. vini maluatici 3. j. mellis rosacei 3. x. myrrhæ, radicis pe-
ucedani tritæ, utriusque 3. ij. sarcocollæ, aloes, utriusque. 3. j. & f. misceantur, &
bulliant unica ebullitione lento igne, & in ulcus infundantur. Sed apud ple-
rosque probatur magis aliud, quod recipit aloes, thuris, sarcocollæ, sanguinis
draconis, balaustiarum, antimonij, aluminis, sacchari, cuiusque 3. scilicet eum

succo fumariae fiant trochisci, quibus liquore aliquo dissolutis, utere.

At dum eo miseriae fistula deuenierit, ut non solum callosa existat, sed uirulenta quoque & maligna sit, ad uisionem venire nos cogit rei difficultas & imminuentis mali timor. Fieri etenim id solet, vel candenti ferro, vel caustico medicamento, quorum neutro in fistulis oris uteri utendum esse censeo, sed in ijs tantum, quae pudendo insunt. Verum ubi opus est, ac lege fieri debet: scindes quidem primo uniuersam fistulae cauitatem, sectionem arteriarum cauens. Quo facto, specillo prius per fistulam inmissio, cuius ductu fistula discindatur, ellychnis partem formabis, donec undique discissa labra disungantur: altera tamen vel tertia die medicamentum causticum immittes, vel ferro candenti, si ugens fuerit necessitas, partem inures, circum ipsam positus, quae repellant ac refrigerent, medicamentis. Facto ulcere, pharmaco uteris mitigatorio, ut oleo cum ouitello: tadem ad ea, quae crustas deiiciunt, denenies, uelut est butyrum, aut pingue aliquod vel unctuosum: tunc enim crustis decissis, pus incipit coctum apparere, a quo donec ulcus sanescat, ea, quae superius diximus abstergere & ad cicatricem perducere, adhibenda sunt. Hoc unum tamen in hac curatione praeculis habeto, quod si affectio ex morbo gallico originem traxerit, verendum minimè est, efficacissima quaeque adhibere praesidia, quale illud est, quod arsenicum & argentum viuum recipere diximus: verum si ex alia causa prodierit, mitioribus semper utendum est pharmacis.

De uteri haemorrhoidibus. Cap. 26.



QUEMADMODUM (ut ex Hipp. lib. de haemorrh. constat) cum humoris alicuius copia ad uenas recti intestini decumbit, sanguinem, qui in uenis est, calfacit: calescentes autem uenae ex vicinis uenulis sanguinem attrahunt, & ubi replentur, interna sedis pars intumescit, & capita uenarum supereminent. Sic profecto, pari prorsus ratione in uteri osculo ac ceruice, uenae quae in has partes desinunt, dum crassiore sanguine, vel alio quouis humore, adeo (citra debitum & statutum menstruationis tempus) replentur, ut intumescant, eminentias non paruas animae haemorrhoidibus per similes efficiunt, quas uteri quoque haemorrhoides plerisque autorum appellare placuit. Has quidem his uteri partibus accidere scimus in quas uasa desinere contingit, in quorum osculis nimio humore, eoque saeculento crasso & effervescente turgentibus, praedictas haemorrhoides fieri certum est: maxime quae in uteri collo aut osculo id uitium accidere, ut ex Cleopatra, Moschione & Paulo euidenter constat: licet Aetius raro utero accidere referat, ac rarissime pudendo. Haec itaque est huius affectus natura, cuius effigies aut caeterarum est haemorrhoidum, uel ficus aut mori, prout sanguinis est conditio, & uenarum, quae tument, magnitudo. Harum sane haemorrhoidum quasdam constat esse dolentes, exacerbatas, ac mali moris: quasdam uero mites & citra dolo-rem: item alias caecas per aliquod tempus, aliasque fluentes semper.

Proficiscitur quidem haec affectio ex uarijs causis: primum quidem ex rhagadijs, condylomate, aut alia uteri excrecentia, ubi ad eam temporis tractu crassus foeculentusue humor confluxerit. Item ex inordinato sanguinis menstrui ad uteri inferioris uenas fluxu: nam si ante debitum tempus huius uenae replantur, fit facile, cum

A cum sanguinem susceptum non profundant (quia nondum tempus excretioni aptum est) ut ibidem incalascant, fiatque crassior, ita ut permeare venarum oscula non possit, ac ex consequenti eadem in tumorem prædictum eleuet. Quia propter dum vitio sanguinis venarum superiorum partium uteri sanguis in eodem plus iusto immoratur, innumera alia vitia, quæ hucusque retulimus, succrescunt, dum verò ad venarum oscula ante debitum tempus cõfluxerit, & ibidem præpediatur, videturque hæmorrhoides & mēstruorum suppressionem, aut inordinatos fluxus proficisci certum est.

Cum hmoi hæmorrhoides in duplici sint differentia, dolorosæ nimirum, & indolentes: oïum signa recensere oportebit, si prius cõe plerisque esse dixerim, sanguinem plurimum fundere, eumque per inordinata & breuissima intervalla: aliquando verò per longiora, nonnunquam verò licet rarissime per statuta tēpora. Habent quoque feminæ sic affectæ colorem fœculento sanguini, aut humori peccanti persimilem: aliquando pallor vniuersas apprehendit ex frequentibus sanguinis vacationibus: quas quoque esse lassitudine, tensione, ac imbecillitate non leui affectas comperimus. Item dolorosas & crescentes comprehendentes ex dolorifica, cruenta, ac subrubra excretionē: in remissione verò fluunt citra dolorem huida & fœculenta. Earum quoque causam dignosces, quia si sanguis fœculentus & crassus fuerit, mori ac sicus formam hæmorrhoides obtinere certum est, in quibus sanguis difficulter aut rarò funditur: at si pituitosus extiterit, vix quidem aut vesicæ formam suscipiunt: si verò adusta flauabilis & crassa, virulentiam ex se cum fœtore & dolore maximo profundent. Ceterum intueri potest affecta pars & conspicua effici instrumento apud chirurgos huic usui parato, quod matricis speculum appellant.

Est quidē tā difficilis & varia apud priscos autores huius affectionis curandi rō, ut si rē diligentius consideres, non possis eos audacie nomine non accusare. Quippe oēs, primò ferè statim curationis accessu, hæmorrhoides in totū abscedentes, aut subtus in earū radicibus scarificantes, donec ipsæ emortuæ spōte decidant, in nō leue discrimen laborantes deferūt. Quā sanè audaciā, ne dicā temeritatem, à Moschione & Cleopatra summe dām natam reperio, licet ipsi quoque scissioni manus adhibeant. Atq̃ uera medēdi rō, & qualis futura sit circa hmoi affectum diligentia, ipsius affectus natura & conditio euidenter monstrāt: scio tñ non deesse, qui sicut hæmorrhoides ani, curare doceant. Considerare tñ imprimis oportet, dolorosæ ne sint, an dolore carentes: nam si primū, dolorē mitigabis sanguine sufficienter mīssō, si plenitudo subsit ex brachio, postmodum tñ ex talo, maxime si menses defecerint, & hæmorrhoides nullum sanguinem profuderint. Deinceps verò in seccionib. vteris ex malua, hordeo, fœnugræco & oleo amygdalarum dulcium factis: cui usui conficies unguentum ex butyro recenti, uel vnguento rosaceo diu in mortario plumbo agitato: item ex mucilagibus seminis citoniorum, aqua plantaginis & rosarum extractis, & in eodem mortario validè cōmotis. Si tñ dolor plurimū urgeat, hoc unguēto utitor, qđ recipit butyri recentis ʒ. j. vnguenti populeonis ʒ. f. olei rosacei ʒ. f. vitellum oui recentis, misce. Conficies item aliud ex nuper dictis, cui adde croci ʒ. f. opij g. x. misce: & vtere: tandem adhibebis aliquod ex ijs, quæ superius ad uteri ardorē, pruritum, aut inflammationem diximus.

Verūm

Signa.

200

Curandi
ratio.


Verum si hæmorrhoides dolore sint carentes, aut iam mitigatio, diligenter exquirere opus erit, an sanguinem aliquē fundant, vel siccæ, & tumentes existât. Si primum iterum medicus consideret, an sanguis ille, qui fluit, modicus fuerit, quo nullum est præstantius beneficium, vel immodicus, ita ut periculum aliquod vel plenioris hæmorrhagiæ, vel malî corporis habitus immincat. Quo tempore diligenter sanguinis profusioni prouidendum est, primò sanguine misso ex brachio partitè, & per intervalla, ne factò subito retrocessu, in principalius membrum irruat, vel facta copiosiore vacuatione vires ocys labant. Mox tñ ad eā, q̄ sanguinem sistunt, veniendum est, cuius naturæ existunt alumē, cortices thuris, pulueres rosarum, myrtillorum, sanguis draconis, quæ omnia albumine oui excepta, uel cum atramento sutorio admixta, summopere prodesse constat. Nec placet quidem hac in parte eorum sententia, qui inurere iubent partem illam: quippe os vteri agrè id perferre poterit, nisi periculo admodum urgente: quo tempore dorso, & eidem parti frigidiori, & astringentia prius adhibenda esse consulo, velut est bolus armēnis, balauistium, folium malicidonij, vel puluis eius, sanguis draconis, acacia, hypocistis; ex quibus fieri possunt vnguenta, pulneres, aut sacculi, parti affluenti adhibiti. Neq; minoris momenti est, ipsas hæmorrhoides illinire puluere, qui recipit gummi prunorum coria meli granati, gallas, acaciam, hypocistidem, quæ omnia uino dissoluantur. Potiones et porrigere oportet, quas sanguinis profusioni conferre dictum est. Itē prodest eoque partes superiores fricare, ligare, ac cucurbitulis ad eas sanguinis ipetū euocare.

Quod si tumentes, & siccæ extiterint hæmorrhoides, vel per longissima intervalla sanguinem fuudentes, consideret tunc prudens, & diligēs medicus, an sanguinē habeant ibidem concretum, an verò carnosam quādam substantiā, fungosamq; ex vitioso sanguine genitā: nā si primum sit: eas rescindere, ut veteres iubent, temeritate plenum esse existimo. Inquit enim Moscio; Antiqui ergo, quibus tollere eas placebat, aut chalaistico eas illiniebat, aut ligno constringebat, aut bases earū scarificantes, sic puluerē apponebat, ut paulatim emortuæ ibi caderent: q̄ oīa p̄sidia, & pleraq; alia eius naturæ nos reprobauimus, q̄ feruor inde nimius emergat, & ex consensu vicinitatis periculū nasci possit. Cui sanè voto ego quoq; assentior, ac existimo, non solum id periculū p̄sto esse, uerū, & incōpescibilem fluxum. Nā Cū hæmorrhoides uniuersi corporis extremū sint, & oscula vasorum: necessum subinde est, his rescissis maximā, & incōpescibilem fieri hæmorrhagiā. Quamobrem in ijs, quæ adhuc sanguinē continent, p̄sidia, citra chirurgicam manum solum adhibenda esse cēsemus, ea nempe, q̄ hæmorrhoides exsiccare nata sunt, uelut est acaciā uino austero trita, aut terra lemnia cum aceto illita, puluis sparte parellæ, aut ligni guaiaci subtilissimus cū melle, puluis rhabbari cū uino nigro. In qua re consulit Aetius ad merè frigida puenire, uelut est succus mandragoræ, aut cicutæ, quibus ego uti nō auderē, nisi aut alijs admixtis, aut in paruissima quantitate. Quem vltimū tutius p̄stabit vnguentū, qd recipit disfriges 3. iij. cerusa, spumæ argenti, plumbi usti, & loti, singulorū 3. iij. excipe melle, & abluta prius uino parte, illine. Qd si frigidis uti necessitas non cōpulerit, exsiccare eas placebit, magis q̄ nimis frigidis cōstringere, p̄stato fortasse maiori dāno. Resiccet quidem huiusmodi hæmorrhoides oleū de semine lini cū oleo de nucleis persicarū, vel pini cōbusti in plūbeo mortario agitatū.

A tum. Confert etiam incredibili quadam efficacia olei de fructibus momordice quam balsaminam appellant. Præstat eundem usum, ut refert Gal. lib. de theriaca ad Piso. theriaca vino liquata, vel frequens uini ablutio, aut sacculus ex chamaemalo & semine lini, uino austero aut nigro, calens ibidem sæpe appositus: item puluis, qui recipit corticis nucis aut quercus, spongiæ, aristolochiæ maioris æquas partes: quæ omnia ex siccata & in puluerem redacta, loco melle illito insperge. Verum si efficaciori adhuc opus fuerit auxilio, id confice, quod recipit foliorum uitis & ficus, ana m. j. viridis aris ʒ. j. quæ in uase aliquo pone & in furno desiccari finito, donec puluis fieri possit: quo locus oleo de semine lini madidus aspergatur. Neque parum profectò conferre uidentur inselliones ex ijs, quæ resoluendi vires habeant, sicut balneum ex aqua sulphurea & aluminosa. Proflunt et alia non pauca, quæ ani hæmorrhoidibus prodesse scimus.

B Verum quando eò miseriæ deuentum sit, ut in fungosam ac fictitiam carnem, totam illam excrecentiam degenerasse comperiamus: maioribus auxilijs, ijs quæ mox diximus, prius tentatis: ad sectionem ueniendum esse cōsulit affectus natura quippe in hac sola hæmorrhoidum dispositione ac statu, sectionem esse proficiam ac tutam existimo. Antè tamen non erit ab re, medicamentis excrecentem carnem conterere: cuiusmodi est, quod recipit calcem uiuam, ac mellis quantum sit satis, ut formetur massa, quam in furno exsiccari permittito, donec facile in puluerem redigi possit, postea melle admixtum super partem insperge: primo tamen accessu aliquid ex mitioribus pharmacis adde, donec comperias quid ferre possint affectio & mulieris conditio. Succus etiam tassi barbasi cum oleo de semine lini parti appositus, fertur plurimum prodesse. Si tamen hæc sufficere non uideantur, sicut condylomata excidenda esse diximus, has quoque hæmorrhoides abscindere necessum est. Mox quidem, ut prædicto cap. diximus, ulcus curare oportebit, præcauentes semper, ne sanguis impetu ruat exhibitio ex astringentibus & resiccantibus aliquo medicamento.

De uteri calculo. Cap. 27.

C  N utero calculos generari inter alios recēset Aetius: sed primū oīum Hipp. lib. de sterilibus, refert ex pure in utero concreto callū fieri: inquit. n. Festinare itaq; oportet ad expurgandum prius, q̄ pus in uteris in callum concreseat. Sed clarius adhuc idem autor lib. ʒ. popu. inquit; Famula Dyfiris in Larissa cū inuēcula esset, ubi Venere vteret, fortiter circū circa dolebat, aliās autē sine dolore erat: concepit autē nunquā, & cū sexaginta esset annorū, dolebat à meridie, uelut ex partu uehementer laboraret. Hæc cū ante meridiem porrum edisset, multum, postquam dolor ipsam corripuit uehementissimus, & priores oēs excedens, exurgens asperum quodam in uteri ore deprehēdit, postea cum ipsa animi deliquiū incideret, alia mulier immissa manu exprefit lapidē asperū magnitudine verticili fusi, & sanata tunc statim. Ex quibus sanè locis euidenter cōstat, uteri calculos nō esse solutos ac liberos, quales vesica generat: nā cum uteri cavitās & osculum tam grande existat, & singulis mensibus tanta sanguinis copia fluat, perdifficile est credere calculos solutos ibidem immo-

immorari posse. Quod etiam constare arbitror, quia certum est, eos quoque in v- **A**
teri ceruice adnasci, ut ex Aetio scriptum inueniemus. Ob id quidem velut tofa-
cea & callosa substantia vteri tunicis aut collo proculdubio adnascuntur duri,
diuersae magnitudinis, & qui non hinc inde mouentur, sed simplici quadam
vniōe ab extremō eorum alitioni apto, incrementum susceperant, & tunicis
aut collo adherent. Quam sanè adhaerentiam euidenter ostendit sententia illa
Hip. lib. de steril. siquidem refert ex materia callum in uterō concresecere, ac cō-
firmat diuturna lapidis mora in vtero famulae Dysiridis, quod erat per difficile,
si solutus uagaretur peruterum lapis. Vtunque tamen sit, morbus est in nume-
ro adaucto, uel in contentis prae naturam.

Causa, Causam verò existimo esse, crudū, crassum & fœculentū humorē in aliqua
vteri parte ex eius imbecillitate genitū, aut paulatina congestione aliunde trās-
missum. Cuius equidem, potissima cā est lentor praedictorū humorū, quos neq;
coquere, neq; discutere ualet uteri calor: non q̄ debilis ac remissus existat, sed,
q̄ ex intensiōe ac uitio tenue digerat citra coctionem & crassum in tofaceam **B**
naturam cōmutet. Generat tñ hmōi extuberantiam, quia cum inutiles sint hmōi
humores, eos quidem trudere ac expellere nititur, qui cum uiscidi sint & gluti-
nosi, tenaciter adherent, cum difficulter sit crassa permeare ac delabi: quo fit, ut
in porositatibus alicuius partis uteri permanentes, praedicto mō accrescant, &
aliquando in magnam profectō quantitatem, natura indies magis ac magis ad
partem mittente. Ex quibus constare arbitror, non lapidem, qualis uesica est,
sed tofaceam substantiam re uera esse: quam natura ualida nonnunquam sepa-
rat & foras trudit: aliquando verò ibidem morari permittit, & multorum ma-
lorum causa existit, Medicis fortasse ob rei nouitatem causam ignorantibus.

Signa. Cū verò hi lapides in utero praesunt, grauatiuus in ipso, ceterū leuis persē-
titur dolor, & exacerbatur maximè ipso cōpresso: mēses inordinate p̄deunt, fē-
mina nequit concipere ad tactum aliqñ cognoscitur. Qui verò vteri collo in-
sunt, maiores inferunt dolores ob compressionem vicinarū partium: qui tñ ali-
qñ adeo crescere solent, ut grauissimam in vtero & partibus vicinis inferāt mo-
lestiam: maximè cum certo quodam modo ac situ fœminae decumbunt aut se-
dent, ita ut vteri collum torqueri ac comprimi contingat. Aliquando verò in- **C**
strumento, speculo appellato, hos lapides faciliè est intueri.

Curatio. Ex affectionis natura & conditione proficiscitur, & ex Aetio constare vī nul-
lam aliam prodesse curandi rōnem, quam eam, quae docet tofaceam illam sub-
stantiam radicitus euellere: ob id consultissimum est, facta leui purgatione, &
iniecō clystere, qđ alius eluat, lapidē extirpare. Ponit autē idem author extra-
ctionis modum, quem ego proculdubito ceteris esse securiorem arbitror: iubet
enim digitis largioribus sinistrae manus in fœminae anum immisis, dextra ven-
trem comprimere, donec calculus extrorsum pelli cogatur. Cū hoc tamē cal-
culus, qui in abdita vteri sede reconditur, curatu existit difficillimus: nam cum
rationi consonum sit, eos vteri tunicis esse adhaerentes, ut superius diximus,
difficillimum sanè erit sola manus compressione euelli. Ob id quidem neces-
sum erit, compresso sinistra manu lapide, dextra tantam uim in ipsum imprime-
re, quae sufficiat, ut paulatina facta euulsione, lapis ipse procidat: quo facto, fa-
cillimum erit, ipsum deinceps ab utero pellerē.

Ante

- A** Antè tamen q̄ id opus moliaris, operæ pretium est, si rem ex voto fieri cupis, exterius fomēta, & blandas inunctiones vtero admoovere, quales ex butyro, oleo amygdalarum dulcium, mucilaginis, ac iure pingui carniū parari solent. Intus verò idem opus mulieris per iniectiones decoctionis herbarum emollientium, ex butyro, & oleo amygdalarum dulcium, quibus vnio rosaceæ illius substantiæ tenuior, ac mollior facta, facilius & indolorosius euulsioni, ac tractioni cedat. Verum si lapis in vteri collo extiterit, facilius rem facies, nam aperto vteri osculo instrumento aliquo ferreo, haud difficulter cōprehenditur, & paulatim, sicut vesicæ lapis euellitur, aut scalpello refecatur. Quibus factis in vterum proijcies ea, quæ recentibus vlceribus proficua sunt, ne sanguinis fluxio iusto copiosior concitetur: quibus admiscebis, quæ magis astringant, ac postmodū q̄ siccant, donec partem cicatrice obductam esse, comperias. Deinceps tñ providendum est, ne fa mina incautè viuatur, sed instituto optimo viuendi modo in victu, ac reliquis vitæ vsibus, curandum est, ne iterum affectio reuertatur: quod facile solet fieri, maximè si cibi vtatur crassis, vel potibus largioribus frigidioribusque, ita vt cibi iterum recrescant. Quamobrem donec habitus morbosus ad pristinum statum redeat, hoc viuendi instituto vtendum est, his terve corpus in anno purgandum, ne clam crassus ille habitus iterum succrescat.
- B**

De vteri vermibus.

Cap. 28.



- N**ON satis inter grauissimos autores cōstat, an lūbrici alio in loco, q̄ in intestinis generari possint, ob loci, ac materiæ apparatus, & cōmoditatē. Verum quia ex Cleopatra, & Prisciano constare scimus, in vtero aliquā reperiri: disputatione videtur dignū (quantum rei institutū partitur) an ibidē fiant, an aliunde in vterum permeent. Primum itaq; experimento credendum censeo, quod docet in vesica vrinæ generari paruos, rotundos, & albos lumbricos. Quod ē unica ratione videtur posse probari: nam si materia eadem & efficiens causa ipsissima in loco intestinis simillimo reperiatur, non capit intellectus, cur nō possint in eadē parte lumbrici fieri, tēpore non deficiente. Quippe si causa est putridus humor, ut ex Gal. testimonio cōstat (q̄ sanè putredinem, nō quamuis, sed subiectam crassæ, crudæ, & pituitosæ materiæ censemus, vel profectò eandē materiam putredini obnoxiam) ubi hæc præfuerit, fieri quoq; lumbricos necessum erit. Atqui cū hæc ē in utero, & vesica reperiuntur, mirum nideri non debet, si ibidem pari ratione insint. Sed dices, qui sit, ut tam rarò extra intestina appareant? id profectò accidit ob uteri grandes, & apertos meatus qui non permittunt tandiu ibidē huiusmodi humore immorari, q̄ diu par est, ut lumbrici ex eo gigni possint: & quia in vesica acris, & biliosa urinæ substantia, ea q; copiosa immoratur, q̄ aut putredini obsistit, aut vesicam à prædictis recrementis repurgat. Constat igitur quatenus ad materialē atinet causam in utero posse lumbricos fieri. Efficiens uerò causa, cū calor sit, constat, si cōsimilis in utero reperiatur, eodē quoq; ibidem fieri posse. Ex ijs enim, quæ ab autoribus & rei natura desumpsimus, euidenter colligitur, duplicem prærequiri calorē in prædicto opere: alterum putredinosum, & spurium, quē necessario humo-

ri

ri pituitoso, & crasso inesse oportet: alterum verò naturalem & copiosissimum, qui autor sit generationis. Ex quo elicimus, pueros hoc malo frequentissime affici, quod ex ciborū ingluvie frigidis, crassis, & pituitosis succis scateant: quos equidē, dū plurimū crescunt, calorē p̄ter naturā concipere. est opus: q̄ dispositionē nacti (nam antea, et si eadē habeant excrementa, lumbricos minimē infestantur) eō q̄ pueri plurimū habeant calidi innati, promptissime lumbricos gignunt. Ad rē igitur: si vterus natura iusto calidior plurima ex his recrementis suscepit, comprehensaq; diu obtinuerit, donec putridum calorem concipiant, rationi consonum videtur prādictos quoq; lumbricos ibidē generari posse. Si quis tñ dixerit, non posse quantū sat est, eo loco immorari excrementa, expēdat primò plus prāstare ad retentionē crassitiem, ac visciditatē humorum, q̄ inueniet ad expulsionē vteri cōmoditas: prāterquam, q̄ quantitas non est tam copiosa, quantum ea, quæ intestinis immoratur: neq; rursus id malum accidit, nisi ijs fœminis, q̄ vias vteri habent naturaliter angustas, & ipsum vterum prāter naturā calidum. Ex quibus causis prodit, vteri lumbricos, aut paruissimos esse, aut eis, quos ascarides appellamus, persimiles: quos prope pudendū adnasci rationabilius est. Cuius sanē rei testis et est Hip. li. 2. de mor. mul. per hæc verba: Si in pudendo mulieris, aut intestino recto ascarides nascantur, viticis folia, ac semē cū fellis bubuli obolo permisceantur. Ex quo decreto euidenter constat, lumbricos quoq; in vtero fieri posse, maximē tñ in eius extima parte, & collo, recto intestino simillimos: idq; ob copiosam pituitam rugis, & vteri osculo inuiscatā, accedente nimio vteri calore. Sed Priscianus, & Cleopatra euidenter docent ex intestinis in vterum lumbricos migrare: quod etsi aliquando fieri possit, non ob id negandum est, prādictis partibus posse quoque adnasci.

Signa.

Nec difficile admodum est, hos vteri lumbricos nosse: quippe dum adsunt, prurit natura, & venter, ac totum corpus inquietudine molestat, inundat vteri osculum, & pudendum nimia pituita, non quod ibidem sua sponte sit, sed q̄ ex lumbricorum pruritu, ac dolore, aliunde in vterum confluat. Sudant plerūque huiusmodi fœminæ, forsitan ex molestia: gracilescunt etiam & impotētes ac imbecilles fiunt. A somno quoque frequenter excitantur, & tumultuosē dormiunt, ac non rarò contremiscunt. Item aliquando inter menstruas purgationes ipsos lumbricos excerni conspiciamus, & aliquando pudendo adaperto videntur conspici. Prāterea, sic affectæ febribus inordinatis maxima ex parte corripuntur, & multa alia signa accidunt, quæ lumbrici intestinorum accersere solent: quæ sanē ob id consultò subiceo.

Curandi ratio.

Vniuersalem medendi rationem in proba victus institutione, & optimo viuendi studio, sitam esse dubitabit nullus: ob id cibaria adhibenda sunt, quæ facilis & optimi nutrimenti sint, ac facillimæ coctionis, & exsiccantis naturæ: ita vt in totum cruditas præpediatur, ac distributio ad singulas partes facili fiat, & insit quoque in alimento vis, & efficacia exsiccandi crudos, & frigidos humores. Potum verò sic affectis institues ex decocto radicis chinæ, vel similacis asperæ, anisi, vel cinnamomi: tandem eius, cui vires insint exsiccandi, roborandi; ventriculum, & viscera omnia.

Verū quia non sat est, victum commodè instituere, ni deinceps ad morbosum apparatus, & genitos iam lumbricos curandi quoq; rationem conuertamus,


A mus, ob id vniuersum corporis habitum exsiccabis mollibus frictionibus, & conuenienti exercitio: tandem ipsum paulatim purgare oportebit ijs, q̄ pituitā & crudos succos purgare nata sunt, qualis naturæ est agarici infusum, syrupus ex infusionibus rosarum persicarum, pillulæ mastichinæ, de hiera simplici Gal. de agarico, de aloë, electarium Indum, & alia nō pauca, quæ superius diximus, & quæ etiam amarorem præter purgandi vim obineant, vt commodius pituitā abradere, & abstergere possint. Quo facto, quia huiusmodi lumbricos interficere medicamento per os sumpto, vt in ijs, qui intestinorum sunt, perdifficile est & inutile, necessum quidem erit per vterinos clysteres ea in vterum infundere, quæ pituitam abstergant pariter, & lumbricos ibidem adherescentes. Fiunt autē tales ex aqua, & alumine cum absinthij succo, aut abrotani, vel eorū decocto, & menthe, calaminthe, dictami, & pulegij cum melle: item ex aqua lupinorum cum hyssopo & melle, vel ex decocto mercurialis cum melle, absinthio, & aliquo ex supra dictis: quibus si addideris aloes aliquid, vel aliud amarum, & abstergens, proderit maximè.

B Exteriorius autem vteri regioni adhibebis cataplasma confectum ex lupinorū farina in hydromelite decocto: item aliud facito ex melantho, & lacte muliebri. Huic quoq; affectioni suum præsidium scripsit Hip. li. 2. de mor. mul. dicēs; Si in pudendo mulieris, aut intestino recto ascarides nascantur, viticis folia, æ semen cum fellis bubuli obolo permisceantur. Quo loco alia etiam recenset auxilia huic vsui non minus proficua. Sed vtile quoque est illud auxilium, quod paratur ex vtraque mētha, & absinthio, ac persicæ folijs contusis, adiecto aloes puluere, lupinorum farina, & mica etiam panis torrefacti cum decocto lupinorum & melle. Pari etiam vtilitate fit aliud ex absinthij, ac persicæ folijs, felle taurino, aloë, ac farina lupinorum, adiectis oleo absinthij, & oleo amygdalarum amararum, & efformato cataplasmate cum oximelite. Denique proderunt reliqua auxilia alijs partibus hoc malo vexatis vtilia: habet tamen hoc vnum

lumbricorum vteri curatio, quod ore sumpta medicamenta, quæ lumbricos interimere habeant, nequaquam admittunt, quod iecur prætergradientia malum aliquod grauius haud difficulter moliri possint.

C Quod profectò in curatione lumbricorum, qui intestinis adnascuntur, accidere ita facilè, est impossibile.
Et huius libri hic esto finis.

L A V S D E O.



DE STERILIVM ET PRAEKNANTIVM AFFECTIONIBVS.


LIBER TERTIVS.

B Quam mihi in animo fuerit, hoc vno volumine omnes feminarum affectiones recensere, & curare nulla alia scribendi ratio commodior visa fuit, quam ea, quae clario, & distincto ordine, affectiones cuique feminarum statui, & conditioni proprias & peculiare complecteretur, ac differeret. Ob id profecto tertium hunc librum sterilibus, ac praegnantibus tantum dicare studi. In cuius prima parte sterilitatem, eius rationem, & causas ad vnguem exequi, institui: necnon quales sint morbi, qui ipsum veluti manufactant: ac rursus quales sint ij, qui eandem perpetuo sequantur. Pari prorsus ratione in secunda eius parte curabo, vteri gestationis causas, & modum expendere: atque etiam quales affectus ipsis agnantibus comites sint: & insuper si quis alius ex grauioribus superuenerit, quali methodo, & prouidentia vterogere tractare praecauereq; oporteat. Quae omnia si exalte, ac diligenter expendis, mihi non est dubium, quin maximam tibi, & laborantibus vtilitatem sis allaturus.

C

De sterilitate in genere.

Cap. I.



QUANTVM naturae interfit, feminas maresq; fecundos esse, ac prolem procreare posse, nemo profecto ambiget: nititur namque ipsa maxime suum opificium immortale construere, id vero cum non possit ob materiae caducitatem, & corruptibilitatem, noua quadam mirabiliq; ratione inuenta, loco vnus animalis, ne species perirent, nouum aliud effingere institui, noua prole reficiens, quod quotidie caduca naturae conditio perdit. Prouida etenim natura, & suae conditionis gnara, quae corruptibilis erat, & caduca, omnibus rebus, nitens sui generis perpetuitatem tueri, insitam quandam generandi potentiam tribuit, qua perpetuum fieret in specie, quod in indiuiduo fieri nequibat. Cui sane operi perficiendo distinxit omnia, quae per propagationem fiunt, in marem & feminam, deditq; vtrique semen prolificum, & instrumenta generationi idonea. Sic profecto

X cmo-

emolumentum maximum dulcissimumq; mortalibus praestat, quod est, amabilis sobolis continuatio, cuique iuxta naturam suam sumillima. Propter quam etiam ferae, & belluae, pisces atque aures pugnantes, & in laboribus gaudent, & delectantur. Fuit enim sterilitas antiquitus tam detestabile malum, ut Platonem scripsisse constet 4. de legum latione, feminam sterilem ablegandam esse à matrimonio, quod esset cum ea inane, & irritum matrimonium. Sic quoque olim obstetricum officium antiquitatem extulisse, ex Platone in Theaet. constat: ille enim tanquam pronuba in conficiendis nuptiis, in considerandis coniugijs, quae cuique ad amabilem filiorum procreationem iugare oporteret, optimè callebant: haud secus quam peritus agrorum colonus, qui, qualem agrum quod semen exposcat, probè intelligat. Quamobrem 5. Aphor. 57. Hipp. dixisse censeo. Si mulier non concipit, scire autem velis, an conceptura sit, & cetera. quasi probas ad coniugium qualis femina sit apta. Atque cum crebro in aliquo stemmate, ad quod regni, potestatis aut imperij, vel reliquorum bonorum dignitas spectat, haeres desideretur, ob virorum, sed frequentius vxorū sterilitatem, ne tanta dignitate stemma quodvis priuatur, peculiari diligentia curandum est, id naturae exitum, quantum ipsa permiserit, auferre. Verum ne quis (ut frequenter fit) in feminas oēm culpam reierat, inutiliterq; illis, non citra maximum damnum praesidia adhibeat: scire oportet: non minus steriles esse plerosq; viros, quam feminas ipsas. Quamobrem vtriusq; sterilitatis seorsum meminisse erit operae pretium. Ante tamē scito, quod praeter sterilitatem, quae sic affecta sunt feminae, grauius à quouis morbo premuntur, quam quae pepererunt. Inquit. n. Hippo. lib. 1. de mor. mul. Si uerò etiam affectio aliqua mulieri, quae iam peperit accidat, ut menses venientes probè purgari non possint, facilius dolorem fert, quam non si peperisset. Assueti. n. sunt uteri, & corpus idoneum ut impleatur, utpote in uentre habenti, & simul multa amplitudo in corpore est. Ex qua sententia euidenter constat quanti momenti sit, sterilitatem remouere: tum sanitatis tuendae gratia, tum uerò ob rationes à me nuper adductas.

*De ster-
minatu
sterilita-
te.*

Est igitur sterilitas vitium uteri, quatenus instrumentum est, concipiendi officio dicatū. Succrescunt equidem utero, quatenus generationis est instrumentū, tria vitiorum genera, iuxta celebrem illam symptomatum diuisionem, quae Gal. adducit lib. de diff. sympt. Quippe vitiatum cui vsus instrumenti actio, aut ablata ex toto operandi potentia, aut diminutè agente, vel corruptum, & monstruosum progignente effectum. Sic profectò ex feminis quaedam omnino non concipiunt, quas peculiari nomine steriles appellat Hippo. De quarum et sterilitate sic locutus est Arist. lib. 2. de Gen. anim. c. 5. Nam, & à primo ortu naturae, locis ad coitum incommodis laesis, steriles, & mulieres, & viri redduntur, ut alterae non pubescant, alij non barbescant. Aliae rursus ex feminis concipiunt quidē, sed fortū perficere nequeunt, quibus necessario contingit abortire: est sanè hic diminuta uteri actio. Pleraq; insuper concipiunt quidē, & continent, ceterū monstrosū quid in utero gignit, qualis naturae existit mola à Medicis appellata.

Primum sanè sterilitatis membrū, quod in genere abolitarum uteri actionū (potissimum earum, quae illi, ut concipiendi instrumentū est, referunt) consistit, quadruplicè sterilitatis, specie cōplectitur: nam mulieres steriles fieri constat primò, ex ingenito sibi uiuio, & naturali quodā defectu à primaria cōstitutione cōtracto,

A tracto, quod emendari arte aut ingenio minimè potest: quarum meminisse Aristoteli loco nuper citato constat. Quam equidem sterilitatis speciem nouisse plurimum confert, ne si eam inscienter curare studueris, ipsa non curata, in incurabiles affectus feminam deferas. Quod proculdubio frequentissimè cōtingisse cōspicimus, ut Hipp. ipsi accidisse constat, qui, ut ipse 5. lib. populi refert, ex catapotto ad sterilitatem auferendam exhibito, mortē feminæ inopinato cōparauit: ob id profectò huius sterilitatis cognitionem, & prouidenti obtinere oportet antequam curationē aggrediaris. Alia rursus sterilitatis species est, q̄ non absoluta (ut præcedentem esse diximus) sed per collationē feminæ ad proprium virum existit. Cuius profectò fortis haud paucas reperies sterilitates, quas ob id mihi commodi ex præsidijs capere conspiciamus, sed cōnates sterilitatem in femina curare, aut nihil prosumus, aut maius aliquod malum efficiamus. Cuius sanè curationē nō à nuda sterilitate, sed ex collatione facta inter virum, & feminam (quantū nimirum quisq; ab altero dissideat cognoscētes) aggredi oportebit. Tertia verò sterilitatis species ex morbo aliquo affectu proheiscit, quæ aut ætate mutata, aut Medicorum diligentia, vel utroque mō auferri pōt. Pleraque. n. ex ijs, q̄ in iuuenta nō pepererūt, in consistente ætate fecundæ factæ sūt. Quarta denique, & vltima est earum feminarum, quæ pepererunt quidem, verum à primo aut secundo partu steriles effectæ sunt. Quarum omnium meminisse seorsum, erit operæpretium, initio sumpto à communis sterilitatis cognitione. nam postea iuxta cuiusque causam peculiaria monstrabo signa.

Multa sanè sunt, quæ feminarum sterilitatem monstrare possunt, & in primis natiua, & naturalis cuiusq; feminæ temperies, aut totius corporis intemperamentum, uel vteri habitudo. Cuius gratia Hippo. dixisse centeo 5. aphorif. 46. Quæcunque præter naturam crassæ non concipiunt vtero, ijs omentum os vteri comprimit, & prius quàm extenuentur, non concipiunt. Quod etiam de nimium extenuatis, & gracilibus ex eodem autore probari potest. Ob id quoque Hippoc. dixisse constat. Quæcunq; frigidos, & spissos vteros habent, nō cōcipiunt. Et idem refert de humidis, & liccis eadem sententia. Sed clariùs libr. de natu. mulie. eadem verba refert dicens, Si os vterorum concludatur, fortè fit uel ut grossus ficus, & si digito contigeris, comperies durum, & contractum, & digitum non intromittit, & menses occultant nige, & vterum non suscipit. Quæ signa communia existunt his, & illis, quas crassum, & spissum habere vterū dixerat. Sed frigidorum vterorum recordatus est libr. 2. de morb. mulie. dicens; Quum verò perfrigeratur vterus, & omnis insitum esse videtur, & color non est clarius, & compactus est vterus. Quæ sententia de morbosa frigiditate, & extrinsecus accepta, videtur loqui. Sed sterilitatem non minus venaberis ex mulieris ipsius voce, quæ aut aspera, crassâ, vel rauca futura est. Idē quoq; ostendit femina, quæ pilos habet circa pudendas partes crassos, nigros, & hirsutos, quales viragines obtinere solēt: maximè si in mēto nōnullos habuerit, moresq; ac robur nanciscatur virile. Sic q̄ calidiores, & hirsutiores existūt, nō cōcipiūt. Pari prorsus rōne steriles existimare oportet eas, quæ in membro aliquo principe insigne malū aut vehemēs intemperamentū perperiuntur. Sterilitatem monstrat inordinata mēstruorum fluxio, diminuta, vel supramodum copiosa.

Feminam præterea esse maximis laboribus debitā, infecundam sterilemq; fore euidenter constat. Item ea, quæ strictum habet uenter m, & coxarum ossa

*Sterilitas
is inge-
nere si-
gnis, &
pr. h. 119.*

plurimum coniuncta, sterilis censenda est, sicut quæ salacissima, nigrioris coloris, & pilosi corporis extiterit; vel membrum aliquod princeps admodum calidum obtinuerit. Quibus exactè in fœmina pensatis, quia frequenter accidit, non semper sufficere ad integram sterilitatis cognitionem, usque ad experimentum & probationem deueniendum esse, consulunt autores omnes.

Primus cūm Hip. mulierē pannis vnde quaq; circum septā thuris, styracis, sylphij, aut cyphæ suffumigio subter suffire iussit, & in apho. ac si odor tunc videatur p corporis meatus internos ad nares. & os permeare, tunc mulierē non sterilem ex seipsa iudicabis. Et lib. de steril. netopū vnguentum lana exceptum & pelli figura efformatum, ac in vterum p obstetricem immisum, id experimentum ē ostendere refert, si subdita; p os manē olfecerit, fœcundā fore, & concipere posse affirmat. Ac subdit: Caput aliq; derafum, & purgatū integrum ad vterum exponat, & si p os postridie olfecerit, concipere poterit. Sic profectō cum oculi spermaticis, vt ferunt, à cerebro poris, affines, q; adeo coitu alteratur, afficiunturq; vt geniturā emissuri, pleriq; conuiuere, vel nictari euidenter cogantur, ut illitis eorum angulis cum croco, fœcunditatem, & an seminales pori obstructi sint, experiri possimus. Id quod Plin. fieri posse testatur, dicens: Fœcunditatis in fœminis progatiuā accepimus, inunctis medicamine oculis saliuā infici. Quod ē Ari. 2. de gen. ani. c. 5. docuisse constat: à quo censeo Gentilem mutuatum fuisse fen. 3. 3. Auic. trac. 1. c. 1. Inquit. n. Aristo. Mulierum fœcunditatis pbatio suffitu fit, vt odores subeuntes vterum, efferantur ad locum spirandi, & afficiāt halitum, atq; ē illitu, aut colores oculis impositi, saliuā oris inficiāt: nā nisi hæc ita fiant, meatus corporis, p quos excrementum decedit, obstructos, & obsecatos esse, significatur: sedes. n. oculorum maximè oīum capitis locorum feminalis est, quod patet, quia sola ipsa p coitum venereum manifestè minuit, & languet, causa est, q; natura genituræ similis cerebro est, & aquosa vtraq; Verum inter probationes potissima est, q; de galbano scribitur, quem si igni emollitū, sericoq; inclusum muliebris vteri stomacho nocte indideris, & caput mulieris purè lotū, linteolo, & reticulo inodoratis tñ obligaueris, manē si uertex mulieris galbanum redolet, mulierē probè purgatā, & esse fœcundā, ne dubites. Idem experieris, si parum balsami aqua admixtum bōbace exceptum, in vterum immiseris, fœmoriq; alligaueris, quod si tunc vterus traxerit, fœcunditatis est probatissimum signum. Præterea fœminā probat pessus ex aristolochia cum melle impositus in ceruice vteri, ac si saliuā dulcescat, fœcunda proculdubio cēsetur. Cuius sanè fortis alias non paucas reperies probationes apud Hip. li. 1. de mor. mul. quas breuitatis studio p̄mitto, consulens harum oīum sterilitatū, ei minime esse curatrices manus adhibendas, q; ex natia sorte, & abstricta viarum structura proficiunt: neq; rursus ei, quæ ex habitu impensè calido, ita vt semen conerāt, aut ex nimis frigido, qui genituram extinguat, principiū fortitur, ne nimium curationi frustra innitentes, mala, quæ superius retulimus inopinato eueniant. Ob id ea vitans pericula supersedeo obsteriliū, quæ tales natura existunt, curatione, diuidens reliquarum medelam in quatuor potissima capita: quorum primum fœminæ sterilitatem tractabit, facta collatione ad virum: secundum quod maius facessit negotium, sterilitatem morbosam: tertium verò sterilitatem ad tempus, hoc est, de fœminis, quæ pepererunt, sed parte

A re ante tempus defierunt: quartam porro, & vltimo de virorum sterilitate, ne fecunditati quicquam deesse videatur.

De fæminæ sterilitate per collationem ad virum. Cap. 2.



CENSEO quidem plerasque fæminas facta collatione ad viros, quibus coniunguntur, steriles esse potius, quàm absolutè, & morbosè. Quas cum Medici nulla distinctione facta, curare aggrediuntur, in veram sterilitatem, aut grauius aliquod malum delabi antè cogunt, quàm quid vtile, ex inconsideratis auxilijs præstare possint. Ob id primò, hoc distinxissè oportebit: nam quemadmodum in omnibus, quæ è terra nascuntur, non quoduis ex quauis terra nasci, aut augeri potest, sed determinatum statutumque est, vnumquodque semen peculiarem terræ conditionem sibi exposcere, esseque terrarum plerasque, quæ quibusdam seminibus proficiat, & necessaria existunt, alijs verò inutiles, & omnino contrariæ: ita prorsus in hominis generatione contingere censendū est. Nam licet fæmina suapte natura fœcunda existat, prærequirit tñ semē sibi congeneum, & affine, citra quod genituram procreare nequit: id quod de viris etiā subaudiendum est pari pensu. Quid enim præstat fœcundum præbere semen, si fæminæ vterus longissimis intervallis, à suscepti seminis natura distat. Quāobrem dictum est ab Hippocr. eisdem rationibus vteri fœcunditatem, quibus agricola sui agri fertilitatem, metiri. Nam vt seminis fœcunditatem frigiditas & agri spissitudo, vt emergere non possit coercet: sic per angusta frigore inspissanti vteri vasa, ad incrementum embrionis, non nisi sanguis, isque serosus perlabi potest, quibus nec secundæ aut cotylidones cum vmbilico formentur, ad nasci possunt, ac perinde in vteris humidis genituræ, vt in palutri solo cerealia extinguuntur, & suffocantur, & vt in agro sicco, & calido defectu alimenti, femina marcescunt, sic arida vteri caliditate prolifici seminis humorem insumi, & aduri pars est. Necessaria igitur est commensurata materni vteri, & uirilis seminis temperatura: nec tamen inficiabimur (vt paulò inferiùs latiùs probabo) dispare in qualitatibus vtriusque coniugis intemperaturas mutua actione corrigi, & fœcunditati non semper, & vtcunque obsistere. Conspicimus. n. nò rarò viduas in primò coniugio steriles, alteri verò marito nuptas, fœcundissimas fieri. Cuius euentus causas, & probationem ad unguem exequi oportebit, ut cuique pro exuperantia vel defectu, in quo dissidium consistit, proficuum præsidium adhibere possimus.

Primum quidem omni arte exquirendum est, cuius nam sterilitas sit, viri ne, an mulieris. Quod licet multi ex vulgato quodam experimento indagare conentur, non tamen ex toto, vitio caret probatio illa. Nam vir etiam si uxorem cum priore marito, fœcundam implere non possit, aut fæmina, si ex marito cum prægressa uxore fœcundo non concipiat, non ob id eos, existimare oportet steriles esse. Fieri enim potest, ut prius iuncti temperati fuerint, aut contrario prædicti temperamento, & ob id fœcundi: nunc uerò uidua fæmina aut uir iungantur intemperato dissimili gradu aut modo, ita, ut omnino gene-

*Probatio
an fæmi
na vel
mas ste
riles sit.*

rationi obstant, & sic infecundi supersint: quod femina quæ fecunda erat ante, nequeat commutare noui mariti semen ob disparitatem, alioqui sua sponte prolificum. Quamobrem certius signum iudico, quod Auic. fen 21. tracta. 1. c. 9. adducit desumptum ex Rasio 22. conti. nimirum, vt projiciantur triusque semina super aquam, ac quod supernatauerit, sterile iudicetur, licet semen mulieris colligere sit difficile, & suspectum. Sed aliud eiusdem autoris facilius videtur, scilicet non ira certum, nempe, cuius vrina super radices lactuce sparsa, aut platan tenerrimam, ipsas exsiccauerit, eiusdem sterilitas censetur. Tertium quidem ex Gal. acceptum non minoris est momenti. Sumantur (inquit) fabæ & grana tritici, ac totidem hordei, & ponantur in vase, & totidem grana in altero, & super illa mingat alter coniugum, & si post septem dies nascantur, is, cuius erat illa vrina, fecundus existimabitur: infecundus verò, cuius grana non nascuntur. Quam etiam probationem monstrat malua, quæ non arefcit post mictum viri aut feminae, quod si urina iniecta arefcit, sterilitatem cuius erat, vrina, monstrat. Idem iudicium elicies, si vir dies circiter nouem aut plures urinam emittat super furfures vase aliquo coctos, & mulier pari ratione in aliud vas, & in cuius vase vermes citius nascuntur, eiusdem profectò sterilitas est. Sed maximè id cognosces ex totius corporis temperamento, nam steriles sunt mulieres viragines, & viri effæminati: item plerisque menstrua desunt: alijs semen profuit exile, frigidum, ac fluxui paratissimum. Quippe infecundum semen est tenue: fecundum verò, quod grandinis speciem refert. Docet quidem Auic. fecundum viri semen debere esse album, tenax, splendidum, ad quod accedunt muscæ, & comedunt ex eo, & odor eius est, vt odor florum palmæ, & iasmini, scilicet valde suavis. Est etiam infecundum puerorum, & valde sentium: item virorum à primo exortu impuberum. Sic enim feminae steriles sunt, quæ pubem, & pudendi sinum habent glabrum, vel nimis hirsutum. Quod etiam comperies ex veneris appetentia cita, tarda, remissa, intensa: item ex seminis emissionem lenta, vel celerrima: à seminis quoque consistentia, quantitate, qualitate, & à plerisque alijs, quæ in causarum expositione, latius docebo. Interim tamen scito, viros feminis satisfacere non posse, nec fecundos esse, qui natura timidi, actus exercent muliebres, voceque feminas referunt: pudenda pilis nudata habent, aut barba exiles, & paucissimos nanciscatur pilos: nam cum huiusmodi gelidam testium fortiantur temperaturam, minimè poterunt generationi inservire.

Is item sterilis censendus est, qui plurimis seminis deditus ex nullo concubitu fetum produxit. Mulierem etiam sterilem dicendam censeo, cuius crassa vox est, pilique multi, & duri, & rigidi pubem obsepunt, mistacem mentumque; barba circumdat, quæ etiam plurimum uirorum amplexus experta, nunquam vtero gessit. Refert quoque Hipp. hæc uerba lib. 2. prædict. Ex mulieribus, quæ magis ac minus in utero concipere solent, ita considerationem facere conuenit. Primum quidem specierum: parua enim ad conceptionem præstantiores sunt maioribus, tenues crassas, albæ rubicundis, nigrae liuidis. Quæ item venas conspicuas habent, meliores sunt, quàm quibus non apparent: carnem autem vberiore habere aniculæ malum est, mammas autem tumidas, ac magnas, bonum, atque hæc quidem ad usum exposita sunt.

Verum interrogare oportet etiam de mensuris purgationibus, an omnibus mensibus

A sibus compareant, & an copia satis magna, & æquales in singulis tēporibus, & in eisdem mensium diebus: sic. n. has fieri optimum est. Locum verò, in quo conceptio fit sanū oportet & siccum ac mollem esse. Sit item nec retractus, nec pronus, neq; os ipsius sit auersum, neque conclusum, neque euersum. Fieri. n. non potest, vt conceptio fiat, quodcunque tandem talium impedimentorum affuerit. Quorum omnium rationem habere oportet, vt prudens Medicus cuiq; iuxta indigentiam, id præsidium adhibeat, quod profuturum intelligit.

Ex oīum autorum decreto constat, potissimam sterilitatis per collationē cām esse, vtriusque coniugis dissidium in naturali & proprio temperamento. Nam cum diuersa, quæ vnum constituunt, certam quandam proportionem sibi adseruare teneantur, ut ex eis tertium aliquid fieri possit, vbi hæc proportio nō reperitur, neq; vtriusq; seminis vnio fit, perdifficile quidem est, ex eis vnum constitui. Ferunt quidem multi temperatum virum in temperata muliere optimè & fecundissimè generare. Alij rursus existimantes similia inter se nō posse agere, censent, neq; eos, qui eiusdē sunt temperiei, neq; qui temperata fruuntur cōmoderatione, posse vsquam generare: ex quo proferunt fecundiores esse, qui contraria cōstant tēperie. Fulciunt quidē oēs suam sūam uerbis quibusdam Gal. li. 5. Apho. 63. quæ in hunc modum se habent. Tam mulieres q̄ uiri, si temperie quatuor qualitatum potiantur, generant: quamuis temperie illa priuatis commisceantur: intemperati verò nunquam generant, nisi contraria intemperie p̄ditis, iungantur, utpote calidi frigidis, humidi siccis, & sic de singulis. Quam equidem sūam sic expositam constat difficilem esse, & sibi aliquo mō contrariam. Nam si uerū esset, intemperatos solis intemperie eorum naturis contrarijs copulatos gignere, qui poterunt temperatis iuncti generare, ut prima pars sententiæ Gal. profert. Neq; sat erit dicere, temperatas naturas intēperatis quibusuis contrarias existere: qm̄ idem autor paulò inferiūs satis manifestum facit: sed de ea loquitur contrarietate, quæ inter vtraque extrema, non inter alterū extremorum & medium posita est. Quamobrem placet magis intemperatio Mercurialis li. variarum lectionum. nimirum, q̄ temperati, si temperatis misceantur, semper gignunt, intemperati verò, tunc solū, quādo contrarijs suæ temperiei copulantur. Quod etiam Lucretius his carminibus probat.

*Isque ad cō id magni refert, vt semina possint
Seminibus commisceri generaliter; apta,
Crassaque conueniant liquidis, & liquida, crassis.*

Ex quibus ego hāc infero rōnē, nempe, tēperatā vtriusq; coniugis naturam, fecundissimam esse, fecundā quoq; intemperatam vtriusq; dummodò non sit distemperantia in extremo, & vehemens; quippe tales infœcundi existunt omnino. Itē infœcundi rōne intēperamenti sūt, qui similē obtinent tēperie, si ambo calidi sint, siue frigidi, humidi ac siccis: nā eorū semē nullā, cū simile sit, p̄stat actiuitatē: quā ad generationē p̄requiri probat Gal. lib. de natura humana. Qd si quis dixerit, temperata corpora esse similia, & ob id debere esse infœcunda, expendat numeris non paucis distare temperatum fœminæ corpus à viri corpore temperato: nam iustitiale cuiusque sexus temperamentum, multis numeris ab alterius temperatione dissidet, & sic diuersa quodammodo sunt temperata vi-

ri & mulieris corpora, quantū sat est ad fœcunditatē. Quapropter tēperatum in
 réperata ob hac diuersitatē generare optimē poterit, quod similes, neq; summē
 cōtrarias habentibus intemperantias, accidere minimē poterit. Hāc sanē snīam
 Gal. loco citato his verbis ex Hip. probat. Primum itaq; necessarium est genera
 tionem huius non pcessisse ab vno: quo nā. n. pacto, quod vnum est, generare
 aliud pōt, nisi cum aliquo cōmiscetur: deinde neq; miscntur, neq; generant,
 nisi sint eiusdē generis, eandēq; habeant facultatē, neq; similis nobis efficiēt:
 rursus nisi calidū frigidū, & siccū humido, modo & æquabilitate respōdeat,
 sed alterum alteri longē p̄stabit, & ualentius infirmiori, nihil generabit. In qua
 sanē Hip. snīa Gal. inquit citra vllā aducntitiā opem non differret fœtum, ne in
 paucos quidem dies, quin ē vestigio expullularet: non. n. ex seip̄s tantū obti
 nent fœmina, vt producant, sed externum desiderant auxiliū. Quas sanē actio
 nes, neq; à similibus, neq; à summe contrarijs fieri posse certū est. Ob id cēseo
 Hip. dixisse 5. apho. 62. Quæcunq; frigidos, & spissos vteros habēt, nō cōcipiūt,
 & quæcunq; p̄humidos habent vteros non concipiunt: nā extinguitur genitu
 ra. Et quæcunq; sicciores, feruidioresq;, nā alimenti difficultate tabescit genitu
 ra (quasi excedentes intemperantias damnans) & quæcunq; ex vtriusq; medio
 crem habent temperatiōē, hæ fœcundæ sunt. Subdit huius rei rōnem Gal. li. i.
 de nat. hum. ac transferens eandem doctrinā, q̄ de temperamento totius corpo
 ris retulerat, ad temperationem vteri partium genitalium, & vtriusq; seminis,
 inquit: Nā de vteri temperamentis, quæ dixi, hæc quidem de genitura tempe
 ramento intelligi debent, vt quæ nunc iusto est humidior, aut algidior, nunc
 siccior, vel feruidior. Est aut vtero sicciori familiaris humidior genitura. humi
 diori siccior, æquē vt calidiori frigidior, frigidiori calidior. Itaq; minimē pōt
 ex duobus coeuntibus aliquid gigni, ni mutua inter ipsa familiaritas, ac medio
 critas, ex attemperatione vnius cum altero ex coeuntibus prodeat.

Sed ne huius pstantissimæ causæ (q̄ coniugium frequentissimē sterile effice
 re habet) varietate, rerum integrē cognitionem obscuremus, p̄ter cōe totius fœ
 minæ, & vteri temperamentum, à quo id p̄ficisci diximus, pudēdarum quoq;
 partium varietatē, ac mutuā inreperiem docere oportet, vt constet cuius con
 iugum vitio sterilitas prodeat. Qua in re expendere prius oportet testium viri,
 & fœminæ naturā, deinceps pudēdi virilis vitium, collatione facta ad vteri si
 nū, & vltimō seminis vtriusq; differentias; nā de morbofis distēperantijs, & af
 fectionib. seq. c. disputabo. Penis igitur virilis, vel longitudo, conuenientiū ma
 ior, q̄ vterum plurimum feriat, sterilem efficit concubitum: item eiusdē breui
 tas, q̄ nondum os vteri attingere possit, inanē efficit seminis emissionē: non. n. re
 cipitur in vtero, sed à pudendis ocysimē prolabitur. Eadem ratione virile mē
 brum latius, aut crassius, q̄ par sit, vel sustinere fœmina nequit, vel adeo os vteri
 aperit, q̄ hiare ipsum faciat, donec semen procidat, vteri osculo nequeunte se
 cōprimere præ dolore, & extensione nimia. Item viri semispadones generare
 nequeunt, vel qui nimis obesi sunt, quia in vterum eiacularē semē nō possunt,
 q̄ ventrosi nimium existant. Præterea viri testes conferre ad vteri, & testiū fœ
 minæ tēperie: nā si calidiores existant, semē exustū, & infœcundū emittunt: itē
 frigidi sterile p̄gignunt, frigidū, ac maximē labile. Quæ pculdubio oīa ad fœ
 minā transferenda sunt, q̄p̄e steriles existunt, q̄bus os vteri hiat, aut clauditur
 plus

A plus q̄ par est, illud qd̄ semen rejicit: hoc verò non admittit. Itē si meatus seminarij naturaliter in obliquū tendunt: vel pudendi os nimis strictū sit, vel plurimū parens, & grāde. Vterus pari rōne supra modū calidus semen exurit, sicut frigidus ipsum extinguit: qd̄ pari lege de testibus subaudiendū est. Quibus causis alia nō minoris momēti accedit, cū videlicet, vteri os in coitu doliat, & sanguis p̄silit: cuius affectionis Hip. meminisse cōstat lib. de steril. p̄ hæc uerba: Si verò à coitu imū ventrē dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semē tritū, & muscū mollē, & adipē anserinū mixta molli lana excepta imposito. Est. n. vteri officiū nō solū sanguinē purgare, & copiosum habere, sed semen suscipere, attrahere, vndiq; cōplecti, & ex eo aliquid parentibus simile efformare, & formatū retinere, & opportuno tpe pellere, in qbus si defecerit sterilis cēsendus est.

Sed in semine cōiectare quidē oportet qualitātē, quantitātē, & substantiā, ac excernendi tēpus. Semen igitur tale esse oportet: quale depingit Arist. li. 3. & 7. de parti anim. & 7. de gen. ani. dicens: Semen generationi aptū sit albū, splendidū, globosum, florū sambuci modo odorū, qd̄ in aquā iniectū, fundum petat.

B A viro tñ infœcundum excernitur semen, cum feruidum fuerit, & veluti torrefactum, vel frigidum tenue, & aquosum, quale decrepitorum est, & eorum, q̄ aquæ nimis sunt potatores, vel quasi puerorū, aut ebriorum, & helluonū, ac pituitosorū, aut acrius, & siccus, qd̄ infœcundum existit: nisi moderatissima, aut appositā seminis fœminei natura fœcundū ex attemperamento reddiderit. Sit p̄terea moderatum, nā parcius generationi nō sufficit, copiosius agrē cōcipit, & malē à mulieris semine nutritur, aut refouetur. Quos et conditiones in femineo semine spectare opus est. Sic et in fœminis viæ seminales angustæ, q̄ impediunt, quominus debito, & æquali tpe ipsum in vterum decidat, non parua sterilitas causa est: sicut semen in vtero diu retentum, priusq̄ ab ipso, vndiq; concipiat: resoluuntur. n. spiritus, & calor inutile fit. Sterilem quoq; hac lege efficit concubitus excretio seminis cuiusq; coniugum ante tēpus, & paritatem facta: nā quod receptum primo est, vel ante plabatur, vel quod vltimò emititur, non ita auidē amplectatur vterus, vt constet quantū errent, qui censeant semine à viro in balneū picto, fœminā, suscepto illo in balnei ingressu, concepisse. Præterea sterile scit concubitus, si coitus coitui accedat, & maximè si cōcubitus coactus fuerit, qd̄ potissimè contingit in ijs, qui inuiti & sine amore iungunt: voluntarius verò, & iocundus fœcundissimus existit, nisi nimium sit ardens.

C Coniugum præter hæc omnia ætas incommoda, immaturaq; sterile efficere euidenti obseruatione comperimus: nam ætas maris annis duodecim (qd̄ multi tenent, ego tamen non probo) fœminæ quatuordecim minor: & illius annis sexaginta huius verò quinquaginta maior, raro fœcunda existit, aut malē fœcunda, vt ex Arist. 4. de par. anim. euidenter constat, licet aliquñ contrarium accidisse scriptum sit. Et Hip. fateatur, lib. 2. popu. par. 2. tex. 18. de coriari vxore, q̄ cum iam esset menstruis orbata, & multos annos habuisset, filium conceperat, non sine magna multorum admiratione.

Ætas. n. conceptui aptior, multis decem & octo annorū probatur: ego qd̄ decimum quartum, q̄ legitimū esse terminū legitimæ cōceptionis censeo: licet, vt dictum est, fœmina antē possit concipere: Debiles tñ fœtus, & cum periculo abortus. Ceterum plures ex ijs, q̄ ante hoc tempus nubunt, aut sterile scit prorsus,

prorsus, si uterus sit valde imbecillis, disruptis vasis, & utero nimirum excalfacto: **A**
 idq; maximè si virile mēbrū magnum sit, & puella parnā vel semen viri vitio-
 sum. Quod et sentire videtur Plato loquens de nuptiarum tempore lib. 6. de le-
 gibus, dum in masculis à trigésimo ad trigésimum quintū, in puellis à decimo
 sexto ad vigésimum coniugium præcipit. Quo profectò fit, ut quæ aliter faciūt,
 à primo partu steriles euadant, ac malè in genitalibus afficiantur, & plerunque
 sic geniti parum mente valeant. Vnde non mirum est, si monstrofi aliquando
 Principes, & magnatū primogeniti, aut nō plurimūm vitales, & firmi nascant:
 nā ob imperium, & maioratū, vel pueri puellis adiunguntur, aut senibus puel-
 lae. Sed in hac re paulò diligentius sententiā proferre oportebit, qđ multis vsi-
 bus proficuū fore arbitror, tum iuris peritis, tum et parentibus qui filias studēt
 viro committere. Primò itaq; ætatem viro maturam, aut in viro aptam ad femi-
 nam, annorum numero nō esse metiendā certissimum est, apud viros strenuos
 & in bona philosophia peritos: nam robur ad actiones potius ex temperamen-
 to comparatur, q̃ ex tpe, quod qui ignorarunt, in mille errores delapsi sunt: sic
 enim Plato, & alij virum, & fœminam non esse coniugio committendos ante **B**
 trigésimum annum, & in fœmina ante decimum octauum. Quos equidem auto-
 res arbitror magis robori comparando studuisse, q̃ metijisse ætatē cōiugio aptā,
 alij verò ætatē fœcunditati aptiorem exquirentes, in viris scripserunt 18. annū
 prærequiri, & in fœminis. 14. Sed sanctè, & piè sacri canones statuerunt ad matri-
 moniū præquiri in viro pubertatem, hoc est 14. annum, & in fœmina 12. nā se-
 dandæ concupiscentiæ muneri, q̃ matrimonij alter est vsus, sat erat eā ætatem se-
 ligere, q̃ ad virum citra noxam salutis, aut fœcunditatis in fœmina sufficiens es-
 feret: nā eo tpe, iā ut inquit Arist. fratrare fœminæ incipiunt, & semen ob acutiem
 & maturitatem ad coitum excitare, & maiori ex parte 12. annorum fœminæ vi-
 ros perferre innocuè poterunt, licet aliquæ ob peculiarem compositionem id
 non valeant. In qua item re arbitror alias quoq; esse, & in undecimo, & circa ip-
 sum, quæ optime visum perferre poterunt, maximè si temperamēto sint calido
 colore nigricante, aut ex albo, & rubro mixto, corpore robusto, & conditione
 lasciuia, & ad uentrem prona, in quibus nulli dubium est, complexionis condi-
 tionē ætatē supplere, si quidem ætas potius hac lege quam annorum numero
 circumscribenda est. Quæ omnia in fœminis, & uiris obseruare oportet. **C**

Obesitas eodem modo alterius, & magis utriusq; inanes efficit concubitus,
 quia generatiuæ partes statutū, & naturalē locū attingere nequeūt, & sanguis in
 his qui natura crassi sunt, paucus, & in adipē consumptus, & sic semine & san-
 guine mēstruo carēt, & parū subinde appetūt, & raro coeunt. Verū licet fœmina
 pinguis crassaq; existat, nō ob id protinus sterilis cēsēda est, et si Hip. 5. Aph. af-
 ferat crassas fœminas nō cōcipere: nā eo loci Hip. intelligit de ijs, q̃ p̃ter naturā
 pinguescūt. In reliquis. n. q̃ natua tēperie crassecūt, solet natura, si nō fuerit læ-
 sa, sic cuncta cōstruere, ut nō laudent necessariæ operationes. Cōsimilē huic snē
 adduxit Hip. lib. de locis, aqua, & aere, dicens; Mulieres aut pinguedo carnis, &
 humiditas steriles facit, p̃ quibus uteri earū genitale semē arripere nequeūt. Cu-
 ius dicti rōnē q̃rens Vesalius lib. de fabr. corp. hum. c. 4. arbitrat, id esse intelli-
 gēdū de pinguedine, & obesitate p̃ter naturā, cuius snām probō: vidimus enim
 plerasq; pingues, fœcundas esse, quas nō ex morbo, & præter naturā, sed à nati-
 ua forte

Aua forte sic factas arbitramur: dummodo mēstrua copiosē profundant alioqui in fecundas arbitror q̄ multum sanguinis in pinguedinem conterant adeo ut fetui alendo desit conueniens sanguinibus vbertas, at alibi fufius dictū est. Ex maci entis tñ pinguioribus fietis, vix vllam concepisse reperiēs, nisi corpulentia moderata sit, vt intelligenda est Hip. sentētia. s. Apho. Probat nostrā & illius viri sententiā Hipp. lib. de superfetatione dicens; Mulier, q̄ p̄ter naturam crassa est ac pinguis, & pituita repleta, non concipit hoc tpe: q̄ verò ex natura talis est horū gratia concipit, si non aliud quoddā ipsam impediāt. Quia sententia euidēter nostrā constare vñ neq; obstat me antea dixisse, magis carere sanguine obesa corpora, quae talia sunt naturaliter, & ob id semine priuari, & sanguine menstruo: illud qdē dē est facta collatione ad corpora p̄ter naturā obesa, sed vtraque cōceptioni inepta, minus tñ, q̄ natura sunt crassa, & magis, q̄ p̄ter naturam, non quidem qd sanguis deficiat, sed ob incrementū omenti, quo vterus comprimitur, vt semē neq; suscipere neq; aptē cōplecti possint. In quibus verò crassitudo naturalis est mēbra interna non hñt hanc deformitatē, & ob id non sunt cōceptioni hac rōne ineptae neq; qd sanguis deficiat, quia tñ habent, q̄tum sibi proficuum fore existimauit natura rectē operans. Ex quibus constat habitum p̄ter naturā tenuem, & crassum steriles esse. Vter verò magis, ab Hipp. monstrat 2. p̄dict. dicente, teuues crassis esse fecundiores. Est quoq; huius disparitatis inter coniuges causa animi affectio vehemens, quae proculdubio vitalē firmitudinem, & calorem imminuit, ac spiritus dissipat: quo fit, ut utriusq; coniugis immoderatus labor sterilitatem efficiat. Item eundē effectū p̄stat aer calidior pestilēs, uictus tenuior, balneū ieiuniū ieiunis immodicū, gonorrhoea, venus immodica, vel vita admodū sedentaria, & ouiosa, ac epulis plena, & tandē omnia, quae uel sanguinem aut semen imminuūt, vel optimā eius, ac moderatā tēperie euerant. Sic aeris vel celi status aut regionis, calor uel frigus inclemētes sterilitatē quibusvis uiris ac feminis accersunt: ijs maximē, quibus ex toto cōtrarij existūt uel adeo similes, vt in tēperamētū adaugeant. Atq; haec de causis dixisse sit satis.

C Primo q̄tum distet temperamento, uel conueniat alter coniugum ab altero, diligenter nosse curabis. Sic calidū uiri uel mulieris temperamentū cognosces, quia calor in cute, & carnosō genere tactu facillē percipitur: & ob id huiusmodi corpora prōptē calēfunt, & refrigerant tardē. Rubor itē in cute adest, adipis inopia, pilorum copia, & capillorū nigrities. Verū si corpus calidius fuerit, hirsutius erit, siccus, durius, gracilius ac nigrius, & ad actiones nō leuē obtinebit prōptitudine: adherit huic et uigilia, agilitas, iracundia, & reliqua, quae methodo nostra scripsimus calorem attestari. Frigidū quidem corpus monstrant frigiditas tactu percepta, refrigeratio prompta, calfactio tardissima, cutis albicās, liuida, plumbea, pilorū nuditas, & glabrities, capillus et aureus remissus. Veruntamen si corpus frigidius fuerit, albū erit, molle, obesum & debile: qd si p̄dictis adiūgat actionū omniū tarditas, certius erit signū. Siccū corpus tale esse constabit, si durū sit, gracile, agrē mobile, & facillē a siccantibus offensū. Sic profectō humidū erit carnosius, mollius, cui et erit laesio prōpta ab humectantibus, subditū fluxionibus, ac multū spuens. Præterea potissimā sterilitatis rōne, cū antea ad pudenda uiri, & feminae reducendā esse dixerim: ob id quidē q̄tū distent a media temperie utriusq; aut alterius partes perdiscere oportebit.

Viri

Signa
causarū

Viri itaque testes calidiores, ostendunt in venerem ab adolescentia propensio **A**
 cum subito penis rigore, ac subita etiā seminis excretionē: quod proculdubio
 semen foemina in vtero sentit calidius acrius, & mordax. Ipsi quoque testes cali-
 di ad tactum existunt, & persentiunt a calidis promptē offensam, & modico fri-
 gore gaudent. Item partes genitales proximae ad umbilicum, & femora celeri-
 mē pilis vestiuntur. Quod si calidiores simul, & sicciores sint, praeter dicta signa
 quoque crassius excernunt: si verò calidiores, & humidiores, venerem minū-
 s praedictis appetunt, & vsu eius minū lēduntur. Si verò multo calidiores sint,
 & humidiores, semen habent largius, sed partes genitales minū hirsuta: hanc
 quidem testium temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas se-
 quitur. His proculdubio omnino contraria signa existunt, dum testes frigidi
 sunt: quod si cum frigidityte humiditas quoque praesit, penis tarde aut rarō eri-
 gitur, venerem tardius exercere incipiunt, ac parum ea delectantur, semen itē
 tenue est, aquosum, & tardē in coitu excretum, ac frigidum a foemina sentitur,
 & infecundum existit, aut foeminas maximē generat. Partes etiam pudendae, &
 his vicinae aut glabrae sunt, vel pilos, eosque tenues, tardē emittunt. Id quoque atte-
 stantur arteriarum pulsus tardi, & vrina colore remissa: cuius sanē rei plura le-
 ges cap. de virorum sterilitate. **B**

Foeminae quidem vterū viro, ac eius testibus esse similē aut diuersum, vel ap-
 tum ad seminis virilis moderationem, cognoscere quoque oportet. Sic vterū cali-
 diorem praeter totius corporis adducta signa, pudendarum partium calor maxi-
 mē ostendit. Itē foeminae audacia, iracūdia, sitis inexplēta, ad omnia propitudo,
 pulsus celeritas, & vrina flaua, menses paucissimi, crassi, calidi, flauī, & ex adu-
 sione nigricantes, cum dolore, & morfu frequenter exulcerante prodeuntes,
 quibus ēt adest salacitas inexplēta, celeris excretio seminis, qd ēt calidius & ti-
 tilans ipsa percipit in exortu: pili in pectine, & cruribus citō nati, multi, crassi,
 flauī, nigri. Vterum insuper esse frigidiorē ostendit corpus reliquum, praeser-
 tim imae, & pudendae partes, angustia imi ventris, & stupor, menses ob crassi-
 tiem a frigore concretam suppressi, rari, tardi, crudi, albi, aut albicantes: interdū
 fluxiles, & aquosi a liquidiorē pituita, veneris odium, seminis pauci aut frigidi
 excretio tarda, & voluptatis expers: os vteri contractū, & spissum: pili in pube, **C**
 & cruribus tardi, rari, exiles, pallidi, aut albicantes. Qd si his humiditas accedat,
 corpus reliquum erit molle, & tactu frigidum: fluxus muliebris, aut saltē ppe-
 tua vteri humiditas, & in coitu maior, ita aut fiat molesta, & ingrata: vteri ēt fa-
 cultas retentrix ob humiditatem imbecilla, ita vt si concipiant, facillē abortiāt.

Verū si siccitas frigiditati adiungatur, menses aderūt pauci, tardi, & crassi,
 semen paucum, coitus appetentia, quam proximae maiori: collum uteri, & etiā
 os in coitu siccum, & ob siccitatem a frigidityte auctam rhagadijs obnoxium.
 At contrario prorsus modo omnia accidunt siccitate praualente, paucus etenim
 erit mensium fluxus, os siccum, labra scissa, coitum appetunt, velut terra sicea
 rorem, facillē irascitur foemina sic affecta, corpore tenuis est, & in actu venereo
 ferē nihil seminis excernit. Et his proculdubio signis deprehendes, qualis in-
 ter sit differentia inter virum, & foeminam, vt discas quemuis ad alterius naturā
 conferre. Reliqua verò, quae in vtroque disparitatem efficere habent, ut aetas,
 tempus & regio ac reliqua facillē citra alia signa tu ipse cognosces.

Cum

A Cū coniugum alter alteri non conuenit, temperamenti ne totius, aut genitalium uicio sit, primò expendendum est. Ac si totius corporis intemperieri rōne dissidium sit, minime diligenter euolues, utra temperaturarū suapte natura à fecunditatis rōne distantior existat, q̃ proxime ad aliam comparabis, reduces, & moderabis alterius temperie adferuam, si quidem inculpator existit. Sic profectò cū femina vel vir, calidior biliosiorve altero extiterit, ita ut fecunditati efficiat, tantum huiusmodi corpus temperandum est, q̃tum ad mediocritatem vel paulò supra reducendum sat sit. Id profectò facies tribus potissimum praesidijs: victu nimirum frigido, & potu aquae vel dilutissimi vini, quibus sensim & paulatim, ac citra corporis alterationem ipsum immutari comperiemus: qd̃ pari lege subaudiendum est de alijs rebus non naturalibus. Secundò ijs medicamentis, quae humorū calidiorū excessum frenent, & attemperent. Huius census est sanguinis detractio bis terve in anno facta: ac ter aut quater expurgata fluabile infuso aliquo rhabarbari ex aqua lactis caprini vel aqua cichorii, manna vel casia fistulari exhibita, vel syrupo ex infusionibus violarū superbibito de cocto hordei: quibus superabundans succus euacuetur, tepescantq; quodammodo calida viscera. Vltimò in, corpus siue viri siue feminae temperabis, intus quidā, decocto hordei cum saccharo, ptisana, fare, sero lactis, aqua cichorii, borraginis, & acetosae cū saccharo, vel lacte caprino, aut asinino, atq; alijs cibarijs, omnino frigidis, dūmodo refrigeratio morbosum quid non pariat. Exteriùs vero idē facies inunctis renibus, & dorso unguento rosaceo, vel refrigeranti Gal, cum medico resumptiuo, vel unguento de cucurbita, aut de lenticula palustri cū butyro recenti vaccino. Præterea frequentibus aquae dulcis balneis: q̃ tantq̃ peculiare, & proficuum auxiliū summopere p̃bo. Tandē corpus omni arte refrigerabis, lentē in paulatim, & cautē, ne ultra id, q̃ par sit conueniat, refrigeres.

*Cura di
talis.*

Pari quoq; rōne si alter coniugum iusto frigidior extiterit ita, ut vnus calor frigiditatem seminis alterius remittere, & cōtemperare nō possit: p̃dictis tribus auxilijs immoderantiā corrigere oportebit, donec ad eam temperiē corpus deuenisse constet, quae fecunditati sufficiat. Sic primum victu calido, & sicco corpus sic affectum reficito, additis aromatis, & calidis speciebus, q̃tum sat sit, ut frigiditatis excessus retūdatur. Vinum sic affectis largiri poteris, & maximē ex ijs vinorum generibus, quae aut cocta, aut calidis rebus condita, corpus calfacere nata sint: cuius census est hippocras appellatum, vinum quidem aromatis conditum. Quod si unum renuerint, uel id corpus non tulerit, aquā garyophyllis, cinnamomo, aniso, feniculo, & corticibus citri incoctā p̃beto. Cui vsui maximū momenti esse probaui eā, q̃ radice chinae, similace aspera, aut ligno guaiaco incoquitur, p̃serim si humiditatis p̃sit suspicio. Humidi ē corpora plurimum exsiccari cōuenit, ne præter frigidam temperiem frigida quoq; extremēta superabundent. Cui vsui perfricabis totum corpus summo manē linteis mollibus, donec cutis rubescat. Itē p̃parata pituita, ipsam pharmaco purgabis ter quaterve in anno: quo facto, dianiso, diacimino; aromatico rosaceo, uel diarrhodone cū uino albo uteris. Quem usum præstat inter reliqua pharmaca, theriaca cum uino supra summo manē, aut aqua theriacalis arte chimica extracta: Sed qd̃ maioris esse momenti in hac re scimus, est vsus balnearū sulphureorū: dūmodo plurimum sudoris non alliciant, sed ea tū mora in eis dē facta, q̃ satis sit corpori calfaciendo,

do. Verum si cum frigidity simul humiditatem quoq; abundare comperiamus, copiosius eisdem balneis sudare oportebit, aut si maius, ex decocto ligni guaiaci, vel similis asperæ: quibus iterum oportet uti eis, quæ posse intus corpus calfacere, superius diximus; donec sensum, & paulatim, ac citra maximam alterationem corpus ad meliorem statum commutemus.

Partes verò genitales eadem lege, & reducendi ratione contemperabis: in viro quidem, ut c. de virorum sterilitate copiosè reperies: at in femina; si caliditate polleant prædictæ partes, balneis aque dulcis vteris, inunctionibus frigidis, & purgationibus bis in anno factis, maximè biliosorum humorum, & proba victus ratione, ac refrigerante exhibita. Præter quæ omnia, ea administrabis, quæ c. de vteri distemperie proficua esse diximus, & sequenti c. dicturi sumus: hac vna sola præmissa differentia in reductione vteri intemperati ad meliorem statum, quod nativam ipsius temperiem ad mansuetiorem mutare nitimur, sensum paulatimq; & longo temporis tractu quamvis temperaturam moderari oportebit: at verò cum intemperatus fuerit vterus, audacius ipsum corrigere, mutare aut temperare oportebit. Cuius operis superius auxilia adduximus, & ob id hac in parte subitico, solum recensens id præsidium, quod Hipp. lib. de steril. scripsit profectum esse ijs, quibus semen prius decidit ob vteri laxitatem, & humiditatem: inquit. n. Si vteri genituram non contineant, plumbum lapidem, quod ferrum ad se rapit, leniter terito, & in linteis alligato, quo in muliebri lacte tincto subductio utat.

Quod si exactè totius corporis vel genitalium partium temperiem ad necessariam reduceris, facile est seminis alterius vel utriusq; vitium corrigere: nam semine abundare vel deficere rarè accidit, nisi totius corporis vel testium vitio. Quamobrem non oportet eadè hic repetere, præter quam quod sequenti ca. seminis vitia specialius corrigere studebo. Sed recensebo hac in parte præsidium ad semine augendum, & fecundum efficiendum, si non sunt mendaces priscorum libri: nam scriptum reperio in omnibus feminarum vitijs, & in hoc maximè prodesse hortensem saluam, si mulier plantam huius hemina cum modico sale quarto à secundo die potauerit, deinde viro post horæ quadrante sese commiscuerit. Hinc aut ferunt in Copto Aegypti post sexuas pestilentias ab ijs, quæ superfuerunt ad eius succum bibendum coactas fuisse, plurimosq; inde fetus produxisse.

Si tamen immatura ætas sterilitatem adduxerit, curatrices manus minime adhibebis, negotium omne ætatis mutationi committens. Interim tamen abstinentioniam à venere imperabis, ne is, qui natus minor fuerit, coitu nimio impotens ita fiat, ut fecundum semen deinceps efficere minime possit. Feminas verò seniores nullo auxilio fecundas efficies, præsertim si menstrua præ senio defecerint: viri quidem senes generare possunt, cæterum non ita facile, quorum curationem c. de virorum sterilitate docebo. Interea verò expendat Medicus calidis, & aromaticis, ac vino præcipuè cocto, aut aromate aliquo condito eorum semen calfaciendum, coquendumq; esse: quod item facies, si coitum præceperis ex longis intervallis, idq; maxime femina eum avidissime amplexante, ac desiderante.

Quod si ex inordinato coitu sterilitatem proficisci cognoveris, ab huiusmodi immoderantia coniuges abstinere imperabis.

Obesos aut coniuges omni arte macrefacies, victu nimirum tenui, exsiccatè, aut rebus siccis condito frequenti exercitio, ac labore, potu partiori ex aqua similis asperæ,

A asperę, anis, cinnamomi vel alterius rei calidę, & sic: frictionibus item fortioribus summo manę, & per vniuersum corpus factis. Sudore proculdubio corpus conterit bblumiturq; pinguedo, potissimum ex decocto ligni guaiaci, vel radicis chinę, aut similacis asperę: item confert frequentissimus vsus s; rupi ex decocto radicis chinę cum multo aniso. Sed efficacius est auxilium balneum ex aqua sulphurea, quo certum est corporis pinguedinem conterı, & euanescere. Utantur et aniso leuiter torrefacto ante prandiu, & cenā, vel tabellis ex aniso, cimino, & cinnamomo, amygdalis testis, aromatico rosato cum vino, & alijs, quibus insit efficacia exsiccanđi, & humiditates ebibēdi. In hac tamen curatione hanc methodu scripsit Hip. li. de natu. mul. Hanc attenuare oportet, & pharmacum infra purgans bibendū dare, & ad vteros apponere q purgent ipsos, & flatus inducat. Quam sanę curationem, licet primō accessu videatur difficilis, sūmo esse habendam preuo existimo: nam extenuare corpus antea non poteris, q dum crebrius corpus, & vterum purges: qua purgatione, omnem humoris dissolutionem, & exsiccationem intelligendam esse arbitror. Neque contēnendū est verbum illud (& flatus inducat) nam proficua esse utero remedia ea credendum est, quę quodammodo uterum dilatent, distendat, & compressos pre pinguedine, & omento meatus patentiores reddant: quod proculdubio existimo fieri pea, q flatus inducunt, quippe qui partē, ubi præsunt, distendere sunt nati.

B Quod si ex alijs causis, quas antea diximus, aliquam pręesse cognoueris velut est Aeris aut regionis inclementia, abstinentia, & inedia, potus aquę, animi affectio, & aliud his simile: malo ocyllimē subuenies facta in contrarium mutatione: ita vt omnino corpus ad contrarium statum ei, qui sterilitatem inducebat, mutationem sensim, & paulatim factam subeat.

De sterilitate morbofa. Cap. 3.

I NTER fęminas, plurimas proculdubio reperies steriles quidem, non tamen ex propria conditione: & natua sorte, neq; p collationē ad virum, cui coniunguntur: sed ex morbofa aliqua cā, q ita fęminam ipsam, & generationi dicatas partes disponit, & afficit, vt etiā si cuius viro quantumcunque fecundissimo adhareat, concipere minimē possit; donec affectum abstuleris. Quod profecto Arist. lib. 2. de gener. anim. ca. 5. scripsisse his verbis constat. Nam, & a primo ortu naturę locis ad coitum cōmodis oblaſis steriles, & mulieres, & viri redduntur. Qua snia de natua sterilitate videtur loquutus fuisse. Verum subdit eodē loco. Alijs in processu ætatis idem accidit affectus, aut pp corporis nutritionem, aut ex morbo viris humidum frigidumq; emittitur semen. mulieribus purgationes vitiantur. Quę uitia, & eorum cās expendisse oportebit, vt cuiq; peculiare auxilium adhibere possimus.

Causas igitur omnes quatuor numero, ac genere esse diligenti obseruatione & multorū autorū lectione cōperimus. Prima quidem se complectitur oēs cās externas, quę prauē afficientes instrumenta conceptioni seruiencia, omnino fecunditatem auferunt. Secda corporis vniuersi, & uteri uitia continet, q uaria admodū sunt, & huic malo efficiēdo efficacissima. Tertia seminis fęminei defectu cōplectit, quo frequentissimē fecūditas ipedit. Quarta verō, et ultima ad sāguinis.

men-

Causa.

mēstrui depravatam fluendi naturam, & rationem refertur. Quæ sanè uitia nisi primò ratione, & methodo corregeris, non solum nihil incuratione proderis, verum obesse sæpius comperies: ob id cuiusq; causarū generis seorsum meminisse oportebit, & cuiq; propria signa, & curandi viam, ac materiam scribere, initio sumpto ab externis causis.

*Causa
externa.*

Inter causas, quæ fœminæ alicui occurrere possunt, inferreque concipiendi impotentiam, eæ potissimæ sunt, quæ vel ad qualitates reducuntur manifestas, vel ad occultas. Qualitates quidem manifestas, ad tempus, ad regionem, vel ad medicamentum optimè reduces. Quippe frigidissimum tempus, frigidissimam regionem aut callidissimam nulli est dubium ex cadentem posse in vtero distemperiem efficere, quæ deinceps sterilitatem inferre nata sit. Sic profectò medicamenta non pauca ob excedentem qualitatem, vtero imposita sterilitatem inducunt, velut ruta, vinum dulce, & pleraque medicamenta calida citra indigentiam adhibita: pari etiam pensu ob frigiditatem camphora vel nenufaris flos idem malum præstant. Item quæ plurimum vteri os emolliunt, vt altheæ radix, aut quæ plurimum indurant, vt omne terræ genus, vel quæ nimis os vteri aperit, vt abrotanum, aut inspissant, & refrigerant, vt sempuuiū, & cicuta uel adurunt, ut calx, vel putrefaciunt, vt auri pigmentum, vel attrahunt, vt pulegium, aut mordent, & irritant, vt acetum, sinapis, & urtica: hæc enim sterilitatem quoque inferunt. Quorum omnium notitiam ex relatione faciliè consequeris. Sic curationem his omnibus præscribes, vel mutata regione in statum celi omnino fœminæ contrarium, vel plurimum similem, qui eius temperamentum versus aliquod extremorum adaugeat: vel adhibitis medicamentis ijs, quæ sterilitatē posse inducere diximus omnino contrarijs. Quæ sanè ob id silentio prætereo, quia facillima sunt, & plerunque sua sponte curantur.

*Causa
occulta.*

Sunt equidem haud pauca (præter diuinam uoluntatem) quæ occulta quadam, & peculiari proprietate citra euidentem qualitatem, sterilitatem inducunt: vel ut est sterilis aliquis astrorum aspectus, qui fœminam in exortu aspexit, in fœcundamq; ob occultum aliquem influxum efficit. Maleficia item, & incantationes, quibus sacrilegi quidam histriones, homines fœminasve (ut ferunt) magicis incantationibus ligant. Præterea ueneni assumptio, quo menibru aliquod princeps perdi contingat. Item turpis aliquis aspectus, uel odium inter virum, & fœminam, aut desiderium nimis ardens. Præterea reperies nō pauca medicamenta, quæ suapte natura aut superstitione aliqua adiuncta, sterilitatem quoque afferunt: quorum profectò hac in parte melioris gratia meminisse non placet, ne quis imprudenter audacterve; & citra Dei optimi maximiq; timorem, eis unquam utatur.

*Prædi-
ctarum
causarū
signa, &
curatio.*

Nosces ex peculiari celi influxu sterilitatem proficisci ex priuatione aliarū carum, q̄ euidenter ipsam inducunt, maximè si natalitia eiusdem fœminæ expederis, ac repereris, natam fuisse sub signo aliquo sicco frigido, & sterili. Cui profectò medeberis, si concubitu iusseris prædominante astro fœcundo, & prædicto contrario nā id tps, in quo Luna uiget in signo fœminino, ac prolifico fœminis sic affectis, fœcundum existit. Præter q̄ quoddam alimentis, & contrario uitæ instituto nativam illam siccitatem, & sterilitatem compescere quoq; tentandum est. Dignosces præterea regionē, & celi statum, peculiarem fœcunditatē influere, eò q̄ steri-

- A** sterilitas eo tpe, eà regione pleriq; fœminis cõis existit, vel ipsa fœmina in alia regione secunda erat. Cuius medela erit regionis mutatio, uel vsus eorum medicamentorum, quæ ex toto sint contraria regionis temperamento, qualia ex ante dictis & ijs, quæ inferius referam, facile colliges. Venenum quidẽ fœminam sumpsisse, licet faciliter perpendi nõ possit, cum hoc tñ consequeris ex ijs accidentibus, quæ præcessisse tibi relatum fuerit, & ex præsenti alicuius principis mēbri vitio: quippe in hmõ semp aliqd accidens superest graue & alienum a communibus, ita vt facta cõiectura, venari possis ex venenosa aliqua substantia, uel qualitate reliquum fuisse. Cui, si veneni naturam assequaris, auxiliũ præstabis per ea alexipharmaca, q̃ è directo ipsi respondere possint, sin aliter, per cõmunia; tandem ea peculiariter adhibebis medicamēta, q̃ aduersa sint ei qualitati, quã in corpore reliquisse venenum cognoueris. Dilectionem verò maximã aut odium, nimiamve in venereis delectationem aut appetitiã, uel deiectã sensibilitatem ex relatione facile perdisces. Quibus medeeris, dum odio se habent, per ea, quæ venerem excitent sicut ijs, quæ deiectam habent veneris appetitiã, quorum auxiliorum siluam pauld inferius hoc cap. reperies. Ijs verò, quæ nimia delectatione amplexantur, per ea, quæ calorem genitalium partium refrigerare, saltem moderari habeant, qualia etiam hac in parte scribam.

Ceterum steriles ex maleficio cognosces ex priuatione signorum aliarũ causarũ, ex præcedente aliqua occasione suspicandi maleficium aliquod p̃cessisse: & cõ q̃ coniuges se adinuicem diligentes, coire tñ nequeunt: aut cùm antea amore mutuo afficerentur, nunc verò citra euidentẽ cãm odio se habent incredibili. Quod sanẽ multis modis contingere posse scriptum reperio libr. appellato malleus maleficarũ. Primo quidem, si uir priuetur generatiua potentia cũ propria vxore, cum alijs tñ vim obtineat & efficaciam. Item secundò, cùm vxorem hēt exosam, nec pōt ipsam cognoscere. Præterea tertio, si non habeat exosam, veluti tñ agnoscere, ceterum membri vigore careat. Quartò, etiam si vigorem habeat membri, cum hoc tñ non hēt excissionem seminis. Quorum oĩum curandi rō sancte ecclesiæ & sacerdotibus omnino committenda est: nam cùm ut plurimum ad maleficium quoduis diabolica vis concurrat, ob id quidem sanctitum est in sacrosancta Romana Ecclesia exorcismis huic rei peculiariter dicatis vtẽdum esse. Quibus æquũ est profectò per peccatorũ confessionem & penitentiã subuenire: sic quidem ieiuniũ, elemosyna, continuæ orationes & sacrificia accedat protinus oportet: q̃ proculdubio, existimo potiora esse p̃sidia. Quamobrẽ ab alijs, quæ suspicionẽ & superstitionẽ non carent, super sedendum esse firmiter arbitror. Verũ si qualitas aliqua manifesta in maleficijs apparuerit, pharmacis aduersus eam operantibus tutò & utiliter uti poteris: qualia verò sint, mox plura referã, si prius dixero dictum esse uiris doctis abrotanum oleo illitum, & uino sumptum, frigidis ex maleficio non parũ prodesse: reliquis uerò opitulat radix asparagi cum uino dulci decocta cõmanducataq; ; sicut & hortense aliũ, uel satureia, aut ocymum hortense, & cardus quoq; hortensis uino generoso præmaceratus. Atqui si ex ui & efficacia alicuius medicamenti uel alterius rei ex oculta proprietate operantis sterilitatẽ proficisci cognoueris, facta diligẽti interrogatione qbus nĩ fuerit usa medicamētis, uel alijs rebus mulier, ex relatione, disces, cui sit reiicienda sterilitatis culpa. Sunt. n. plurima, quæ sterilitatem in-

Y

ferunt,

ferunt, q̄ subdicere hac in parte studui, ne quis prece vel pretio seductus, eis praue utatur: sat. n. est nosse plurima alia esse, q̄ inductam ab his sterilitatem auferunt: qualia mox referā, si prius dixero hanc esse utendi legem & rōnē, nepe, si ex medicamēto uel alimēto supererit in corpore qualitas aliqua euidentis ex eis, quas hic referā, id liges, qd̄ aduersus illā qualitatem pugnare natū sit. Verū si citra introductionem manifesta qualitatis, sterilitatem p̄stiterit, id quoq; adhibebis auxilium, qd̄ nulla qualitate euidente polleat, id tñ possit. Habeant equidē experimenta hæc, præterquam q̄ primò & per se his occultis causis aduersentur, ut euidentibus qualitatibus non noceant, potissimū seruata qualitatum cōtrarietate. Quapp cordatus Medicus hæc expendat suspiciatque, ut sibi cōparet materiā cuique causæ proficuum, & propriam, ac multis quoque cōmunē.

Primū sanē experimētū est si fœmina inūgat pudēdū succo satyrionis sparso puluere leporis cōbusti: idē p̄stat suffumigiū ex trochiscis myrrhæ, styracis liquida, galbani & baccarū lauri. Ex usu ēt est, fœminā testes gallorum comedere, & uterum balsamo inungere: pastinaca quoq; siluestris idem præstat comesta, vel semen eius in potu duorū mensium spatio. Confert theriacæ usus ijs, q̄ ex frigiditate non concipiunt: quibus ēt prodest uinum Hippocras appellatum: semen feseleos confectum, aut ficus arida cū folijs abieris: genitale arietis, uel tauri coctum & comestum: testes cerui in puluerē redacti: semen vrticæ. Præterea potus lactis vacinini: oua perdicis: simus accipitris cū mulsâ: limatura eboris tribus diebus exhibita cum eadē mulsâ: sanguis leporis cum eius coagulo, & puluis artemisiæ. Prodest & potus ex g. x. diamusci cū uino calido, in quo bullierit rasura eboris, & cornu capræ, sic & uinū ex floribus roris marini factū. Abluere item partes pudēdas cū aqua melissæ, ex usu esse fertur suffumigiū ex lilio in forma polētę cū thure mixto, uel factum ex limatura cornu capræ cū oleo de spica: cui usui aliquādo prodesse scimus puluerem baccarū lauri, uel ex asphalto, fimo leporis, ruta sicca, & melle, aut facto suffumigio ex ligno aloes, uel addita eboris rasura, aut puluerē uteri suis. Pessariū itē eundē usum multi p̄stare dicūt ex mētha sicca, myrrha & cera, uel limacibus cū croco, aut ex coagulo & stercore leporis cū melle: ex felle itē taurino & adipe aut butyro, uel ex felle caprino cū oleo rosaceo & cumino. A coitu ēt cōferre fertur pudēdū obturare pessario ex lana confecto & succo myrti madido: & eundē rōne nasciale factum ex croci, spicæ, pinguedinis gallinæ, gummi, olei de spica, singulorum partibus æqualibus cū cera. Itē quatuor horis ante coitū teneat aliud pessariū ex croco, myrrha, spica, sepo, galia, terebinthina, mastiche, & oleo de spica cum pinguedine gallinæ, & lana confectum. Præstat idem beneficium pessarium ex satyrione cū melle, uel stercore uulpis cū oleo rosaceo & lana, aut succus mercurialis cū lana: itē aliud factū ex oleo de ben, de bdellio, & balsamo, uel aliud ex nuce cupressi, baccis lauri, gallia, amomo, & cera, aut ex oleo de bdellio, & melle: aliud itē ex medulle cerui, hyssopi uiridis, butyri, sepe capræ, styracis liquida, meliloti an. 3. vj. olei de spica. 5. j. galliæ, mastichis, spicæ an. 3. j. cū oleo rosaceo fiat pessariū. Confert, & aliud confectū ex sœnugrēco cū adipe anatis, uel ex musco dissoluto oleo rosaceo, aut ex trifera magna cū succo artemisiæ, uel ex eiusdē artemisiæ succo cum myrrha. Sumere quoque per os theriacam cum limatura eboris, conferre maximē plures ex autoribus profitentur: sicut electarium, ex flore roris

Aroris marini, & potissimū ex flore stœchados cum melle, aut electariū de pudē do tauri cum mentha & melle factū. Puluis ēt prodesse fertur testiculorum cer ui visco quercino addito factus, sicut puluis ex artemisia cū saccharo summo manē sumptus, postea factū suffumigio ex calamintha. Præterea coagulū leporis comestū, vel uterum eiusdē allatū, & comestum plurimum, pdesse scriptum, reperimus: itē a purgatione sumat fœmina duo ova sorbilia nepeta plena, cum modico vino, ac postmodum cum viro coeat. Utatur ēt balneis ex decocto spi- cæ, florū chamæmeli, meliloti, polij, seseleos: postea suffumigium suscepter ex opopanaco cum balsamo. Proliunt intra uterum immisse pillulæ filo appense, confectæ ex gentiana, croco, & folijs myrti tritis cum pilis arietis, & oleo sesa- mino formatis. Itē subijcere oportet pessarium ex lana, & testiculis uulpis, ac felle galli, quo factū fœmina bibat limaturæ eboris cū uino. 3. f. Præter quæ oīa & alia, quæ consultō prætereo, refert Plin. (si uerum est) sterilitatem mulierum emendare hyæne oculum glycyrrhiza, & anetho sumptum in cibo. Sunt q̄ flo- rem cratœgoni bibentes mulieres, intra quadragelimum diem concipere, tra- dant. Quibus itaq; omnibus uti poteris facta prius hac consideratione, q̄ ea, eis q̄ nullam habuerint euidentem qualitatem, quæ sit causā sterilitatis adhibeas, quæ uerō aliqua pollent, ijs tantum, quæ illi ē contrario respondeant.

Causas quidē ad quas potissimum referri sterilitatem apud uiros doctos, & cordatos conspiciamus, uel corpus est uniuersum, aliquo morboſo affectu deie- ctum, cuius in hac parte meminisse non est in animo, sed ipsum ad proprium cu- iusq; mali caput relegare, uel uterus ipse alioq; officina, & receptaculū genitu- ræ, uel seminis quidē alterius, uel utriusq; uitii aliquod, aut sanguis mēstruus certa quadam ratione uitiatuſ: in quorum expositione, & medella ab uteri ui- tijs initium sumam. Si prius de nimia obelitate, & gracilitate aliquid dixerō.

Obesitas quidē multis modis, & uiris, & fœminis infœcunda existit. Primō, quia & seminis, & adipis eadē est materia: nō quidē ut multi arbitrantur, q̄ fri- gida sint obeforū corpora: hinc. n. sit, ut salatiores ueneriq; nimium indulgen- bis exsuccari, & graciles uideantur. Idē probat quoq; castratio, q̄ in animalib⁹, ut pinguescant, molimur: dum. n. testes & uenis aurire delinunt pingue tenuem & æream substantiā, tota in adipē conuertitur: q̄ sanē ex nimio coitu facile e- naneſcit. Præterea in uiris obelitas breuiorem efficit penē, & ob id eos steriles reddit: in mulieribus uerō omentū craſſius conceptionis spem adimit, ut mox scribā, & ex Scitharum fœminis Hip. lib. de locis aq. & aere, refert: Nimia item pinguedo mulierū fecunditati obest, q̄a multus in ea gignenda sanguis abſu- mit, ita ut qd̄ superest, alendo fœtui non sufficiat. Præterea q̄ obese sunt lunares purgationes minutissimas habent: quod Scithis uitio uerterat Hip. & q̄a ocioſam uitā debebant, nimitū esse steriles dixerat: ancillasq; earum, q̄ uirā agebant laborioſam, fecundas. Quibus rationibus addi pōt, huiusmodi fœminas carno- sum, & pingue adeo uterum obtinere, ut iustum spatium in locellis fœtui con- tinendo, non relinquatur: præterea uenter prominentior sterilem utrumq; facit. Inquit. n. Actius tetra. 4. ser. 4. c. 26. Hoc uelut maximum negligendum non est, nec ulti, nec mulier pinguem habitū acquirant: tales enim inepti ſunt ad pue- ros gignendoſ: nam nec pudenda inter se adaptare poſſunt, & uiri parum ſemi- nis emittunt, & mulieribus pauci menses feruntur, cum maxima a'imenti pars

*Causa
internas.*

in pinguedinem transeat. Quæ vitia sanè vitaberis, si vtrunq; macrefeceris: A

Vterus quidè sterilis efficitur, vel subuersa natia temperie qua mille cōgregat excrementa, ac flatus, quibus semen nō raro propellitur: vel subuerso appetitu, ira, vel nihil appetat, aut nimio appetitu excādescat: tertio mutata propria figura, vel laxiori constrictiorive facta: vltimò sterilis fit mutatio peculiari, & natiuo situ. Dimitto quoq; hac in parte vlcera, & cætera, q̄ ad chirurgi officinā p̄tinent, quorū lib. p̄ce. meminimus, & alia q̄ viri accessum dolorosum efficiūt: nā & id quoq; sterile est, vt refert Hip. li. 5. pop. in histor. famule disiridis. Quod verò fœminis si equentissimè accidere cōspicimus, p̄culdubio est vteri intemperamentum, quemadmodū ab Hip. & Gal. scriptum reperimus 5. aphor. 62. Quippe referunt benè tēperatos vteros ad cōceptionem esse idoneos: malè autē tēperatos, si parum à bonitate recedunt, difficulter concipere: si verò nimium, mulieres steriles fieri, & ob id eas esse fœcundas sine ambabus bonis temperaturis est impossibile. Inquit. n. Gal. in com. Appello autē bonas temperaturas, mediocres, sicutum ex calidi, & frigidi, tum ex humidi, & siccī cōmixtione: cū fieri possit, vt secundum vnā oppositionem benè temperatus sit vterus, secundum alterā verò malè. Quapropter censeo Hip. dixisse: Quæcunq; vtero ex vtrisq; mediocrē hñt temperaturam, eæ fœcundæ sunt. Quā quoq; sniam adduxerat idem Hip. lib. de nat. hum. per hæc verba: Si non calidum, ac frigidum, siccum, & humidum moderatè, ac æqualiter inter se haberent, sed alterum multum præcelleret, & validus debiliori præstaret, non posset fieri generatio. Verum inter prædictas intēperantias, quæ ad calidum, & humidum inclinant, successū temporis haud difficulter corrigi possunt: quæ verò ad siccum, & frigidum nequaquam, sed post iuuentam fiunt deteriores ni maxima diligentia corregeris. B

*Calida
vteri si-
gna &
curatio.*

Excandescit frequenter vterus præ nimio calore, quo geniturā cōterit, & cōsumit, vt Hippo. scripsit 5. apho. 59. In quo sanè affectu aliqñ solus elucet calor plerunq; verò adiunctis flaua bile, & alijs ichoribus, ac succis calidis, quibus nō solū calore, & sterilitate efficit, verū & alijs subinde malis, quorū abundè superius meminimus. Dignosces vtranq; intemperie simplicē quidè, & cū humore adiunctā ex corporis squalore, ac ex mensium paucitate cum dolore, p̄deuntū ita vt pudēda mulieris exulcerent: sed q̄ proderint nigra sunt, & ob nimia mordacitatem nullum ordinē seruāt. Sequitur et hanc intemperiem insignis salacitas, & totius corporis siccitas; quò fit, vt semini suscepto accidat id quod semini bus terræ cōmissis sub cane, & feruido Sole: quippe hæc nō solū alimenti defectu, sed & æstiuo calore, & nimia siccitate contabescunt. Cui intēperamēto subueniendum est, non tñ ut sterilitatem arceamus, sed vt maiora mala, q̄ accidere solent, p̄pediantur. Sic instituta ea victus rōne, q̄ vim refrigerandi sanguinē, & vniuersum corpus, nata sit, & pari pensu in reliquarū rerū non naturalium administratione diligenter rimari oportet, an subsit biliosi mordacisve succi aliquid: qđ p̄culdubio Hip. docuisse cognoscere li. de nat. mu. apertè cōstat, dicentē: Si mulierē parere nō potentē purgare velis, & fuerit biliosa, aut pituitosa, cognosces aut vtrum horū sit, si arena subtrahā cū menses fuerint in Sole sanguinē supra fundas, ac siccari sinas: si. n. biliosa fuerit, supra arenā sanguis pallidus erit, si verò pituitosa velut mucus erit. Cui fœminæ, si id iā cōpereris, ante oē auxiliū, p̄uidendæ est sanguinē mittere ex basilica lateris dextri, vel ex eiusdē lateris C

- A** teris manus saluatella, vel (si maioris censo esse momenti) ex talo semel aut bis. Qd si feceris omni arte postmodum humoris calore, & acrimoniā reuēdere oportebit apozematis, & syrupis frigidis ac humidis, velut est syrupus granatorū, buglossæ, cichori, & borraginis, addito, si uterus nō renuerit, oxilaccari modico cum aquis buglossæ, acetosæ, borraginis aut portulacæ. Quibus & alijs, quos ex succis granatorū, aqua hordei, & saccharo, vel ex succis prædictarū herbarū clarificatis cum aqua portulacæ, & saccharo conficere poteris, aliquid gusti gratū & aromaticū addens, velut est santhalarū, rosarū, aut diamusci momentum. Probat et plerisque, & merito, syrupus, qui excipit foliorū buglossæ, borraginis, & rosarū rubearū ana m. j. violarū, lactucæ, foliorū papaueris albi, nictibi, scariolæ ana m. f. seminis intibi & scariolæ ana s. f. quatuor seminum frigidiorū maiorū ana 3. vj. fiat decoctio secundum artem, quæ collo traiecta suscipiat sacchari li. 2. aceti albi 3. j. vini granatorū lib. f. lēto igne fiat syrupus, qui gustui gratus efficiat addito santhalarū modico. Quibus dum præparatū cognoueris flauū bilē, primò corpus purgabis ex māna, cassia fistula, aut syrupo solutiuo rosarū, vel violarū cum decocto adithi, florum buglossæ, violarū, prunorū, & tamarindorū, vel cum aqua cucurbitæ. A quibus vel facta vna purgatione, porriges cōfectionē amech sine scāmonio, & colocintide, sero lactis vel aqua stillatitia ex hordeo, & portulaca dissoluta, pōdere 3. j. aut ex ipsa cōfectione cum modico rhabbaro cōficies bolos cum saccharo, vel porriges rhabbari insulip in aqua lactis, buglossæ, borraginis, aut cichori 3. j. & s. cū 3. iij. syrupi violarū ex infusionibus. Itē paulatinis vteris purgationibus ex aqua cucurbitæ aut hordei stillatitia, & rhabbaro. Maiora. n. in his adhibere medicamēta verēdū est: ob id tutius existimaui prædicta repetere, quā grauiora adhibere. Purgata flaua bile, puidēdū est deinceps calido intemperamento: primò balneis aquæ dulcis frequentioribus vel infusionibus ac fomentis vterro adhibitis, quæ recipiāt maluræ vtriusque cum radicibus manip. iij. florum violarū, salicis, rosarū, ac nimpheæ ana m. ij. foliorū vitis, & malorū cotoneorū, & vlini ana p. i. fo nigræ li. f. facto decocto, insideat mulier ieiuna pcanens ne sudet. Itē ex eo decocto pudendū abluet, uel ex prædictis herbis sacculū cōficies: quo facto cubitum adeat, & antea sumat sequentis medicamēti aliquid. Excipe fragmentum santhalarum 3. ij. ramenti eboris, visci quercini, pudendi tauri, vuluæ leporis ana 3. j. & s. sacchari candidissimi lib. f. saccharū aqua rosacea, aut hordei liquet, & forment quadre pondere ij. 3. Diebus et alternatim interpositis, loco prædicti auxiliij sumat mulier aliud pretiosius, quod recipit conseruæ rosarum 3. i. conseruæ florum nymphææ, & florum vtriusque buglossæ ana 3. iij. pulueris triū santhalarum, electarij, de geminis & diamargaritonis frigidi ana 3. j. seminis mercurialis 3. iij. ramenti eboris, visci quercini, pudēdi tauri, & matricis leporis ana 3. ij. misce, & facta cōfectione cum syrupo adithi p̄beto cocleare vnum ante prædium à balneo, & tantundē ante cernam. Poteris quoque feminam suffire pastillis, qui conficiuntur hac lege: Recipe oīum santhalarum ana 3. f. rosarū rubearum, florum nymphææ, & molarum ana 3. ij. styracis 3. j. ambre g. x. terantur, & rosacea excepta redigantur in pastillos. Vtilissimum pari pensu erit, fœminæ dorsum inungere olēo rosarum, nenufaris, & violarum, aut vnguento rosaceo, de cucurbitis, refrigeranti, vel resumptiuo: quibus bolus armeni aliquid addere poteris, uel calidi alicuius medicamēti, ut id, quod dorso aut venter adhibueris,

hibueris, impensè frigidū non sitiat. n. est uel tēperatum esse, uel parum à mediocritate recedens, ut optimè consuluisset Aetium cōstat. Ad pubē verò, & imū ventrem ac lumbos refrigerantia eadē adhibeto: quibus addēs solani, aut umbilici ueneris succi modicum, aut lactucæ oleo rosaceo admixto, ubi ingēs fuerit caliditas. Cui vsui hoc mō apposituissimum parabis medicamentum: excipe foliorum atriplicis, portulacæ, & lactucæ p. ij. coque, & pistā, ac adde olei rosarum, violarum, & citoniorū ana. ʒ. j. farinæ ordei p. j. cū modica hordei aqua fiat emplastrū. Uteri osculo pessarlū et appones, qđ recipit medullæ cruris uituli, cerui cerebri, butyri vaccini, adipis capratum, seminis mercurialis ana. ʒ. f. acacia, hypocistidos, santholorum rubeorum, cornu cerui vsti ana. ʒ. ij. oleo rosaceo, & lana in pesslos excipe. Præterea in pudendum dū ingues fuerit caliditas optimè infunditur aqua hordei, aqua portulacæ, & cucurbitulæ, & umbilici, ueneris cum modico rosaceo; quē quoq; usum præstat lac caprilum. Refert itē Aetius, mercurialem, utero pectini, & dorso impositam prodesse, & argenti spumam ac carusam cum aqua tritam. Quorum tamen omnium frigiditatem metiri, & attemperare oportebit, quantum natura, & uterus fœminæ permiserint.

*Frigiditas
uteri
generis
causæ.*

Inter oēs morbosæ sterilitatis causas, frigiditatem vulgatissimā, & communissimam esse censemus: cui pfectò ob id paulò diligentius prouidendum est. Inquit. n. Hip. 5. Aph. 59. Quæcūq; frigidos, & spissos uteros habent, non concipiunt, quæquidē parte arbitror Hip. nō quæcūq; uteri frigiditatem sterilem esse intellexisse, sed eā solum, q̄ tanta sit, ut spissum reddat uterū; quā sanè intelligentiam rōni, & Gal. consonam esse constat, maxime cum apertum sit quinque assignasse modos, quibus frigiditas sterilem reddit uterum. Primus qđ est, cū frigiditas per se extinguit seminis innatū calorem: secundus, cū tm̄ uterus à frigiditate cogitur comprimatur, ut semen recipere non possit: tertius, cū venarū ora occludit, ita ut sanguis non possit in uterum instillari, ad fœtus alimoniam; quartus verò, cū sanguinem efficit aqueū, & nutritioni, aut solidorū vel carnis cōpactioni ineptum: quintus, cū tantam uterus ob frigidū tēperamētū generat pituitam, q̄ humidior, mollior, & generationi ac seminis compressioni ineptior fiat. Quapp censendum est minus has fœminas menstruo sanguine purgari. Sed constare iā ex his arbitror, eā frigiditatem sterilem esse, q̄ (ut dictum est) spissum reddat uterum, siue in propria substantia, siue ob humorū crassorum, & frigidorum copiam. Cognouisse tm̄ ac distinxisse adamussim hos frigiditas operandi modos oportet, ut p cuiusq; effectu, & natura calfacientia quoque adhiberi possint: ne si frigiditas unū predictorū uitiorū inserat, alteri remedia adhibeamus, decepti sola frigiditas specie. Nā uterū cuiusq; affectus p̄sidiū nō solū cām respicere tenent, sed & modum operandi ipsius causæ, ut par in mō operandi, & qualitate id adhibeamus. Docet itaq; Hip. frigidū intēperamētū nosse lib. 2. de mor. mul. per hæc uerba; Quum verò perfrigerat uterus, & onus insitū esse uidet, & color non est clarus, & compactus est uterus. Verūm specialius cognosces ex mensibus suppressis, qui in cōmodè ferunt ob nimiam crassitiem: accedit et̄ stupidus sensus circa pectinē, lumbos, & crurā: quibusdā itē crurū impotentia accidit, ac si prorsus perfrigeratē fuerint, quas uenerem minimè appetere, & uteri osculū contractū habere, certum est. Affectum tamen frigidum esse cognosces, qā semen extingui percipies, quod uir in coitu pudendū sentiat frigidum,

Agidium, & femina non percipiat semen suscepisse. Venarum oscula claudi constat ex mensium suppressione uel paucitate, quorum sanguis aquosus existit, & decolor, ac debitum tempus antevertens: mucosum esse dignoscet, quod sanguis crassius sit subalbidus, & mucosus.

Quibus cognitis, talem opus est instituere medendi rationem, quæ non solum calfaciendi vires habeat, sed quæ cuiq; etiam agendi modo respondeat, contrarieturq;. Nam dum semen extinguere cognoscimus, quæ caliditate polleant, ipsamq; frigiditatem compescant, citra alia operationem adhibenda sunt, donec innata uteri caliditas sopita, & veluti extincta ad nativum redeat temperamentum. Dum verò frigiditas præ uteri conclusionem semen non admittit, non solum quæ calfaciunt adhibenda sunt, sed quæ dilatare, & aperire partes possunt, quæ lia esse credimus vaporosa omnia. Sic dum venarum ora concludi sentimus, eadem sed lentius, & diutius adhibere oportet. Ceterum si frigiditas sanguinem aquosum pariat, calida reficcantia, & euacuantia proficua sunt: dum uerò pituitosum, & crassum calida, quæ attenuent, abstergant, & repurgent. Quæ omnia

B si exactè animadvertas, nil mirum si sepius quam alijs prosperè successisse rem comperias. At quia plerunque huiusmodi frigiditatem sibi comitem habere parvam frigidi humoris copiam scimus: ob id ante omne opus frigidos, crudos, pituitosos, & aquosos succos, non tantum uictu exsiccante, & calido, verum, & medicamentis munere necessum erit. Primum itaq; cibarijs omnibus admiscebis quæ alim citare possunt calida & acria, ut fœniculum, anisum, gnidium, apium, smyrnium, crithmum, & alia consimiles vires habentia. Potus et probatissimus est aqua decoctionis similacis asperæ, radicis chinæ, gariophyllorum, cinnamomi aut anisi. Deinceps uerò lentè, & paulatim prædictos humores præparare curabis melle rosaceo syrupo de mentha, de absinthio, de radicibus, & horragine cum modico oximelite, addito decocto rubæ maioris, radicis brusci, asparagi, gtraminis, nepetæ, gallitrici, samplici, origani, calaminthæ, pulegi, cum seminibus calidis, & modico sabina, & ex eisdem facto interim syrupo. Tandem omni arte curabis pituitosum humorem euacuare ijs, quæ in millies id diximus. Scias tamen interim id fieri posse agatice, syrupo ex infusionibus rosarum, cartamo, electario indo, catholico, pilulis mastichinis, alephanginis, & ijs similibus. Quod si aquosus sit humor prædictis addes vel rhabarbari, vel hieræ simplicis Gal. aliquid: cui vsu pilulas ex rhabarbaro, agatice, cartamo, & mastiche efformare poteris. Laudo in purgationes fieri viginti diebus à menstruatione, ut menses puriores, & copiosiores prodeant. At si per epierasim purgare libuerit, utile quoq; erit, huic vsui pillulas porrigere, quæ recipiunt xylobalami, cinnamomi, fileris montani, asari, mastichis, seminis anisi, fœniculi, macis, croci ana. ʒ. j. calami aromatici, squinanti, spicæ, ana. g. x. myrobalanorum, turbit, ana. ʒ. ij. aloes ad pondus omnium, cum succo fœniculi fiat massa. Attamen si ex indebito mixto instituto uel uentriculi ultio, aut totius corporis frigido habitu, uterum prædictos, succos suscipere aliquando comperias, probatissima mihi uidetur ea purgandi ratio, quæ per uomitum fit, exhibito origani aut thymi decocto.

C Purgato quidem altero aut utroq; modo sufficienter corpore, ea potui aut

esui porriges medicamenta, quæ præter id quod humorum reliquias coterere habeant, totum subinde corpus, & sanguinem ipsum calfaciant, & siccant: eoq; magis, quod aquosior extiterit menstrualis sanguis. In primis itaq; administrabis,

Causa.

Y +

343

3.℥. vel 3.℥. triferæ magnæ sine opio ex vino, pliris cū moscho, diābræ, diafaty-
rij, rameti eboris, seminis mercurialis ana 3.℥. coaguli leporis, & matricis eius-
dē ana. 3.℥. sacchari albi. li. ℥. liquore stillatio apialtri, & aquæ buglossæ saccha-
rū dissolue, & adde conservæ corticum malicuri 3.℥. conservæ florū stachados
3.℥. atq; in quadras redige pondere ij. 3. quas ieiune p̄beto: sumat ēt ex confectio-
nibus, quas p̄cedenti capite huic vsui proficuas esse diximus. Confert non mi-
nūs à purgatione castoreum, cuminū, pulegiū, anisum, iuniperi fructus in pul-
uerē redigere, & cum xyloaloe, & saccharo tabellas efformare, vel cōditū cum
melle addito modico vino albo. Præstat, & mercurialis cum castoreo, aut 3.℥. ec-
legmatis diābræ, vel diamusci, seu de xyloaloe cū uino, aut aqua florū cinnamo-
mi vel citrangulorū. Quo sanè facto, mox omni arte corpus calfacere, & exsic-
care opus erit: primò qđ balneis naturalibus ex sulphure, qđ summopere esse
utilia diutino experimēto didicimus, vel alio arte parato ex p̄dictis medicamē-
tis. Ex vsu non minūs est sudorē euocare decocto ligni guaiaci, smilacis asperæ
aut radice chinæ, qđ ēt multis profuisse scimus: ad quod quidē auxilium cōsu-
giendum esse in pituitosis, & albis fœminis arbitror. Verū si sudare renuerit, B
syrupū ex decocto ligni guaiaci cū floribus stachados & semine masculæ mer-
curialis, noctuq; per dies triginta porriges, quē magni vsus fore, certo scio. Qđ
si hæc non satis sint, ad fomenta, & encatasmata veniendum esse consulit neces-
sitas, & rei rō: p̄stabis quidē vaporē per infundibulum fœmina vndiq; cooper-
ta, ne in aerē spirer. Euaporationes hoc mō cōficio: excipe artemisiæ, betonicæ,
chamedrios, camēphythios, chelidonæ, gallitrici, foliorum lauri, maluæ maio-
ranæ, nepetæ, melissæ, chamæmali, meliloti ana m. j. carui, cimini, sileris mōta-
ni, anisi, seminis lini, anethi, fœnugræci ana. 3.℥. fiat decoctio, qđ pro balneo etiā
naturali administrari pōt. Sed probatior mihi vī fœtus, qui fit ex aqua calida, in
qua prius fuerit decocta artemisia, salvia, ruta, cuminū, pulegiū, ciperus, iuncus
odoratus, acorus, & reliqua semina odorifera. Verū in his, & suffitiis nō o-
porteret diu immorari, ne maior in pudendis concitet calor, qđ par sit: sat. n. erit fre-
quentius his uti. Cataplasma quoq; ex his oībus confectum, & pubi appositum
magni est momenti, qđ vterum calfacit, & roboret. Suffitus etiā parati possūt C
ex calidis odoratis, ut cassia, cinnamomo, costō, aniso, thure, myrrha, styrace, &
alijs ex his compositis, qđ recipiant pilularum cupressi, mastichis, thuris, ladani,
baccarū lauri, bdellij, styracis ana 3.℥. ambre griseæ 3.℥. misce, & per infundibu-
lum suffitum suscipiat. Aliud ēt conficies, quod recipit styracis 3.℥. agalochi, am-
bræ ana. 3.℥. balsami. 3.℥. moschi 3.℥. confice pastillos. Itē aliud recipit ladani pu-
ri. 3.℥. styracis 3.℥. & fagarophyllorū, agalochi, sabinæ sicce ana 3.℥. ambre, &
moschi ana. g. x. fiant pastilli. Idē beneficium p̄stant alipta muscata, gallia mus-
cata, & reliqua suffumigia, quibus fœminæ vtuntur ad conciliandum gratum
odorē. Studebis ēt his factis sensim vterum purgare, calfacere, & roborare pes-
sarijs, quæ recipiant artemisiæ, sabinæ, maioranæ, dictami, absinthij ana 3.℥. ani-
si, ameos, rutæ, corticis thuris ana 3.℥. quæ oīa in minutissimū puluerē redacta,
sinco mercurialis excipe, & in raro pāno locellos nocte immitito: quibus ad-
dere aliqn oportebit oleū momordicæ, vel idē oleum bombace exceptum vte-
ro impolitum, qđ incredibili efficacia prodesse scimus. Aliud item conficit qđ
recipit macis, bdellij, galliæ muscate ana 3.℥. pulueris hieræ 3.℥. cum ladano
confice.

- A** confice pessarium, cui adde agarici modicum. Quam proculdubio curationem si quis diligenter examinet, reperiet vniuersam scriptam esse apud Hip. li. 2. de mor. mul. per hæc verba. Quum vero perfrigerat uterus, & onus insitum esse videtur, & color non est clarus, & compactus est uterus. Quum sic habuerit, purgare oportet eum eo, quod pituita ducat, & extenuare, & frequenter vomere, li. 1. pop. par. 6. tex. 34. huic subueniens sterilitati, inquit, ut mulier in utero habeat, polypos super flamma allatos, qui calidissimos, & plurimos semini vestros edendos dare, & nitrum egyptium, & coriandrum, quibus sanè tantum in hac causa utendum esse arbitror. Verum ut res ex voto succedat, non utcumque adhibenda sunt prædicta auxilia, sed hac limitatione præhabita, quod inter vnum, & aliud auxilium, vel vomere, vel leui aliquo pharmaco corpus purgare studeas: aut adhibito catapotio ex hiera, ex mastiche ex agarico, vel decocto ex syrupo guaiaci cum sena, vel ipsa foliorum senæ infusione cum melle, aut saccharo. Præstat itè pulvis senæ cum saccharo, & succo mellissæ in tabellas formatus. Præterea prædandum est, ut ex prædictis auxilijs vnum quodque iuxta effectum à frigiditate indutum adhibeatur: quippe suffitus ijs maxime profunt feminis, quibus ob frigiditatem menstrua, vel nulla, uel diminuta prædierint, præsertim si aquosa humiditas adiungatur. Suffitus aromatum (inquit Hip.) muliebria educit. At euaporationes ijs, quibus os uteri, & oscula venarum ipsius frigore constipantur, ita ut semen suscipere non possint: omnia tamen hæc peculiare hoc habent, ut frigiditatem uteri cōpescant, quo minus semen extinguatur. Sed quod uterum purgant pessaria illis tamen ex usu esse censeo, quibus pituita, aut aquosus humor in utero abundat, quod quidem cautè agendum esse arbitror, licet autores liberè colocintide, & alijs gravioribus utantur. In qua sanè rescriptum reperio, & uiris doctis non leuiter laudatum, pessarium de alio hortensireferunt. n. aliis cum oleo de spicatricis, & in rarum linteolum oblongi sacculi modo cōformatum, intrusis, ac in vuluam profundè pulsas, & dum lacebit, exclusis, cessantes menses (quod pituitoso utero non raro accidere cōspicimus) potenter moneri, & uterum mira voluptate affici, ac repurgari, adeo, ut hinc facta sit via nonnullis ad cōceptum longo tpe desperatum. Eandem et intentionem cōplent & purgationes, & balnea, & sudores, & medicamenta, quæ humorum reliquias cōterere, antea diximus. Sed cum satis non sit ad fecunditatem cōciliandam, hæc omnia præstitisse, nisi uterus ad antiquum vigorem redierit: ob id ventris inferioris regionem, & uteri locum in lateribus iuxta inguina inungere primo opus erit, oleo momordicæ, balsamo, oleo de styrace, naphthæ, liliorum aliorum, de baccis lauri, de angelica, de cinnamomo cum musco, & alijs, quæ calida sint, & gratum odorem spirent. Præterea fomentis æquale vini portionem addes: cataplasmata itè cōficias ex pulueribus prædictarum herbarum, & seminum cum aromatis, vino, & oleis prædictis, quæ iuxta inguina adhibenda sunt. Sed umbilico, & eisdem partibus emplastrum quoque affigito prædictis viribus præditum, quale est, quod recipit ladanum depuratum 3. j. thuris, styracis liquidæ, an. 3. l. spicæ nardi, gariophyllorum, ambræ griseæ, an. 3. l. cere quantum sit satis, ut fiat emplastrum cum oleo liliorum, nardino, & balsamo. Aliud quidem recipit emplastri ceronei 3. ij. ladani puri 3. j. & l. galliæ muscatæ, aliptæ muscatæ, pulueris cinnamomi, & baccarum lauri, ana 3. i. excipiantur omnia oleo ex angelica, & cōficiatur emplastrum. Parabis et aliud efficacius, si exceperis styracis calamitæ 3. j. ambræ 3. j. myrrhæ, thuris, gariophyllorum, ligni aloes, cinnamomi, nucis muscatæ, nucum cupressi, & seminis angelicæ

gelica ana 3. j. & cum cera, ladano, terebinthina, belzoino tecamacha indorū, A
caranna fiat emplastrum: quod et ex eadem tecamacha vel caranna cum balsa-
mo, & theriaca vtilissimū cōficiēs roborant quidē vterū, quā c. de eius imbecil-
litate discimus, sed maximē id quod recipit pulueris granā, & gariophyllorū
ana 3. j. f. pulueris rosarū, coralli, sanguinis draconis ana 3. j. pulueris mastichis
3. f. diambra, & diamusci an. 3. j. ladani depurati, & ceræ q. s. ut fiat mediocris
consistentiæ emplastrum. Quibus sanē ea moderatione uteris, ut ne vterū ultra
debitum calorem moueas, aut prae timiditate nihil efficias, sed ea prudentia re
moderaberis, vt neq; noceas, aut frustra, & inutiliter labores.

*Humidi
uteri
st-
gna,
cura-
tio.*

Humiditate nimia vterum laborare, & ob id non concipere cognosces ex fe-
minae habitu molli, pingui, & subalbido: ex precedenti uictu humido, aquoso,
ac potu immodico, & uita quoq; sedentaria, & otiosa. Ex largioribus itē mensi-
bus, ijs q̄ aquosis, tenuibus, & ichore plenis. Præterea ex pudendo nimis humi-
do, ac madore pleno: ex nulla vel obscura veneris appetentia nulla, et delecta-
tione in coitu. Quae sanē omnia mira quadā breuitate Hip. lib. 2. de morb. mul.
cōplexus est dicēs: Si verò nō cōceperit, seu secūda aut tertia die exeūt ea, q̄ à vi B
ro emissā sunt, fluētia cū multa humiditate: manifestū est qđ uteri sūt humidio-
res: Ad qđ sanē cām, uteri laxitatē, & nimia apertionē, reducere pōt: sed placet in
suū dīferre locū, & ad institutū redire. Quatuor igitur modis cōceptū humidi-
tas nata est impedire: primo dum vterus nimia humiditate luxuriat, & uiri ge-
niturā suffocat extinguitq; vt ex Hip. cōstat. 5. Aph. 62. Sed fieri id cēseo nō a so-
la humidi qualitate, uerū à copia et materiæ per se geniturā suffocantis: non
enim datur humida intemperies euidēs sine p̄sente materia. Hoc procul dubio
cognosces, quia retento adhuc semine, & non prolabente, protinus fēminas cō-
cipit. Secūdo humiditas geniturā perdit, quia lubricitatē uterus ex humidi u-
bertate nō parua cōtrahit, qui facillimē semen susceptū prolabit: qđ percipies
ex fēminae relatione. Tertiò uerò, quia humida uteri intēperies nō p̄mittit fēmi-
nam semen fecundū generare, sed aquosum, p̄humidū, labile, & generationi
oīno, uelut aqua, ineptū: nā testīū & vasorū fēminae uis nimia humiditate obru-
ta neq; q̄tū par sit, semē coquere, ac p̄ficere. Id procul dubio cognosces ex semi-
nis fēminei tenuitate: nā mox a coitu procidit, & tenue atq; aquosum apparet. C
Quartò uerò, & vltimò, id malū humiditas affert, qđ robur, & firmitatē ipsi deij-
ciat, ac ueluti paralytū in ipso moliat: cuius rōne susceptū semē nō cōplectitur
vterus, nec ipsius osculū ea ui, & efficacia claudit, qđ sufficiat ipsū cōtinere: cum
(vt refert Hip.) necesse sit os vteri ita claudi, vt nec specilli acūmē admittat, qđ sa-
nē vitiū pleraq; fēminas p̄dere certū est. Dignosces aut id priuatione aliorū si-
gnorū: p̄terquam qđ hae fēminae p̄p vteri oris operationē, & laxitatē nullā sētiūt
in coitu delectationē, & madore nimio affectas semp partes pudendas habent.

In curatione qđ dē licet cōi quadā indicatione, qđ ad siccitatē vterum reducat,
oēs humiditatis actus cōueniāt: vt Hipp. docet li. 2. popu. par. 3. tex. 28. dicens;
Humiditas per exeuntia, uictus rōne siccissima: nihilominus tñ peculiarem que
uis agendi rō exposcit siccandi materiā, & curandi rōnē. Nā qđ suffocat humidi-
tas, maiorē exposulat uacuationem: quae lubricū reddit uterum maiorē cū ex-
siccatione absterfionem: qđ imbecillā reddit coquēdi, & conficiendi semē potē-
tiam, p̄ter exsiccationem ioborantia, & coquentia pharmaca exigit: qđ uerò pa-
ralysim

- A** ralyſim infert, & os uteri laxū & molle redit, q̄ aſtringendi, roborandi & firmā di vterū vires habent cū exſiccatione deſiderat. Referā in primis q̄ ſiccitate eſſe ꝑꝑicua in cōi ſcimus: deinceps cuiq; ſymptomati, & affectui ex ijs, quos retuli, ꝑeculiaria ſcribā ꝑharmaca. Sed referā ante oīa uniuerſalē medēdi rōnē quā huic affectioni ſcripſiſſe Hip. cōſtat li. i. de mor. mul. ꝑ hæc verba; Si verò humi dior fuerit, tales uteri, nullo ex his opus habent, ſed vice verſa, neq; cōtrectare, neque lauare recente motu factō oportet, neq; ſuffire: nā ad periculū hæc ꝑcedere ſolent. Et ſi magis quā ꝑ natura fuerint humectæ, ſiccare ſanē ac ſuffire oportet: ſi verò biliōſa in ipſos confluant, medicamētū dare, qđ bilē purgar: ſi uerò ſalſuginōſa, lac aſininum, & vinum, & alia auxilia. Morborū porrō vires cōſiderare oportet, & cauſas, ex quibus morbi ſiunt exquirere, atq; ſic ad alia ꝑcedere, & morbos circa locos curare: & quidē ob cām oſculorum hiantiū ꝑhibētur, vt ne detineant in uentre horum oſcula ꝑparare, vt ꝑbē diducta ſint. Quū verò humiditas ꝑhibuerit, hanc inſpicere, ut ne impediāt totis mulierū negotijs expenſis, ſiue ex toto corpore qđ moueri videat, ſiue ex ipſis vteris, ſiue ex vtriuſque.
- B** Vteros autē ſic curare oportet: immo ſicciores qđ tātō magis bono ſucco, quāto ſunt ſicciores hmōi humiditate, vt pingues magis fiant, q̄ graciles. Humectos verò, & madidos ſiccare ita, ut relinquant, quō humidi ſint, & nō ualde reſiccantur: excellus in his ualde ſunt uitandi. Cōcipit autē in vētre neq; ea, q̄ humiditatē habet, neq; q̄ reſiccata eſt, niſi qđ horū in ueteri natura fuerit. Placuit quidē ad uerbum Hipp. ſnām tranſcribere, vt q̄ prudentiā in curatione, & veram medendi rōnē, & metas ēt operandi adamuſſim doceat: quā ſanē citraturo expedit ꝑæ manibus perpetuō habere. Itaq; ſi cognoueris ſemen ꝑæ nimia humiditatis copia ſuffocari, eum uitæ modum inſtitues, q̄ exſiccare quantū ſat ſit, poſſit, exhibitis ſiccioribus cibis, & vino vel decocta aqua aromatis, & calidis ſeminibus, ut aniſo, cinnamomo, radice chinæ, aut ſmilace aſpera. Vtæ quoque ſemina laborioſis exercitijs, lētē tñ factis, & frictiōibus ēt, maximē ſuperiorū partiū. Quia uitæ inſtitutione habita, ꝑmiſſa tñ leui purgatione, quanta ſat ſit, vt corpus eitra noxā exerceri poſſit, vacuare ipſum deinceps copioſius oportu num erit. Primò qđ ꝑ ea ꝑharmacha, q̄ pituitā, & aquoſos humores expurgare nuper diximus, idq; conſertim primò, deinceps aut ꝑ epicraſim, exhibitis pilulis de agarico, de maſtiche, alephāginis, de hiera: vel ijs, q̄ conſciunt ex rhabarbaro, agarico, & aloe, uel ex pulueribus hieræ ſimplicis cū pulueribus radicis chinæ, & ruberæ æquis portionibus. Quod itē facies inſuſo aliquo agarici, aut ſyrupo ex guaiaco, radice chinæ, & agarico cum melle, & ſaccharo conſecto: cuius deſcriptio talis eſt: excipe decoctiones maioris ligni guaiaci, & radicis chinæ li. i. agarici trochiſcati, ligati, & expreſſi 3. iiii. foliorum ſenæ 3. ij. ſacchari, & mellis quātū ſit ſatis, ut fiat ſyrupus. His factis, ſemel aut bis in hebdomada uomendum eſt, ꝑæſertim ſi totum corpus aut uentriculus utero cīm ꝑæſtiterit. Quod ꝑæſidium, ſi ſemina non reuſauerit, ꝑtermittēdū nō eſt.
- C** Præterea has ſeminas ſudare non minus, q̄ ꝑdictas coges, maximē ex decocto radicis chinæ cum aniſo, & ligno aloe: quod ſanē inter cetera auxilia ꝑeculiares vires habere, experimento, & ratione didicimus. Quod ſi ſemina iecur habuerit calidius, aut timueris calorē ſuccedendi plus iuſto, decoques radicem chinæ, aut ſmilacē aſperam ſtillatitia aqua cichorij, borraginis aut bugloſſæ.

Quo

Quò factò, si opus fuerit, ad naturalia balnea, eaq; sulphurea confugies, q̄ cō
stāt sēpissimē profuisse. Tandem si plurimū humiditatis pēsse cognoueris, tan
quam vltimum præsidiū consulo fontanellam in altero crure aperire, p̄ quā
paulatim uteri humiditas dilabatur. Interim tamen studendum est topicis auxi
lijs vterum ipsum exsiccare fomentis, videlicet, primò siccis ex artemisa, cinna
momo, anetho, chamemalo, hyssopo, menthastrò, semine, & radice angelicæ,
baccis lauri, gariophyllis, & nucibus cum diambra, & diamoscho. Inūges quo
que vniuersam vteri regionē oleis, & vnguentis, ac emplastris, quæ nuper dixi
mus: pessaria tamen hac lege facito: excipe macis, bdellij, gullie muscatæ ana
3.ij. agarici 3. j. pulueris hieræ 3.ij. cum ladano fiat pessarium. Suffumigium id
parabis, quod recipit ladani puri 5. s. styracis calamitæ 3. j. ligni aloes, sabinæ sic
cæ ana 3. s. ambre 3. j. musci g. iij. misce, & fiat suffumigium. Cui consimile pa
rabis, si exceperis styracis 5. s. ligni aloes 3.ij. balsami, & ambre grise ana 3. j.
musci 3. j. fiant suffumigia. Prodest etiam aliud ex historia, xylobalsamo, nepe
ta, melissa, & ladano. Sed in hac potissimum causā paratur vtilissimum, quod re
cipit ambre, styracis ana 3. iij. myrrhæ, mastichis, thuris, gariophyllorum, ligni
aloes, cinnamomi, nucis muscatæ, nucum cupressi ana 3. j. & s. conficiatur mas
sa cum ladano addito angelicæ semine, ex aqua pessaria, suffumigia, & empla
stra pro matrice, efformare poteris.

Quibus porrò factis, ad ea medicamenta veniendū est, quæ & cām elidāt, &
proprietas quadam conceptui aduinculo sint, quale est, qd recipit testiculo
rū veris desiccatorū, limaturæ eboris, seminis seseleos, vteri leporis, & coaguli
eiusdē ana 3. s. fiat puluis, quo utatur manē, & cū iure pulli. Et semel in hebdo
mada pessario hoc vteris, qd plurimum vterum purgare scimus: excipit quidē
castorei, agarici, mastichis ana 3. s. colocintidis 3. s. buliant in vino albo, & post
colaturā adde mellis quātū sit satis, vt fiat lēto igne pessariū, qd insperge pulue
re nucis vomicæ combustæ. Verūm si humiditatem cognoueris lubricū redde
re vterū, p̄ter dicta medicamenta ea adijcies, q̄ abstergerendi vires habeant: cui v
sui conficies clystere, quod recipit thuris 3.ij. aluminis 3. j. nucum cupressi pul
uerizatarum 3. j. s. vteri ceruæ in puluerem redacti 3. iij. mellis optimi 3. iij. bul
liant oīa in vini albi lib. i. & s. ad consumptionē medietatis, cui adde theriacæ
3. j. & fiat colatura. Parabis etiam clystere ex decocto ligni guaiaci, radice chine
næ, & similacis asperæ cum melle, quod mirū in modū abstergere, & exsiccare
natū est: vti etiam pessarijs, & suffumigijs supradictis, ac postmodum confe
ctionē hanc sumat femina tertio quoq; die cū modico vino, recipit quidē ga
riophyllorum, cinnamomi, galangæ, zingiberis, xyloaloes ana 3. j. nucis musca
tæ, zedoariæ, seminis ocyimi, spicæ, croci ana 3. j. ossis de corde cerui, rasuræ e
boris, & margaritarum en. 3.ij. ambre g. x. musci g. iij. sacchari quantū sit satis,
vt cū aqua rosacea fiāt tabellæ, quarū 3. j. porriges. Ex quibus medicamētis dem
pto saccharo, & additis styrace, & ladano, emplastrum conficies, qd experimen
to didicimus vterum maximē calfacere, exsiccare, & roborare: & ob id eo vti
mur, vbi ex humiditate testes, & vterū malè affectum, & tenue effundūt semē.

Verūm si ex vteri laxitate, & osculi eiusdē resolutione ocysimē semē pbat:
præmissis vniuersalibus auxilijs, q̄ retulimus, & quæ mox diximus peculiare
exsiccandi, & calfaciendi vires obūnere, ad ea, quæ adstringendi, & roboran
di effi-

A di efficaciam habent, cōfugiēs, quale est, quod recipit rosarum rubearū 3.℥. thuris, mastichis, myrrhæ, sanguinis draconis, boli armeni, myrtillorum ana 3.℥. & f. Ryracis calamitæ 3.℥. ladani 3.℥. ambre, musci, spice nardi ana 3.℥. formentur trochisci ad suffumigia paranda, vel emplastrum vmbilico & imo ventri apponendum. Cuius naturæ aliud efformabis, quod recipit ligni aloes, & cinnamomi ana 3.℥. & f. gariophyllorum, cyperi, nucis muscatæ ana 3.℥. radicū bistortæ, angelicæ ana 3.℥. gallarū & aluminis ana 3.℥. v. musci 3.℥. ex quibus item coctis, femina, si euaporationem susceperit, minime non est dubium, quin maximum sit cōsecutura beneficium. Quem quoq; vsum præstabit euaporatio ex decocto ligni aloes, radicis chinæ, aut ligni guaiacis item ex eisdem suffumigium aut clystere. Cæterum ab his oībus cauendum proculdubio est, mensibus instantibus. Confert insuper post menstruatam purgationē, per metrachitam iniicere in uterum clystere, quod recipiat galbani puri 3.℥. lactis caprini 3.℥. & f. bulliant, & facta colatura infunde. Cui consimile aliud efficies, quod recipit hyperici, radicis peoniæ, uel seminis eiusdem & angelicæ ana 3.℥. myrrhæ, carpobalsami, gallarū, balaustij an. 3.℥. crulla bulliunt in lib. ij. aquæ ad cōsumptionem medietatis. Nec difficile erit euaporationes varias, suffitus, emplastra & pessaria huic usui idonea efformare, si quis exactè expendat quæ hucusq; diximus.

Siccitatem quidem summè esse sterilem euidenti argumento ex terra desumpto probari potest: nam quid persimile feminis sicca intemperie laborantibus, accidere comperimus, quale arene, argillæ terræ, aut petrosæ accidit, dum illis semina committimus: dixerat. n. Hip. li. 5. aphor. 62. Et qui reuq; siccos magis, & adurentes: nam ex defectu alimenti corrumpitur, dissipaturq; facile semen: in fabuloso enim loco nihil feliciter nascitur, sed semen ocyslimè contabescit. Duplici quidem ratione sicci uteri concipere nequeunt, prima quidem, quia seminis substantiam ebibunt, & conterunt, terræ liccillimæ instar, quæ vberissimas pluias confestim depascitur: secunda uerò, quia suscepto semini nullum præstant alimentum, uel quàm parcissimum, q̃ feminæ sic affectæ sanguine careant: quò fit, ut facile id vitium cognoscas, quia per menses nihil instillat, uel exiguum aut crassum. Corpus item sic affectatum hirsutius & siccus existit, ac pilosum, aut citra pilos, si frigiditas accedat. Os item uteri siccum, labra scissa, ad tactum dura, nulla humiditas instillat, & coire plurimum appetunt.

Erit igitur duplex curandi rō, altera, quæ madidum & mollem reddat uterū, quominus semen conterat & ebibat: altera uerò, quæ humidū ac semine & sanguine mēstruo, vberem efficiat. Quamobrè primò vniuersum corpus humectare studebimus alimentis humectioribus & optimi ac multi nutrimenti, & tandē ijs, quæ aqueo humore abundant. Quia in re opus est uti carnibus auium aquatiliū, piscium nō salitorum, & auium domesticarum, ptisana & lacte nutritarū; carne item testudinū, limacū & ranarum: fructibus horarijs, melonibus & similibus, quæ multā substantiā aqueā præstant, dummodo eorū vbertas tanta nō sit, quæ corrumpi periclitetur. Quo facto, amylo, pulte, farre, ptisana, & alijs huic naturæ uti oportebit, donec sanguinis & seminis maior sublit, & ad uterū cōfluat copia. Postmodū quidem frequētibus aquæ dulcis balneis totum corpus humectare oportebit iuxta Hip. pceptum lib. i. de mor. mul. quā parte hæc refert verba. Et si quidem siccior fuerit, balneis pluribus, & obsonijs oībus coctis.

tum

*Siccitas
ut vteri
signa &
curatio.*

tum marinis, tum carnibus vtatur, oleribus coctis, pinguiibus ac dulcis: vñd et vtatur aquoso, & diluto, hæc n. plerunq; faciunt, vt humiditas præsit tum in reliquo corpore, tum in uteris, maximè accedente uita sedentaria, & otiosa. Prætereà utero & ipsius regioni foris ex aqua dulci, & euaporationes adhibendæ sunt ex decoctis herbarum humentium, velut malua, viola, althea, rosa viridis, semen altheæ, fœnugræci, & citoniorum, ex quibus vel balneum, vel fomentum, vel euaporationem hac lege conficies: arietum duo capita, quo ad vsq; caro ab ossibus sponte separetur, decoquenda curato, quibus adde, vt leuiter bulliant florum salicis, violarum, chamæmali, maluarum ana m. ij. altheæ cum radicibus m. j. radicis valerianæ lib. i. fœnugræci, & seminis lini ana. ʒ. iij. fiat decoctum, quo vtare. Præstat item verum frequentissimè inungere oleo de floribus salicis, amygdalarum dulcium, uiolarum, de seminibus melonũ, & cucurbitarum, butyro recenti, lacte & similibus. Vtile quoq; est creatum rosaceum, vel unguentum ex cucurbitis, aut resumptiuum: In vterum etiam infundes ex prædictis decoctis vel lactis aliquid, olei amygdalarum dulcium, iuris pinguis, aut decocti carniū limaciarum, & hordei. Itē præstat pessus, qui recipit medullæ cruris vaccinis, adipis gallinæ ana ʒ. i. styracis ʒ. j. cum lana confice pessos, quibus adde olei amygdalarum dulcium q̃tum sat sit. Verum, vt summam referā, hoc vñd in curatione hac obseruandum censui, vt corpus omni arte reficiat & humectet: cui vsui præstat hoc medicamentum frequenter sumere, quod recipit sacchari albi lib. j. & samyli ʒ. iij. in qua rosacea coquito, & interim adde olei amygdalarum dulcium ʒ. ij. ac lento igne in eam consistentiam redige, quæ tabellæ fieri possint. Ex vsu quoq; est lac asinæ calidum exhibere, aut lac caprilum cum modico saccharo, & farina leuiter coctum, uel amyllum cum lacte, & vitellis ouorum, & tandem corpus vnuersum uelut hecticorum corpora reficere. Vltimò tñ in hac curatione expendes vteri osculum non rarò esse siccitate contractum: cui vsui inter alia præsidia, quæ passim retulimus, confert (multorum sententia) succus porri hortensis, si eidem misceatur adeps anseris, coque inungatur post menstruatam purgationem collum uteri: quod sanè præsidium contractum uterum laxare procul dubio fertur.

Flatus
uteri si-
gna, &
curatio.

Ex diminuto uteri vel ventriculi calore præexistente ibidem humiditate, q̃ C
regulare nequit pusillus ille calor, facilè quidem in utero flatus generari assolent, quos sterilitatis esse frequentissimam causam cognouimus, propulso nimirum ex utero impetu ipsorum suscepto semine, uel q̃ præ distensione apertum teneant plerunq; vteri ostium. Hos quidè semine cognoscunt, præsentiumq; quia silentes, & strepentes non rarò proflire per os uteri percipiunt. Prædictis et feminis uenter inflatur, maximè a coitu conate utero se ipsum claudere, sed mox quod suscepit, proijcit. Rugitus quoq; adest in inferiore uentre, tensio, & nō leuis molestia, q̃ protinus flatus excreto cessant. Huic sanè causæ innitendū plurimū, esset, ut q̃ frequentissimè sterilitatem pariat, nisi communem obtinuisset curationem cum frigido, & humido uteri intemperamento. Cum hoc tamen duplicè hæc affectu fortitur medendi methodum, alteram, q̃ calori imbecillo ob frigiditatem uteri, aut ob suffocationem ex humiditate inundante prouideat, cuius nuper abundè meminimus: alterā uerò, quæ flatibus prorudeat ijs præsidijs, q̃ ipsos tenuent, discutiant, ac dissipent, qualia sunt (præter ea, quæ diximus) ena-
po-

Aporationes, suffitus, & facculi ex ruta, cumino, anetho, aniso, apij semine, costo, cinnamomo, semine, & radice angelica, & huius naturæ reliquis. Quæ quoque usum præstant inunctiones ex oleo, in quo serbuerint in prædicta oia, uel lauri bacce & folia, ex quibus cataplasmata, & emplastra parabis, quæ addita prædictis auxilijs calfacientibus, & exsiccantibus frigidū, & humidum uterū maximè attemperant. Caterum frigiditatem, humiditatem ac flatibus prævalentibus hoc unum præsidium scio esse proficuum, ac non leuibus experimentis confirmatum, quod recipit nucis muscata, rasuræ corticū mori, rasuræ corticū nucis, florum roris marini, ligni cupressi mundati, & in puluerem redati ana 3. iij. cuius dosis est ʒ. iij. cum uino odorifero uel aromatis confecto. Confert item sudare decocto radicis chinæ facto ex aqua stillatiua buglossi. Item utus cardus hortensis huic causæ, & vtriusque coniugis sterilitati ferunt graues autores providere, & ad masculorum generationem maximè conducere.

B Prædictæ quidem intemperantiæ secundis qualitatibus, quas sibi comites asciscunt, frequentissimè uterum afficere solent ita, ut non minus sterilitate afficiant, ac ipsæ per se nata sunt efficere. Proficiscitur etenim à primis qualitatibus durities, quæ uteri officio, & naturæ aduersissima existit: quamobrem dixit Hippoc. 5. aphor. 5. 2. Quibus os uteri durum est, ijs os uteri comprimere necessum est. Constat ex hac sententia hunc affectum reducendum esse ad morbum in utero potissimum; nam hac ratione fecunditati officit. Sed expendendum est de ea uteri duritie nos hic loqui, quæ morbosa est; non quidem de ea, quæ prægnantibus accidit, cuius meminerat Hippoc. aphor. 5. 1. libr. 5. Ad hanc proculdubio affectionem os uteri pingue reducendum quoque est, quia in vtriusque non suscipitur semen. Sed hæc eadem causa longè diuersa est ab ea, quæ mille in locis de omento crasso, & crassis formis Hippoc. refert, quas esse etiā ad concipiendum ineptas docuit 5. aphor. 4. 3. 4. & 6. & libr. de natu. mulie. ac de sterilibus. Verum huius affectionis clarius meminit libr. de locis, & aqua & ære, textu: Lunares purgationes, quod sanè vitium paulò inferius curare monstrabo. digerentibus, & exsiccantibus auxilijs, ut expressè Hippoc. consil. libr. de steril. per hæc uerba; Si uerò mulier à pinguedine uteros sibi læsos, esse putat ad conceptionem, attenuato ipsam quàm maximè, & ad reliqua grauiora facito. Verum tamen ut crios, durum fieri est necessum aliqua ex his causis accedentibus, ob idque claudi, & mulierem non concipere, quod semen non susceperit.

C Atqui licet durities possit separari ab utero concluso, est tamen illius signū, ut dixerat Hip. libr. de nat. mulie. Si os uterorum concludatur, spissum fit ueluti grossus ficus, & si digito contigeris. cōperies durū, & contractum, ut digitum nō admittat, & menses occultant, & geniturā non suscipit hoc tpe, & dolor hæt in uentre, & lumbos, & laterum mollitudinem. Item paulò ante, hæc uerba refert, Si indurati fuerint uteri, os ipsorum asperum fit, & menses occultantur: cū uerò apparuerint, uelut arena sunt, & genitura hoc tpe non fit: si uerò digito cōtigeris, asperum fit os uterorum. Quæ sententia ostendit conceptui esse impedimentum prædictam uteri crassitatem, sicut antea dixerat libr. de steril. hæc uerba scribens: Os uteri prohibet conceptionē, si auersum, si distortum, si conclusum, si recens fuerit conclusum. Et eodē li. paulò inferius inquit, Cū stomachus ute-

*Durities
oris uteri
signa &
curatio.*

ri

ri durus fuerit totus, aut summa parte, & conclusus, ac non rectus fuerit, sed ad alterā coxā auter sus, aut ad intestinū rectū inclinatus, aut in se ipsum cōtractus, aut labrum stomachi sibi ipsi incumbuerit: vnde cumq; igitur aut asper fuerit, aut callosus, sit aut durus & à conclusione à callositate. Cuius et cognitionē ad ducit eodē lib. dicens, Si os vterorū durum fiat, aut ceruix, ex digito cōtractu cognosces. Duritiei quoq; cām recenset eodem lib. dicens; Os vteri durum sit, aut dum concluditur, ut nuper adducta sinia in fine monstrauit. Ex quo constat posse concludi, ut in prægnañtib; citra duritiem. Verum si durities accadat vel à callo, vel à scirrho, vel à tumore aliquo præter naturā, vel à nimia frigideitate aut siccitate, quæ partes constingat: longè diuersā esse censendū est à præcedēti. Contingit et ex alijs causis, maximè ex adnascēti membrana quadam, cuius meminit Hippo. lib. de natu. mul. per hæc verba; Si genituram nō suscipiat mēsisbus secundum naturam fluentibus, membrana ante vteri os excreuit. Cognosces autem hoc, si digitum admoueris, membranæ prætextum continges.

Huic quidē affectioni medeberis iuxta differentiam cuiusq; distarum causarum; nam licet Hipp. indistinctè videatur duritiei remedia scribere, si quis re penitius consideret, reperiet vnicuiq; causæ peculiare auxilium dicare, quemadmodum lib. 2. de mor. mul. dicens; Si verò obduruerint vteri, osculum ipsorum durum sit, & clauditur, & menses non prodeunt, sed pauciores & deteriores, & dolor incidit & febris, & rigor corripit circa imum ventrem & lumbos & laterum mollitudinem. Cū sic habuerit, multa calida lauato, & tepesfactoria adhibeto, si dolor habuerit, & uteros multo tempore cum aqua decocti cucumeris siluestris fouero, deinde mollitoria apponito, atque hæc per triduum facito: & si ex cōtractu osculum vterorum molle apparuerit, ex crudo lino tres penicillos suppuratorios indito, primum tenuem, secundum paulò crassiorē. Deinde subdit. Sed vbi fomentum adhibueris, ex odoratis glandem mollitoriā apponito. Item lib. eodem paulò inferius inquit; Si os vterorum non suscipiat genituram, sed durum fuerit ac conclusum, plumbeum penicillum apponat, velut dictum est, per triduum, vbi calida lota est, & mollitorijs vtatur, & supina decumbat, & in aquam calidam insideat, & lanam vnguento imbutam imponat. Ac rursus paulò inferius pulchra admodum & vtilia recenset medicamēta, quæ diligens Medicus eadem parte reperire poterit. Item lib. 1. de mor. mul. inquit; Quibus autem statim vbi coeunt, fluunt ea, quæ à viro sunt emissæ, ijs os vteri clausum est: curare verò sic oportet: siquidem ualde conclusum fuerit, tædis & plumbeis fistulis immisis aperito, & molli fomento ex fœniculo foueto, & subducti ijs, quæ uteros attenuant & indirectum redigunt, purgato. Post purgationes autem & fomenta, ea infundito, quæ causæ sunt contraria. Quæ sanè loca, & alia pleraq; euidenter monstrant cuiq; duritiei causæ, peculiaria esse adhibenda præsidia. Sic profectò si tumor aliquis præter naturam causam clausio ni præstiterit, vel callus, curare eo tempore oportet, ut lib. huius operis 2. abundè dictum est: quippe hac in parte eam duritiem curare in animo est, quæ uel ex siccitate, uel ex frigore certum duxit.

Itaq; si ex siccitate durities suboritur, clausum vterū mollē & laxū reddes, præterea, q̄ sicciori vtero prodesse diximus, ijs, quæ ex Hipp. locis citatis attulimus, balneis aquæ dulcis, fomentis herbarum & rerum remollitiuarum, aut la
etis

- A Etis aut dulcis olei, vel amygdalarum dulcium: ac rursus ex unguento, quod recipit axungie gallinae, anseris, & anatis ana. ʒ. i. olei amygdalarum dulcium, liliorum, & sesamini ana ʒ. j. & radicis iridis, altheae, & aslari ana. ʒ. j. cere albæ quantum sit satis, ut fiat molle unguentum. Verum, ne circa methodum in curatione ultra procedas, scito, frigidam duritiem opus esse si enare evaporationibus, & fomentis, ac suffumigijs: siccitatis corrugationem balneis, fomentis, evaporationibus, inunctionibus, ac mollibus pessarijs: cui usui pessaria conficiet: quæ recipiant radicem, & foliorum malvæ, & altheae ana. ʒ. iij. farinæ seminis lini, & fenugreci ana ʒ. i. adipis anseris ʒ. iij. croci, & musci parum, excipiantur in serico luteo, & involuta, pessaria fiant, quæ in oleo irino, aut de semine cucurbitæ intincta in utrumq; immittantur. Prodest, & pessus ex radice altheae, axungia gallinae, vel butyro inuncta, vel ex lardo suis sine sale, aut ex pinguedine anseris vel anatis. Cæterum si durities fuerit callosa, non plumbeos penicillos, ut Hipp. refert, sed ex radice altheae tres penicillorum ordines efformabis, & minorem primò per noctem, & diem butyro aut aliquo pingui inunctum appones, à quo sic eadem lege, & tertium, qui crassior est, apponito, & immorari fiant. Interim tñ partem fouebis, inunges, & omni ingenio emolles: & tandem ad pessaria, & subducticia, quæ Hipp. consultit, devenire poteris: corpore prius purgato per supernam, & infernam alium, ac positis et subductitijs, quæ præter id, quod emolliant, digerant quoq; extennent, ac repurgent partem. Quæ profectò in re, securè administrabis quod recipit hyssopi ceroti, medullæ cervinae, adipis porcinae recentis, terebinthinae, cere albæ ana. ʒ. f. & saloes. ʒ. i. butyri, adipis anserini, leporis coagulati, myrrhae ana ʒ. iij. castorei, nardi ana ʒ. j. mellis quantum sit satis, ut fiant pessaria. Sed utilius longè est aduersus omnem duritiem, & conclusionem id præsidium, quod recipit lini semen, altheam, fenugrecum, omnia æquis portionibus in uas nouum immittemus, ubi oleum dulce, & aqua æqua mensura fuerint, ut semina contegantur, quæ cum molli uapore coqui, & ebullire ceperint; spumam, quæ supernatauerit, colliges, cui anserinos adipis, & ceram inunges, & pessarium facies. Est & aliud valde utile, quod recipit cere punice ʒ. iij. mastichis, & styracis ana ʒ. j. adipis anserini ʒ. iij. butyri, & medullæ cervinae ana ʒ. iij. ruscæ, & fiant pessaria. Aliud et recipit ceruse, medullæ cervinae, cere punice, butyri, olei amygdalarum dulcium, nardini & glaucini ana ʒ. f. resinae, thuris, mastichis, summe argenti quantum sit satis, ut fiant pessaria. Consultuerat quoq; Hipp. lib. de natu. mulie. utilissimam evaporationem conficere hac lege: vinum quod inuicissimum cum pari aque temperatum, trium semiorum Atticorum mensurae, & feniculi radicis, & seminis feniculi quartam partem, & unguenti rosacei semihenotam, hæc in uas nouum fundito, & uinum affundito, uasis autem operculo perforato, & impollita arundine foueto. Quod si hæc re quidem prodesse uideantur, pessaria ex omni gummi genere conficies, additis ijs, quæ modicè dissoluit & digerant partem duritiem, ut Hipp. consuluisse constat lib. de steril. his uerbis: Si conclusum fuerit, aut durum osculum uterorū, si cū albam expurgato, & nitrum Aegypti purissimum tritum admisceto, & subductitium facito magnitudine galle non magnæ, quod in lana molli unguentum irinum tinctum apponat per tres aut quatuor dies, prout uisum fuerit. Post hoc conducit fomentum odoratum, postea uerò molli quodam opus est subductitio, quod saniosa maxime dicat; deinde

Z

mer-

mercuriali, si tenera fuerit, cum unguento rosaceo in linteo ad diem, & nocte subdat. Si quis tamen duritiem amplius emollire studuerit, legat lib. 2. nostrum de praef. indica. & reperiet.

*Apertio
nis oris
uteri si-
gna, &
curatio.*

Dum uteri os nimium hiat, laxum, apertumve existit, nulli fore dubium arbitror, quin sic affectae feminae steriles esse debeant: inquit. n. Hipp. libr. de nat. mul. Si hiarit os uterorum magis quam tolet, menses plures fiunt, & deteriores & humidiores, & per longius tempus, & genitura ipsam non contingit, neque intus manet, sed rursus foras effunditur, & si digito contigeris, os uterorum hanc comperies, & impotentia ipsam corripit praemensibus, & febris, ac rigor, & dolor tenent inum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem: & docens causas inquit, Paritur autem haec maxime si quid in ipsa fuissem fuerit, & corruptum computruerit: patiuntur etiam ex partu, & alia aliter. Eodem quoque libr. paulo inferius eadem refert: sed clarius ad huc lib. 2. de mor. mul. de eadem re verba faciens sic scribit, Si uteri praeter naturam hiarint, menses plures prodeunt, & viscosi, & frequenter, & genitura intus non manet, & osculum hians est, & fieri non potest, ut genituram attrahat (& subdens causas inquit) Morbus autem corripit ex fluxu sanguineo, & fit cum menses suppressi de repente eruperint. Et eodem quoque libr. paulo inferius refert, Si os uterorum hiarit amplius quam in mensibus solet, menses ita fiunt plures, & deteriores omnes, & liquidiores, & per longius tempus, & genitura non attingit, neque manet, sed rursus exit, & fere eadem verba refert. Quibus sane locis constant, & signa, & causae plures praeter humiditatem, cuius hac in parte meminisse non est in animo: Cognoscens ulterius huiusmodi affectionem, quod femina in coitu nullam vel leuissimam persentit delectationem, facile semen citra sensum pellit, viro ingrata existit, & pudendum humectum habet. Fit etiam uteri os molle, & hians, ubi leue efficitur, & lubricum, ut Hipp. refert lib. de steril. in principio dicens, Si leues fuerint uteri, contingit autem hoc, & ex natura quibusdam, etsi ulcera magnas cicatrices reliquerint: si leues igitur uteri fuerint, mulier in utero non concipit. Quam sane affectionem a natura quoque fieri refert, & immedicabilem iudicat, quia semen non continent, neque contentum amplexantur, & proprium ante tempus excernunt.

In curatione tamen si quis legat Hipp. reperiet geminam esse medendi viam: inquit. n. lib. 2. de mor. mul. quum autem magis, quam oportet, aperti fuerint uteri, purgatione opus habent, post purgationes autem collutionibus, & suffimentis. Si vero propiores sint, quam oportet, vomitibus uteri opus habet, & fomento foetido, donec ad suum locum redeat. Ex qua sententia euidenter constat aliam adhuc subesse causam apertionis uteri, nimirum ipsius prolapsionem, cuius paulo inferius meminero. Eandem quoque curationem adducit lib. 2. de mor. mul. sed clarius eodem loco paulo inferius dicens, Si uero conclusi fuerint uteri, velut oportet, in aqua desideat, in qua cocta sit myrtus, aut lentiscus, aut vitis, aut oleae folia, aut rosarum. Dieta uero sit quae relata est in rubro fluxu. Optimum uero ipsi auxilium est sitis, frequens vomitus, & prohibitiones balnearum (dulcium aquarum ego intelligo.) Ex qua sententia euidenter constat hunc affectum curandum esse frequenti purgatione, sudoribus, balneis sulphureis, syrupo ex ligno guaiaco, & reliquis, quae superius dicta frequenter sunt. Sed expendendum est generale quoddam praesidium omnibus quibus semen susceptum effluit, commune & pro-

A & proficuum: quod scripserat Hipp. li. de steril. dicens; Si uteri geniturā non contineant, plumbeum lapidem, qui ferrum ad se rapit, leuiter terito, & in linteo alligato, quo in muliebri lacte tincto subductio utatur. Quod sanē præsidium omnibus causis esse proficuum prēmisa tñ uniuersali prouidentia existimo. Cui etiam vsui idonea reperies cataplasmata, emplastra, & suffumigia pauld inferius c. de sterilitate ad rps paragrapho de articulatione dorsi. In peculiari tamē huius affectus curatione prēmittenda est uniuersalis illa prouidentia in purgatione, & uomitu, q̄ pauld antē proficuum esse diximus p̄ humidis uteris. Qua facti uteri os peculiarius cōstringit fetus, qui recipit radicis bistorte, quinquefolij, & cypripidis ana ʒ. iij. rosarū cum calicibus, corticis mali granati, & balaustiorū ana ʒ. j. iuberis ʒ. iij. hederae m. j. fiat decoctio in aqua, & vino astringenti, & quo uis die fotu utat̄ femina. Cui ēt vsui p̄sunt suffumigia, pessaria, fotus, & euaporationis, q̄ p̄dicto loco adduxim⁹, & pauld inferi⁹ dorso exarticulato dicturi sum⁹.

B Constat ex Hipp. decretis inter potissimas sterilitatis causas unam esse, & maximē efficacem, oris uteri auersionē, quod euidentissimis verbis monstrauerat adducens causas, & curationem lib. de steril. dicens; Nunc autē ostendā ob quas causas mulieres omnino steriles fiunt, & cur non pariunt antē quā sanentur. Causam uerō hanc esse dico, si os uterorum omnino auersum fuerit a pudēdo, non concipiunt, non. n. suscipiunt uteri genituram, sed statim foras exit. Cōtingit autem hoc ēt si os uterorum parum distortum fuerit prater naturam a pudēdo. Et si omnino conclusum fuerit os uterorum, neq; sic suscipiunt, neq; si recens conclusum fuerit magis quā oporteret. Singula uerō relata manifesta sunt etenim si omnino auersum fuerit, aut conclusum, menses non prodeunt omnino, aut prodeunt uiolenter cū morbo, si sanguis coegerit uteros pro more, conuerit. Et si purgata fuerit mulier aliqñ os uterorum ipsi a pudendo auertitur. Si uerō parum distortū, aut recens conclusum fuerit, prodeunt quidē menses, prodeunt aut uiolēter, & paulatim per multos dies. Multis quidē modis refert Hipp. uteri os posse ad uarias partes torqueri, & subinde sterilitatē efficere: nā utēq; siue sursum, siue deorsum, siue ad latera uterū torqueat, rectē nūtile semen in uterū neq; ire. Qd sanē dignoscēs ex tactu obstetricis digitis facto, quo nō erit difficile qua uergat parte perdiscere, p̄ter q̄ quod ex dolore in loco, ad quē uergit, mille in locis posse cognosci refert Hippo. Sic. n. inquit lib. de natu. mul. Si uteri ad latus, allapsi fuerint, tussis detinet, & dolor sublatas, & uterū durus uelut pila insidet, & ad contactum dolet, uelut ab ulcere. Et post multa hmoi feminas purgare iubet, & calida lauare, & tepesfactoria adhibere. Et subdit pauld inferius; Si uteri obliqui fiant, & os ipsum obliquū sit, & menses ipsi nunc occultantur, hunc prius apparentes euanescent, & non similes fiunt, sed deteriores, & pauciores, q̄ antea, & genitura nō sit hoc tpe, & dolor hēt inum ventrē, & lumbos, & coxam, & attrahit ipsam. Quum sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare oportet, & calida lauare, ac fore. Vbi uerō recens lota fuerit, digito immisso os uterorum corrigit, ac dirigit, & odoratorum suffitum admittat, & ex potionibus dato iuxta experimentum, q̄ libenter suscipit. Ex his q̄ sic affectae sunt li. 2. popu. p. 2. tex. 1. 9. q̄dam cum ei coxa doleret ex uteri recursum ad eam partem concepisse refert, & coxam grauidationis tpe non doluisse.

Uniuersa tanq̄ curandi ratio in hoc affectu stat in reductione uteri ad antiq̄-

Z 2 sedem:

*Vtiosiss.
tenisus
signa, et
curatio.*

sedem: quod equidem fieri nequit, nisi vel purgatis humoribus, quorum ratione laxat^A uterus, vel resiccatis auxilijs topicis, ac sedato dolore, & molliore facta parte, ut in dolorosius ad sedem citra inflammationem reducat^A. Quam sanè incedendi rationem locis nuper citatis & mille alijs partibus adduxisse Hipp. euidenter constat. Itaque primò purgabis corpus, & fomentis, ac remolliitorijs uteris, tandem digitis obstetricijs uterum recendum curato, & ultimo eiusdem manibus hinc inde per vniuersum ventrem, versus umbilicum vndequaq; oleo uteri regionem perfrica bis mediocri compressione, donec uterum à parte, cui incumbit, separatū, & in antiq; sedem reductum cognoscas. Postmodum verò, veniri adhibebis quod calfaciendi, & exsiccandi, ac discutiendi flatus vires habeant: quemadmodū in mulier eulæ circa vllā rationem, passim solent efficere. Cauebis tū in hoc opere, ne mēstrua instent, vel multorum humorum copia in utero subsit, ne quid deterius praesistenti malo succrescat. Verū dum id facere studueris, post id opus, olei inungito vterū rutaceo, liliorum alborū, irino, chamamelino, de baccis lauri, super sparsis pulueribus ex eisdē rebus, & aniso, ciminio, cinnamomo, & similibus: quorum siluā reperies in curatione humidi uteri. Quo facto, emplastra eadē parte adducta vmbilico, imo vetrici, & dorso adhibebis, & pudēdi ostiū firmabis iussitib^B, & alijs rebus, quae exsiccandi vires habeant. Proderit, & viri usus quo melius os distorquet^B. Menstruā quoq; purgationis initio haud raro feminas fieri steriles comperimus: nam siue copia exuberante, aut deficiente: siue ordine profluendi prauo, ipsae anteuertere aut remorante, siue vitiosa qualitate, aut substantia prodeant, affecti, utcumq; sit, semper sterilitatis existit causa. Quippe ex immodico sanguine, quumuis laudabilis existat, obruitur, & confunditur genitura: nequit enim perfilla virtus generans uti sanguinis principio futuræ conficere, ut optimè aduertisse Hipp. constat lib. de steril. per haec verba; Venæ enim sanguine plenæ geniturā non suscipiunt, & in uteris aliquid inuxeratū sanguinis in esse est, quod genituram nutriri prohibet. Et paulò antea eodem lib. adduxerat alium affectum ex copioso sanguine, dicens; Si quid ex mensibus in uteris remanens scissuram, ac legmētum habeas, quod circa osculum, aut paulò penitus incale scat, & rursus frigescat, neq; sic in ventre concipit. Pari quoq; ratione si menses omnino non profluant, credendū est feminas steriles fieri: nam, ut paulò inferius probabo, plerumq; concipiunt feminæ post menstruas purgationes, ubi ab illis fuerint expeditae: cum verò eis omnino carent, perdifficile est posse concipere. Cōceptus, inquit Arist. lib. 7. de hist. anim. c. 2. mulieribus à profluuiio menstruorum sua natura contingit, & quae his carent, steriles magna ex parte consistunt. Verū fieri potest ut aliqua et sine eorum effluuiio concipiant, videlicet quibus tamen humoris colligitur, quum ijs, quae purgantur restare solet, quod non tanta copia, ut foras possit effluere: Alibi et hoc idem refert dicens; Impossibile est concipere sine mēstruorum excremento quod antea redundans foras profluxerit, aut intus satis sit. Praeterea inordinata excretio non expurgat quantum satis est uterum, ut geniturā admittat (praeterquam quod alimentum inopia arefcit non raro semen) sic inordinati plerumq; semen suum deferunt, & ob id genituram prohibent. Inquit enim Hipp. lib. de steril. Si verò pauciores, quam debeant, menses prodeant, neque sic praegnans fit: ac si plures, quam debent, menses mulieri prodeant, neque sic in utero concipit. Vteri enim sanguine euacuato geniturā non concipiū per debilitate.

Quas

Mēstrua
sanguinis
vitiis
signa, et
curatio.

- A** Quas procul dubio causas omnes Scytharum feminas efficere steriles recēsit li. de loc. aqua & ae. dicens; Lunares nanque purgationes eis nō eueniunt, quē admodum est necesse, sed minus, & intempestiue. Et subdit. Vnde necessario sequitur non multum fecundam Scytharum gentem esse. Quod de reliquis feminis pari pensu intelliges. Item menses corrupti, & uterque aliter vitiosi minus ad concipiendum idonei censentur: primum si aquei, fetidi, aut nigri proueniant; deinde si albi, crocei, virides, aut cerulei: si plurimum fluant, largiori aut breuiori tpe, q̄ par est: & si non statuto circuito, sed seruius aut citius, aut si oīno non fluant. Cum hoc tamen ex, quibus menses non fluunt, non omnino sunt steriles iudicanda: vidimus enim plures, quæ conceperunt nuptæ, cum virginibus non fluerent menses. Nosces tamen has esse sterilitatis causas ex signis, quæ retulimus lib. huius operis i. proprijs cap. ad quæ sanè recurre, si veram sterilitatis ex menstruorum vitio curādi rationem ediscere velis. Nam satis mihi est hac in parte docuisse, mensium vitio feminas steriles non raro fieri: est sanè molestum, & tediosum multis in locis eadem referre. Ob id, cum ex mensium vitio infecunditas suboritur, nullam aliam adinuenies potiore curandi rationem, quā menstrua ad statutum fluendi ordinem reducere, aut eorū substantiam corrigere, & moderari: quæ omnia prædictis cap. postquam sterilitatis causam cognoueris, facile inuenies.

Inter causas, quæ sterilitatem feminis præstant, potissimam frequentissimāque esse censeo seminis femine vitium, quale sufficit generationi ineptū ipsū reddere. Quod equidem tale fieri quatuor modis constat, nimirum dum aquosius existit ita, vt figuram seu delineationem præ tenuitate suscipere non possit. Id profectō dignoscēs ex seminis excreti naturam, & consistentia, ex vteri etiā frigiditate vel humiditate, ex celerrima seminis ipsius citra delectationem excretionem. Secundo semen vitari assolet propter crassitiem immodicam, quam deuincere calor nequit, neque ex eo quicquam præ crassitie efformare. Quod nosces ab ipso semine excreto, & quia femina tardē ad coitū excitatur, & subinde parum excernit. Tercio quidem semen generationi ineptum fit, eō quod corruptionē seu labem aliquam perueniat, siue ex gallico morbo, siue ex putredine quauis prodeat: vel ex vitio aut morbo aliquo cuiusvis principalium membrorum. Quod videtur insinuasē Hippo. lib. de steril. reddens rationem, quare semen retentum in utero non degeneret in conceptum: inquit enim; Si verō genituram continens, non prægnans fiat, id quod multis contingit stomacho vteri præter naturam hiante, menses plures, quā cōuenit, & humidiores procedunt, vt & id, quod à femina prodit semen, ad fertificationem non cōcipiatur, & viri genitura insuper accedens corrūpatur: contingunt autem hæc, & corpore, & uteris ægrotantibus. Sed vitia hæc cognoscēs ex colore alieno, substantia, & odore insuauis, plerunq; fetido, & ex totius corporis acuteri morboris signis. Vltimō tñ semen conspurcatur, & generationi efficit ineptū ex vitio alicuius prauæ substantiæ, qua femine uterus scatur. Quod perpēdes ex superfluis vteri purgamentis, quorū meminimus lib. huius operis i. c. pen. ac ex vitiosis mensibus, vt ex Hipp. constat lib. i. de mor. mul. Reperies huius maligna, & causas loco super citato. Sed præter has causas aliæ insuper reperiuntur duæ genituram vitantes, nimirum seminis paucitas, quæ genitura non sufficiat,

*Semini
vitiosū s̄
gna, &
cūctio,*

ac uberrima, & immodica copia, quæ virile semen suffocet, & extinguat. A
 His sanè seminis vitijs medeberis primò aquositati, & ybertati ea lege, quæ
 diximus paragrapho de uteri humido intemperamento, omni videlicet exsic-
 cationis genere tam per victum, & potum, quàm per exercitia, balnea sulphu-
 rea, ac sudores, quàm per alia pharimaca huic vsui proficua. Cui vsui ferunt pro-
 batissimo experimento multi, conferre conseruam ex flore stachados, aut ex
 saluia, vel saluiam ipsam hortensem commasticatam. Reliqua verò, quæ hic
 defunt, reperiens varia quidem, & proficua cap. de sterilitate vitiorum. Crassiori
 verò, aut paucò semini medeberis per ea, quæ aduersus siccitatem proficua es-
 se nuper diximus, & ijs etiam, quæ omni arte corpus humectent, & yberius, ac
 tenuius semen gignant alimentis, balneis aquæ dulcis, & medicamentis, ac mul-
 tis alijs auxilijs, quæ referam cap. de virorum sterilitate. Corruptioni autem se-
 minis prouidendum est per ea, quæ membrorum principalium affectiones au-
 ferant, aut putredinem curent sanguinis detractione, purgatione, & meliori
 nutritione; tandem ijs, quæ per epierasim corpus euacuent ab excrementis pur-
 gatione, sudore, fontanella, vt iterum corpus probo alimento reficiatur. Cuius B
 sanè affectionis, & curationis meminit etiam Hip. lib. 1. de morb. mul. per hæc
 uerba. Quibus porrò intus manet uiri semen, & computrescit, & turbationem
 facit, his triplicis semen, aut succum cum melle, aut cumino delinguendum
 dato. Et subdit apponendam esse portulacam cum adipe anserino, referitque id
 malum fieri à bilis, & sanguinis influxu, quorum ratione curationem instituit.
 Nam quodammodo diuersum videtur, & diuersam exposcere uacuationem se-
 minani proprium semen corruptum uiuiatumque effundere, aut uirile semen su-
 scepium, alioqui sanum uitiare corrumpereque, & ineptum generationi effice-
 re, ut Hippocr. sententia insinuare uidetur. Prouidendum quoque est uteri ex-
 crementis, siue biliosa sint, siue pituitosa, frequentibus totius corporis purga-
 tionibus, ut ex Hippocra. mente nuper retulimus, & rursus eorundem excre-
 mentorum diuersione per alia emunctoria, & per ea etiam, quæ uterum à præ-
 dicta spurcitia vindicant, quorum non paruam copiam cap. citato adduximus.
 Præter quæ omnia peculiariter uterum in hac causa purgant pessaria adducta
 à Theodoro Prisciano, quæ recipiunt opobalsami. 3. j. peucedani. 3. j. & scario-
 lochiæ 3. j. myrrhæ 3. j. aloes 3. ij. croci 3. j. & medullæ ceruinæ, & adipis anse-
 rinæ, ana 3. j. & sex quibus fiant pessaria, quæ huic vsui maxime proficua expe-
 rieris. Deficienti quidem semini medeberis eo modo, quem docet Galen. lib. 5.
 simpl. cap. 23. Quæcunque (inquit) semen aut procreare, aut pronocare possunt
 bene nutrant, & flatuosa sint oportet, ut bulbi, cicer, fabæ, polypodes, quæ mul-
 ti seminis edulia sint. Et eodem libro, cap. 21. inquit; Seminis affectrices facul-
 tates sunt, ut lactis, partim medicamenti tantum, partim alimentis. In medi-
 camenti, cum succos pituitosos calfacientes in sanguinem uertimus: in alimen-
 tis autem secundum totius substantiæ similitudinem. Quibus perspectis faci-
 le erit uitiosum semen emendare: & materiam, ac modum duobus cap. sequen-
 tibus abundè reperiens.

De



ST quidem præter dictas alia sterilitatis conditio, & natura, quæ neq; in omnibus feminis, neq; utcumq; reperitur, sed quibusdam solum: neq; integra est, neq; semper, sed ad tempus tantummodo, qualem accidere feminis comperimus, quæ ante maturam ætatē, & perfectum tempus nubunt: aut post ipsum grandioribus iam fa-
 ctis, & penè senescentib. Alia etiam sub hoc genere continetur sterilitatis spe-
 cies ijs feminis succrescens, quæ pepererunt quidem, sed à primo partu aut se-
 cundo vel steriles remanserunt, vel quàm rarissimè concipiunt. Quamobrem
 vniuscuiusq; seorsum meminisse oportebit, ut uel præpediatur, quominus cui
 quam accadat huiusmodi malum, vel auferatur, si forte iam adest. Docet quidē Hipp.
 li. de lo. aqua & ac. inter reliquas sterilitatis causas, eam feminis esse potissimā,
 quæ ex immaturo coitus tpe proficiscitur. Nanq; nuptiarum tps uarij uariè qui
 dē scripserunt. Inquit etenim Moschio græcus. Tanto quidem tpe, donec pur-
 gatione superueniente cum uiro coire possit, natura & matrix officia adimple-
 re, & representare uideatur. Plato verò 6. de legi. in fine specialius de hac re sen-
 sisse uidetur, dū in masculis à trigésimo, ad trigésimū quintū, in puellis à sexto-
 decimo ad uigésimum, id est, non minor sextodecimo, neq; ultra nigésimū præ-
 crastinandū. Sed hac in re nō laboro in ijs, q̄ causaliter euenire solēt, & rarò, sed
 solū mihi est in animo docere, q̄ nubūt ante tps ex arte, & natura præfinitū, qua-
 le sterilitatis periculū subeāt. Itaq; q̄ ante decimū quartū annū nubunt, q̄ termi-
 nus est in plerisq; legitimæ cōceptionis (sed, ut mihi ex Moschione uerius uī,
 anteq̄ mēses prodeant) plerūq; aut nō cōcipiūt, aut debiles, & cū periculo abor-
 sus manēt: nā uteri os efficit ualde debile disruptis uasis & maximè cōcalfactis,
 præcipuè si virile mēbrū magnū sit, & puella parua, aut uirile semen senile, aut ni-
 tiosum. Alijs quidē ex à uillata pudēdo situs uteri uitiatur, & ob id perpetuò ste-
 riles euadūt. Pari prorsus p̄sens existimare oportet uirgines, q̄ uel morbo aliquo
 afficiunt, uel nimis ualitudinariæ existūt. Quippe dū sic affectæ deuirginantur,
 nulli certè dubiū esse dēt, quin eadē mala succrescāt, q̄ eis, q̄ ante decimū quar-
 tum annū, aut menstrua nō fluxerūt, deuirginantur, accidere solent. Imbecille. n.
 superest uteri os, & uterus ipse totus, ut nec suscipere, nec cōtinere deinceps se-
 men possit. Præterq̄ q̄ sic affectis, ac ualitudinarijs feminis, dū ea dispositione
 deuirginant, motu & calore, ac dolore uteri in coitu primò excitatis, totū id ui-
 tiosi humoris, quod in corpore abundat, faciliè ad uterū alliciet, & obstructio-
 num, febriū diuturnarum, & maiorū malorū sæpe causa existit: cū plerūq; uiro
 accedere nō possunt citra oris uteri dolorem, & iudicio nostro maiori ex parte
 steriles euadūt. Ceterum uirgines, q̄ factæ sunt grādiore, cōtraria prorsus rōne
 difficulter cōcipiunt, aut nunq̄. Rō sanè est, quia & uterus induratur, semen ui-
 tiat, ac menstrua mille modis à debito euariāt ita, ut omnino uideant esse steri-
 les, nisi menstrua ordinatè, & copiosè p̄cesserint. Quibus sanè sterilitatis causis
 p̄ueniendū est: primò quidē utile existimo in puellis rarissimè seminā uiro acce-
 dere, postq̄ semel corrupta est, donec grādiior facta integritatē, ac robur ex itēpe
 siua de uirginatione amissū adipiscat. Cui vitā infirmes vel sedētiariā, uel min⁹
 laboriosā: uictū itē opūmi nutrimentū atq; et pudēdū iperabis ablui mox a pri-

De fieri
libus ex
etate.

mo cōcubitu ijs, q̄ posse astringere diximus. Deinceps verò cum iterū uiro accessura est, abluat pudenda ijs, quæ remolliendi, laxādi & humectādi vires habeant. Post coitum autē adhibenda sunt emplastra roborantia, umbilico, & dorso, donec grādiior, & robustior facta, viri accessum citra noxam ferre possit. Verum tñ de valetudinarijs fœminis vulgariter fertur, nil esse illis vtilius ad valetudinem recuperandam, q̄ viro committi, & sic multæ deceptæ falsā vulgi opinionione, in pericula, q̄ nuper diximus, deciderunt, malo præexistenti, nō curato. Qua in re certum esse scimus, q̄ si affectiones, quas fœmina patitur principium fortiantur à semine vel sanguine menstruo retentis aut vitiauis, nullum aliud p̄stantius p̄sidium reperiri constat. Quippe hac via expurgatur vterus, & immunitis superest ab affectionum, q̄ præerant, causis. Verum si ob iccoris, splenis, vel totius corporis vitium fœmina laborarit, tñ abest, vt coitu leuetur, q̄ potius nō uo malo in vtero (alioqui sano) facto, euocatis ad ipsū agitatione illius actus humoribus, grauiore efficiantur affectiones, quæ præexistebant, vt experimēto plerunq; didicimus. Si tñ fors tulerit, & aliud fieri non possit, consummato matrimonio abstinendum est a viro, donec in pristinam sanitatem restituta innoxie possit uiro accedere: ac si qñ accedere velit, purgato corpore vel aliter p̄munito, faciat. Grandiores verò fœminas alio modo tractare oportet: nā balneis aquæ dulcis calidæ menses euocandi sunt, inunctionibus, fomentis, & infusionibus, ac deniq; ijs omnibus quæ prodesse succo ac duro vtero dictum est, adhibitis etiā pessarijs, quæ mediocriter emolliant ac purgent, & quod corruptū, ac vitiatum est, expellant, admittantq; & amplexentur virile semen.

De ijs,
qua se-
mel pe-
pererunt
& steri-
le: sicut
sunt.

Non minus profectō negotium facessit ea sterilitas, quæ fœminis, postquā se mel peperunt, succrescere solet: maximè cū fœminæ corpus primo accessu sanū videat. Inquit. n. Hip. lib. de steril. Cuicunq; verò stomacho recto, & molli, & sano, & probè habente, & in debito loco sito, menses non apparuerint, aut pauciores, & per amplius tempus, & non sani morbum perscrutati, quem vteri habent, & an corpus et aliquid conferat, comperies cām à qua prægnaus nō fiat. Quod si affectum aliquem compereris huic p̄sto esse oportet, ne affectio verustior facta, difficilius curetur. Sed clarius adhuc huius affectionis Hip. meminisse constat li. i. de morbanul. per hæc verba; Si mulier parere nequeat, q̄ prius peperit, nitrum, & resinam, & myrrham, & cuminum æthyopicum, & vnguentum simul terat, & apponat, aut pulegium siccum in linteum subdat: bibata aut pulegium, vbi dormire voler. Sed rōnabilius p̄fectō eiusdem affectionis meminisse li. de steril. dicens. Quum aut mulier nō conceperit, prius concipere solita, vteri verò viri genituram in se ipsis suscipiunt penitus, necesse est mulierum ferosā hāc facere: quandoq; n. in vteris pus innascitur: pus aut in vteris à tuberculis fit, & sanè ob hoc genitura viri, qñ cū viro coit, vteros nō cōtingit, quò videlicet ipsa viri genitura compingatur: nā pus ipsam dissipat, ut ne afferatur: mortificat. n. pus, & putrefacit genituram. Proinde, & pus ex vteris expurgare oportet, & tuberculum in vtero sedare: quò de cætero ne impediatur geniturā cōpingi ac afferri: festinate itaq; oportet ad expurgādū prius quā pus in vteris in callum concreseat. Qua p̄culdubio snā enarrare v̄ vnam peculiaremq; huius vitij cām. Si tñ quis rem diligentius pensaret, multo plures reperiet causas, quibus q̄ semel peperit fœmina, amplius parere non possit. Quippe contingit sæpe id

A id malum cū defectus naturalis, qui vel ex morbo ac vitioso apparatu contrahitur, aut natiuus illi inest, haud paucas etenim reperies feminas, quibus solum sufficit ad sterilitatem semel peperisse, et si partus laboriosus non fuerit: tanta proculdubio est in quibusdam naturalis compositionis tenuitas, & potentiarū, vteri imbecillitas, vt satis illi sit, nouē mēlibus vtero gestillē, vt superlit ab hoc labore vterus aded imbecillis ac labore defessus, quod deinceps minimē possit amplius concipere, nec si concipiat, diu fetum continere. Quod sanē malū feminis praestantioribus, & illustribus, & ijs, quae in otio vitā degunt, frequentissimē accidere cōspicimus. Idq; certissimē est vitū, qđ in Scytharum feminas reiecit Hip. de lo. aqua & ae. & subdit hac rōne earū ancillas, & q̄ laboriosam vitā agunt, frequentius concipere. Hanc quoq; sterilitatem patiuntur feminae, & eā cōmonstrant, quibus lac in māmīs diu durat: quinimo cenleo eam feminā nō esse concepturam toto eo tpe, quo lac in māmīs extiterit, & fortasse in his signum erit cōceptus, si mēstruis deficientibus, lac quoq; ē māmīs euanescat. In hanc pariter sterilitatem delabuntur feminae, quae difficulter pepererunt: nā ex laborioso partu credibile est ijs, quae admodum robustae non sunt, uterum aded affici, labefactari, distendi ac dilacerari, vt praē lassitudine deinceps cōcipere nō possit, aut quā rarissimē, vt plerisq; contigisse scimus. Pari itē rōne alijs ex abortu idē malum succrescit: nā cū magis in abortu, q̄ in partu laboret natura, maiusq; inferatur in uterum eā dispositionē nanciscitur ab extensione, & molestia, quae nequat amplius vel tā citō, ad pristinum officium redire, ac semē continere, & concipere. Alijs quidē eadem sterilitas succrescit ex mortuo fetu: nam p̄ter laborē, quē veluti in abortu patiuntur, accedit insuper distemperies conspurcata ac fœda, quā de mortuū fetū posse ob viciniam vtero mutare credibile est: bene tēperatum. n. ad concipiendū debere esse vterum, Hipp. testatū reliquit. Sic proculdubio idē contingere scimus ex vteri mola: nam aut deinceps immodicus vteri status succrescit eō q̄ vasa dirupta permanferunt, aut nimia mensium suppressio obstructis venarū osculis ex crassa materia, q̄ molle p̄stiterat principium. Verūm praeter has oēs causas, hanc vnam omni partui laborioso vel abortui cōem esse cenleo, nimirum, vterum, aut eius collum vel retrahi, vel torqueri, vel quauis alia deprauata figura affectum superesse, aut fortasse, prolapsū ita, vt amplius concipere nō possit, ni prius ad pristinam sedē reducat. Itē aliud quoque his ferē oībus cōe est, vt coxarum, osis sacri, & dorsi, quibus vterum alligari fertur, in laborioso partu seu abortu articulationes ita extensa, aut à propria, & natua sede prolapsae supersint, vt minimē vterus deinceps cōceptionis officio fungi possit. Quae sanē oīa sicuti, & varias distēperies, q̄ vtero ex his causis succrescunt, considerare opus est, si uelis sterilitatem remouere.

Imprimis si feminae natua constitutio delicatissima fuerit, ita ut p̄ uno partu deiecta vterus nequeat amplius cōcipere (vt Hip. scripsit li. i. de morbis mul. dicēs: Si verō nō cōcipiat, vteri aut sani sint: contingit. n. & hoc plerisq; cū debiles existentes vteri ab affectione macilentī fiunt, aut praē medicamentis, & fomento multo geniturī ferre non possunt, priusquā assueti fiant, & conualescāt) id diligenter nosse curabis: quod etiā loco nuper citato dixerat Hippo. per haec verba; Hoc autē sic cognosci potest: cū ab ipsa exierint, secunda, aut tertia die exeunt,

exiunt, aut adhuc prius crassa, & compacta uelut mucus, nisi mali quid sit, & A
 propter alium uterorum morbum genitura discedat. Quum igitur talia appa-
 ruerint, curatione quidem uterorum non est opus, uerum reliqui corporis cu-
 ra habenda est, quo huiusmodi bonus habitus fit ipsi, aut contractum simul sit
 corpus, & iuxta mole praeditum, & paucorum balnearum, plurium uero, &
 leuium laborum usu. Quibus sane uerbis, & alijs, quae sequuntur, ut huius oc-
 casionis uniuersam prouidentiam complexum fuisse. Quamobrem ab hoc pre-
 cepto sumpto initio solidioribus cibis, uino, & largiori exercitio curandum est
 habitum reficere, & solidiorem reddere, adhibitis quoque utero, & lateribus
 eius emplastris, quae ipsum roborent, qualia sunt, quae pro matrice uulgo ex-
 runtur, ea maxime, quae temperata, & modice astringentia fuerint, qualia addu-
 ximus c. de uteri imbecillitate, & lib. 2. huius operis mille in locis. Neq; alia au-
 xilia utero adhibenda sunt, ut Hip. consulit, sed ea tantum, quae robur addere
 nata sint. Curandum praeterea est, ut frequenter foemina uiro non accedat, sed
 post aliquod grande interuallum, ut uterus ad antiquum robur restitui possit:
 nam sic anidius genituram complectitur, conficit, efformat, ac retinere oaleat ro-
 bustiore facto utero emplastris, & praedito uitae modo. B

Verum si ex laborioso partu, uel abortu sterilis supererit foeminas, coniecta-
 dum eo tempore est, an figurae uitium aliquod contraxerit uterus, uelut est p-
 lapsio, aut a propria sede contorsio, uel in aliquam partem inclinatio, quod ex
 tumore, ac dolore partis, cui incumbit, facile percipies, ut frequenter ex Hipp.
 mente retulimus. Cui sane affectioni medebris per ea, quae diximus c. de uteri
 procidentia, sed specialius per ea, quae huic usui scripsit Hip. li. de nat. mul. di-
 cens: Si puerperae uteri in coxam incubuerint, aut ad laterum mollitudinem, ad
 sanam coxam oleum Aegyptium album, aut bacchari unguentum, apponere
 oportet, & in sanam decumbat, & peoniae g.v. bibat, & fructus sambuci, & ca-
 storei magnitudine fabae uino postea lota suffiatur. Qua sententia constat quibus
 medicamentis utendum sit in huiusmodi affectibus. Verum si ex diruptione,
 lassitudine, & tensione ipsius uteri sterilitatem prodire comperiamus: quae astrin-
 gendo roborant emplastra adhibenda sunt, qualia ca. de uteri imbecillitate ad-
 duximus, & dicturi sumus cap. de partu laborioso.

At quia plerumque accidit ex praedicto labore aded imbecillitati uterum, ut C
 copiosa susceperit, aut aliunde trahat excrementa, ita ut mutata propria temperie,
 & natura, uel humiditatibus abundet quantum sat sit, ut concipere deinceps
 non possit. Huic curationem institues per ea, quae adduximus praeced. cap. insti-
 tuentes curationem humidi uteri, & frigidi iuxta qualita:em, quam praedomi-
 nari cognoueris.

Veruntamen si dearticulationem aliquam dorsi, ossis sacri, aut coxendicium a
 partu, uel a casu, ictu, percussione, animi pathemate uehementi, uel quauis alia
 occasione foeminam perpeti comperias: ad cataplasmata, & emplastra confugien-
 dum est, qualia sunt, quae ex terebinthina, resina, & pulueribus calidis apud uul-
 gares obstetrices frequentissime reperiuntur. Ante tamen quae adhibeas, curandum
 est dorsum iuxta renes, & os sacrum prius blandis medicamentis emollire, & cal-
 facere, ut proprius luxatae partes, uel extensa cataplasmatum cedere possint. Ap-
 pellant autem uulgariter huiusmodi blandum praesidium seuatum, quod maiore
 seui


A leui portione cōstet. Efficitur probatissimum, & multis feminis proficuum id, quod recipit carycarum pinguium 3. iij. dactylorum sine ossibus 3. v. florū lauē dulcē p. ij. sepi renū capri lib. s. radicū althēæ coctarū, & pistatarū, 3. x. fecis ceræ lib. l. bulliant oīa in li. j. vini albi ad uini consumptionem, & facta colatura, adde sepi arietis liquefacti 3. vj. & fiat ceratum, cuius infima pars, quæ attingit os sacrum, sit amplius suprema. Quo sanè vtendum est octo, aut duodecim diebus ante cataplasmatīs adhibitionem, cuius primā descriptio recipit picis vtriusq; terebintinæ ana 3. j. galbani, serapini, ammoniaci, myrrhē, masticis ana 3. iij. cinnamomi, nucis ana 3. j. ladani depurati, opopanacis, sarcocollæ, ana 3. iij. sanguinis draconis, pulueris myrtilorum, coralli, rosarū, gariophyllorum ana 3. j. croci 3. l. fiat cataplasma. Efficiēs tamen ex eisdem rebus aliud efficacius, si omnia hæc aceto ferbuerint, postea facta colatura omnia reiecto acetō coquantur, donec fiat emplastrum. Item aliud cataplasma utilissimum conficiēs, quod recipit masticis, cinnamomi, nucis, belzoini, pulueris ligni aloes, gariophyllorum, sanguinis draconis, pulueris granæ, ana 3. l. succini 3. j. ambræ musci ana g. vj. terebintinæ quantum sufficiat vt fiat cataplasma. Umbilico ē appones id emplastrū, quod recipit pulueris ligni aloes, nucis, gariophyllorū, succini, & granæ ac rosarū ana 3. l. musci, & ambræ ana g. x. ladani, picis, & ex tecamacha quantum sit satis. Huic etiā vsui non parum confert suffumigium, quod recipit ladani depurati, styracis ana 3. l. gariophyllorum 3. j. conterantur in mortario lapideo cum pistillo calido, & aqua rosacea, ac fiat pasta, ex qua post menstruum purgationem suffumigium susceperit femina, & mox zibeto, inungatos vteri. Tandem curabis omnia arte antequam hæc adhibeas, si quid luxatum apparuerit, ad pristinum locum reducere subleuata vehementer cure supra partem, quam existimaueris dearticulatā esse. Ac si quodammodo diuulsa videatur alicuius partis dorsi caro, coniungere articulationemque roborare prædictis cataplasmatīs opus erit, donec citra dolorem, aut molestiam femina proprijs munitis fungi possit.

C Quod si ex fortu mortuo deterrimam aliquam spurcissimam ac fœdam qualitatem nobis compertū sit vterum contraxisse; theriacæ vsu, mithridati, tum per pessaria, tum verò exterius rem agere tutum erit: sicut per metrachitis eadem liquata in vterum immittere. Cui vsui proficua sunt odorata omnia, quibus vterus delectetur, & ad natiam temperiem reducat. Cuius indicationis gratia vteri regionem inunges oleo naphthæ, iasminorum, de semine angelicæ, de styrace, balsamo, & alijs, quæ odoratissima sunt, cauentes ne nares huiusmodi odores persentiscant, ne vterus ad superna irruat.

Si verò molam id vidū præstitisse certum sit, iuxta affectus, quem in vtero relinquit, naturam, & conditionem auferendam esse sterilitatem cenſeo; nam si sanguis immodicè fluxerit, eodem prorsus modo ei medeberis, ac dictum est cap. de menstruorum fluore: sicut si suppressio pari pensu ac de reliquis viijs, quæ vterus contraxerit, intelligendum est.

De

De virorum sterilitate. Cap. 5.



ON quidē minus virorum defectu per plures sēminas prole orbata reperies, sed forsitan magis, licet vulgari errore decepta se plerunq; steriles iudicent, & accusent, & mille praestigijs praemant gratia pacādi viros: qui cū infēcundi, & ignaui sēpius existat, in vxores omnem culpam reierunt. Fiant itaque viri steriles multis de causis; prima, ex genitalium partiū ignauia: secunda, propter vitiatam figuram: tertia, propter seminis vitium aliquod, quarta ex vitio excretionis, quippe nonnulli ocius quam par sit, semē externunt, quo fit vt virilē detumescat & coire minimē possit: quinta verò, & vltima, ex totius corporis, vel partis principis impotentia, ob morbum, aut caloris defectum. Quibus sanē omnibus aut coire probē nō possunt, aut si coeant, semē nō emittunt, ac si emiserint, inutile est & inane, ita vt nullā in eius emissionē delectationem persentiant, quod non leue solet esse generationis impedimentū.

De genitalium ignauia

Est sanē genitalium ignauia impotentia quēdam ad rē veneream exercendā, quamvis ea vti cupiant. Quam proculdubio affectionem, symptoma esse cōstat in genere noxae functionū naturalium ac eiusdem pudendi propriē abolitarū: quippe hi neq; in venerem promptē ruunt, neq; etiam si conētur, ob genitaliū ignauiam attollere possunt, neq; nullo ingenio efficere, vt distendantur. Quibusdā quoque accidit, vt tamen virilē arrigant, leuiter ac molliter id efficiunt, & mox in sēminē accessu subsistit, & collabitur semine ocysimē citra delectationē emissō, vel excreto flatu per intestina haud secus: quam senib. in contingit, quibus protinus pudendum detumescit, flatu excreto; quoniam cum comprimeretur à flatu in recto intestino, exire nequibat spiritus expunēdo, & persistabat tentigo: quod locus reddebatur angustior, quo dilatato, tensio cessat.

Causa.

Accidit quidem plerunq; inter alias causas viris hoc impotentiae genus vel ex totius corporis mollissima carne, & pinguedine, quae effeminatam reddat neruosam pudendi substantiam, vel ex pudendorum resolutione, ac veluti paralyti; item ex seminis paucitate, & tenuitate: vel ex maleficio admodum, quem cap. praecedenti adduximus, cuius hac in parte non meminero, quod satis sint, quae illic retulimus, item si semē ocysimē procidat, id fieri constat, vel seminis tenuitate, vel flatus defectu, vel uiarum laxitate. Atque praeter uitia quae in genitalium intemperatura simplici vel composita reperiuntur, alia itē cōperimus quae illis ut instrumentalia sunt membra, in sunt, uelut obstructio in uasis seminarijs, qua fit ut semen eiaculari non possit. Sic, & ex defectu spiritus vel flatus, quos dissipat uel multus calor aut insigne frigus constringit, uel animi nimia distractio uel negotiorum detentio. Item licet flatus sint, colis aut uiarum eius obstructio, distorsio uel compromissio id malum efficit. Vltimò tamen ex mille alijs corporis uitijs, quae paulò inferius referam.

Signa.

Dignosces uitio totius corporis fieri ex habitu obeso, & molli, ac uita crapulis, & otio dedita. Seminis uerò uitia signis non egent alijs, praeter ea, quae superius praecedentibus duobus cap. scripta reperies. Fieri pudendorum defectu, & mollitie narrabit ipse laborans.

Ve-

A Verum si ex iecoris vitio malum oriatur, ex proprijs particule symptomatis deprehendes, & ex totius corporis vitioso colore referente sanguinis vitium. Si verò id ex defectu cordis, & spiritus ortum, habeat, pusillanimitas, ac timiditas id facile ostendet, sicut totius corporis frigiditas, vel pulsus parvus, debilis, & rarus. Tertium verò, calidum vel frigidum, aut quodvis aliud intemperamentum facile discies ex signis quæ Gal. 2. theg. abundè scribit: quamobrem breuitati cōsulens subitico: præterquam, quod semen ipsum excisum id facile monstrat, vt superius diximus. Flatus autem defectu cognosces, primò quia nulla apparent signa reliquorum affectuum, & quia nulla sit penis erectio: secundò quia plurimum profunt auxilia quæ flatum generant: item ab excessu intemperanti, cū flatus à diminuto fiat calore solum.

Cui sanè affectioni medeberis, si ex obeso molliq; corpore originè traxerit, per solidiores cibos, per laboriosa exercitia, per frequētes, ac duras frictions: per victum et, & potus parsimoniam, qui sit vel vinum, uel aqua ex decoctione cinnamomi, anisi, dauci, vel radicis chinæ, aut similacis asperæ. Purgabis itē corpus per aliqua interualla medicamentis, quæ primam regionem à cruditatibus recrementis liberent. Tandem sudoribus ex ligno guaiaco, vel balneis sulphureis, quod magis probo, maiorem negotij partem committes: nam & exsiccant, & roborant, ac macrefactioni, & carnis soliditati aptissima sunt. Sed antequam peculiarem curationē aggrediar expendisse oportet ea omnia auxilia, quæ venerem augent, in duplici esse differentia, quippe alia seminis abundantia præstant, alia uerò ipsum prouocant qd iam genitum est, pter quæ et alia reperiuntur, q̄ flatum generat, erectioni pudendi maximè idonea: nā veneris appetentia frustra insurgit, ni mēbrū genitale erigatur, quod fieri flatu, & spirituum copia antea diximus. Quæ sanæ omnia siue medicamenta siue alimenta sint vt Gal. placet 6. de locis aff. c. 6. & 5. simpl. calida, & flatuosa esse oportet, maximè verò, si semicocto humore abundant, vt eodem simpl. idē Gal. explicat. Deniq; primò expendēs natura ne insit coeundi impotentia, à cuius curatione, prudenter desistes, præterea an ex obesitate: item ex defectu caloris, & vitalis spiritus, tandem colis iactura, & paralysi, an ex obstructione vel seminis aut flatus spiritus defectu, & iusta cuiusq; harum causarum, quas retulimus, rōnem curandi institues.

C Si seminis paucitate id malū accidere cōpetas, reieres in testium, & uasorū seminalium refrigerationem, sicut caectionis defectum ad mollietatem, & relaxationē fistulosi nerui collis, ut ambo hæc vitia simul cōplectar, & curē. Quippe ad testium refrigerationē sequitur seminis paucitas, & aquositas, ac flatuosi spiritus, inopia: nā copia ex diminuto calore potius quā frigiditate prodit, ad nerui et fistulosi laxitatē sequitur impotentia erigendi pudēdū: quo fit, ut sic affecti neq; arrigere, neq; semen expellere possint. Cause proculdubio sunt, q̄ infrigidate, & humectate possunt testes, colē, & uasa seminaria, uelut otium, & nimia ventris pinguedo, siue omenti moles: potius aquæ frigida, usus medicamentorū refrigerantium, qualia in testium, & renū inflammationibus ad mouere solēt Medici: Sed pter dicta pauci seminis signa, accedit quoq; id excerni cū animi deliquio, & facultatū animalium euidentī noxa. Eius aut frigiditatē cognosces ex tenuitate, aquosa substantia, ac infecunditate. Nerui quidē fistulosi laxitatem deprehendes, quia sic affecti semē emittunt sine erectione, uñ veneris appetētia excitata,

*Curādo
testis.*

citata, & modica tentigine perſentita. Horum aut̃ omnium curationē inſtitues per ea, quæ ſemen generant: quorum natura calida exiſtit, licet non plurimum humida tñ, & flatuoſa, velut ſunt cibi, qui optimè nutriant, calfaciant, totisq̃ ſubſtantijs familiares exiſtant, dummodo ſiccitatis nihil obtineant: quippe talia ſemen interdiciunt, quemadmodū dixerat Gal. 4. ſimpl. 22. præſertim ſi eis flatuoſa conditio accedat. Sed ſunt prædictæ naturæ bulbi, cicer, fabæ, nux pinea, paſtinacæ radix, rapa, porri, horminum, aniſum, fœniculum, amygdalæ dulces, polipodes & concharum genera, uua recens, & erucæ ſemen tritum cum vitellis ouorum, uinum odoratum. Poſt quæ alimenta infernas corporis partes exerceri conuenit, & rurfus ad alia, quæ uenerem excitent confugere. Proſunt quidem deuorata fruges cum lacte, præſertim fabæ, hordeum, dactyli pingues cū lacte, uino, & cinnamomo: itē columborum carnes, anatis, pudicis, turturis, ſed præcipuè anſeris lingua, teſtes et̃ gallorum, & aliorum animalium, quæ comēſtilia ſunt. Quæ quidem in puluerem reducta proſunt: quorum ſuſcipe 3. j. galangæ, piperis longi ana 3. j. & ſ. ſacchari ad pondus omnium fiat puluis, cuius manè laborans cū uino ſumat 3. j. Cæterum hic tacendum non eſt fœniculū quomodocunq; hauſtum pudēdis eſſe amiciffimum: ſiue ad fouendum radicem cum uino cocta, ſiue ad illiniendum eadem cum oleo trita. Præterea expende, quod ruta, & mentha uirides ex Hipp. & Gal. ſententia ſtatus, ac ueneris pruritum excitare ſolent: ſiccata uerò uel frixa, & præcipuè ſemina eoſdem diſcutere, ac ueneris impetum compeſcere, ſeminisq; profluuium gonorrhœam nuncupatum ſiſtere. Sed ad inſtitutum redeamus. Præſtat quoq; multorum decreto ſucus pulmonis arietis aſſi, puluis ex genitali tauri cum ouo ſorbili in paruiſſima quantitate, q̃ de ſtercore accipitris et̃ ferunt, puluis de oſſibus pedis hirci, vel de teſta teſtudinis, lac item. Prodeſt meliſſa, pulegium, oeymum, ſatureia, urtica, fœniculum, qua lege dictum eſt, ſumptum, acori radix, alliū, cepa, enula, ſatyrion, napi, raphanus, & ſemina omnium. Valent itidem composita plurima, uelut eſt illud, qd̃ recipit ſeminis erucæ, pulueris pudendi tauri, & teſticulorum uulpis ana 3. j. galangæ, & piperis longi ana 3. j. zingiberis, & cinnamomi ana 3. j. caudæ ſtyncorum 3. j. fiat puluis, cuius modicum ſumat laborans in ouo cum it dormitum. Aliter conficitur, ſi exceperis ſeminis erucæ, ſeminis urticæ, ſatureiæ, teſticulorum uulpis ana 3. j. & ſ. caudæ ſtyncorū 3. j. cum cerebellis paſſerum conſice pilulas, quarum laborans capiat 3. j. Sed utiliſſimam parabis confectionē, q̃ recipit ſeminis erucæ, urticæ, aniſi, fœniculi, & paſtinacæ an. 3. Nucis pineæ: amygdalarum dulcium ana 3. ij. piperis, cinnamomi ana 3. j. ramenti genitalis cerui, & ſatyrionis ana 3. j. diambra, aut diamuſci 3. j. ſacchari diſſoluti in aqua meliſſophylli quantum ſit ſatis, ut fiat in morſulis. Vtiliſſimum aliud parabis, q̃ recipit ſatyrionis lib. ſ. dactylorum 3. iiij. zingiberis conditi, iuiubarum ana 3. iiij. coquantur in lacte ouillo, & piſtentur: tandem accipe teſticulorum gallorum, & uerris ana 3. ij. cerebrum columbauū, & paſſerū 3. iiij. cerebra hæc, ac teſticuli in lacte coquant, & cum modico butyri recentis quodāmodo frixa parentur additis uiellis ouorū tribus: demum accipe mellis deſpumati lib. ij. ſacchari tantundem, mel, & ſaccharum ſimul coquantur leuiter comiſcendo omnia, q̃ prædiximus, q̃bus facta coctione, addes pulueres, qui recipiūt pudēdi tauri, ſeminis erucæ an. 3. iiij. galāgæ, zedoariæ ana 3. j. cinnamomi 3. v. piperis lōgi, ſemi
nis

Anis fraginæ ana 3.ij. seminis mercurialis & malux ana 3. sime dulle nucis indicæ, pinearum mundatarum, fisticorum, amygdalarum dulcium ana 3. j. quibus vel minutim incisis cum prædictis admiscebis, & summo manè bolum ex his magnitudine castanæ præbe. Quæ sanè omnia ea prudentia, & moderatione adhibebis, qua finem consequaris citra alterius mali interuentum, vt multis enenire assolet, qui sterilitate non curata, nouum affectū veluti manu faciunt.

Verū inter reliquas compositiones, probata maximè est, quæ recipit testiculorum vulpis decoctorum in hidromelite 5. j. contulis adde pinearū, & auellandarum in paucō lacte & melle infusarum, vbi leuiter ferbuerit ana 5. scarnis leutræ, stercoris muris, moschi ana 3. scum syrupo, cortice, & conserua citre fiat opiata. Cæterum efficacior, & utilior exillit, quæ recipit corticis citri, zingiberis viridis ana 3. j. conseruæ eryngij 5. scarnis leutræ 3. iij. testiculorum vulpis, vel pudendi eiusdem, & tauri ana 3. j. s. pulueris diamusei 3. j. cum melle fiat opiata, cuius porrigere magnitudinem auellanæ parum ante cenam, superbito modico vino.

BCui consimilem vsum præstant renes styncorum, cæterum veni ad nos non asportantur, neq; apud Venetos adhuc reperiuntur. Præstat quoque cibus, qui profectò peculiare est huius mali beneficiū, si receperit oryzā, ablutam & remollitam in lacte die ac nocte, coquatur in aqua, & oleo, & sanguine gallinarū vnico feruore, & paulatim bulliat deinceps, donec integrè coquatur, & postmodum adde zingiberis, erucæ, piperis longi ana g. x. sacchari quod sufficiat, vt gustui gratum fiat. Sed præstat non minùs cepta cum ouis, & butyro frixa, castanæ ex corticata decocta in iure gallinæ primò, & postea in lacte cum zingibere, & eruca.

Pudendo quoque robur addit & firmitudinem, maximè dum laxum fuerit, inunctio circa ipsum, & partes vicinas facta ijs, quæ calfaciant, & exsiccant, velut est oleum, cui adiectum sit radicis narcissi parum, cocci gnidij, seminis vriticæ, pyretri aut viticis, leporis item coagulū, aut leonis adipem pudendo illitum: deinde aliquot piperis grana cum tragacanthi succo trita, quo postea testiculos, & interapedinem inter anum, & pudendum ac lumbos illinito, præcipue addita leonis pinguedine, vel oleo ex semine aut radice angelicæ.

CCui consimile parabis, si exceperis olei liliacei, mastichini, de castoreo ana 5. j. adipis leonis 5. s. piperis, pyretri, cypeti, myrrhæ, ac sulphuris viui ana 3. moschi g. iij. cum cera fiat vnguentum, quo lumbi pudendum, & testes vngantur. Simili ratione iuuat pedū plantas inungere oleo, in quo cyperus, & synapis ferbuerint, vel oleo sambucino, & vulpis cum pyretro, addito musci momento. Conficies vtile aliud si in oleo formicarum, & maximè volatiliū duo oua ferbuerint, cuius olei postea recipe 5. ij. seminis erucæ, cepæ ana 3. j. & euphorbij, castorei ana 3. j. ceræ quantum sit satis, vt fiat vnguentum molle.

Aliud itē vtilissimum paratur, quod recipit axungie vulpinæ, succi erucæ ana 5. vj. testiculorū vulpis 3. ij. coquatur ad consumptionem succi, & colentur: Cui adde lento igne ceræ 3. vj. seminis cepæ, baccarū lauri ana 3. iij. quibus fiat vnguentū. Sunt præter hæc omnia alia non pauca, quæ venerem excitant, inter quæ summopere commendatā reperio inunctionē, quæ recipit olei castorei, & de nucis indicæ ana 5. j. olei musci 5. s. castorei, euphorbij an. g. x. muschi 3. j. alyptæ muscæ 3. j. & ceræ quantum sit satis, vt fiat vnguentum, quo manè vngantur plan-

plante pedum, regio pubis, renum, & perinaei, quo facto, parum galagae orema
sticando detineat: aliquando verò sumat laborans castaneas decoctas cū dacty-
lis, & eruca, ac bulcos etiam cum melle, & sinapi. Ad quorum rationem, & mo-
dum alia pleraque effingere poteris huic vsui idonea. Verum si semē ocysimē
plabatur laxitatis viarum ratione, balneis sulphureis vteris, vel sudoribus ex
guaiaco, aut radice chinae, & aliquo ex praedictis, testes, & pudendi radicem
inunges. At si flatus defectu vel seminis tenuitate id vitium fiat, ei medeberis,
hic quae crassos succo gignere possint, qualia superius abundē diximus.

*De pu-
dendi fi-
gura.*

Secunda sanē sterilitatis causa ex pudendi virilis figura proficiscitur: nā aut
nimia paruitate debitum vteri locum non attingit, quod vitium remedijs cede-
re nequit: aut longiore extensione, & magnitudine ipsum praetergreditur, ex
quibus causis tria vitia proculdubio subsequuntur. Primum, quod semen, ut
Avice. fatetur, in longissimo itinere vitatur, quod proportionatum requirat
a testibus ad vterum spatium. Secundum, quod femina minus delectatur, si
locum, ubi tiullationem perferent, praetereat pudendi caput. Terrium verò
eò quod improporcionatum, & quodammodo dilaceratum, dolore, & mala
figura affectum relinquit vteri collum, ita ut proprium semen, & feminae vte-
rum sterilitate afficiat. Cui sanē vitio nullum aliud adinuenies praesidium,
quam quod pudendum totum femina non suscipiat. Quibusdam etiam adeo
in altitudinem turget pudendum, & extenditur, ut femineum receptaculum
ipsum capere non possit citra euident nocumentum: quod non minus imme-
dicabile existere arbitror. Verum si ex tortuositate obligamentorum breui-
tatem deprauata figura accidat, vel ligamentum abscinde, vel mollioribus la-
xa pharmacijs.

*De semi-
nis vitio.*

Tertia verò causa ad seminis vitium referenda est: quippe aut vile semē fer-
pidum, & veluti torrefactum existit, aut frigidum, tenue aquosum, & langui-
dum, quale decrepitorum est, vel crassius quam oportet, emittitur: vel parcius
aut copiosius, quam par sit. Sed quia plerumque haec vitia proficiscuntur, vel vi-
tio totius corporis, aut partis alicuius praecipue: ob id illarum omnium seorsum
meminisse oportebit, si prius dixerō non raro etiam prodire testium affectorū
occasione. Sic etenim ex peculiari eorum calore semen vritur, & concrefcit ari-
ditate, ita ut ineptum prorsus generationi reddatur. Alio autē modo ipsum vi-
tiatur testium abscessus, vel simile quidpiam: sic & vlcus factum in calculi extra-
ctione, aut herniae curatione. Praeterea testium frigiditas modò ex natura sit,
modò ex senectute, id malum quoque efficit: sicut quoduis eorum iam factum,
& habitabile. Quorum omnium notitiam ediscere oportet, ut iuxta cuiusque in-
digentiam auxilia adhibeantur, quae vel calidos testes moderentur, vel frigidos
calfaciant, & sic de singulis causis, quarum praesidium adinuenire facillimum
erit, si expenderis quae hucusque tam copiose dicta sunt.

*De vitio
corporis,
aut par-
tis prin-
cipis vi-
tuo.*

Cōtingit proculdubio maiori ex parte viris sterilitas ex aliquo totius corporis
vitio, vel naturali, aut nō naturali impotētia ob impēsū aliquod in tēperamē-
tū, vel morbi galliei accessum, quorū ratione nullū, aut in fecundū, vitiosum, ac
inutile semen gignunt. Item ex nimia obesitate, quae, & viros, & feminas infecū-
dos plerumque efficit, quod quidē euidentissime ex Arist. probatur lib. 1. de gen.
ani. c. 18. cum ex professio doceat, pinguedinis, & seminis eandem esse materiā:
quo

- A** quo fit, ut minus fecundi sint, qui multā coacerbant pinguedinē, quia tū illis de semine deest, quantum pinguedinis abundat: Arist. verba hæc sunt; Hominū nonnulli, ubi per habitum corporis bonū carnulenti; aut pinguiore euaserint, minus semē emittunt, minusq; rem venerē expetunt. Et paulō post, viri et mulieresq; pingues minus fecundæ esse, quā graciles vidētur, qm̄ in vegetioribus excrementum cōcoctum transit in pingue. Refert et lib. 2. de gene. ani. cap. 19. Pingua minus seminis habent, quam macilenta, præter quam, quod penis breuior efficitur. Itaq; ratione optima fit, ut cū materia superuacua consumpta in pinguedinē sit, deficiat genitura. Cui etiā dogmati Plinius his verbis assentitur. Steriliora cuncta pingua, & in maribus, & in fœminis, sic quidē castata animalia pingua sunt, quia seminis materia in pinguedinē abit. Quamobrē in his potissima curandi ratio erit ipsa corpora macrefacere, & exercitijs dare, ac sudoribus, & balneis, ut consumpta pinguedine postmodū vxoribus dediti, seminalē materiā ad testes, & vasa spermatica euocēt, ut copiosius fiat deinceps semen. At ex alienius partis principis graui aliquo affectu steriles fiūt, ut de tertiū morbis dictū est: sic si in cerebro epilepsia, vel quouis alius affectus præsit, qui magnam inferat neroso generi, aut reliquis particulis imbecillitatē, steriles fieri viros conspiciamus. Pari p̄su iecur, ac vētris os, & tandem oīa membra, quæ aliquod habent officium reliquis partibus proficuum, & necessarium, si grandi affectu, aut habituali corripiantur, id malum efficiunt. Sed potissimū id mali subori scimus cordis, & arteriarū affectionibus. ob id valetud in trij homines, in quibus calorem innatum minus valere coniectabile est, plerunq; steriles sunt. Nī cū potissima seminis prolifici ratio sit in spiritus vitalis, ac natui, & influentis caloris influxu ad testes ipsos, & hi à corde uelut à fonte prodeant, sit facilē, corde aut arterijs affectis steriles superesse tales uiros. Hac. n. rationem arbitror Hipp. lib. de lo. aqua, & ac. dixisse Scythas steriles esse, quia uenas retro aures scindunt, & copiosē sanguinem fundunt, donec homines præ frigiditate obdormiant, ex quo qui euadunt, steriles caloris, & spirituum defectu, supersunt.

- C** Sed ne quid huic tractationi deesse uideatur, paulō diligentius virorū impotentia expēdere insitui. Cuius rei gr̄a asserimus quatuor esse in uiris potissimū ad fecunditatē necessaria inter se inuicē coordinata: quorū si aliquid deficiat, fecunditatē quoq; deficere necessum est. Primum quidē salicitas est, seu appetitus ad uenerē: secundum seminis copia: tertium erectio ualida membri: quartū & ultimum fecunditas. Inter quæ sanē oīa salicitas minor est ad generandū, q̄ hæc ēt in senibus ac decrepitis reperiatur. Postmodū magis necessaria est seminis generatio: q̄ in ipsis quoq; senibus reperiatur, non tamen adeo copiosa neq; bona, ut in iuuenibus. Vtilior quidē est erectio membri (licet non sufficiens, ut in eunuchis) quæ sanē non quia talis est, sed quia multis indiget: & ideo in senibus minor reperiatur, neque sit nisi post somnum, & cibo cōcocto, præsertim calido potestate cum potu modico, & ante mictum, ac sine uentris crepitu. Causa porro huius erectionis est robur cordis, aut valida imaginādi uis, quæ cogit cor impellere spiritum flatuosum: caliditas insuper renum validorum, & pinguium trahentiū, & transmittentiū: quæ si adsint, secundus erit homo, & ad uenerem potens. Verim, ut in summa dicam, quatuor etiā reperiuntur causæ,

Aa qui-

quibus hoīs corpus sterile fiat, quarum prima frigiditas est, cuius potissimum A
 rōne dixit Hipp. loco citato Scythas steriles esse: nam inquit; Scytharum genus
 fului valde coloris existit pp frigus ingens, non. n. vehemēs accedit ad eos Sol:
 à frigore verò albedo exurit, & fit fulua. Ac subdit. Neq; verò possibile est, fē
 cundam eorum esse naturam, cum viri minimè cupidi sint cum fæminis cōmi-
 sceri ob nimiam corporis humiditatē, ventrisq; molliem, ac frigiditatem. Quē
 causa est, q; nec semper probè fiat, nec spiritus vitales ad tensionē suppedient:
 quæ duo ad venerem necessaria esse diximus. Quibus accedit ex accidenti hu-
 miditas, vt Gal. aduertit 2. de temp. c. 3. quæ causa mollietiei existit, & infæcundi
 tatem quoq; mollitur. Quapropter censeo Hip. dixisse: Scythes eunuchos natu-
 ra esse, inquit. n. loco citato: Amplius aut præterea, plurimi Scythæ eunuchi na-
 scuntur, & muliebria officia obeunt. Cuius loci ratione, qui difficilis vī, q; vix
 credi possit hoīs nasci eunuchos, expendendum est, tria nomine eunuchi an-
 tiquos intellexisse. Primum ergo hoc nomen generaliter accipitur pro omni
 hoīe, qui impotens sit ad venerem: nam cū antea declarasset Hip. Scythas esse
 frigidos, ob id ēt hac in parte steriles vult subaudire, quia ad venerem sunt im- B
 potentes, propriè. n. frigidi dicuntur hoīs, qui ad venereos actus inualescentes
 sunt. Vnde titulus est apud iuriconsultos. De frigidis, & maleficiatis: quos spa-
 dones vocatos reperiō, sicut eos quoq; quibus meatus pudendi contortus est,
 aut pudendum ipsum admodum breue, & virilia effecta sunt. Secundū hoc no-
 mine eunuchi thlibiæ appellantur, & sunt, quibus testes in manibus obstetri-
 cum contorti sunt. Tertium vero, eunuchi castrati dicuntur, & sunt ij, quib. adē
 pta sunt virilia oīa, & impotentes sunt ad venerem, vel soli testes, & hi non sunt
 fæcundi, cæterum potentes ad venerem. Itaq; eunuchi trium sunt generū, qui-
 dam ob priuationem virilium, aliqui ob vitium in illis, multi ob naturæ impo-
 tentiam semen non generantis, aut statum transmittentis. Quippe hæc tria ne-
 cessaria sunt ad venerem, membrum nimirum cum suis partibus, materia, & ia-
 culator spiritibus. Sed in hac re, vt ad pensum redeamus, expendendum est, q;
 vt habetur 1. de semine, priuatio, aut corruptio testium causa est frigiditatis in
 toto corpore, & vicissim frigiditas causa est impotentiae ad venerem. C

Præter adductā ab Hip. causam sterilitatis Scytharum, aliā superaddit, dicēs:
 Ab equitatione ipsa diuurni eos corripunt dolores, nimirum pro pendentib.
 semper eorum cruribus, deinde claudi fiunt, contrahunturq; vertebrae, cū inua-
 luerit morbus. Et paulò inferiūs de reliquis hoīb. inquit. Simili aut modo, &
 reliquis hoīb. euenit, vbi. n. frequenter, & continuè hoīs equitant, ubi pluri-
 mi à diurnis doloribus veriebrarum maximè, & pedum corripuntur, ad coi-
 tumq; fiunt impotentes. Ac licet Arist. 4. probl. 12. asserat, equitationem assiduā
 facere libidinosiores, intelligendum venit, si non læduntur, & commodè equi-
 tentiā de alijs, quorum Hip. meminit. Arist. ēt 5. probl. 31. refert, genituram p
 somnum profluere, vt perspicuum sit huiusmodi homines ad concubitum fieri
 impotentes gonorrhæa enim, qualiscunq; sit, debilem reddit hominem ad ve-
 nereum, tum quia minuit illius materiā, tum quia humectat membra genitalia,
 tū verò quia facit incontinentē, aded vt semen effluat ante pudendi tensionem.
 Potentissimi enim sunt ad venerē quicunque tardius, & non nisi maxima cum
 ten-

- A** tensione membri, & confricatione semen emittunt. Sed ad rationem redeunt: ex incōmoda equitatione, & quouis labore ualido, vt refert Gal. 1. in 6. de mor. uulg. comm. 6. confluunt humores ad prædictas partes, & mala, quæ Hip. recensuerat, scribit. Cui sanè accedit alia, quòd ex longa equitatione, & ualidioribus exercitijs summopere imbecillitentur renes eò quòd calidiores præter naturam efficiantur, & seminis fecundam temperiem euertant: faciunt etenim renes plurimum ad ueneris appetitum, & robur seminis. Vnde qui generationi student, raro debent, & parum equitare, magis tamen in pedestribus exercitijs se exerceri conuenit; parum edere, & cibos crassos, & boni ac ualidi elementi, ut suillas carnes assas, caseum modicum, uinum rubrum potens: à quibus probè dormire est opus: porrò omnia, quæ inimica sunt cordi, & ueneri officium generationi. Præter dictas sterilitatis causas superaddenda est ultima exemplo sumpto à caulis sterilitatis Scytharum, quæ uisio est, vel sectio uenarum post aures, uel seton, aut fontanella. Quæ in re, inquit Hip. lib. de lo. aqua & ac. Medicantur autè sibi ipsis hoc modo: à principio morbi utranq; uenam retro aures inscindunt: quo facto, sanguine multo promanante somnus eos corripit præ imbecillitate. Et subdit, At mihi sanè uidetur, ea medicatione se ipsos perdere: uenæ enim retro aures sunt, quas si quis secet, sterilitatem inferret ijs, quibus secantur. Quod proculdubio vitium ijs etiam, qui uisionem vel profundam vel diu manantem in aliqua corporis parte patiuntur ex aliqua morbosa occasione, certum est subsequiturum, id quod ab Hip. etiam est proclamatum: nam inquit, Scythæ omnium hominum minimè sunt ad coitum valentes. Ac reddens rationem subdit: Et q̃ humoris detractiones ex perustione cauteriorum semper habent, & plurimum temporis in equis degunt. Cuius rei iterum adducit rationem lib. de genitura dicens: Quibuscunq; uenæ post aures sectæ sunt, hi coeunt quidem, & genituram emittunt, uerum modicam, debilem, & infecundam, nam plurimū genituræ pars à capite iuxta aures in spinalem medullam procedit, ipse autem litus, cicatrice sectioni inducta consolidatus est. Lib. tamen de loc. in homi. huc refert: Aliæ uenæ à vertice iuxta aures ab anteriore colli parte utrinque ad caua uenam appellatam feruntur, ex infecundum faciunt hominem, cum fueriat se & x, & in magnos digitos desinunt.

C Quam sententiam quoq; profert Arist. li. 2. de gen. ani. q̃ semen habeat quipiam cum cerebro affine: Inquit enim; Sedes oculorum maximè omnium capitis locorum seminalis est, q̃ sola ipsa per coitum uenerum manifeste immutetur, & usu immodico rei ueneræ oculi aperti langueant, & subsideant. Quæ omnia sano modo esse intelligenda arbitror, ac cenleo præcipuam sterilitatis rationem in hac causa pendere ab ingenti frigidityte, & impotentia, qua totū corpus ex copiosa sanguinis profusione afficitur, & cerebrum maximè, licet semē non decidat ab ipso cerebro, est tamen pars, quæ vim & efficaciam semini, ac testibus tribuit, qua genitale constat enadere semen, & ob id ipsa sublata, vel diminuta nil mirum si semen infecundum fiat. Quæ si expendis, & antequā auxiliares manus adhibeas, probe consideraberis, certo scio te profuturum summopere. Cuius rei exemplum reperies in ijs, quibus fontanella occipitio, vel brachijs diu aperta est, & plurimum fundit: nam licet ad sanitatem alicuius

Aa 2


affe-

affectus prodest, mirum non est, si ad integram indiuidui perfectionem non sufficiat. Atque haec sunt, quae corpus infecundum, & imbecille reddunt. A

*Curatio
rati.*

Quibus omnibus ea erit utilis prouidentia, quae affectum corpori communem, aut alicui parti principi proprium auferre, & valeat: nam qui morbo gallico affectu steriles existunt, sudoribus ex ligno guaiaco, & aliis huic malo aptis praesidijs haud difficulter fecundi fient. Sic frigidos ex quauis causa calfacies prudenter, & omni arte ijs, quae superius retulimus balneis, sudoribus, exercitijs, frictionibus, inunctionibus, fotibus, & alijs, quae intus sumpta, siue alimentis sint, siue medicamenta, calfacere, & flatus generare nata sunt. Pari quoque ratione prouidendum est cuique membrorum principalium, si huic malo causam praestiterit, iuxta cuiusque intemperamentum & vitium: ex ijs enim quae diximus, satis ampla subest cuique ad curationem materia: & ob id huius cap. hic esto finis.

De conceptu. Cap. 6.



CREATIS vniuersis, quae in caelis terrisque continentur, summus ille rerum conditor. Deus, terram ut implerent cresceret, & multiplicarentur iussit, ut habetur Genesios. 1. Quamobrem quandam inclinationem, propensionemque ad generis sui propagationem cuique indidit, ne breui temporis spatio corruerent, quod omnia ex corruptibilibus essent conflata: unde appetitum illum conseruationis propagata specie, ortu duxisse constat. Hinc effrenis generandi cupiditas emanauit, ut pulchre Arist. innuit li. 2. de ortu & interdicens, Nam cum in omnibus quod praestabilius est, naturam semper expetere dicatur, praestabilius autem sit esse quam non esse, hoc enim in omnibus impossibile est, propterea quod longe ab ipso principio distent, reliquo modo Deus ipse vniuersum compleuit continue facta generatione. Quibus verbis constat hinc esse deperdiri restaurationem, qua noua prole facta, vniuersum indies quotidiana generatione continuat. Ob id etiam idem Arist. 2. de ani. c. 4. dixit, generationem esse operationem maximè naturalium viuientium, quae sunt perfecta, non imminutam, neque fortuitam generationem habentia, nimirum animatum simile procreare, plantam autem plantam, ut quoad fieri posse, durationem participarent: omnia. n. haec appetunt, & huius gratia agunt quaecunque secundum naturam operantur. Sic philosophi omnes affirmant generationem primam esse, ac perfectissimam viuientium operationem. Perfecta quidem dicitur, quod aliud sufficiens est generare, ut ex Arist. 3. meteor. 3. euidenter constat. Quare si nutritio & accretio ad animalis sunt perfectionem, haec autem ad generationem, erit sane generatio omnium aliarum naturalium operationum finis, ac idem prima dignitate, & perfectione: finis. n. teste Arist. 2. phy. perfectior est ijs, quae sunt ad finem. Quod est elegantissima quadam sententia Plato in Symposio probauerat. Ex quibus constare cuius arbitror, quanta naturae succrescat generandi solitudo: nam cum rerum species deficere naturae vitium foret, ac mostrosus, praecanet diligenter ipsa ne eius perfectio (quae in specierum varietate sitam esse cognoscit, idque nullo alio modo, quam per nouam rerum propagationem) corrumpatur dilabaturque.

Verum

- A Verum cum hanc ex materiali aliquo principio fieri oporteat, licet omnia ex elementis consent, expendendum subinde est, non omnia immediate ex ipsis fieri: sed ea immediatius, quam ipsorum naturae magis congruunt, ut lapides, & metalla. At verò animalia, ut quae longe ab elementorum natura distideant (licet ipsis constet) fieri citra maximas transmutationes nequeunt: nam ipsa in plantas, & reliqua alimenta primò mutari oportet, hanc verò in sanguinem & semen, ex quibus ut generatio fiat, multa profectò requiruntur, quae mox referam. Cum namque ad fetus generationem satis non sit seminis, ac sanguinis menstrui bonitas, neque corporis aut partium principalium eius temperies, ac sanitas, sit quidem ut necessum sit, utrum quoque aptum fieri per commodationem, & temperiem, ac virium integritatem, quibus accedit calor et vis, & efficacia, ac puritas: ex quibus id futurae opus, cui primò ipse uterus incumbit, conceptio est. Erit igitur conceptio, ut ex Gal. colligitur lib. de semine, attracti ab utero seminis commixtio in sanguinis menstrui puriori parte, in quam locellorum calor nativus ita agit, quod vivificato seminis genitalis calore, demum fetus generatio sequatur. Conceptionis porro nomen à comprehensione dictum esse constat: refert quidem Gal. e loco citato mulieribus praegnantibus futuris intus remanere semen, alioqui tales non fieri. Primum itaque opus uteri à proprio calore fit: nam attracto semine tamen autem sese uterus colligit, ut seminis vel sanguinis menstrui egredi permittat nihil. In calore quo sane opere seminis cum sanguinis puriori parte commixto fit: in quo calore uteri cogente, seminis calor ad actum reducitur, ut deinceps sua specie in futurum opus progrediat. Antè tamen, quam hinc discedam, ex quo sanguine conceptus fiat, docet necessum fore duxi. Quia in re, quo tempore mulieres potissimum concipiant permittendum est: cuius gratia, ut ex Hip. lib. de septimes. partu colligitur, accipiamus conceptum fieri, aut in ipsis interlunijs, aut ante plenilunium, aut decrescente Luna: si in ipsis interlunijs conceperit, rarissimè quidem fiet, idque in illis praecipue mulieribus, quibus accidit vel in ipso mensium fluentium impetu, semen masculinum reineri, propterea quod parcissimè purgari sunt natæ. De quibus Arist. li. 7. de hist. an. c. 2. & 4. de gene. ani. c. 4. haec scripsit: Nonnullae etiam, dum profluunt menses, concipiunt, postea concipere, nequeunt, quibus vult statim à purgatione comprimitur. Ceterum de reliquis antea dixerat. Conceptus mulierum à profluvio menstruorum sua natura contingit. Hip. tamen lib. de nat. pueri, singulis suum tempus concipiendi praescripsit: inquit. n. Oportet igitur mulieri tempus dare mensis, in quo ipsa purgatio contingit. Ex quibus conclusit, necessarium esse plerasque mulierum circa plenilunium, & ultra concipere: quibus equidem luce clarius constat, ut plurimum mulierum concipere post menstruas purgationes. Præterquam, quod decrescente Luna, tempus existit frigidius, & humidius, quo minorem facit abundantiam excrementorum coctorum: & ob id minus eo tempore feminae concipiunt. Itaque & fluentibus, & iam fluxis mensibus feminas concipere constat. Verum quaecumque feminae menstruant sunt, vel non concipiunt, vel statim abortiunt, licet concipiat, ut inquit Arist. loco citato, vel vitiosos fetus edunt: non quod felicitè concipiunt ut ex, quod à purgatione. Quod et protulerat expressis verbis Hip. li. 2. pop. p. 3. text. 27. dicens, post menstrua aliquando dextra aliquando sinistra hiant: quasi reddens rationem, quo tempore fieri potissimum conceptus, nimirum quia, & uteri sunt aperti, & venae, quae in ipsum finiuntur, &

Conceptio
quid.

tur, & quia inanis uterus eo tpe auidius trahit, & rursus idem probat eodē lib. A
 p. 3. tex. 31. dicens aut a menstruis numerandi sunt nouem menses, aut a conce-
 ptione. Quippe (vt ad institutum redeam) mulieres nō concipiunt ex sanguine,
 qui fluit, quod multis ium causis, tum indicijs fieri, & nosse datur: primum, q̄
 non par sit nutrirī fixum ex recremento: secundum, q̄ propensus est sanguis il-
 le menstruis effluere, non retineri: tertium, q̄ a purgatione, cū nihil sit, qd na-
 tura teneatur expellere, facilius semen cōcipit: demum, q̄ par sit fētū nutrirī ex
 defæcato expurgatoq; sanguine, qui est circum uterum, vt pars superflua ei iicia-
 tur, & pura nutriat fētum. Ex quibus iam constare censeo, ex quo sanguine fieri
 fētum oporteat. Sed qm̄ dixit Hip. 5. aphor. 18. Mulieri si menses eant, impossibi-
 le est fētum esse sanum. Retentis ob id mensibus arbitrantur multi mēses in ali-
 mentum infantis absumi. Itaq; in primis duo semina in vnum coire in utero te-
 nentur, postea verò sanguinem purissimū accedere par est, vt prosperē fētus for-
 mari possit. Sed p̄dicto operi multa proculdubio requiruntur: nam primò mas,
 & femina, non vtcunq; concubant oportet, sed femina in concubitu capite pā-
 rum demisso, coxendices, clunesq; altiusculas habeat, feminibus latē patētibus B
 donec vir tandem genitale semen ante vuluæ ostiū emittat. Cui semini spirituo-
 sa substantia, q̄ genituum appellamus spiritum, permiscetur atq; confunditur;
 q̄ inquam, sicut humiditas, procul expellatur oportet, tantò seminis humidita-
 tem peruincens, q̄tò ocyus egeritur efferturq; longius: nihil. n. procul citra spiri-
 tum vehementiam proijci pōt. Cæterum virilis seminis profusio, nō intus, vt
 pleriq; censent, fit: nam os vteri angustum est; sed ante ostiū, quo & femina suc-
 cum quendam nihil ad conceptum conferentem secernit: in quibus prorsus ex-
 cretionibus paritermē voluptate mas & femina affici solent. Viri aut profusum
 ibidem semen intus ab utero auidissimē rapiunt, si calidus, & modicē tempera-
 tus, si oris labra asperiuscula, & herentia: si et nunc tenuiora sint, qn̄quidē ad cō-
 ceptum ita se commodē habent. Sed p̄ter hæc oīa, q̄ nuper & c. p̄cedenti dicta
 sunt ad concubitum esse necessaria, vt conceptus fiat, alia insuper quatuor p̄re-
 querit grande hoc opus, imaginariam nimirum cupiditatem, affluentiorē succū
 spiritalem substantiā, & flatuosum materiā. Quæ oīa a cerebro, iecore, toto cor-
 pore, cordeq; proficisci æquum est. Quocircā voluptas ex deprehensō rei dele- C
 tabilis, & cōcupitæ simulacro concitata (qd̄ inchoaps primum est) protuberat
 vehementer: mox inanē spongiositatē, q̄ in medio glandis colis apparet, cupidi-
 nis spiritus confestim subit. Deinceps verò alia vis, q̄ huic obtēperat, genitalis
 seminis materiam discindens ad seminales meatus peculiari utillatione excita-
 tos expellit: quo cū tetenderit humoris portio calorigica cā agens in flatū ver-
 titur, quò genitalia extenduntur: virorum nimirum rigescunt intumescuntq; fe-
 minarum verò fauscunt atq; extuberant. Quibus medijs, q̄ in hoc opere necessa-
 ria existunt, ab utroq; parente semen prolificum in utrū excidit, qd̄ equidē si
 uterus vndiq; complectat ita auidē, vt internū uteros ad eō astrigatur, qd̄ ne mi-
 nimū quidē seminis, aut sanguinis menstrui exire p̄mittat, cōceptus eo tpe dici
 meretur. Quippe simul, ac geniturā intra se uterus traxerit, in vniuersum alueū
 se supra semina duo colligēs, ac vndiq; eā cōphēdens ita cōtrahit, vt nulla peni-
 tus, siue multū, siue parū seminis iaculatū fuerit, vacuitas relinquat. Cū verò se-
 minalia hæc recrementa in utero cōstiterint, atq; et intra septenas horas post eia-
 cula-

Nec di-
 splacet
 prolificū
 etiam se-
 men ad
 eam par-
 tem mis-
 si; argu-
 mento est
 grauidā
 mulier,
 qua in
 utero cer-
 uicem se-
 men af-
 fundit.

Aculacionē in effusione relapsa neutiq̄ fuerint, si uteri calore cōseruent regantq̄; concepisse feminā credendū est. Et, ut in summa dicā, conceptionis causā sunt proba uteri cōmoderatio, recens mensiū purgatio, idonea etas, & congressus appositus: in viro aut̄ bonus corporis habitus: ad calidum p̄sertim, & humidū inclinans, seminis prolifici copia, robusta, & virilis etas cū viriū robore coniūcta concubitus moderatus, & plenior victus rō. Quæ quidē oīa ad conceptū conciliandū necessaria sunt. Quid verō a conceptu ipso fiat, ubi semel probē a muliere in alveo retēta fuerit genitura, iam explicandū aggredior, si prius quid fetus efformatio sit, dixerō. Est sanē virtutis seminis in menstruo sanguine tā efficax actio, ut materiam illā efformare, ac incepta informatq̄; ad membrorū formē susceptionē ducat. Dissidet quidē a cōceptu, proprio seminis calore perficiatur, licet seminis quoq̄; vis accedat, at fetus generatio, q̄ ille uteri calore efficit. Que ut probē teneas, p̄mittendum est B. Tho. p. 1. q. 118. art. 1. arbitrari, materiā a femina ad cōceptū p̄stitam, statim a principio actū esse animā vegetatiuā donatā; non tñ esse in actu secundo, sed in actu primō: q̄ mihi de semine utriusq̄; parentis intelligendū fore non oīno improbabile vī (saluo tñ meliore iudicio) itaq̄; semen vtero cōprehensum, mox actus secūdos efficit, disponēs, & delineans futuri fetus mēbra, educansq̄; de potētia materiæ animā vegetabilē, qua deinceps alatur, & sensitiuā, donec rationalis introducat. Quod sanē alijs corruptis omnīū virtutes eminenter obtineat, & operet q̄ ipsæ antea efficiebant, & quid amplius. Formatiua itaq̄; facultas nō quiescit ab opere, donec vegetabilem, & sentientē animā educat de potentia materiæ: & postea ab ipsa ingeniū p̄cipuis mēbris in plantata, opera nō mediocri momenti agit, ut inferius mōstrabo. Postea vero opus relinquit vegetatiuē, & sentienti, q̄ ipsum perficiant iuxta formationis varietatem, ut mox scribā. Sed suspico, licet virtus seminis transmissa a patre, se habeat velut instrumentū, qđ artificis, aut motoris motū exequit, nō subinde cōstare, hanc virtutē posse citra aliqd aliud agens, qđ simul coagat, ipsum semen solū posse virtute illa opus ita grande perficere: sed cōseo (saluo meliori iudicio) concurrere actualē matris virtutē, non quæ in semine est solum, q̄ anima actu in id, & reliquā materiā mediantibus venis, & arterijs transmittit. Verū id alibi latius sum disputaturus. Multa sanē eaq̄; mirabilia vno tēporis momento circa animalis generationē sunt naturæ opera: nā sex septemve diebus primis semina duo ociosa nō sunt, sed sanguinē trahunt, in sui q̄; naturā cōmutāt, & veluti alunt, qđ sanē opus inter Barbaros mulū lactationē appellarūt. Post verō in semine ipso duo cōsiderat Gal. corpus nimirū seu corpulētā crassāq̄; subtilitā, & spiritū, & in eo calorē natium, quibus formatiua facultas veluti instrumentis vti ad fetus generationē. Quæ, p̄culdubio rōne Hip. dixisse arbitror, Scythas steriles esse: nā ex arteriarū retro aures sectione tāta spiritūū vitaliū copia effundit, ut semen ob id infecūdū superfit, evanescētibus spiritibus, & calore, Formatiua itaq̄; facultas, q̄ in semine viget cōcepto intra uterū iā semine, tam est à summo rerū cōditore erudita (licet cognitione careat) ut uniuerſa, ac necessaria in animalis cōformatione nouerit, mēbrorūq̄; vſus, & formas, ac facultates eadē certis tēporibus, & partes et̄ efformat, auget, exornat, & tādē ad debitū perducit statū. Quæ profecto opera tāta sunt admirationis, dignitatis, & excellentiæ, ut non naturæ, sed un̄ Dei opt. max. potentia, & maiestati tanquam au-

Non gignendi simile quoddam membrum ex qualibet parte seminis, sed calidum ex calida, & frigidum ex frigida distā singillatōnem seminis, & sanguinis illa tantū.

toris naturæ iure, ac meritò adscribenda sint. Quod agnoscens rex, & propheta A
 David Psal. 118. Cœlesti numine plenus illud cecinisse visus est; Manus tuæ fe-
 cerunt me, & plasmauerunt me. Quod & sanctus Iob eisdem penè verbis est et
 testatus, corporis vniuersi plasmationem Deo auctori tribuens. Gal. et ipse totus
 in Deum assurgit, & humani corporis fabricam admirabilem illi vt auctori tri-
 buis: illiusq; in pangendo corpore, in connectendis mēbris, in disponēdisve po-
 testatē, prouidentiam, sapientiam ubiq; admiratur. Sic & Arist. 2. de gen. an. c. 1.
 cœlitus in nobis principium duci adstruxit. Quamobrē Deum benedictissimum
 tanti operis effectorem, & architectum summa cum laude, ac veneratione p̄di-
 cabimus. Cum aut (vt ad institutum redeam) seminalia recrementa in vtero con-
 stiterint calfacta actuatq; calore vteri (q̄ conceptum appellare, & circumscribere
 diximus) ambo hæc spiritu genitiuo vtroq; iam concreto calhant. Quo fit, vt
 concrecant spissenturq; & ex calore statuosus spiritus generetur: quo statu cō-
 mixtæ genituræ turgent atq; intumescunt: minutissimē insuper bullæ spiritu re-
 pleatæ assurgunt: ex quibus deinceps iūctis vna fit cavitā copiosam spiritus q̄-
 titatem cōprehendens. Qui sanē spiritus intro reclusus cum calidus sit, & ob re-
 clusionē calidior factus (refrigerationē queritans ad sui custodiā) sibi in medio
 seminum partes scindendo peruium iter parat, vt expirato feruido, temperatus
 ad feruorem cōtēperandū, eadē via subingrediatur. Quo spiritū ingressu egres-
 suq; & vi spiritum potestate vitalē, animale & naturalē ex animali vitali, vt di-
 ctum est, factum, ad proportionata loca formatiua facultate mouente, disiungi
 arbitramur. Cui sanē operi duo semina materiā præstant. Deinceps coactis iam
 partibus ijs, & in vtero insinuatīs diuq; cōtentis, & conueniente sanguine attra-
 cto, halito persimili, & mutato per totā seminis substantiā in rois specimen ve-
 luti alimentum illi p̄stans, ipsum semen augmentum suscepat, vt sufficiat parti-
 bus efformandis: ac ne augmentum ultra q̄ par sit, suggeratur, ipsum sanē coop-
 erit tumicisq; euoluit, & externa parte terrena resciccescente, circum mēbranu-
 la perinde, ac in decoquendo pane obducit: p̄terq̄ q̄ necessaria erat, vt fluidum
 incallescensq; semen contineret; ac vt spiritum genitiuū tueretur, adhærens vte-
 ro per cornua, & vteri aspredines. Quam et tunicam aliā in generatione sequū-
 tur: ceterum illa, q̄ prior formatur, est q̄ Gal. lib. 1. de sem. c. 7. & lib. 2. c. 1. & 4. C
 intestinalē vocat; hæc quidē græcis corion; latinis secundina dī, vtero tota adhæ-
 rens atq; suspensa ab hac priore mēbrana q̄ necessaria erat: altera porrò innascit
 mēbrana venis, & arterijs eius inter se coniunctis, & alias se latiores gignētib.
 sensimq; dilatatis: ex quibus tenuis qdā altera membrana cōflatur, quæ Græcis,
 alantoydes dī: hæc altera sui parte, qua dilatato primo vraco enasci incipit, sca-
 bra, & aspera apparet, ab alio latere lenis admodum, & subtilis existens. Tertia
 inde procreatur alantoydi ferē cōtinua, & ex porrecta tunica, q̄ fctum proximē
 continet & inuoluit, circa q̄ et embrio volutatur, q̄ amnion, vel auitium, aut sel-
 lam, & alijs pluribus nominibus appellant; cuius functio est, humorem exsu-
 datum à puero coacervare vsq; in diem partus. Ego tñ in hac re cenſeo non esse
 verisimile fctum, qui neq; alui excrementa, dū in vtero est, emittit, sudorē emit-
 tere, quē homines non nisi violento aliquo casu profundunt. Sed arbitror esse
 pingue quoddam recrementum ad salutem infantis à natura excogitatū, ibidē-
 que adseruatū. Apposui quidem hanc mēbranarū seriem, quia sic multis neo-
 teri

Primum
 forma-
 tionis
 empirus.

Ad tria
 nimirū
 corporis
 princi-
 pia, vt
 Auicē.
 refert
 Fen. 21.
 3. trac. 1.
 62.

- A** tericorū vīsum est. Verū ego clarioris doctrinę gratia mēbranas sic distribuo. Vbi. n. fētus concreſcere cōpit mēbrana vna tenui, q̄ amnios (hoc est muſcus: adheret. n. fētui, vt muſcus arbori) nominatim inter q̄ & fētum non ſudor, ſed pingue quoddā exiſtit. Hanc circūdat corion mēbrana neruea craſſa, dura valde, multis vaſis, ac vinculis in texta vtero, & exterius carnea ſubſtantia tota obducta, vt firmior eſſet: inter hanc autē & amnion vrina fētus cōtinetur. In qua ſanē re, qđ magis mihi eſt experimēto confirmatū, illud proſectō eſt: nullā aliā in fētibus humanis reperi mēbranam: in cornigeris media eſt alia, vt Fallopius autor eſt in anatomicis adminiſtrationibus. Quod ſi p̄ter has (vt multi faciunt) velis carneā placentulā, ſtratum quoddā ſuppoſitū vaſis craſſum, carneū ac firmū ſuperaddere, nō diſplicebit. Ego tñ arbitror carneā, & craſſam ante dictę mēbranz partē eſſe. Vaſa verō, q̄ ex corio in vmbilicū ferūtur, duo ſunt, q̄ pulſant; & totidē quę non pulſant, alternatim poſitę, & aliqñ vna ſola reperitur magna, q̄ pulſat in medio duarū quietarū ſita, & prope vmbilicū diuiditur: poſtea verō vnum fit corpus ex his tribus quatuorve: meatus ē vrinarius, qui ē veſica fētus fertur extra amnion in medio poſitus exiſtit. Ac ſi quis dixerit, plures alias tunicas Hipp. nomināſſe, intelligat carneā partē vnius tunicę, & membranā ipſius bis recensuiſſe. Contingit tñ quibuſdā in partu amnion nō rumpi, & puerū veſtitū naſci: quō fit, vt vulgus exiſtimet aliā pręter dictā ſub eſſe tunicā. Sed vt eō, vnde abiit, redeat oratio: in harū tunicarū medio dum generantur, conſtat, locū ſanguini cōcreto per ſimilē apparere, quo ſpiritu intus deferente, & calore extrinſecus exſiccāte, cordis bulla tumet vitali ſpiritu reſerta: deinceps verō, bullulę geminę ſuperna parte pro cerebro vna: dextrorſum pro iecore altera extuberant: q̄ nihilominus ſpiritu ſuperna animali naturali altera replentur. Quę ſanē vnā cū ijs, q̄ in mēbrana illa continentur, q̄ totum embrionē eſſe arbitror, enutrire, incrementūq; recipere neceſſe eſt: ob id per vulnę acetabula cruentus ſuccus reſudant aluē ſubiens, mēbrana circūambit: quē ſimul cū refrigeratū ſpiritu per meatulū, quem genitiuus ſpiritus ſibi efformauerat, intra panniculū a genitricis attrahitur, quo perfectē, & ad integrum cocto partes, quas modō diximus, aluntur augenturq; dixerim, has tres precipuas: nā reliquę poſtea fiunt, & aluntur. Mox tribus ijs, quas nuper memorauimus bullis, tres p̄tenuēs admodū obductę mēbranę, cuiq; vna, ſexto ſeptimove à conceptu die procreatur, vt ex Hipp. conſtat lib. de natu. pueri, qui in hunc modū ſcripſit. Qualis autē erat, ego referā, veluti ſi quis ouo crudo externā teſtam circū circa adimat, in interna verō pellicula incluſus liquor pellucēſcat; modus quidem talis erat, & vt abundē dicā, ruber erat liquor, & rotundus: in pellicula verō fibrę quędā albę, & craſſę videbantur cū cruore craſſo, & rubro obuolutę, circum autē pelliculā foris cruenta veſtigia inſtar ſuggillatorū, iuxta mediū verō, tenue quidē inerat, quod mihi vmbilicus eſſe videbatur, & pillud ſanē expirationē extrā, & intrō fecere apparebat. Quę quidem oīa ſex dierū ſpatio fabrefacta eſſe dixerat, licet mihi non diſpliceat. Aui. ſententia Fen. 2. 1. 2. tract. 1. cap. 2. qui tenet naturā minimē poſſe primū delineationis tēpus ſex Solis ortibus tātum perficere, ſed ad ſeptem neceſſariō ſe extendere. Quod probatum etiam reperiēs lib. 1. in ſomnium Scipionis ca. 6. & apud Plin. lib. 7. natur. hiſt. cap. 5. & apud Ariſt. qui numeri ſeptenarij dignitatem exponens, huic operi idoneum eſſe fatentur. Sed Hipp.

*Simul
fieri incō
pium, ob
cor ac co
rebrū vl
timo et ſi
mul per
ficiuntur.*

Hip. hās lites dirimīs lib. de nat. pueri dicens: Fiant verò hæc è dieb. plurib. aut pauciorib. Quā diuersitatem suboriri arbitror ex maioribus, vel minoribus facultatis formatiue virib. His itaq; diebus sortitur hæc substantia rudem, quaudam vitalium principiorum delineationem, itaq; non vt fors tulit, & à casu, vt Democriti ex snia referente Arist. sed miro profectò naturæ ordine, nam cum primum fœtus planta sit, radicationem, hoc est, iecur primò sortiri necessum erat. Verum, quia neq; vita animalis viuere vllō mado poterat, quin præsto illi esset cordis beneficium, per calorem: ob id, vel simul, vel protinus obtinuit cor. Cæterum vt ex toto esset ab iniurijs genitura immunis, prouidit natura vltimò sensus principium, putà cerebrum tribuere, & neruos obscura quadam & confusa delineatione non distinguere quidem & efformare, sed initiari tantummodo, quantum sat esset ad genituræ nomen adipiscendum.

Nam vt constat apud Medicos, iecur primo efformatur, & mox cor, tandem cerebrum, sed hæc est formationis ratio, & ordo, quod à iecoris generatione, cor primo incipit esse, & mox cerebrum. Verum hæc duo membra vni potētiæ animali necessaria sunt: ob id quæ sequitur, simul perfectionē consequutura: falsum. n. est, cor prius q̃ cerebrum formari, quia ociosa esset ipsius formatio, si ambo mēbra vnius potētiæ sunt instrumenta. Et cum fœtus dum format, & in utero est, matris potius q̃ proprio calore viuat, ob id non opus fuit, cor primo viuere, sed prædicto ordine oīa generari. Et licet Hip. refērat lib. de carnib. hæc septem dieb. fieri, hoc tñ verum est, quia nutritionis principium eo loco intelligo vitam appellare: quippe hæc his diebus incipit: quo tpe anima seminis vegetatiua mediante formatiua virtute prædicta opera effingit, & fœtui educit vegetabilem animam de potentia materiæ, ex vi generantis sibi cōmissa, ac p̃cipuis membris efformatis, corruptoq; iam semine, & mutato in eadem membra, sensitiua facultas q̃ eduxit de potentia materiæ, vegetatiuæ opus inceptum, quoad nutritionē, & augmentum perficit: manente virtute formatiua in membris p̃cipuis: saltē formaliter, vt B. Tho. optimè aduertit par. 1. q. 118. ar. 1. ad 4. Caiet. eo loco. Quippe ad corruptionem seminis arbitror eius formatiua corrumpi, saltē mutari in formatiuam alterius potētiæ vegetatiuæ, quæ denuoeducta fuit de potentia materiæ. Neq; obstat contrarium protulisse B. Tho. q. de potentia art. 9. ad 16. nam ea parte refert manere eandem in specie, hic verò corrumpi eo modo, quo dictum est, vt exponit Caietanus loco citato.

Secundū formationis sc̃pus. Mox verò à genituræ formatione, nouem, aut quindecim, vel intermediorū dierum spatio (iuxta maiorem, aut minorem facultatis formatiue, vt dictū est, efficaciam) operante iam vegetatiua ipsius fœturæ, vt explicatum est, nō seminis quia iam corruptum est, & ingenturam mutatum sanguineus succus in carnē conuertitur: nam id tempus conerit in carnificatione incipienda explendaque sanguine prædicta genitura, quo incrementum susceperit: licet perfectionē prædictæ membrorum delineationes, quantum sufficiat, vt nomen fœtus, ac dignitatem obtineat illud, quod antea genitura erat. In quo etiam tempore membra, colores, & mollitiem, duriemq; adipiscuntur, quæ omnia circūscribunt secundum formationis tempus.

Tertium porrò tempus sequitur, in quo tria illa primaq; principia, iecur videlicet

A delictet, cor & cerebrum exquisitè sunt perceptibilia, reliquorum autem membrorum descriptio tantum, ut in secundo tempore dictum est, ut delineatio apparet. Tunc verò evidentior est principiorum formatio: verum enimverò partium ventris obscurior longè his omnibus, brachiorum, & crurum distinctio conspicitur: quod sanè tempus ramificationis appellavit Hip.

*Tertia
forma-
tionis tē
pus.*

Quartū verò, & postremū formationis tempus mox sequitur, quo nō solum interiora mēbra delineata perfectè, ac cōspiciē sunt, sed tunc brachia distinctè absoluteq; cernuntur clariora naturæ opera. Quo tpe non amplius fixum, sed infans, id quod in vtero gestatur Hip. appellavit: tunc. n. & pedibus calcitrare, & veluti perfectum animal moneri incipit: cuius integrā delineationem depingit dicens: Caro aut gescens ab spiritu articulatur, & abit vnumquodq; simile ad simile, densum ad densum, rarum ad rarum, humidum ad humidum, & vnumquodq; ad propriam regionem abit iuxta cognationē ad id, a quo genitum est. Et quæcūq; subdit, à densis genita sunt, densa sunt, & quæcūq; ab humidis humida, & reliqua iuxta eandē rōnem sunt in incremento. Et ossa durescunt à calore congelata, & sanè ramificantur, velut arbor, & tum interna, tum externa corporis adhuc melius articulantur: ipsumq; caput distantia acquirit ab humeris, & brachia, ac cubiti à laterib. & crura inter se distarant, & nervi exiliunt circa naturas articularum, & os per se diducitur, & nasus, & aures eminent in carne, & perforantur, & oculi implentur humore puro, & pudentum cōspiciuntur. Quam siñam ad vnguem transcribere placuit, ut quæ huic vñi cōmodissima mihi visa fuit. Sed supersedendum mihi est hac in parte à disputatione de primæva membrorum principalium generatione, q̄ proprium hac in parte non obtineat locum, & ei sint satis quæ hucusq; diximus. Ad institutū igitur rediens totum formationis tēpus hac lege partiti oportet. Sic. n. Soles spumificationi dicere actores constat, quatuor lineationi, octo lineationis repletioni, quatuor, & decem carnificationi, terdecim efformationi quoq; attribuit. Quibus proculdubio quadraginta quinque dierum numeris constat, quē esse maiorem formationis terminum oēs ferè asseuerant, sicut minore triginta dierum, vel triginta quinque spatio constare: quoniā Soles sex spumificationis, duo lineationis, quatuor lineationis repletionis, nouē carnificationis, totidē formationis sunt, neq; his pauciores esse possunt. Quod quidem cōputationis genus de maris generatione subaudiendum est: secus quidem res se habet de fœminæ cōceptu, & formatione: quippe q̄ longioribus temporum impendijs absoluitur. Decē nanq; dierum spatium (licet non desint qui pauciorib. formari referant) ultra masculi spatia ad sui efformationem expostulant. Verum cum in lucē prodierit fœmina, ocyus, q̄ mas accrescit, & ætate floret, ac viget, demūq; senescit ob materiæ fluiditatem, & caloris inopiam, q̄ Hip. dixerat li. 2. pop. par. 3. tex. 29. dicēs: Quod citius discretum, & motum est, augetur rursus sanguis in longius tempus. Itaq; mas intra triginta quinque dierum spatium, & fœmina quadraginta quinque ad summum efformat, & anima rationali informari certum est. Quò autem termino præfinito, vegetatiua incipiat operari omnino ignoro. Vnum hoc certo & circa vllam dubitationem scio vegetatiuam, & formatiuam potentia seminis eo vsq; durare, quo vsq; semē corrumpatur, & fœtus mēbra degeneret, ut antea dictū est: tunc. n. vegetatiua ipsius fœtus opus excipit, & nutritionē, ac augmē-

*Quarta
forma-
tionis tē
pus.*

to,

to, & perfectione factum distinguit. Quo tempore factis iam instrumentis, & organis conspicuis, suspicor sentientē animā educi de potentia, materia: quae ulterius fetus perficit disponitq; ad praestantiorē formam, & fetus sic efformato & constituto rationalē animā aduenire, q̄ alijs formis corruptis earū vires hēt ac exequitur, quod monstrant dictis terminis infantium motus. 35. nimirū aut 45. vt dictum est. Quo tempore est arbitrādum animam rationalem introduci, vt quae perfectissimam praerequirat organizationem, quam ante id tempus nō potuit natura perficere, etiam si sensitiua fetus anima praefuerit: nam ad eius introductionē non opus erat tanta organizatione, vt q̄ imperfecta esset forma, & solum se haberet velut via ad maiorem perfectionem. Quae omnia si exactē expendisti, monstrabunt faciliē qua prouidentia te vti oporteat, vt quantum fieri possit cures feminam vtero gerere: & pro defectu cuiusq; eorum, quae ad conceptum necessaria esse diximus, prudenti consilio prouidebis, quae ad supplementum opus esse cognoueris.

Ne videar aliquid eorum, quae nonnulli ex autoribus proferunt huic operi utilia, praetermisisse, licet mihi non plurimum ardeant: meminero quorundā eorum, quae referunt proficere ad masculi, vel feminae generationē, nā id quoq; parentes plerunq; desiderant. In qua quidē re nonnihil mihi prius immorandum est, nimirū quantum sat sit, vt constet, quae sit potissima masculorum, aut feminarū ratio. Cuius rei nō leuis est apud Arist. lib. 4. de gener. anim. c. 1. disceptatio. Sunt etenim, qui in seminibus hanc esse contrarietate dicunt: semē nanque, qd a parte dextra excernitur mare gignere, si praevalet ei, qd a sinistra: & contrariū accidere, si femina gigni dēt. Et ob id profecto, qui masculos generare student, sinistrū testē lignant. Sunt & alij, qui masculos fieri asserunt ex praedominio seminis masculini, & feminas ex praedominio seminis feminei: itaq; pro exuperatis seminis uictoria masculū, aut feminā generari referunt. Alij verō uniuersam huius rei rationē reiecerunt non solū in seminis praedominium, sed in efficaciam quoq; & praedominium partium, quibus mas, & femina differunt. Gal. aut lib. de sem. huius rei causam esse censet seminis caliditate, aut frigiditate: quippe existimat partes genitales uiri a genitalibus feminæ: solū loco differre, idq; calore fieri, qui foras trudit genitalia uiri, cuius defectu in feminis intus recondita manet: & sic praualente frigido temperamento feminas, & praedominante calido, masculos fieri. Nec desunt, qui arbitrentur, id esse reuerendum in uterum ipsum, qd duobus modis posse accidere censent: primo, ob uniuersam vteri temperiem, quae si calida fuerit, masculos; si uerō frigida feminas generare nata est: secundo uerō (cuius opinionis creditor fuisse Hip.) ob situm uteri, inque incumbit semen: iudicant. n. in latere dextro uteri mares, & in sinistro feminas fieri. Sed Arist. locū aliter proferre vī loco nuper citato, causam huius rei ad actionē, & passionē referens. Cum. n. (inquit) principium non superat, neq; cōcoquere pōt propter caloris inopiā, nec ducit in suā formā, sed tantisper superatur: mutari in contrarium necesse est: contrarium autē mari femina est, nimirū, quo alterū mas, alterū femina est. Hec sanē sunt antiquorū sententiae, quas breuissimis rationibus refellere non erit ab re, et si crediderim aliquid uerum obtinere, ut inferius referā. Sic profecto ijs, qui ex testium diuersitate, id referunt fieri, cōtradicit experimētū: nanq; non minus nisi sunt, qui dextro teste carent filios generare, q̄ reliqui.

At

A Atqui, exuperante alio semine masculinum, aut feminam fieri pro exuperatis natura referunt, tenentur asserere feminam matri non solum in sexu esse similem, sed in omnibus alijs, siquidem semen matris vincere dictum est: contrarium tamen frequenter reperitur, nimirum, filiam patri esse similem, ergo alia est constitutenda causa. Qui verò ob seminis partem venientem à pudendis id fieri referunt, intelligant semen non ab omnibus actualiter semen factum, sed à testibus tantum & valis spermaticis provenire: unde non militat eorum ratio. Gal. autè rectius sentit tribuens uniuersam rei rationem caloris: sed credendum non est, differentiam sexus ex solo calore fieri: nam potissima differentiarum ratio non situ solum, sed in figura consistit, quæ proprius, quæ situs, sexum distinguit. Præterquod credere intus esse conditos uteros mulierum ob debilitatem caloris rationi consonum non est; cur. n. vesica, & aliarum internarum partes in viris pariter, ac pudenda non prominent? Pertinet igitur sexus differentia ad formatricem facultatem, non ad calorem. At si conformatio præcipuam ostendit differentiam, constat, conformationem longè fore diuersam. Sunt. n. concauæ partes mulierum (& utero abundat, quo viri carent) solida verò virorum: conformatio autè, in qua spectamus figuram concauitatem, asperitatem, & lenitatem partium, numerum, magnitudinem, situm, & connexionem: formatricis facultatis, non caloris solum sunt opera. Verum, qui ad uteri caliditatem referunt, siue in toto, siue in dextra sit, videtur recedere à principijs, quæ alioqui ipsi concedere tenentur, nempe, id opus pertinere ad eandem potentiam, cui conformatio omnis factus incumbit: sed huiusmodi potentia adest in semine, ergo ad ipsum, & non ad utrum, pertinebit conformatio illa, quæ sexum distinguit. Præterquod, quod non ita distincta est sinus dextri, aut sinistri natura, ut tam longissima differentia dissideant. Arist. verò demonstratio non omnino euidentis est: nam conformatio diuersa partium diuersi situs connexiones differentes fieri quidem non possunt, eo quod materia resistat agenti, & se planè vinci non patiatur: requirunt etenim hæc omnia alicuius agentis vim, qua possit sibi assimilare, & formare in suam naturam id, quod paritur. Ego tamen bona venia tantorum virorum arbitror differentiam sexuum fieri potissimum, & maxime caliditatem, & coctionem perfectiorem, aut deteriorem. Nam constat euidenter utrumque semine pariter in se habere vim, & efficaciam gignendi hominem, quoniam in semine est solum potentia, & facultas ad organizationem formæ hominis, cuius mas & femina æqualiter sunt participes. non est autem in semine potentia ad formam feminæ potius, quam maris, quoniam mas, & femina forma non differunt, sed solo sexu: in quo cognoscitur perfectio maior, & minor iuxta maiorem, aut minorem calorem ad opera perficienda: mas. n. feminas perfectior, & calidior est, & ob id a calidioribus, & perfectioribus principijs debet gigni. Et cum perfectio hæc non possit sumi, à substantiali forma, necesse est, ut sumatur ab accidentali forma, nempe, à primis qualitatibus, quibus illa utitur tanquam instrumentis ad naturæ opera efformanda: sic. n. vir calidior, ut plurimum existit: nam sunt inter feminas quæ multis viris calidiores existant, quas non arbitramur calidas extitisse post generationem, & ipsa genitalia habuisse viro frigidiora, & ob id non euasisse virum, ut aliqui censerent, sed quia id vetuit materiæ soliditas, & densitas, licet tamen caloris obtinuerit, quoniam viri, & hæc est questionis huius solutio. Ad pensum igitur rediens sit sanè, ut natura, quæ eadem est in semine ob diuersa instrumenta, seruata eadem forma totius, diuersum sexum efficiat. Itaque, semine

ca-

calidius optimeq; concoctum, mares gignit: quod uerò frigidius est, & malè è laboratum, vel gignere non valet, vel fœminam procreat. Quam equidè varietatem ostendunt, quæ in generatione accidunt: quippe ij, qui frequenter coeunt, aut vesperi, aut vino, & crapulæ sunt dediti, aut studiis animi incumbunt, aut seniores, vel iuniores existunt, tandem utcumque sint affecti, ut probè semen non concoquant, illi fœminas procreare solent, masculos uerò, qui coctionem perficiunt. Quibus exactè pensatis, licet antiquorum sententiæ, quas refutauimus, omnino veræ non sint, nihilominus in non temerè creditur conferre semē, quod emittura est, à teste dextro, ut qui calidior sit, & aptior ad perfectius semen efficiendum. Quæ est ratio ad masculorum generationem coadiuuat aliquid menstrui sanguinis, & uteri caliditas maximè dextræ eius partis, ut Hip. docuisse diximus, & maximè lib. 2. pop. p. 6. tex. 2. i. dicente, Circa naturam plurimam vim habet mamma dextra, & oculus dexter, & qui in fra sunt: nam & mares dextris partibus hærent: quæ omnia veluti concauæ sunt adiuuantes seminis utriusq; colorem, & optimam elaborationem, in quibus sitam esse arbitramur quodam modo masculorum generationē. Ob hanc igitur rationem dixit Gal. 2. art. med. B
Temperatura uerò testiculorum calida quidem ad uenerē procliuis, & masculorum generatrix, & fœcunda. Ex quibus euidenter constat ad masculi generationem duo concurrere, locum nimirum in dextris, & fœminæ in sinistris: secundum uerò ut semen calidum validiusq; tam maris, quàm fœminæ prædominetur: in utroq; enim parente calidum semen masculum est, & masculos gignit: imbecillum uerò, & frigidum in utroq; fœminas, ut ex Hip. constare videtur lib. de genitura. Quum ergo genitura sit calidior, & siccior, quod ad spiritum, qui format atinet, seu sanguis ille postmodum mensruus calidus sit (quod melius esset) siue frigidus, parum interest: nā pœonia mascula in frigida terra, pœoniā masculā generauit, sed in ualidam: & pari prorsus modo pœonia fœmina in calida terra fœminam. Quamobrem nullam aliam viam ad masculorum generationem certiorē esse arbitror, quàm eam, quæ hanc euocat in semine conditionem. Cui vsui expedit, ut vir ex longissimis coeat interuallis, victu utatur, plurimo, & qui robur, & calorē augere possit, & vino aromatico, ac potēti utat, tādē iis, quæ superius diximus impotentia prodesse. Cui rei fertur ex vsu esse cubare fœminam, dum viro accedit supra latus dextrum, ut deciso ibidem semine, aptius ad masculos generandos fiat. Fœmina item calidioribus utatur cibis, & sit exercitiis dedita, non utatur iis, quæ semen refrigerant: nam utrunq; semen calidum esse oportet. Verum ad fœminæ generationem vir, & fœmina temperatioribus, aut paulo temperato frigidioribus utantur. At ne videar silentio celare quæ alicui prodesse possunt, referam quæ apud grauissimos autores de mercuriali herba ad masculorum, vel fœminarum generationem legi. Hæc itaq; planta in marem, ac fœminam distinguitur: hæc candidiora, illa nigriora habens folia. De quibus sanè mirum est, quod proditur, marem scilicet facere, ut mares gignantur, fœminam uerò, ut fœminæ: sed id contingere, si à conceptu succus statim bibatur in passo, edanturq; folia ex oleo, & sale decocta, uel cruda ex aceto. Sed uerendum quidem est, ne fœturam projiciat vis harum herbarum purgatiua. Quamobrem placet magis Dioscor. sententia, qui, licet in ea re astipulatur Plinio, nihilominus tamen consulit succum iam dictum bibendū esse à mēstrua purgatione.

A tione, & trita folia genitalibus adhibenda. Experientia addidit oportere altero à purgatione die dare mulieribus per triduum, & quarto die à balneo viris accedere. Quam sententiam Hip. antea protulerat.

Quàm cautè, & prudenter pronuntiandum sit feminā concepisse, norūt oēs qui ignoratione, vel audacia decepti infamia periclitauerunt: quod turpissimū esse cenſeo, nā pronuntiato ſemel conceptu, quid vilius, aut turpins accidere potuit, q̄ mox, aut menſes profluere, aut flatu excreto ventrem ſubſidere, qđ multis viris et doctis eueniſſe legimus, & experimento didicimus. Sunt etenim inchoati hoīes notæ fallaciſſimæ, & quibus minus credendum eſt, q̄ oēs ſimiles exiſtante iſ, que apparent menſtruis deficientibus. Igitur ſi noſcere libuerit, cōceperit ne mulier, cuncta diligenter obſeruare oportet, in viro quidē ſi pudēdo diſcedat à coitu nimis exucato, præſertim ſi ſuctionis ſenſum perceperit. In femina verò ſi nihil aut parum ſeminis defluxerit, maximè ſi gratiſſimā cōſecuta ſit delectationem: tandē deinceps ipſa accedit inſolita pigritia, dolorq; inter vmbilicum & femorā: item paruus quidam horror ſeſe vtero colligente, & ſeminis nouitatē alterato. Præterea ſi femina à conceptu decimo Sole, aut maturius vel ſerius ex ſuperuacua materia tentatur capitis dolorib. & inquietudine infeſta, id ē cognosces ſi caliginofa vertigine oculorum acies hebetet, ſi pupillæ imminuant, ſi candida particula amplior fiat, ſi flauſcat, ſi eiſdē uenulæ cruore turgeant, ſi cauent oculi, ſi palpebræ molliant, & ob id eiſ aſpectus grauior magis reddat, ſi pannus ruſq; lenticulæ earum faciem defoment, ſi uenę inter oculorum angulos, & nares hæc conſpiciant magis appareant. Quippe ex oculis Hip. id quoq; rimari docet dicens: Mulierem gravidā ſi aliter non cognoscas, oculi tibi demonſtrabunt: nam retracti & caui magis ſunt liuidiſq; eorū albū eſt. Item ſi ſub lingua uena uiſcat, ſi ceruix calidior, tergus algidius, ſi colli uenæ arteriæq; extendant, pectoris uenæ liueſcant, nigreſcantve, aut alio calore ſedent, ſi mamma obdureſcant, extuberent, prædoleant, & caput doleat, aut antiquæ capitis affectiones exacerbentur iuxta Hip. decretum, lib. 2. pop. par. 3. tex. 3. 2. dicentes: Cibis, & potionibus humorem, ac mamma inflantur, & eorū quæ ſunt in capite inſirmitates, & inflationes incrementa recipiunt, ſi papillarum color in rubeum demutetur, ſi potus quiuiſ in mammas recto tramite frigiditasve, vel calor ſentiat. Inſuper ſi in cibis faſtidium, ſi malacia apprehendat: quæ ſit, ubi quicquam guſtare improbè appetat, aut enormiū appetitus varijs allurgant, citoq; commutentur: ſi cibi appetitus auferatur, ſi ventriculi redūdantiam ſuccorum pariter, atq; cibariſ vomitiones acciderint, ſi acidè ruſcant, ſi dūm biberit, languida fiat mulier, flacceſcatq; ſi cordis pulſus perturbetur, ſi lætetur, triſteturve ocyſſimè, ſi tormina aluū vmbili cunq; præcipue fatigent, ſi renum, & coxendicum grauitas uexet, ſi uenter, illa potiſſimū intumuerint, ſi inguina perſenſilcat, contorqueanturq; ea parte, ſi coitū renuerit, vel ſi ſolito accidentius cōcupierit, ſi vteri os arctiſſimè cōiuerit, molleq; & naturale cū hoc extiterit, ſi menſibus p ſtatas perhiodos priuetur, ſi etiam nunc dolores, tumores, extuberationeſq; carnis in cruribus ſuccreſcant, ſi corpus uniuerſum grauetur. Atq; præter hæc oīa ſi pulſus protinus à principio vehemens, & magnus, procedente verò tēpore paruus, & velox perſtet. Ex urina verò licet

inger-

incertum in hac re praestet iudicium, aliquñ tñ certi aliquid elicere possumus, vt **A**
 si subalbida sit, clara, nubilofo rore supernatante, ac stellati lapidis colorẽ præ
 se ferente, maxime atomis ipsam variegantibus. Itẽ si à conceptu primò mense
 ima sui parte candicantia corpuscula, ad farinae crassioris specimẽ subsideant, q̃
 cõnnota carminati fili effigiẽ repræsentat. Præterea si accedente adhuc tpe flaua,
 deinde rubra, puniceave, postremo atra nubecula parta superna rubore suffusa
 euadat: si quocunq; tpe subsidentia tenuis, dissecta, carminato gossypio perquã
 similis in ea ipsa congeratur. Idem quoq; iudicium elicies Hipp. & aliorũ viro-
 rum, qui docti sint, experimentis factis, nimirum si venter torqueatur ex mul-
 so epoto. Alia tamen, quæ passim ab Hip. scribuntur, breuitatis causa prætermi-
 to studens masculi fœminave conceptus signa aliquot scribere.

Huic sanè rei nõ parũ conducit, nouella ne sit fœmina, an senescens, vel etate
 florens nollẽ, qñquidẽ hæ mares, illæ maxima ex parte fœmellas procreant ob
 calorẽ vegetiorẽ, aut magis deiectum. Ventorum cõsideratio huic rei plurimũ
 quoq; conducit, siquidẽ aquilonares ventos magis generare mares cõperimus. **B**
 Item scripsit Hip. 5. apho. 40. Mulier si marẽ concepit, bene colorata est, si fœmi-
 nã, malè colorata. Libro ẽt de steril. inquit; Quæcunque in vtero habentes, ma-
 culã habent solarem in facie, fœmellam gestant; quæcunq; verò bene coloratæ
 pmanent, masculum plerunq; item si papillæ sursum conuersæ fuerint, mascu-
 lum gestat. Idẽ iudicium pstat si lac contempleris super folia emunctum: nam si
 condensatur, masculum gestat, sin aut diffunditur, fœmellã. Præterea si pastillos
 formaueris cum farina ex eodem lacte, ac lento igne cõmiseris, si fundat pastil-
 lus, fœmellæ est signum, sin aliter masculi. Id quoq; monstrat tumor in dextra
 ventris parte, & sensus motus ab eadem, sicut in sinistra fœminã: Sic ex Auic. mẽ
 te. 2. 1. 3. tract. 2. c. 13. pulsus dexter ex masculo maior, ac si fœmina assurgit, ma-
 num primò portigit dextrã, pedemq; dextrum præponit: mamma item dextra
 maior & durior, oculus quoq; dexter maior: contra autem in fœminis. Hęc et-
 enim scripta sunt, nequid huic tractationi deesse videatur, quæ cautè, & nõ, nisi
 sub dubio pronuntiare tenetur petitus, & cordatus medicus, aut maxima dilige-
 tia omnia intueri, neri sum aliquando temeraria pronuntiatione moueat. **C**

De su-
perfoeta-
tione.

Dictũ proculdubio hucusq; est, quanã rõne infans in vtero generet, mirabi-
 le quidẽ opus. Verum non minus admiratione dignum est vtero clauso existen-
 te, formatoq; iã fœtu, alterum posse denuò generari, quod opus superfœtationẽ
 medici appellant. Quippe verò gerentes superfœtare, neq; fabulosum, neq; no-
 uum est: quoniam oĩum maxime animalium mulier, & equa grauida initũ no-
 uere. Cetera (vt pote quorum natura, more leporis, superfœtare recuset) vbi gra-
 uida extiterint, mares contemnunt. At mulierem superfœtare certum & euidẽs
 est. Sed superfœtationem esse in duplici differentia euidenter constat: alteram
 quidem improprie, qñ plures fœtus vno concubitu generantur, quos gemellos
 vulgari nomine appellant: alteram quidem cum vno conceptu iam facto, secũ-
 dus proximè secutus denuò nouam domum sibi parat. Nec desunt qui tertium
 & fortasse plures admittat: qbus accidit alia differentia ex tpe noui conceptus
 desumpta: nã sunt qui longioribus tempotum impendijs, post concepti sunt ni-
 hil quicquã proficere valentes: sed dolorem, quo & ipsi, & primus partus inte-
 reat

- A** reat prematurus concinant. At verò si a primò conceptu secundus proximè secutus sit, paululumq; temporis inter eos intercesserit, quod superfœtari, absolui ediq; potest. Sunt & fœmina, quæ tertium superfœtatunt: verum dum iustū pariendi tempus instaret, primos vitales edidit: secundum, qui obiter diem suū obierat, mense quinto elisit. Altera rursus inuenta est fœmina, quæ cum primū vitalem mense septimo peperisset, mox geminos iusto mensium numero vitæ compotes exina est. Neq; desunt quæ octauo mense concubuerint, & partus mureore plenos ediderint. Sed in hac re illud summo opere difficillimum vī, nimirum, si carylidones, & vasa omnia primi fœtus corio, & inuolucro ita adherēt, vt ob id menstrui sanguinis nihil profluere possit, ac si profluat, quia vincula, & vasa dirupta esse monstrat, abortus periculū prælagiunt, qui fieri pōt, qd denuò fœtura fiat: si nec sint vasa, quibus nouum corium generari possit, nec per quæ alimentum nouo fœtui natura præstet. Cui dubitationi respondendum est, id perpetuo sagacissimam naturam cauere, ne omnia vasa in vnius fœtus nutritio ne dispendat, sed aliqua vel ad mensium purgationem, si fortè redundauerit sanguis, ne fœtura abundantia suffocetur, adseruat, vt in quibusdam, fœminis vterogredientibus, & menstruis adhuc fluentibus experimento comperimus: vel ad nouos conceptus alendos, si fortè fœmina concubat, & seminis aliquid vterus suscipi. Ex quo per prædicta vasa, quæ vacua huic vsui, & otiosa melioris gratia reliquit natura, nouum artificium prædicto simile, superfœtationem videlicet vnam, aut plures fabrefacit natura non raro.

De monstruoso conceptu.

Cap. 6.



- V**M fœminis haud rarò accidisse constat monstrosos peperisse fœtus, quoddam profectò miseræ genus) ob id qualem affectum in huius opere natura patiatur, expendendum est, vt quū fieri possit a diuta naturalis conceptus, & partus, ac parentibus similes efformet. Mōstri igitur conceptum semper esse præter naturæ institutum, & rationē euidenter constat: ob id iure optimo quid naturale, quidve præter naturam insit conceptibus considerandū est.
- C**onstat quippe dictum esse Arist. 2. phys. naturam esse materiam vel formam, hancq; vocadam esse magis naturam: & rursus subdit, illa habere naturam, quæ huiusmodi habent principium: & ea ē secundum naturam esse, & appellari quæcunq; his insunt secundum se. Hoc. n. (inquit) natura est, neq; naturam habet. Ex quibus sumpto principio sic formo rationem. Si natura est forma, & materia, sequitur illa maximè esse secundum naturam, quæ ab utroq; principio sibi ratione specie necessario proueniunt. Mox ab his secundum ordinem constituunt, quæ solum ab vna suæ speciei natura fiunt: & quā forma est magis natura, q̄ materia, ideo in quibus forma suæ speciei seruat, & formæ vis, illa magis secundum naturam existere censemus, q̄ alia, in quibus forma vel penitus est deperdita, vel obscure operatur, propria in materia remanet. Ea verò, in quibus neq; forma, neq; materia suæ speciei seruat, nullo pacto, profectò secundum naturā vocari possunt. Atq; vt illa prima, in quibus formæ, & materiæ rō adseruat, planè secundum naturam sunt: ita hæc postrema toto genere esse præter naturā certum

E b est:

est: media verò inter hæc extrema non facile constat, an prorsus sint secūdū, vel pter naturā. Ex quibus patet, animalia & eorum partes in humanis cōceptibus optimè esse & appellari pter naturā: at lapidis in uesica, uel renib. ac lumbricorū generatio toto genere esse pter naturā dubitauit nemo, id ē Gal. asserēte. Verum mōstra, ut ex Arist. constat 4. de gen. anim. c. 4. pter naturā quoq; sunt, sed partim quodammodo secundum naturā: nā in illis eadē met materia adseruari solet, naturalis tñ forma mutari, veluti in vteri mola a Medicis appellata, euidēter monstratur. Cum hoc tñ in rigore philosophico illud ē, quod habet aliqd secundum naturā, monstruosum, & pter naturā appellamus; siquidē degenerare constat a generantis natura. Ceterum monstra, ea propriè erunt, q̄ contra naturam fiunt, neq; solum monstra, ea dici merentur, quæ diversorum animalium speciem ex parte, aut ex toto referunt, sed ea ē, quæ formā prodeunt multi mēbri, multi nimirum pedib. aut capitib. ut ex Arist. euidenter constat li. 4. de gen. ani. c. 3. Itaq; rationes monstrorum, & oblesorum animalium propriæ, & similes inter se quodammodo non sunt, monstrum. n. esse, oblesio quādā est, deesse ēt facti quicq̄ aut superesse monstruosum est: Verum tñ monstri rōnem tradit idē B autor lib. eod. c. 5. dicens: Cum ita feminis genitalis, & naturæ in efformando factu motus soluantur, & inordinantur, & eo vsq; procedendo a semetipso degenerent, ut deum ne homo quidem, sed animal tantum aliquod existat, huiusmodi quæ gignuntur, monstra appellari meritò solent. Neq; n. quod genitū est, generanti vīpiam simile euadit, sed extraneum maximè & alienum, & quæ superest materia a semine, & vi formatiua non superatur, homo quidem ex homine eo non nascetur, sed tantum animal, quod uniuersale seruetur in generatione, pereat autem quod singulare, & indiuiduum est.

De mon
stri seu
prodigio
si conce-
ptus dis-
ferentis

Sunt proculdubio tā prodigiosi cōceptus, tantaq; in his uarietate natura ludit, ut difficulter possis eos numerare. Nā primo ferunt non solum geminos ter nosve, sed numerosa sobole posse una factura fieri conceptus, q̄ licet forma, & natura totali genitorib. existant similes, numero tñ & naturæ ordine, ac instituto dissident. Idē alios producit natura, quibus gemina habere genitalia cōcessit, hermaphroditos appellant, olim androgynos vocatos: sexus vtriusq; inter se vīcibus coeuntibus: nā mamā dextrā uiri, in mulieris dextra generari multis est cōperum. Itē duplici genitali nōnulli visi sunt: sic & frequentius supracaneis partib. p̄ditos plerosq; uidimus. Hinc nonnullos geminato capite, cruribusq; geminatis corpore ferè toto geminato esse, nec fabulosū ēst, siqdē semel duos tergoribus iunctos, immo potius terгоре uno p̄ duob. corporib. fuisse perfungentes traditū est. Qui ēt nunc uiginū annorum tractu motibus plurimum differentes uixerunt, quorum alter cum mortem obiret, alter tandiu superstes fuit, donec iā emoriui germani corruptione, putrilagineve, ac graeolentia discesserit. Præterea aliqñ euenit, partem aliq̄ aliis esse iusto maiore & deformiorem, ut digitus, aut manus, aut caput, vel plures q̄ par sit euadant, & rursus, uel minores uel pauciores, q̄ hominis naturæ conueniant. Atq; ita in his naturam ludere cōspicimus, & uarietate luxuriari, ut ad deformiores alios conceptus sese quoque ueluti delirans irruat. Nam ferunt castro diui Amandi Alliferi in solo Borbonico, ex iuuenula quadā natum puerum ab umbilico supra hominis figuram referentē, infra verò Syrenæ modo in pedem minicum desinebat. Itē fertur fœminam

A minā sine brachijs nati, q̄ pedibus ad nondū, & suendum loco manuū utebat̃. Refert quoq; Di. li. 6. c. 39. in orientis parte intima gentes esse sine marib. alias superiori labro orbatas, ac nonnullis sine linguis. Quidam & Pigmeorum gentes prodiderunt ante paludes, ex quibus Nilus oritur Nomades cynocephalorū lacte viuentes. Verū ex integro naturę errore horrenda interdum videre est animalium fragmenta. Puerum. n. ortum capite arietis, & alium capite bonis accepit Arist. & ouē bouis capite natā. Alcipem ēt feminam elephantum peperisse fertur. Ancilla itē cuiusdam, q̄ serpentem peperit indubitatum exemplum est, quale in vrbia extitisse Lucanus elegit inter præcinit. Matrem, q̄ suus conterruit infans, fertur repetam esse. Hippocentaurum quoque in Thessalia ē muliere natum Claudus Cæsar non dubitauit. Dimitto quidem plura alia exempla, ne alicui tedio esse possim, & vt ad horum omnium differentias deueniam.

B Ex ijs, q̄ diximus constat quinq; repetiri monstrorum genera: primū, qd v̄ quodammodo secundum naturā existere, cōprehendens oēs nationes, quæ defectu aliquo insigniuntur. Ferunt etenim quosdam vnico in media fronte oculo insignes esse: alios in humeris oculos habere, quippe quibus ceruix minimē sit: itē alios in montis Amiai conualle siluestres pone crura plantis auertis; alios quoq; sine ore, corpore uniuerso hitutos, halitu & spiramentis naso tractis viuentes. Sic Sciapodes reperiuntur, hoc est, qui se vmbra pedibus facta tegunt. Alios geminas in singulis oculis pupillas habentes, visu quos irati intuenē intimentes: aliosq; eiusdē naturę cōplures, quos monströse à cōi hominū generis figura esse formatos dubitauit nullus. Secundum genus monstrorum ex his est, quorum corpora magnitudine, aut paruitate à natua hominum cōmoderatione deficiunt, vt pumiliones, vel gigantes. Tertium verò ea continet corpora, quibus aliquod mēbrum deest, vel superabundat, quod sanē complectitur her maphroditos, vel ea corpora, q̄ plures digitos manuum, vel pedum, aut plura brachia, vel crura, aut capita habent, vel ex necessariis defecta existunt. Quartū quidē ea monstra cōplectitur, q̄ partim humano corpore fruuntur, aliqua tñ particula, aut pluribus bruti alicuius speciem refert. Quintum autē & vltimum eorum est corporum, quæ bruti alicuius animalis ex toto, vel plurium mixtim speciem, ac figuram representant, quorum omnium causas iam audies.

C Ad verā causarum monstri indagationem prius operæpretium duxi docere vniuersam rōnem monstri pendere ex defectu similitudinis natorum ad parentes, q̄ a forma, & a materia proficisci ex Arist. mente antea retulimus. Verū circa primam naturę partē, vt constat ex B. Th. 1. p. q. 4. ar. 3. Cum similitudo attendat̃ secundum conuenientiam, vel cōicationem in forma, multiplex subinde erit similitudo, secundum multos modos cōicandi in forma. Quædam. n. dicuntur similia, quæ communicant in eadem forma secundum eandem rationem, & secundum eundem modum, & hæc non solum dicuntur similia, sed æqualia in similitudine, sicut duo æqualiter alba. Alio modo dicuntur similia, quæ cōicāt in eadem forma secundum eandem rōnem, & non secundum eundem modū, sed secundum magis, & minus, vt magis album, & minus albū. Tertio modo dicuntur similia ea, quæ cōicant in eadem forma, sed non secundum eandem rationem, vt patet in agentibus non vniuocis. Cum. n. omne agens agat sibi simile in quantum est agens, agit autem vnumquodque secundum suam formam,

Bb 2 neces-

*De mon
strorum
causis.*

necesse est, quod in effectu sit similitudo formae agentis. Si ergo agens sit contē-
 tum in eadem specie cum suo effectu, erit similitudo inter faciens, & factum in
 forma secundum eandem rationem speciei. Si autem agens non sit contentum
 in eadem specie, erit similitudo, sed non secundum eandem rationem speciei,
 velut ea, quae generantur virtute Solis, accedunt quidem ad aliquam similitudi-
 nem Solis, non tamen ut respiciant formam Solis: nisi secundum similitudinē
 generis, & non speciei. Præterea dum agens est contentum in eadem specie cū
 suo genito, tres similitudinis naturarum ad parentes species apud peritiores vi-
 ros scriptas reperio. Prima quidem est in specie: secunda in sexu: tertia verò, &
 vltima in proprietatibus individualibus. Sed anteq̃ vltimā progrediar, dubitādi
 rō sese offert circa similitudinem in specie, qua homo hominem generare nititur,
 videlicet quam rōne formativa facultas, cum de genere sit naturalis potētiae,
 disponere possit materiam sibi subiectam ad suscipiendam sensitiuam formam,
 cum agens nullum vltra suam perfectionem agere quicq̃ possit: eò maxime cū
 eiusdem fortis instrumenta obineat, temperamentum nimirum, calorem, & spi-
 ritum. Quo fit profectò, ut difficile videatur eandem posse his instrumentis or-
 ganicum constitinere corpus: cui si accedat secūda dubitatio de similitudine in
 particularibus cōditionibus, difficilius reddet dubium. Sed huius rei gratia in
 memoriam reuocare oportet illud Arist. 2. de ani. c. 1. nempe, ipsam esse actum
 corporis physici organici. Quod fit, ut potentia inferior aliq̃ teneatur organiza-
 tionem instituere, & parare iuxta naturā formae introducendae, cuius naturam
 sapiunt potētiae oēs, quae cum instrumenta sint agentis principalis, ab illò mo-
 ventur ad actiones, & fines sibi necessarios: ob id profectò naturales potētiae
 habent intuitum à forma superiore perficiente inferiorum actiones, & ideo
 videntur aliquo mō vltra suam naturam agere: haud secus q̃ rude instrumentū in
 peritissimi artificis manibus. Quamobrem in hōi actionibus talis ingentura
 pullulat de lineatio, & figura, qualis fuerit editio, & natura agentis principalis
 ris, à quo mouetur: & ob id mirum non est, vegetabilem potētiam corporis or-
 ganici effingere adiuta, & ducta altioris potētiae vi, & efficacia: quam sanē
 efficaciam inceptam, ac receptam in semine, perficit, & adiuvat feminarum v-
 terus, cui ē efformandi vim auctores nō contēnendi praebeuit, & semen eius-
 dem cui ē assistit feminae forma. nam per difficile esset credere solam illā vim
 à generatōe transmissam semini virili posse formam formare in concursu vteri,
 & seminis feminei vis. Ex quo quidem difficile videri non debet primā simili-
 tudinis differētiā, quā in specie sitam esse diximus, proficisci ex facultatibus in-
 ferioribus corporis organica harmonia disponētibus ad introductionē formae
 rōnalis, q̃ speciei, & substantiam rei genitae constituit, similem quidem parenti-
 bus in specie, licet parentes hanc formā non p̃stiterint, sed dispositum corpus,
 hoc est, semen formativa facultate donatū, q̃ postea in vtero organizationi in-
 cumbit. Difficiliore aut dubitationem constituit similitudo, q̃ sita est in indi-
 dualibus cōditionibus, & cuiusq̃ rei proprietatibus. Quam sanē similitudinē
 sitā esse in facultate quoq̃ formativa individuali, non quidē specifica, ut in pri-
 ma similitudine, suspiciuntur. Ad cuius dubij intellectum expendisse oportet ad
 cunctarum rerū generationem, ut auctores nō contēnendi arbitrantur, hu-
 ius facultatis feminaria plurima expandi per continentē aerē à caelo gignenda
 plan-

A plantas, & animalcula quædam: tñ hæc manent actus non contractus ad naturam indiuidui per signatam materiam: ob idq; non adseruat indiuidualem similitudinem: & cum non sit per proprietates propriæ materiæ coercitus, producit semper sibi simile in specie, non tñ sibi simile indiuiduo. Verum informatrix animatorum in semine facultas, cum sit per signatam materiã contracta, ab illa recipit, vt producat speciem similem, respondentem tñ certis et definitisq; affectibus eius indiuidui, vnde decisa est. Cum. n. informatrix sit vis corporea residua in parentum membris, & sui similitudinem semen inducat, quia facultates has potius ex subiecto, & materia, cui inhaerent, diuersas esse credendum est, q̃ ex propria natura, si quidem potentiæ per materiam indiuiduatur, ob id hanc peculiarem similitudinem non à facultatis formatiue diuersa ratione solũ (licet eam consciam eius similitudinis esse oporteat) sed ad materiam seu instrumentum, et quo vitur, & cui veluti subiecto alligatur, referendam esse proculdubio arbitror. Subiectum aut, cui formatiua hæc facultas inest, tñ esse censeo spiritus, & temperamentum illius seminalis substantiæ, cui inhaeret, vt semen illud in aliud transmissum simile ei, à quo decedit, generare possit. Sed explicare nũc incumbit, quas habeant tẽperamentũ, spiritus, & semen conditiones, quasve vires, vt tam grande possit eis vtens formatiua vis effingere opus, quale est nõ solum organizationem absolute efformare, sed cum hoc ad materias has sese contrahere, ac determinari ad indiuiduales conditiones. Quas proculdubio existimamus fortiri ex parentũ corporibus: quippe cũ hæc potentia naturale sit agēs (non quidẽ absolutũ, sed ad indiuiduale quandã proprietatẽ reductum) & agēs omne, oĩsq; potentia sibi simile producat, q̃ studeat semper passum sibi assimilare: sequitur easdem indiuiduales conditiones suscepturum semen, & eisdem pollere factum iam in utero genituram. Quas sanẽ vires exerit calore seu temperamento, & spiritu: quibus sanguis menstruus facile accersitur ex innata dispositione, ac deinceps sigillatione, q̃ ex principalium mēbrorũ temperiem genitura principium fortitur. Expendendum tñ est, vt clarior euadat hmõĩ doctrina, quam rōne eas vires parentum tẽperies semini præstare possint. Temperamentum quidem, vel nullo dubitante omnium humani corporis actionum immediatum esse instrumentum euidenter constat. Præterea temperamentum duplex existit: cõe seu totale vnum: & peculiare cuiq; partũ propriũ aliud: hoc quidem veluti cuiusq; partũ forma illi inhaerens: illud verò ex omnibus particulis constans, hoĩemq; taliter, vel taliter temperatum denominans, continens virtualiter oĩũ particularium tẽperamentorum aliarũ corporis partium vim, & rōnẽ. Insuper, licet tẽperamentum non sit præcipuũ agens in hoĩs formatione, augmento, & nutritione: est tñ proportionatũ instrumentũ huic actioni: & quemadmodum in virtute causæ cõtinentur effectus cãe principalis, ita in virtute instrumenti immediati, p̃sertim determinati ad illam actionẽ, continentur quoq; effectus. Siquidem in artificialibus, & naturalibus et vnũquodq; instrumentum peculiari cuidam actioni dicatur, velut serra, aut malleus, aut pinicillus. Sed probare nunc interest, temperamentum virtualiter conũnere omnium partium organizationem, vt dum in actũ dirigitur in semine, eã, & patri simile efformet. Cum dictum sit duplex esse tẽperamentum, partiale nempe, & totale constat temperamentum partis cuiusq; esse illud, qđ taliter partis, cui inest, na-

turā constituit, & substantiā, qđ alteri parti inutile esset contrariū, aut diuersū: A
in quo sanē téperamento tota partis natura, & conditio, ac pprietas sita est, non
solum ea rōne, qua similis, verum ēt quatenus organica est, quia téperamētū
& simplicib. & organicis proficuum existit instrū, illis quidē tanq̃ proprium,
organicis uerō tanq̃ cōe. Ex quibus constat uentriculū, iecur, cor, caput & cete
ra totius corporis mēbra suum sortiri peculiare téperamentum, qđ sanē si alteri
particulæ p̃stes, non ob id p̃fecto officium eius, qđ id recipit, eo téperamēto optū
mē fiet, sed singulis actionib. corporis singula quoq; sunt téperamēta, actionib.
illius partis p̃ficua, & formæ eiusdē immediata. Ob id cum totale illud tépera
mentū uirtualiter contineat reliqua oīa, sic semen fit (ad cuius materiā ea humo
rum pars, qđ totali hoc téperamento fruit, separat, & ad testes defert, vt semē fiat)
vniuersali quoq; téperamento p̃ditum, velut corpus a quo decedit. Quod semē
cum deinceps pręstaturum sit in generatione materiā, facilē in similes partes
eis a quibus decedit, cōmigrat, quia facultas formatiua, qua fœtus producit, hoc
téperamento cōi utitur tanq̃ instrū, quod cum in se cōtineat proprietates, & in
diuīduales conditiones oīum partium, à quarum téperamento sigillatum cōflu
xit (siquidē postq̃ illarum conditiones indiuiduales, & proprietates illas rece
pit, retinet quidē & ad actum reducit suscepto in vtero semine) fit facilē, ut fœ
tus efformatū parentibus similē effingat formatiua facultas. Ex quibus constat
qualiter téperamentum p̃stet ad similitudinem efficiendum. Intere est mō docere
qua nā ratione seminis, & sanguinis materia huic quoq; similitudini princi
piū pręstare possit, quod ex eo p̃bandum est, qđ sanguis vel menstruus, uel ex
quo semen fit, vt ex B. Th. constat, sigillationē quandā in iecore suscepat, tanq̃
ab opifice cōmodum, & naturā particularium mēbrorum respiciente. Quā sa
nē rē paulō diligentius cōprehendisse oportet, docet. n. p. 1. q. 119. art. 2. cōstare
in natura animalium verum esse, uirtutē reperi in cōicatiuā sui in materia indi
uiduo proprio, ex quo sequitur alimentū, quod in principio est dissimile, & in
fine oīno simile, in medio esse in potentia proxima ad finē. s. formā determinatā
mēbrorum. Quod si aliter esset, forma non esset cōcabilis. Præter qđ quod natu
ræ ordo habet, ut gradatim procedat, de potentia ad actū. Sic igitur alimentum
ipsum primo accipit quandā uirtutē cōem respectu oīum partium corporis, qđ
sanē in fine determinatur ad hanc partem, uel ad illā, quod ēt de spiritibus qui
ad testes descendunt, subaudiendū puto: nā in materia, qđ ex hoc sanguine, & spi
ritibus in testiculis conficitur, uirtus qđā est deriuata ab anima generantis, at p̃
ductionē totius corporis. In qua sanē rē expendendum est, uirtutē hanc forma
tiuā in principio generationis imprimi in mēbris præcipuis a semine ex quo fit
fœtus. Quo facto constat ab eisdē membris transmissā substantiā (siue sanguis
sit, siue spiritus) in totius uitæ discursu, secū ferre eandē vim formatiua in potē
tia remota, impressā p̃dictis substantiis à mēbris his, uirtute animæ corpus in
formantis, ita vt necessum sit, quantū rei natura patit, similē fieri fētū genitorib.
quia in materiis ex quibus geniturā fit, adest uirtus oīum partiū, & rursus potē
tia formatiua, à p̃dictis mēbris cōcata, qđ necessario fœtum formabit iuxta sui
naturam, & conditionē. Cuius rei probatio hæc est, iecur non generat sanguinē
in genere, & citra aliquem respectum, sed ipsum perficit ad indiuiduū habito
respectu, cuius nutriuonem intendit, quamobrē, tenetur non utcunq; sanguinē
gene-

A generare, sed certum, & determinatū pro hoīs ipsius peculiari natura, & conditione. Præterea non sat est sanguinē sic inconsulō genuisse, sed eis conditionib. præditum, quibus possit singulis particulis respondere, easq; reficere, & alere: siquidem non quævis sanguinis pars quis particulam nata est alere, sed determinata sanguinis natura, & conditio determinatā quoq; particulā adit, & alit. Quod ēt probari vltius pōt ex iecoris officio & præstantia, quippe id generari ubi soli sanguinem non est credendum, sed pro reliquo corpore, q̄ hac rōne membrum princeps sit appellatum. Quapropter non vtcunq; & indeterminatē, sed iuxta naturam corporis alendi, id perficit in quo opere impressionē & sigillationē quandam sanguini præstat, vt eis partibus ex usu sit, quas alēdas sibi natura tradidit. Ex quibus iam constare arbitror, semen & sanguinē menstruū naturā, & uim a conficiente iecore suscipere, qua parentum particulis correspondere teneant, si illis futurum erant alimentum, si quidē alitionem ex similibus fieri erat necessum. Eam aut similitudinem, q̄ cum membris alendis obtinet, seruat sanguis menstruus, & qui semen fit, vt postea in utero ex hac materia facile sit reliquis consentientibus, in membra similia eis, quæ in corpore parentū alere tenebantur, commutari, & commutare virtute formatricis potentia operatis, quam indiuiduari per hanc materiā antea diximus. Et hanc arbitror esse materia sigillationem, q̄ in sanguine fieri B. Th. profert. Similitudini quoq; consequendæ innititur spiritus quidā genitiuus, seu calor, cui formatina facultas ēt inheret. Cuius sanē spiritus magna copia cum sanguine defertur, continēs ferē formale seminis, quatenus genitale est, rationem. Nā ob id testibus tribuit natura arterias, nervos, & venas, vt possit oīs spiritus suppeditare vberem copiam, q̄ testes coctione in seminis materiam implantant, & ipsum hac ratione efficiunt prolificum. Quippe testes nil aliud semini (quo genitale sit) pstant, & in hoc differt semen, quod vasa spermatica conficiunt, ab eo quod testes, quia illud infecundū est, hoc verō hac rōne fecundum, cum formatiua hoīs uis in ipsum his spiritibus medijs, sui similem vim formatiuā inducat, testibus coctione huic operari ministrantib. Qui sanē spiritus sic transmissus genitibus appellatus, conūct ēt in se virtualiter oīm membrorum indiuidui a quo decidit, proprietates & conditiones, quod iam probare aggredior. Spiritus quidē hi de genere & sortivitalium spiritūū existunt, & cum vitales sint (quod nullus dubitauit) iidē re cum tēperamento influente, seu, vt rectius loquar, cum calore influente, sunt. Præterea, huius temperamenti gratia oēs nostri corporis partes viuunt, & actiones perficiuntur. Quo fit profecto, vt verum sit, hos spiritus, seu hoc tēperamētū insinens virtualiter quoq; in se includere oīm particularium tēperamentorū virtutes & efficacias: siquidē totale temperamentum, quo homo a prædominio taliter tēperatus existit, ex oīm partium temperatura resultat, & tēperamenta hæc particularia illud totale habent constituere rōne influxus a corde mutuati. Qui sanē influxus (si oīm temperaturarum particularium custos est, & alimentū, & hæc sunt variæ, & differentes iuxta varias partiū corporis naturas) potentia omnium temperamentorum partium corporis virtutem obtinere oportuit: siquidem si alter esset, non posset proculdubio actioni cuiusvis partis, cum ipse iam diuersæ naturæ sint, adminiculo esse: neq; earum innatum temperamētum fouere, ac in actum dirigere partium potentias: & rursus quando vitiatum est,

Bb 4

reli-

restituere, nisi huius spiritus haberet rationem causae vniuersalis, in qua particularium causarum virtutes debent contineri. Cum ergo facultas formatiua subiectetur in his spiritibus, mirum non est, illorum conditionem insequens proprietates, & naturas individuales, quas spiritus semini adiunctus secum affert, inducat in foetum ipsum, quem gignit, ut similem parentibus efficiat. Quae in re expendendum etiam est, totam horum spirituum praestantiam atque efficaciam in moderandis, & fouendis varijs corporis particulis perdere ex efficacissima cordis virtute, quod Solis instar in medio corporis situm, calore suo, & spiritu omnia sibi subiecta, & commissa membra fouet, tuetur, & nouo spirituum influxu reficit, cuique tribuens quantumuis diuersum sit, quod illi est proficuum, & necessarium. Quippe temperamentum cordis et si videatur peculiare, respectu tamen totius, est veluti vniuersalis causa, qua omnes partes praedicta beneficia susceperant: & ob id necessario tenetur habere virtutes omnium temperamentorum, non secus quam caelum, quod licet particularis sit natura, est tamen vniuersalis causa, quae necessario continet in se virtualiter omnium inferiorum naturas, & proprietates. Sic profecto cor virtualiter omnium membrorum naturam obtinuit: cuius gratia censo Aristotelem dixisse cor tantum esse vniuersum membrum princeps, quod singulis partibus per spiritus communicet suas vires. Atqui cum in semine horum spirituum maxima reperiatur copia: sit profecto, ut illorum ratione inducat formatiua facultas proprietates individuales, quarum ratione similitudinem operatur. Quibus omnibus exacte perspectis facile est intelligere rationem similitudinis natorum ad parentes, auos, proauos, patruelos & ad reliqua individua cognationis intra quartam generationem. Nam euidenter constat sic contingere, & has esse potissimas huius rei rationes. Nisi quid aliud impenderit, ut paulo inferius docebo. Superest praeter dictam similitudinem, similitudinis in sexu ratio, quae ad seminis efficaciam reducere Medici omnes. Nam dum semen virile, & femineum maiore calore participant ambo, nulli dubium est, quin masculus generetur: matri vero an patri similis euadat, ex efficacia formativae virtutis alterius seminis proficiscitur. Verum si ambo semina iusto frigidiora existant, certum est feminam generari. Quod si quis dixerit, maiorem similitudinis in sexu parte pertinere ad figuram, & organizationem partium, idque minime posse ex calore, aut frigiditate, vel temperamento proficisci: respondemus hanc similitudinem ratione materiae, cui inest temperamentum, & ratione formativae potentiae fieri; nam materia, quae ratione sui temperamenti apta est ad certas partes simplices efformandas, dispositionem quoque habet ad figuram seu organizationem adquirendam, non ad quicquam, sed ad certam, quia organizatio non ex quibusvis simplicibus, sed ex certis, & determinatis proficiscitur. Cum vero materia ad certas, & peculiare partes simplices determinata sit, sequitur quodammodo determinari ad eam organizationem, quae ex illis nata fuerit proficisci. Quibus constat quantum proficit materiae temperamento organizationi perficiendae. Praeterea formatiua facultas, quae temperamento omnibus partibus efformandis communi utitur, supplet sua vi, & natura defectum ipsius temperamenti, quod nequit ex proprijs viribus figuram construere: construit tamen ipsi formatiua facultas: nam ea ratione tributum est illi id nomen ex dispositione nimirum instrumenti, & spirituum. Sed genitalia sic formata intromanere, aut prominere extra, non quidem solum ex formatiua facultate, & mate-

- A** & materiæ aptitudine. Sed ex calore proculdubio proficisci, credendum est. Sic profectò dum semina ambo calore pollèt, facilè hæ partes prominent, dum verò calore sunt orbata, aut diminuta, intus latent, sexum constituentia diuersentur vt paulò superius docuimus, & hac rōne intelligenda est sñia eorum qui tenèt sexum proficisci à calore, non quidem, vt multi interpretantur, quod nos antea refutauimus. Et hæc est in genere similitudinis ratio. quare verò dissimilitudo vel à sexu, uel à parentibus, uel ab specie fiat, iam audies. Ab his igitur similitudinibus ex prædictis causis promanantibus, tria etiam dissimilitudinis genera prodire comperimus. in quibus quinq; illas monstruorum species cōtineri dictum est. Quæ genera recensere mihi est in animo, si prius dixerò genitum fieri dissimile à generante duobus modis. Vno quidem, quòd informatrix facultas, licet habeant omnium paternorum membrorum simulacrum, cum hoc tamen non æqualiter ab omnibus illis excitatur ad simile opus perficiendum: quia informatrix seminis non applicatur singulis idolis sufficienter in fœtu efformando. Ex qua sanè causâ prodit dissimilitudo natorum ad parentes modo in sexu, mō in accidentibus. Verùm si non solum in æqualiter vis formatiua excite, sed
- B** et inordinate per semen distribuatur, monstruosos fieri partus necesse est, quia partes in diuerso situ locat, vt cum aures in humeris, aut eadem parte oculos figit, vel vis generatiua pedū ad manus peruenit, aut contra: quibus constat monstruosum fieri quoq; conceptum. Altera rursus causa dissimilitudinis, aut (ut rectius loquar) deformitatis est, qm̄ connata, & formatiua uis assimilare qñq; impeditur in opere, ne assimilet. Quod fieri profectò pōt vno è duobus modis: nimirum, quia similitudo diuersa in altero semine potètiore est, & euertit alterius seminis similitudinem remissiorem. Contingit. n. nō rarò patris oculos esse paruillos, & matris maiores; ac fœtum subinde altero oculo patrem æmulari, reliquo uerò matrem: qđ quidem de brachijs, & cruribus, ac reliquis partibus, q̄ binæ sunt in corpore contingere semus; id qđ proculdubio monstruosum esse certum est. Secundo mō natū dissimiles à parentibus fiunt, qm̄ materia seminis uel menstrui, vel utriusq; nequiuīt à formatrice regulari neq; quoad speciem in ducendam, neq; quoad similitudinem aliam: qua sanè de causa, non solum dissimilitudinem à genitoribus, sed mille monstra potissimum oriri arbitror. Hæc etenim causam retulit Arist. li. 4. de gen. anim. c. 4. nimirum cum materia facultates, & motus generantis uel minus impedit. Atq; hi sunt modi, quibus in uersum fieri dissimilitudines, & monstra contingit. Expendendum nūc est, quæ ratione materia inepta fiat ad motus formatiue facultatis suscipiendos. Fit autē materia inepta ad ueram similitudinem comparandam, multis modis. Primo ex defectu sufficientis copię, idq; aut in toto, aut habito respectu ad aliquam uel plures partes futuras. Ex quo prodit fœtus pumiliones fieri, vel aliquibus partibus constantes longè minoribus, quàm toti corpori debeatur. Secundo ex nimia materiæ ubertate, cuius molè si rectè formatiua gubernare potens est, gigantes, vel deformes magnitudine procreat homines, aut aliquas partes facta collatione ad totū corpus magnitudine deformissimas. Quòd si eadē copiam regulare nequeat natura, informem carnem, aut mille alia monstra, quæ inferius referā producit. Tertiò verò modo inepta fit ad similitudinē cōparandā materia ex dissimilitudine, & inæqualitate substantię, uel ex effusione ipsius p̄ uterū ipsum; uel

luc

luti accidit plumbo calfacto, quod si inæqualiter fustum sit, inæqualia efficit simulacra: ex quo sanè vitio in semine deformes, & inæquales partes succreuisse comperimus: ut ijs accidit, qui caput habent crassius gradius, ac deformius, vel pedes, manus, aut nasum, q̃ reliquo corpori conveniat. Quarto mō id accidit ex vitio crassitiei, duritiei, vel fluiditatis, aut corruptionis seminis, aut sanguinis menstrui, ut etiam si aliquid generetur, longissimè tñ à parentū natura dissideat. Sed anteq̃ ad vltimum materiæ impedimentum deveniam, expendisse oportuit quibus hæc monstra modis à parentibus dissideant. Dissidere aut̃ monstra hæc à parentum natura tribus modis cōstat. Primò dum materia seminis idonea est, non tñ ex toto superatur: quo tpe proculdubio fit eorum, quibus assimilari pōt id, qđ maxime est vniuersale, & genericum, cum fieri nō possit simile in specie, neq; in individuo: ob id pullulat eo tpe in generatione ex sanguine menstruo aliquod animal, cum homo fieri non possit: tendit. n. natura ad id, quod melius est, subsistit tñ in eo, quod pōt. Itaq; generatur tantummodo sensitiuum, in quo subsistit defectu materiæ: nam cum semen illud potentiam habeat ad sensibile, id ad summum consequitur; rōnale verò non fit, neq; anima talis introducitur pp̃ inceptitudinem materiæ, & organizationis. Seruatur tñ in generatione quidem vniuersale, quod est animal, & genitum remanet in forma dispositiua, aut degenerat in aliquam brutorum speciem. Cur verò potius hoc, q̃ illud monstrum suboriatur, ad imaginationem esse referendum pleriq; arbitratur, & paulò inferius docebo. Secundo modo ex hoc defectu à parentibus dissident nati, cum magis ēt impeditur seminis facultas ita, ut neq; animal adhuc gigni possit, sed tñ quid informe, medium inter viuientia, & non viuientia obtinens, cuius generis sunt molæ mulierum, ut sequenti c. monstrabo. Vltimò verò ex hoc defectu prōdit tam esse mutatione penitus ineptam materiam, ut agentis facultas nullo modo ipsam immutare possit. Ex quo illud prodire certum est, quod toto genere præternaturam esse philosophi censent, & appellāt: cuiusmodi est in vteris seminarum generatio calculorum, aut tophaceæ substantiæ. Sed ut finem huic rei imponam, superest quidem aliud impedimētum, quo semen operari liberè nequit, nec natos parentibus assimilare, nimirum imaginatio varia, & vehemens inter concipiendum, vel in toto formationis tpe, quæ sanè dominatur formatrici naturali seminis, imperatq; ei eo modo, quo inferiores potentie parent superioribus. Et sic imprimatur potius idolum seu effigies imagine vehementer cōprehensa, ante quidem, q̃ paternum dolum in semine adseruatū ex quo vulgatum est apud plerosq; philosophos p̃dictum dogma. Quibus etiā astipulatur B. Tho. q. 4. d. art. 8. ad. 13. dicens, quod imaginatio est vis quædam in organo corporali, vnde ad speciem imaginatam mutatur spiritus corporeus in quo firmatur vis formatiua, q̃ operatur in semine: & idē interdū aliqua mutatio fit in prole ex imaginatione parentis in ipso coitu, si fit fortis. Ex qua sña, & ante ipsam multi censuerunt ex inepta materia, quæ hominis formam adipisci nequit, fieri aliqñ sensitiuum, eius tñ speciei, cuius est animal, qđ fœmina in imaginatione concipit, & vehementer apprehendit, aut expauescit. Cuius rōne ferunt accidere partus monstrosos, aliqñ canis effigiem præ se ferentes, aut niri, vel felis, vel cuiusvis alterius bruti iuxta imaginatricis apprehensionē. Ego tamen eidē B. Tho. sententiæ innitens proculdubio arbitror, tantæ esse efficacię

&

- A** & potentia imaginatione, vt ad specie imaginatā mutetur spiritus corporeus, qui ad testes feminæ, & vterum perueniēs, sit veluti facultatis formatricis fundamentum, & subiectum: qui postmodum iuxta imaginē imaginatiuæ impressam, ferū efformare habet, eò q̄ maioris sit efficacix, q̄ genitiuus spiritus, qui in semine paterno præfuerat. Mouent. n. potentia superiores infimas, & aliquē earum actus potentius perficiunt, q̄ ipsæmet naturales, vt videre est in ira, timore & tristitia, ac cæteris animæ passionibus, quæ potentius, & efficacius vniuersū corpus turbare habent, & humores vndiq; mouere, q̄ ipsæ naturales. Ex quo constat spiritum illum ab imaginatiua potentia prædicto modo motū efficacius suas vires exercere, & formationis, effigiem delineare, q̄ ipsa formatiua, q̄ ex parentis membrorum conditione prodierat, & in semine, vt dictum est, præfuerat. Verum cum hoc (vt expressè ex eadem B. Tho. sententia constat) arbitror imaginationem posse aliquod accidens in generatione immutare, vt constat ex femina, quæ æthyopem tpe coitus intuens depictum, & ipsum vehementer imaginans, æthyopem peperit: nam id omne efficere potest hæc imaginatiua potentia, q̄ cā æquiuioca, putā Sol ex putredine terræ, vt murem, lumbricū, aut aliud animalculum ex ijs; quæ imperfecta sunt, & ex Sole, terræq; apparatu, ac putredine indeterminatè fieri conspiciamus. Verū animalia perfectā, vt canem, vitulū, aut huius naturæ alia, censemus citra vniuocum agens fieri sola imaginatione esse impossibile. licet dictum sit meridionalibus, & australibus feminis plerunque accidere, carneam quādam substantiam cū sexu excernere, animalis alicuius speciem ferentem, quam feminæ illæ feram appellant: an tamen verū sit ignoro. Quod si aliquē quid simile contingere videamus, dubium profectò est, an femina culpa alicuius bruti accessus excusari possit: siquidē impossibile est (aut saltem intellectus non capit) potentiam illam imaginatiuā adeo posse materiā immutare, qd ipsam ad peregrinam illā formā introducendā disponat; ni velimus Albertū magni opinionem sequi, qui tenet id fieri posse ex vi astrorū, q̄ apta est illis animalculis generandis, q̄ cum omnino integrum generare ex humano semine, & sanguine non possit partē aliq̄ illi similē effingere: quum varietatis obtineat dicent alij: & sic quodā mō vī experimentis acquiescendū, in ijs maximè, q̄ animal aliquod, aut partē eius appetierunt ingēti desiderio, & imaginatricis apprehensione. Nā ob id ferunt repertas esse feminas, q̄ suos filios pepererunt ore leporino, aliæ dedibus ouillis. Tñ hæc ita obscura sunt, vt videant in arcanis naturæ recondēda. Maximè cū ex profello doceat B. Tho. p. 1. q. 117. art. 3. ad. 2. materiā corporale nō obedire substantiæ spiritali ad nutū: inquit. n. Sed suprā ostensum est, q̄ materia corporalis non obedit substantiæ spiritali ad nutū, nisi soli Creatori, & ideò melius dicendū est (loquebatur de fascinatione) q̄ ex forti imaginatione aīe immutantur spiritus corporis coniuncti, q̄ quidē immutatio spirituum maximè fit in oculis, ad quos subtiliores spiritus pueniunt, oculi autē inficiunt aerē continuū vsq; ad determinatū spatiū. Ex quo inferre oportet, qd licet vehemēs imaginatio vires hēat spiritus mouēdi, efficiēdiq; aliqd (vt dictū est) immutare tñ materiā, vt possit pfecti alicuius bruti forma introduci, mihi vī perdifficile. Præsertim cū idē B. Th. q. 101. art. 2. ad. 2. referat, qd animalia perfectā, q̄ generat ex semine, nō possunt generari p solā virtutē celestis corporis: ex quo inferri minimè posse sufficere huic generationi cām aliā æquiuoce i lōgē inferiorem,

feriorē, & impotēiorē celesti, nimirū imaginationē. At licet huic adiūgat virtus **A**
 formatiua, quæ præfuerat semine parentum, hæc quidē sufficit os, carnem vel
 alias partes efformare, cæterum formam, & figuram earū ex æquiuoca illa cau-
 sa, videlicet imaginatione proficiscitur, & cum hac sit minoris efficacæ, quàm
 Sol, non poterit a quē disponere ad generationem animalis perfecti, q̄ non nisi
 ab agente naturali fieri pōt. Atq; hæc sunt, quæ de similitudine, & monstrositate
 natorum colligere potui: quæ si quispiam aliter, aut curiosus velit scrutari, nec
 vero, nec displicebit. Dimitto etiā multa de similitudine natorum ad parētes,
 quæ huic vsui non erant proficua, licet pulchra. Huius profecto rei pauca (q̄
 De mon-
 stroso cō-
 ceptu di-
 gnoscen-
 do.
 ego legerim) extant notæ, cum hoc tamen certissimum est, in monstroso conce-
 ptu, matrem graui, & nouo aliquo symptomate, premi quod vel admirationem
 inferat, vel causam habeat occultam: nam cum mali alicuius causam nosse, sit
 perdifficile, & grande fuerit ipsum malum, coniectandum est, à prædicta aut f-
 mili causa proficisci, vt in mola generatione plerunque conspiciamus: quæ qui-
 dem si tam graui, & varia atque diuersa à communi conceptu adfert acciden-
 tia, quanto maiora sperandum est, monstrum posse præstare. Sic profecto Hip.
 lib. 2. pop. p. 2. tex. 20. retulit de Antigenis vxore, quæ monstrum masculum pe-
 perat, inquit. n. Antigenis vxor quæ circa Nichomachum peperit filium, cramo-
 sum quidem, habentem autem, maxima discreta, magnitudine autē, vt quatuor
 digitorum, sine ossibus, post modum verò crassum rotundum. Hæc antē partum
 asthmatica fiebat, deinde simul cum partu pus euoluit modicum, quale ex fu-
 runculo. Qua certē sententia probatur, quam graui, & noua accidentia ex mō-
 stroso conceptu subcrecant. Quapropter ne turpius aliquando decipiamur,
 id cautē proferre, & diligenter expendissē oportet. Mirum fortassis alicui vide-
 bitur, quorsum scripserim monstrorum generationem, si quidem postquam ge-
 nitum est, difficillimē cognoscitur, & curari auxilijs nequit. Verum mea mens
 est, in hac affectione, quæ periculosa, & miserabilis censetur in femina, quæ se
 mel monstruosum edidit partum præcauere quominus id malum iterum reuer-
 tatur. Cuius rei gratia duplicem oportet præmittere indicationem, alteram, quæ
 facultati formatrici prouideat: alteram verò, quæ materiam dissonat, aptamq;
 reddat fœtui naturali efformando. Circa primam duo nobis officere incumbit, **C**
 primum, facultatem ipsam formatiuam roborare, vt commissum sibi negotiū
 perficere possit. Quod sanē fieri existimo ijs, quæ spiritum copiam generare sunt
 nata, & genitis calfacere, velut vinum ex aromaticis confectum; cibaria facilli-
 mi nutrimenti, calida vel media temperie prædita. Instillatij etiam liquores
 ex vino, floribus calidis, & odoriferis: ac præcipuē instillatio, q̄ ex theriaca, vi-
 no oderifero, vitellis ouorum, melle, gariophyllis, cinnamomo, & pane recen-
 ter cocto, & calido paratur. Cōfert, & electarium de hiacintho, vel de gemmis
 cum speciebus, & prædicta instillatione, aut vino. Item omnia odorata, quæ ca-
 lidū, & suauē odorē expirent; velut vinum, aqua uitæ, aqua naphæ, cinnamo-
 mi, iasminorū, & ea, quæ ex gariophyllis paratur. Exterius uerò corpi epithema
 ra apponere oportet, quæ consimilem præstent virtutem, & tandē curandū est,
 totum corpus roborare leuibus frictionibus, exercitijs, somno medico, alimen-
 to multi succi, & animi hilaritate, ac delectamentis. Quibus facultas robustior
 facta siurijs externis, imaginationi, & materici viijs resistere vehemē⁹ possit.

Se-

- A** Secundum verò, quod circa facultates moliri oportet, est imaginativam potentiam perpetuò à brutorum turpiumq; animalium consideratione distrahere, eamq; pulcherrimarum rerum imaginibus insignire, nò solum cuius spe, sed tota gravidationis duratione. Quamobrem distrahere oportet musicis instrumentis, gratis loquelis, pulchrarum imaginum inspectionibus, & ipsa quoq; femina perpetuò conetur, quæ pulchra, & grata sunt, considerare, mæstitiâ fugere, timore oî carere, & hilari constantiq; nò esse, ne ex bruti alicuius, ut muris serpentis vel alterius inspectione terreatur, & expauescat. Circa materiam verò considerandum est, nîm ex paucitate, ex vberiori copia, ex crassitie, tenuitateve aut partium inæqualitate, vel ex propria corruptione in hæc mala degeneret. Nam paucitate, ob quam pusillos fieri sævus contingit, subveniendum est copiosiore alimento, maioris substantiæ, humidioris, & copiosioris succi, & abstinentiâ venere. Vbertati verò, inedia, exercitijs, frictionibus, alimentis paucioris succi, tandem sanguinis detractio, & frequentioribus balneis ex sulphure vel ex calidis herbis. Purgabis quoq; has tertio quoq; mense, ante quàm gravidæ fiant cartamo, agarico, & alijs, quæ crudos succos, ac pituitam expurgare scimus, sic dum crassum existit semen, q̄ inscindant, attenuent, digerant, & expurgent, sicut adhibenda, & alimenta, ac potus, quæ fluidius reddat semen. Utendum etiam est medicamentis calidis, quæ crassas partes seminis fundant, & ijs et q̄ superius diximus posse vberiorum spirituum copiam suppeditare. Quod si fluidius semen fuerit, alimētis crassioribus, & solidioris substantiæ re ages, diuurno, & laborioso exercitio, balneis ex sulphure, frictionibus, & purgantibus medicamentis, qd̄ serosos humores evacuari habeat. Partes et̄ genitales calfaciendæ sunt, & uterus calidis roborandus, & siccis, qualia abudè superius diximus. Item, si inæquale semen est, prosperam in omnibus alimenti officinis coctione conciliare oportet calidis roborantibus, & modicè astringentibus medicamentis. Interdicereq; ante oîa opus est cibarium varietatem, sed unico m̄ utatur femina, vel duobus eiusdem nature, servata in q̄titate oîbus diebus pari portione. Vtrob̄ et̄ q̄ roborent, & semen probè conficiant, adhibenda sunt, qualia abudè superius diximus, proficiscitur non minus prodigiosus cōceptus ex inæquali seminis utriusq; parentis emissionē: cui rei primum ex usu est, si ambo ad coitum ita se inuident, ut simul, & semel atq; cōferim possint semina emittere, excitato tardo parente, coercitoq; qui citius excernit ijs, q̄ superius diximus. Prodest quoq; si se parentes abstineant à frequenti coitu, maxime si semel mēstrua defecerint, & femina per se senserit se gravidam esse: nam ex huiusmodi concubitu facile ex nimio appetitu aliquid ei aculati seminis uterus rapit, cuius aduentu incepta formatio interturhatur, vitiat̄, & (qd̄ frequentius est) turpi aliqua nota fedatur, vel superfœtatio aliqua gignitur. Præterea cauendū est, à concubitu femina adhuc mēstruis occupata, donec ex toto purgata fuerit. Nil. n. citius, & propius monstruosum conceptū efficere poterit, quàm si sanguis ille mēstruus, quæ natura tanquā inuile, & spurcissimū expellit, materia fiat genitura: nā mirum non est si ex ita inepta, & fœdissima materia monstruosū, & horrendū animal fiat: superat quidē virus, & nralit̄ illius sanguinis oēs genitalis seminis, & formatricis facultatis vires. Vltimò aſtichæ monstra fiunt ex corrupto semine, vel sanguine mēstruo. Quamobrem quibus in feminis cognitū fuerit, sanguinem mēstruum

struum vitiosum esse, sanguinem ante conceptum mittes, & ipsum à putrilagie **A**
ne expurgabis cassia fistula, confectione amech sine scammonio, & coiocintide,
decocto foliorum sanæ, aloe, & pillulis ex mastiche, vel rhabbaro. Itē ali-
mentis moderari omnes humores oportebit, vt superius dictum est. Tandem ca-
uere feminae accessum conuenit, nisi quinque; aut sex diebus post menstrua pur-
gationem, sanguine prius misso, & sufficienter expurgato corpore. Seminis itē
vitia corrigere oportet pessarijs odoriferis, siccis, & q̄ putredinē exsiccent, sed
p̄cipuē ijs, q̄ semen per vterum expurgent, additis alimentis copiosiorib. & bo-
ni succi, q̄ putridæ substantiæ admisceantur, ipsamq̄ corrigant, & atterperent.

De vteri mola. Cap. 8.



ATVRA proculdubio interdum certis quibusdā motibus ca-
operatur, quæ fieri ex eiusdē legibus non posse vident. Verū
cum ipsi munus sit, sese quantū possit conseruare, & tueri, lon-
gè satius existimat, aliquid (vtcunq; sit) potius, q̄ nihil efficere **B**
ca. n. est nature prouidentia, vt calor artifex, & autor eorum, q̄
generantur, nunq̄ sit otiosus, sed ex qualicunq; materia opus
aliquod artificio constituat. Sic in vermiū generatione, & aliorum, q̄ ex putre-
dine terræ fiunt, oriri nequit q̄ cum maius aliquid ex materia efficere nō pos-
sit, animalculum illud, in quo conseruari queat, effingit. Quod si materiā pro at-
bitrio tractare non possit, q̄ parcior, vberior aut ex diuersis generibus constas;
vel aliter affecta fuerit, monstrum generat, q̄ aliud perfectius efficere materiæ
defectu illi non datur: si tñ adhuc omnino inepta sit, vel herbari, vel rudius ali-
quid in terra efformat inducta perfectione, q̄ maximè pōt. Quæ quidem omnia
in feminarum vteris euenisse conspiciamus ab spiritu illo genitiuo, quē sui do-
micilij architectum veteres appellarunt. Quamobrē dum sibi conueniens ma-
teria, tractabilis substernitur, ex vtriusq; sexus semine cōstans, fetus ad vtriusq;
vel alterius effigie efformatur: p̄sertim si accesserit imaginatricis facultatis vis,
optimi moderatoris officium exequens. Ceterum si formatricis vis imbecillior
sit, & q̄ subiicitur materia, nequeat ad tantam perfectionē peruenire, eō q̄ qua-
litate, q̄ titate, cōsistentia, vel alicuius extranei permixtione, maximè aliena exi-
stat: fugiens nihil generare, aliquid effingit, siue animatū sit, siue inanime: nam **C**
cum dictum antea sit, hominem esse parū mundū, proculdubio est, quia om-
nium, quibus mundus constat, perfectiones continet. Sic etenim essentiā cum
elementis, vitā cum plantis, sensum cum animalibus, & sibi peculiare intelligē-
tiā, seu animā rōnalē habet. Atqui cum ita ad hoīs perfectionem progrediatur
natura: sit quidem ob id, vt portentosa generationes haud rarō accendant: nā (vt
dictū est) rudis q̄dam moles gignitur, in quasi vitio ipsius materiæ, vel faculta-
tis formatricis defectu in ipso itinere, intercipiat, nil mirū si informē sorturam
sine ipis ordine excernat. Quod si vltcrius progrediatur, nō tñ debita perfectio
ne, animal eius naturæ, q̄ magis conuenire materiæ videat, proficisci est creden-
dū: ex quo fortasse vel rudis aliqua mola differētia, vel sortura varijs animalū
imperfectorum figuris affecta conspiciat. Cum tñ præcedenti e. abundē dictum
sit de monstroso conceptu, nūc verō de mola generatione, causis, signis, & cu-
ratione

A ratione agendum duxi. Est igitur mola, vt Gal. placuit li. 4. & 14. de vsu par. c. 7. *Mola quid.*
 & 14. meth. c. 23. caro quædam inutilis atq; informis, & ouo gallinarum subue-
 taneo proportionē respondens. Quæ verba si quis expendat, reperiet, molam mi-
 nimè esse tumorem, neq; vteri duritiem, sed quid proportionē ijs respondens,
 q̄ adnascuntur. Cuius naturam optime depinxerūt Hip. & Arist. 4. de ge. an. c. 7.
 & 4. meth. c. censentes ex diminuto calore vel ex defectu gignitini spiritus, vt
 censuit Hip. fieri non quidē per omnimodam cruditatē, neq; per assationē, sed
 per mediā q̄dam caloris, & spiritu actionē q̄ imperfectæ naturæ actio cēscenda
 est. Quorum virorum sententijs refelluntur snæ Auic. Pauli, & Aetij de mola
 generatione, ni velis ipsas amicè interpretari, vt sequenti paragrafo leges. Ex
 quo elicitur, cū mola caro sit informis atq; inutilis in vtero supercrecens, mor-
 borum esse ipsius in compositione, ex eorum p̄sertim numero, q̄ toto genere p̄-
 ter naturam existunt, velut est lapis in vesica: eò q̄ in eius generatione nil sit eo-
 rum, q̄ secundum naturam nobis in esse diximus: licet Arist. neq; perfectā, neq;
 omnino aliēnum à natura esse censcat. Itaq; eius natura consistit in omnimoda
 natura imperfectiōe, q̄ nondum vetuit animantis conditionem attingere, sed
 carneam substantiam adeptā, informis, & rudis nulla figura prædita vtero adna-
 scitur, & adheret, donec tanq̄ quid inuile indiuiduo, & specie oc̄sillimè proj-
 ciatur, natura ipsa lacellita, & defella id mollicie, nulla seruata t̄pis lege. Hu-
 ius porro imperfectæ genituræ multi existimantur varias habesse differentias. *Mola differē-
 tiæ.*
 Ni Paulus, & Aetius nomine mola tumore in vtero induratū lapidis duritiē re-
 ferentē intelligi voluerunt. Quā affectiōe ego non ad molā, sed ad tumorū spe-
 ciem aliq̄ potius reducerem: t̄o profectò id conuincit, quia in virginibus raro
 hm̄i se t̄rhoia dispositio, quæ vterum in tumore, & magnitudinē insolitā at-
 tollat, reperitur: cū mola ex vtroq; semine fieri certum sit, vt inferius probabo.
 Barbari item ferè oēs crediderunt molā esse p̄ter carnē illam substantiā, q̄ verā
 molam appellat, statuosam quæ vel aquosam, aut cuiusuis alterius humoris na-
 turam referētē, intra vterum conclusam, ipsūmq; grauidationis mō, in tumo-
 rem attollentē. Quas oēs mole species ego ad falsam grauidationē reducere, po-
 tius q̄ ad molā: nam nili caro sit inutilis atq; informis qd̄ in vtero gestatur, haud
 quāq̄ molā esse appellandā, arbitrandū est, iuxta Arist. saltē, & Gal. sniam. Verū
 in ipsa carne substantia, q̄ veræ mola rōnē hēt, nō leuis existit differentia. Mul-
 ti n̄ q̄; referunt in forme quidē esse carnis frustrū, ceterū motum, qd̄ p̄tissi-
 mū extensionis, & contractionis obdūere, ac obscurū ēt̄sensu citra vlla formā.
 Constat t̄n maiori ex parte carnē solū esse plurimis venis, ac sanguinis ramifica-
 tionib. interseptā quibusdā albis ductib. vel viridibus, aut subcholoris nigris ve
 aut varijs coloribus pmixtis sine sensu neq; motu nullā seruante figurā, legē, ne
 que ordinē. Itē alterius substantiæ aliq̄n visitur, nimirū, pelliculose, & mēbrano-
 sæ, sanguine aliquo veluti affuso, & concreto, qui postea in aq̄ proiectus in ip-
 sam, qd̄ sanguinolentū est, abit reinanente parte mēbranacea, q̄ seminis cōcreti
 naturā refert citra determinatā aliq̄ figurā. Sed cōperrū est quoq; grauidationē
 hanc degenerasse in membranaceā substantiā, globosamq; totā aquosis bullis
 rotundis, tumidis, pellucidis, & innumeris plenē, aliq̄n cum sanie fetida, & di-
 luta: quā sanē figurā iā cōperimus in vxore bibliopolæ cuiusdā, & se vidisse te-
 stant ex neotericis plures. Si quis autem rē diligētius consideret, reperiet uarij
 figu-

figuris insigniri posse, cum de genere sit eorum, quæ præter naturam existunt: A
 quæ sanè neque legem, neque numerum, neque certum naturæ, & generatio-
 nis modum vlsquam obrinuerunt, & ob id multi forma sunt, sicut & mole mul-
 tiformes apparèt sine ordine, aut figuræ integritate. Causas verò huius affectio-
 nis Hip. primum omnium literis mandasse constat inquit. n. 1. de mor. mul. Mo-
 læ conceptus hæc causa est. Quum multi menses exiguum, & morbosum semē
 exceperint, neque conceptus rectus sit, & venter plenus est, veluti prægnantis.
 Consimilia quoque refert lib. de steril. dicens; Fit itaque mola in vtero, cum mē-
 sium copia exiguum, & minimè robustum semen virile conceperit, aut etiam
 muliebre. Ex quibus euidenter constat duplicem huius mali existere causam:
 alteram, copiosum sanguinem, ac fortasse sæculentum, crassum, & omnino in-
 eptum, quem natura ad menstruam purgationem tanquam inutilem adserua-
 uerat, copia, & natura à fœturæ perfectione alienum; alteram verò, vim seminis
 formatricem imbecilliolem. Quibus sic iunctis fit, vt defit motorium princi-
 pium formando fœtui idoneum. Quo circa constare arbitror, duo hæc esse ne-
 cessaria ad molæ generationem, nempe sanguinis menstrui copiosum affluxū, B
 & seminis virilis impotentiam. Primum quidem præter Hip. sniam probauerat
 quoq; Arist. 4. de gen. anim. nam quærens, cur cæteris animalibus mole nō ge-
 neretur, nisi mulieribus duntaxat, respondet, eam inter animalia affectionibus
 vteri obnoxiam esse, & menstruis abundare. Quibus verbis euidenter fatetur,
 menstruorum copiam necessariam esse ad molæ generationem: ac probat eodē
 loco præquiri et viri semen, dum inquit; Accidit quidem mulieri, vt cum con-
 cubuisset, & se cōcepisse putasset, primum ventris moles augetur, & reliqua
 ex ratione venirent: quæ demum difficultate intestinorum implicata, eoq; mō
 periculata peperit carnem, q̃ molam vocant. In cuius confirmatione dixit Gal.
 lib. 14. de vsu par. loquens de falsa quorundā opinione circa mulierum semē.
 Secundo aut, q̃ mentiuntur et in ijs, quæ accidunt, explorandis: non. n. sicut gal-
 linæ, sine maribus oua pariunt, ita mulierem, aliqñ viderunt sine viro, vel mo-
 lam, vel hmōi quidpiam aliud concepisse. Ex quo patet non sufficere mulieris
 semen ad fœturam aliq̃ efformandam, sine viri semine, et si suscento ab ipso prin-
 cipio ad fœtus formationem concurrat. Quòd si virginibus aliqñ euenisse con-
 stet, aliquid molæ persimile præmissis grauissimis accidētibus excreuisse, id po-
 tius ad vteri lumbricos referendum existimo, q̃ ad veram molam. Neq; rursus
 credendum est, molam aliqñ fieri ab exurente sanguinis menstrui, aut vteri ca-
 lore; nam carnis generatio non est solum caloris opus, sed moderati cum spiri-
 ta, & vi formatiua, qua carent vterus, & sanguis mēstruus; præterq̃ qd id ex pro-
 fesso docuerat Arist. loco citato dicens; Afficitur. n. conceptus eo mō, quo ea, q̃
 inquinari dicimus, cum elixantur: neq; per calorem, vt quidam volunt, sed po-
 tius pp caloris debilitatem. Natura. n. deuicta certare vī, neq; posse perficere, si-
 nemq; apponere generationi. Et mox subdit; Causa nanq; duritiei cruditas est:
 quippe cum inquinatio quoq; cruditas quædam sit. Censeo tamen in hac re ali-
 quando molam fieri posse non ab adaucto menstrui calore, sed ab exurentis se-
 minis conditione, cum defectu, & resolutione spiritus genitui: nā constat opti-
 mē semen morbosō calore esse calidissimū, & de pauperatū ob id, atq; orbatum
 spiritu naturali: ex quo fieri quoq; molā existimandū est. Quibus iā cōstabit q̃-
 rum

A tum veritatis obtineat Pauli, & Aetij sententia, & eorum etiam, qui censent ex solo mulieris semine, & menstruo sanguine fieri, vel ex immodico ipsius menstrui calore. Superest igitur principium prestare paucissimum viri semen, morbosum, ac imbecille, & copiosum sanguinem, cum maximè, qui menstruationi paratus erat. Quo fit, ut mola plerumque suboriat, si femina coierit menstruis eminenubus, fluentibus, vel nondum ex toto purgatis. Et vltimo cum antequàm foemina, quæ concepit, & fetus formationem perfecit, viro avidissimè adhereret. Item his accidit, quæ diu habent menstrua suppressa, ut Hip. lib. 5. pop. refert de vxore Gorgiæ; cui menses per quadriennium non fluxerunt, & frænellâ pepererat, & subsequuto diuturno vteri fluore, proiecit molâ, postq̃ sana facta est. Præterea dictum est superius aliam aliquâ subesse molæ speciem, q̃ membranaea constat substantia multis bullis referta: cuius causam esse censeo aquosum, & frigidum mulieris semen, tpe concubitus vnâ cum vteri plenitudine in ipsû ejaculatum: quod à virili semine concalfactum debilitat, nullum præstitit generationis principium: cui aliquâ accedit virile semē morbosum, copiosum, & flatibus plenu spiritum, & calore nativo orbatum. Aut credibile est, viri semen ab vteri ichoribus, & spurcitiâ extinctum, refrigeratumq̃, fuisse: semen verò femina, cum exigui sit caloris, membranam concretionē fabrefecit, agēte adhuc imbecilli calore bullas ex elevato statu, quem discutere nequiuit: quò fit, ut bullæ illæ succereuerint in genitura. Atq; hæc sunt molæ causæ, quas, p̃ vario mixtionis modo, variâ quoq; molæ configurationes, & varia accidētia procreant. Quæ oīa diligenter cognoscere oportet, ne aut in sterilitatē, aut malum corporis habitû femina commigret. In principio quidē à vero partu difficulter mola distinguitur, ut Hip. lib. 1. de mor. mul. aperte monstrat, dicens; Si verò fluxus ipsi nō fiat, contingit, ut p̃gnans esse videatur, & cū viro coit, doleat, & putet quid incumbere, & grauitas sit in ventre, & venter prominat, & desiderijs similib. afficitur, velut in ventre habeat, & stomachi dolore affici, maximè vbi quinquaginta dies præterierint, & dolor aliâs, atq; aliâs habet ventrē, & partes circa vmbilicum, & collū, & inguina, & lūbos, & postq̃ menses duo, aut tres præterierint, qnq; menses acervatim ipsi in pudendum erumpunt, & quæ prodeunt, velut carnem esse putant. Atq; licet pleraq; ex his signa veram quoq; grauidationē ostēdere soleant: cum hoc tñ distinguere eam oportet ex venteris tumore: nā is magis, & citius impletur in mola, q̃ in vera grauidatione, & durior efficitur. Menses item supprimuntur, nausea, & uomitus incurrunt, motus in utero tremulus percipitur siue à mola, siue ab utero, velut inutile pondus excutere contēdēte. Motus ē, quales fetus edere soleat, nullus persentiunt, et si trimestris, aut grandior existat. Accidit præterea corporis macies, deprauatus color, sanguine menstruo redundante, ac regurgitante ad supernas partes. Quæ accidiſſe constat, q̃ prohi alimenti materia desit, & quod anorexia graui corripiantur, nec cibū ingerant: quamobrem extenuari est necesse. Sequitur et quibusdam sanguinis fusio per uterum, cum à mola conceptæ magnitudine vel fetus premitur, vel noliū suscipit alimentū, vel ad incrementū nullus illi subest locus, mola occupāte magnā vteri partē, & ob id aperiēte vasorū oscula. Vnde mox dolores, & cruciatus vteri, sanguinis tetri, & concreti ualdeq; corrupti profusio ingens, & per plures dies animi deliquia, enixus, febris grauis, insomnia, pulsus defectio, coloris

Mola signa.

Mola signa.

Cc

loris

loris pallor, angustia, symptomata melancholica, & timore plena haud raro subsequuntur. Verum cum hoc (nisi foetus simul adsit) nihil in ventre mouere vel quod exiguum percipimus, ut Hip. testatur li. i. de mor. mul. dicens; Nihil autem in ventre mouetur, neque lac in mamminis generatur, licet plerisque mammae intumescant, verum sine lacte, & cum maxima lumborum grauitate, & in ventre cum pungenti dolore, utero ipso prolabente ad feminae decubitum supra dextrum, uel sinistrum latus. Verum de enixus tpe consideratione dignum est, quod ex his, primis statim mensibus quidam excernuntur, aliae diu durant per duodecim menses, ac per tres integros annos, ac multo plures. Aliae quidem cum fetu generantur, apertae, (ut dictum est) iterum uteri osculo: nonnullae foetui alligantur, quodam secundis ita implicite sunt, ut difficulter excerni secundas permittant: aliae rursus tam grandis existunt magnitudinis, ut grande aliquod animal representant. Quas procul dubio esse periculosissimas nemo dubitauit, maxime si Hip. crediderit, quod li. i. de mor. mul. & lib. de steril. haec refert uerba; Si mola, una caro fiat, mulier perit, neque, nisi fieri poterit, ut superstes maneat: si uero plures, erumpit ipsi per pudendum sanguis carnosus plurimus; & si hoc moderate fiat, seruat, sin minus, effluxu correpta perit. Distinges autem haec accidentia ab iis quae in uero conceptu reperiuntur, quod signa omnia certam quidam conditionem praeseferant, qua id facile monstratur; nam cibi fastidium non utcumque, sed maxima cum animi deiectione est: ite immodicus appetitus non quiescit adhuc exhibere appetita: uomitus uel niger, uel foetidus, aut alterius deterrimae conditionis profilit: dolores frequentes, grauiore, & acutiores: animi deliquia non sine periculo: enixus est cum grauissimis accidentibus, & toto fere gestationis tpe prope os pubis, pudendum, & imas uentris partes, pondus persentiunt, & non leue molestiam, quasi ad partum perpetuo pruritu irritatae, cum dorsi & inguinum doloribus. Quae omnia anxios, & quodammodo sollicitos nos reddere debent, suspicantes conceptum illum non esse legitimum: inquit. n. Hip. li. i. de mor. mul. Iudicare uero oportet ex plenitudinis mole, & quod in uentre non mouetur: nam trimestris, foemina quadrimestris motum habet. Postquam igitur tpe hoc praetergresso, non mouetur, nimirum hic morbus est: est autem hoc signum, quod lac in mamminis non generatur. Curadi quidem rationem tribus omnino capitibus comprehensam esse arbitror. In primo quidem cum mola confecta esse certo scimus, quid agendum sit docebo. In secundo qualiter accedentibus, quae ipsa excreta subsequuntur, & in ipso enixu uigent, subueniendum sit. In tertio uero, ne iterum foemina in huiusmodi conceptum incidat, praecauere monstrabo. Primam itaque medicandi rationem maturo, & prudenti consilio aggredi opus est, ne loco informis foetus ambiguus signis deceptus; aborsu prouocare contingat. Quam profecto rationem Hip. dixisse arbitror li. i. de mor. mul. Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut certe cum praedictione. Verum si certi fuerimus mola esse conceptam, (quia maius periculum est, si diutius in utero inueterauerit, ita ut plerisque scriptum sit, quod paucissimas fuisse superstites) pronuntiato periculo curationem aggredi oportebit; laborante aeri reposito exposita, in cubiculo non admodum lucido, exhibiteque uictu optimi nutrimenti, & prohibitis animi affectionibus. Quo facto, si corpus plenum esse conuereris, sanguinem ex dextri brachij basilica extrahes, parce tamen ne doloribus, & sanguine nimis detracto, imbecillior foemina fiat. Nec conuenit malleolorum uenam tundere post praedictam sectionem, sanguine adhuc redundante. Quod si crassorum humorum copia subsit, praeparatione praemissa, pro-

Curadi
ratio.

fos

Afos purgabis, ut e. de suppressis mēfib. dictū est. Præterea, si natura ad expulsionē non gliscat, neq; partum acceleret (qđ melius foret) eis vtendū est medicamētis intus, & extra, q laxandi, emolliendi atq; mitigandi vires habeāt. Sic. n. inquit Hip. li. i. de mor. mul. Et primū quidē totum corpus foueto, deinde per sedē clysterem adhibeto, quo sanguis multus erumpat: fortassis. n. qđ cōpactum est, cōmoueris, id quod fœtus esse putatur, muliere a pharmaco cōcalfacta: sed & vteros colluito, quo sanguinem educas, sin minūs, subditijs vtatur fortissimis: ē bupræsti, & dictamum creticum ē vino bibat: sin minūs, castorei testē, & retro cucurbitulam ipsi ad laterum mollitudinē effigito, & plurimum sanguinē detrahitō: atq; hoc maxima rerum, ac viriū ipsarū cōiectura facta, facito. Qua snia pulchrē docet, vniuersā huius affectionis curationē, à qua sumpta rōne licet fœmēta in principio parare, q vteros aperiant, vt faciliē sanguis deinceps fluat. Huius naturæ sunt quæ parantur ex decocto maluarū, althææ, chamæmali, seminis lini, fœnugræci, fertulæ, & anethi, factō quidē ex aqua, aut hydræleo, qbus paulo post addes lauri folia, thymum, pulegium, hyssopum, poliū, centaurā, & crocum. Sed peculiarius huic vsui cōpertum est prodesse decoctum, quod recipit

B althææ, maluarum cum suis radicibus ana m. j. radice aristolochiæ rotundæ, & longæ cuiusq; m. j. & s. (longæ, item aristolochiæ radix fœmori alligata partus accelerat) foliorū artemisiæ, mercurialis, saluiæ, hyssopi, calamēti ana m. s. seminis lini, althææ, fœnugræci, & leuistici ana s. s. florū chamæmali, meliloti, roris marini, geniste, artemisiæ an. p. j. fiat decoctio in hydræleo, & cū philtis foueantur muliebres loci, inguina, & coxendicū partes. Quo factō, hoc linimentū p̄diētis partib. adhibebis calidū, qđ recipit olei irini, liliorū alborū, anethi, & chamomillæ ana s. j. butyri recens, adipis anserini ana s. j. & s. vini odorati. s. j. bulliant ad consumptionem vini, & addē ladani s. j. ceræ q̄tū sit satis, vt fiat vnguentū. Aliud quidē maioris efficaciz experiri poteris, qđ recipit dialthææ. s. ij. emplastri filij Zachariæ. s. j. axungiz porcinæ, pinguedinis gallinæ, anseris, & medullæ cerui an. s. s. styracis calamitæ. s. ij. colocintidis, pulueris radice vtriusq; aristolochiæ an. s. j. oleorū de lilio, & violatū q̄tū sufficiat, vt fiat linimentū addito croco. Verūm si hæc prodesse nō possint, vt mola decidat, & angustia, ac dolores creuerint, ad maiora deueniendū esse cōsuluir vrgens necessitas: quo casu

C confert potius, qui recipit cinnamomi electi, myrtæ electissimæ an. s. s. pulueris aristolochiæ lōge. s. j. pulueris diamargaritonis frigidi. s. ij. fiat oīum puluis, cuius det. s. j. cū aqua decoctionis phaseolorū. In qua sanē re si plurimū necessitas cōpulerit, ad ea q fœtus mortuos eijciūt, deueniendū est. Qđ si hæc uelis experiri, li. huius operis. 4. c. de secunda relicta, abundē reperies. Ceterū cū in laborioso hoc enixu vires tm labi possint, q fœmina frequenter præ animi defectu, & spirituum resolutione periclitentur, omni arte curandū est vires reficere, & robustiores reddere, maximē si a partu anteq mola excernatur, vel antea ob molæ vitiū copiosior sanguinis fluxus pcedat. Optimis itaq; iusculis, & carnibus caponum atq; perdicū, vel succo carnis cum margaritis, vel pulueribus cum electario de gēmis laborantē reficere oportet, vel iccore gallinaceo elixo cum iure gallinæ uel capi, factō ex prædictis puluerib. salamento cū saccharo: succo ē reficere oportet ex caponum, & perdicum carnib. in balneo mariæ extracto, dummodo puluis margaritarum, gariophyllorū, cinnamomi, & coralli

Cc 2 rubei

rubei de super spargatur. Sed potissimum id opus facies vino albo, tenui, & odorato, ac si sanguis copiose fluxerit, admixto modico rubro. Quib. factis Deo op. max. iuvante vires facile restituentur, ac fortuna discedet, obstetricis manibus conante carnem illam comprehendere, ac leviter extrahere.

Secunda curandi ratio, ab excreta mola principium sortitur, quae procul dubio tantum praecipit viribus providere, & dolores mitigare: hoc quidem anodynus, quae superius diximus, & oleis liliorum, de semine lini, lumbricorum, de radice, & semine angelicae, & axungijs gallinae, & anatis cum croco, & butyro recenti, & alijs huius celsus: illud vero praedictis cibis quae renutriendi vires habeant, veluti usculum cum vitellis ovorum, pauco vino albo, saccharo, & cinnamomo. Praestat, & vinum ex odorematis confectum, electarium de margaritis, vel conditum ex confervis rosarum, buglossae, & violarum, adiecto pulvere margaritarum; vel electarij de gemmis: confert etiam alchermes vel confectio de hyacintho. Quod si sanguis plurimum irruat (quod gravissimum saepe infert periculum) viriliter cibum ingerere oportet, & partes supernas leviter vincire, ac fricare, & alijs praesidijs uti, quae c. de immodicis ment. dicta sunt.

Tertia vero, & ultima curandi ratio praecavere docet, quo minus iterum generetur mola in ijs, quae semel id malum perpessus sunt, qualia reperies c. praecedenti. Quam etiam indicationem adimplebis purgatione ante menstruum fluxum, sanguinis missione ex talo, si improbe menses prodierint, & ex brachio, si sufficienter fluxerint. Proba item victus ratione, moderatis exercitijs: cauentes ne concubitum admittant mensuris non satis purgatae, aut mox à conceptu, si femina se concepisse senserit: quod partu peritis facillimum est.

De falsa gravidatione. Cap. 9.

NON citra optimam considerationem factum est, falsam gravidationem à mola me separasse: quidem, ut mea fert sententia, & mox probabo, & generationis modum, & affectus naturam, & curandi rationem, ac signa ipsa longè diuersa habent. Fit itaq; gravidatio falsa, cum feminae cuiuspiam viro uterum menses supprimuntur, venter intumescit, accidentiaq; verae gravidationis similitudina ad sunt: cum hoc tamen nil vitae particeps in utero efficitur, sed aliud, quod cuiuspiam elementorum proportionem, & natura respondeat, velut flatus, aut quid aquae per simile. Cuius rei gratia dictum est praecedenti c. ob id hominem esse perfectissimum inter cetera animalia, quod omnium perfectiones complectatur. Nam cum quatuor sint naturae perfectiones, esse quidem ut in elementis, vivere ut in plantis, sentire, ut in animalibus, ac intelligere, ut in homine: fit quidem, ut inferiores superioribus contineant, sicut binarius numerus continet unitatem, & ternarius binarium, & unitatem. Sic prorsus pari ratione id, quod essentia tantum gaudet, necessum non habet, ut vivat, neque quod vivit, ut sentiat, aut quod sentit, ut intelligat. Verum in homine omnia praequiruntur, ut praecedenti c. dictum est. His suppositis, cum natura progrediat in generatione perficiendo per ascensum: contingit non raro in prima perfectione ipsam subsistere. Nam susceptis seminibus non affluente sanguine, & utroque semine morbofo existente ex calore imbecillo uteri, & viriusque seminis in aqua vel in vaporis utrunque semine degenerat: non quidem agere nec debilitate, nec alio modo, ut in praedictis facultatibus, facultate formativa, sed extincta ferè omnino existens permittit calorem vel semina liquari, vel in hali

A halitum mutare citra aliud conceptus principium, prohibens tñtum, ne in corruptionem genitura commigret. Id. n. est, quod solum efficere valet subsistēs in eo, quod potest, nimirum in specie illorum elementorum. Non quidem q̄ ipsa formatrix facultas elementa illa possit efficere, sed tñ impedire, ne materia illa in corruptionem commigret. Calor tñ, cuius hæc opera sunt, per diminutā coctionem vaporem seu aerem creat, & per liquationem, si imbecillior fuerit, aqueam substantiam: à quibus, postq̄ uterus semine suscepto conclusus est, venter intumescit, & reliqua subsequuntur grauidationis indicia. Atqui cūm facultatis formatricis nullum in hoc opere, elucescat vestigium: à prædictis cōceptibus hunc affectum separare mihi fuit uisum; & quia semine concluso hæc mala succrescunt, grauidationem, eamq̄; falsam appellare placuit. Quamobrē cēseo Hip. dictum esse lib. de mor. mul. & multis alijs in locis, loquens de fœminis sic affectis. Et putant se in uentre habere. Sed clarius profert lib. de nat. pue. qui eas, quæ longius, quàm decem mensium tps uterum gestare sibi uise sunt, deceptas esse testatur, idq̄; in hunc modum. Quod uteri sepe spiritum capiant in se ipsos à uentre flatum exhibente, eleuato tñ atq̄; intumescere vtero: vř sanē sibi tñ mulieres concepissee. Quin et menses non procedentes atq̄; in utero congregati, aut calescentes, aut flatibus mixti falsam quandam grauidationis speciem nō raro mulieribus præbent, ut sibi in utero habere uideantur, nimirum menstruis nō prodeuntibus, & uteris eleuatis. Quod his verbis etiam Hip. dixisse constat li. i. prædictionum. Quæcunq̄; in utero se concepissee putant, & non cōceperunt, & per multos menses falluntur, menstruis purgationibus non apparentibus, & vř tres augeri, ac moueri vident: hæc & caput dolent, & collum, & præcordia, & in mammis lac ipsis non est, nisi modicū quiddam, & aquosum. Cuius et affectio nis Barbaros medicos meminisse constat, nec non, & neotericos, qui sub nomine molæ non ueræ, eam complectuntur: inquit. n. Matthæus de Gradi. Fit etiam alia apparentia prægnationis, & falsa prægnatio ex inclusione aliarum materiarum ex matrice non sic in duratarū: de quibus aliquoties est uentositas sola generata in matrice, siue in concuitate eius, siue in uenis extendens eam præter naturam; & generatur ex humiditatib. ibidē inuentis clausa matrice. Quā quoque sniam Auic. obtinuisse constat: à quo Matthæus ad verbū transcripsit, cōstituens prædictas differentias; in quarum una, aquosa præest substantia, q̄ tps tractatu in corruptelā degenerat. Huius primū meminisse Hip. legimus li. i. de mor. mul. per hæc uerba; Multis uerō contingit, ut putent se sex mensib. in utero habere, aut et paulō breuiori tpe, & uēter prominet, & alia sibi fieri putat uelut in uentre habentī, postea sunt, quibus suppurati erumpunt supra inguen simul cū quinto, aut sexto mense, & uia ea patefecerūt. Quibusdā aut̄ ulcera fiunt in vteris et̄ infra sub inguine, & periclitat̄ mulier de uita. Quibusdā et̄ (subdit) in pudendum erumpunt, & prodeunt ipsi putrefacti, ac purulenti. Quibus euident̄ fit argumentū, fœminam sic affectam in uentre habuisse, ceterum id aquā, eāq̄; corruptam fuisse: quibus constat, falsam grauidationem à mola longē differre. Sunt equidem non paucæ falsæ grauidationis differentie: nā quibusdam in aqueum humorem genitura cōmigrat: alijs in flatum; nonnullis in pus: plerisq̄; in mucorē fœtidū, acrem, & mordacem: alijs et̄ in ichorem tenuem, & fœtidum subalbidum, uel in globosam tofaceamve pituitam uel caloris præter naturā vteri

Cc 3 in.

Differen
tia.

in eodem induratum. Quæ omnia vterum in tumorem eleuasse, ac postea excreta fuisse autorum decreto, & obseruatione comperimus. A

Causa. Causam habetis affectus primò feminis morborum, & inutilis susceptionem, & conclusionem: item vteri intemperamentum, quo genitalis feminis spiritus perit; quibus accedit, vel pituitæ, vel aquosi humoris, aut diluti sanguinis aliquid, maximè si femina sua sponte menses decolores, pituitosos, aut ichorosa substantia conspurcatis habeat. Quibus proculdubio facillè constat id, quod vtero susceptum est, in aliquam ex prædictis substantiis migraturum.

Signa. In ijs verò, quæ apparenter grauidæ sunt, primò menses supprimunt, quos antea necesse est, non fuisse boni sanguinis: ob idq; his suppressis dolorem perferunt molestum capitis, lumborum, dorfi, ventris, & inguinum. Venter celerius intumescit, quam in vera grauidatione: nam in ijs, quæ grauidæ sunt, ferè a principio subsidet, & postmodum eleuatur: at in his, confertim intumescit, & percussus tympani sonum edit. Verum si sonitus aquæ naturam referat, grauitas & fluctuatio in ventre perferuntur, & albis humiditatibus quid persimile ab vtero instillat foetidum, acre, ac mordax. Pedes item nonnunquam intumescunt, & facies, sed potissimùm oculi, nisi ex flatu sit, totius corporis color in pallore mutatur: & tandem omnia ferè accidentia hæc feminæ habent, quæ in hydropæ, vel vteri inflatione reperiri diximus. Quibus etiam accedunt febres inordinatæ, cibi fastidium, appetitus deprauatus, & animi defectio, & alia his similia. Præterea in huiusmodi feminis grauidationis tempus, neq; vnum, aut ordinatum existit, sed ante in plerisq; vterus proicit prædictas fecundas, in aliquibus verò multo post statutum tempus, ita ut non paruum inferat admirationem. Euadunt quidem ab hoc malo foeminæ, vel steriles, vel pudendis exulceratis: quapropter diligentia non leui futurum malum præcauere oportet, & præsens curare, maximè si affectio antiquior fuerit, nam eo tempore suppurationem subit aut vterum, ita malè afficit, quod immedicabilis superfit. B

Curatio. Obtinet quidem id affectionis genus, a quaui prodeat causa, vnam communissimamq; curandi rationem, nimirum, euacuationem eius, quod præter naturam in vtero concluditur, siue flatus, siue aqua, siue pus, quæuis alia substantia sit. Habet etiam vnaquæq; prædictarum causarum aliam peculiarem medendi viam, nempe peculiaribus, & sibi propriis auxiliis debere vacuari. Quamobrè præmissò optimo vitæ instituto, frequenti exercitio, parcissimo potu ex vino, vel aqua cinnamomi, anisi, corticum citri, aut radicis chinæ, omni abortum mouere oportet. Caueat tamen diligens, & prudens medicus, ne falsa falsi conceptus imagine decipiatur, & partum legitimum perdat. Cuius rei facta diligentia distinctione, validis exercitiis feminam committere oportet, velut saltus est, aut cursus, idq; in primis grauidationis diebus. Tandem fomentis, quæ c. præcedenti adduximus, vtendum est, & inunctionibus ex oleo, croci, spice, & liliorum alborum cum vino, in quo ferbuerint radix aristolochiæ, ciminum, ruta, & anisum cum artemisia, in fessionibus etiam rerum, quæ valenter menses, & urinas mouent: pessariis, quæ uterum irritent, & purgent, veluti ex hiera, ex aloe, C
ex

A ex agarico, ex succo lictæ, & alijs grauioribus, quæ paulò inferius cap. de secūda relictā recensebo: clysteribus etiam acrioribus, & quæ flatus discutiant, ac ventrem purgent. Per superna vetò porriges, quæ valenter menses mouere proprio cap. diximus, & alia, quæ vrinas ciunt. Quæ proculdubio omnia admiscebis ijs, quæ è directo prodesse profunt flatui, aut aquoso humore. Quo in opere cautè corpus, facta leui ex melle rosaceo, vel syrupo absinthij, aut de thymo præparatione, purgato ex hiera, pillulis mastichinis, ex aloë, aut confectis ex agarico, cartamo, & aloë, si humoris huius copiam, à quo flatus eleuantur in corpore, redundare cognitum sit: nam si solo defectu caloris flatus orientur, purgandum minus est, & discutiendum, ac roborandum magis. Facta tamen purgatione flatui discutiendo innitendum est, facta per vterum inunctione oleo ex radicibus liliorum, cui in decoctione adiecto cardamomi, seminis apij, & ameosana partes æquales. Præstat & oleum de cinnamomo, de baccis lauri, & reliqs discutientibus: item emplastrum de baccis lauri, vel ex prædicto oleo, & stercore bouino, aut columbino, addito vnguento marciaton, & alijs, quibus in tympanite vti conceditur. Vterum autem prius mollificato, vt facilius, quod ex flatu attenuatur expiret: cui vsui in fessionem parabis ex althea, semine lini, femugræco, floribus chamæmali, anethi, & semine rutæ: quibus euaporatione, & fomentum cum filtro parabis. Item suppositorium indes ex linteo prædicto decocto, madido superparto puluere aristolochiæ longæ, calamenti, rutæ, hyssopi, & trochiscorum de myrrha: quo non erit ab re suffumigium aliquod parare ex ruta, picra, aloë, & similibus. Loco autem suppositorij vtere radicæ maluæ, althææ, vel talsi barbaßi inunctio oleo costino, de lilio, de ruta, de croco cū puluere rutæ vti tor. Clysteria etiam, quæ discutiant, profunt, si acceperint decoctū chamæmali, anethi, rutæ, serpylli, sisymbrij, artemisiæ, seminis apij, feniculi, cimini, ameos cum oleo rutæ, vel de baccis lauri, additis hiera, & melle rosaceo. Quod sine hæc prodesse videantur, electarijs, quæ flatibus discutiendis sunt idonea, vt edum est, vt diacimino, dianiso, theriaca instillatio liquore ex vino, aniso, dauco, cinnamomo, theriaca cum mica panis recenter cocti, & puluerib. radicis angelicæ, cum decocto lupulorum, & melle per chemicam artē in balneo mariæ extracto. Ex vsu quoque est, summo manè parum aquæ sumere decoctionis cardamomi, seminis apij, ameos, & cassiæ lignæ cum passularum carne, & modico vino. Si tamen aquosum humorem in vtero contineri compere-ris, frequentioribus vtendum est purgationibus ex agarico, pilulis mastichinis ex hiera, cartamo, diaphenicone, vel syrupo ex artemisia, decocto radicis chinæ, agarico, & cartamo confecto. Tandem eis vteris, quæ cap. de vteri hydropis dicta sunt. At si icho rosam, putridam, aut fetidam substantiam ab vtero promanare comperiamus, adhibenda protinus sunt ea, quæ vterum, & pendendum abluant per metranchitam iniecta: qualia cap. de vlceribus dicta sunt.



INTER ea, q̄ p̄gnantibus frequentissimè accidere cōspicimus mala, primū & vulgariū euenit appetitui quoddā vitium, ob varietatē, & instabilē conditionē, picaceum appellatum. Quē sanē affectū appellant, picā, seu chitam, ex auiculā cuiusdā similitudine, q̄ varijs ex albo, & nigro pingit colorib. aut hederæ similitudine, q̄ varijs rebus sibi obuijs adheret, & inserit: malaceā Latini appellant. Est quidē hęc affectio vna ex ijs, q̄ ori ventriculi accidunt: appetentiam (propriam illius pars officium) deprauans, non quidē in intentione, & augmento, vt in canino contingit appetitu, sed in deprauata appetitione, eaq; varia. Quamobrē huiusmodi affectum iure opūmo p̄dictis nobis insignierunt antiqui: ac reduxerunt ad earum rerum appetitum, quæ nobis extraneæ, & alienæ existunt, velut sunt carbones, gypsum, terra, & alia huius conditionis, vt v̄ginibus morbo v̄gineo correptis, ac viris atro humore infestatis, accidere passim cōspicimus, sed frequentius, vt ero gerentibus.

Causa. Succrescunt his fœminis huiusmodi accidentia, mille alijs varietatib. implicata ex mensium suppressione: quorum causā tot accidunt malorum varietates vt vix numero complecti possis. Sed antequam hinc pergā, nosse oportet, plerū que ea magis profecto ijs euenire, q̄ laudabiliori abundant sanguine, licet alijs quoq; non delint. Sed ea interest differentia, quod fœminæ opūmo p̄dictæ temperamento pulcherrimos producant partus, ipsæ in frequentissimè toto grauidationis tpe laborant. Ratio potissima est, q̄ adducit Hip. lib. 1. de morb. mul. nimirum, quia fœtus præstantiorem sanguinis partem ad se alliciunt impuriore, & fœculentiore relicta: ex qua consonum rationi est, fœminam malum habituram. Quod plerisq; accidisse scimus, & idem refert Hipp. li. 2. pop. par. 2. tex. 19. dicens. In vtero habenti in tibia dextra infernè tertio, aut quarto mense exanthemata. Ex quo loco constat iecur ex praua redundantia affici, & in dextrū erus sese exonerare. At eę, quæ valetudinariæ sunt, morbosos edunt partus, ipsæ verò à fœtu expurgantur copia fœdi sanguinis, & ob id plerunq; in grauidatione melius se habent fœtu sanguinis vitiosi copiam minuente. Vicunq; tamen sit, primis mensibus constat sanguinem menstruum redundare, qui non expurgatus, præsertim attracta puriori eius parte à fœtu, facillimè conspurcatur, & ea labe vitiosus efficitur, vt quancunq; adeat partem, grauissima accidentia concitare possit. Atqui non solum sanguis id malum efficit, sed eius ēt halitus tam est perniciosæ naturæ, vt non minus molietur damnum. Quem sanē cum ad os ventriculi transmiserit natura, inter aliā vitia, quæ excitat, appetitum deprauare nō raro habet, ita vt iuxta eiusdem naturam, quibusdā carbones, plerisq; terram & id genus reliqua abominatur digna, degustare in mentem veniat: talia pculdubio, qualis humoris redundantis conditio extiterit. Nam licet appetitus semper suo pte motu contraria fugere, & similibus delectari habeat, tam vehementer hęc humoris natura imprimit suum vitium partibus quibus adheret cōnaturalis fiat, & appetitus quoq; more naturalis similia appetat. Quippe actiones omne, quæ coniuncto insunt, & organo corporeo operantur, non possunt, nisi

pro.

A pro dispositione corporei instrumenti operari. Sic appetitua potentia tales appetitiones profert, quales est ventriculi temperamentum quoad praedictam actionem; quo fit, ut similia appetant feminae humoribus superuacuis ori ventriculi factis iam connaturalibus. Sic quae exusto humore abundant, carbones appetunt, & prosequuntur: quae melancholico succo terram ingerunt: quae saluginoso, sal edunt insatiabili quodam appetitu: & simili ratione quae humoribus crassis abundant, gypsum ardentem expetunt. Quae sane omnia non nisi ob similitudinem humoris deprauantis appetitum exquiruntur. Nec deest quoque ratio, qua aliquando liceat probare huiusmodi feminas contrarium sui affectus appetere: nimirum dum temperamentum oris ventriculi mutatur, ceterum intemperies non fit connaturalis: quo tempore potentia naturalis, quae nondum peruersa est, sibi simile appetit, & propter sui conseruationem affectui contrarium: quo fit, ut aliquando appetant, quod sibi futurum subsidium agnosceret si primo accessu videatur dissimile. Dignoscet autem id esse simile, aut dissimile, non solum a re appetita, licet videatur a natura aliena, sed ex eo, quod appetitus harum rerum similium, quae praeter naturam sunt, insatiabilis est, & nondum quiescit re appetita consecuta. At uero alter appetitus, quin subsidium affectionis, contrarium causae, aut intemperamento exequitur, tantum abest, ut insatiabilis sit, quod potius habita re appetita, cum ea morbo sit contraria, & ob id morbus ipse subsideat, cessat protinus appetitio, quia cessat necessitas. In altera uero crescit causa, quia crescunt humores ob similium appetitum, & ingestionem. Quibus facile cognoscet, & affectionem, & causam, causae naturam, quae utroque gerentes male afficiunt, ad tertium, & plerumque ad quartum usque mensem. Cessant autem eo tempore partum, quod uomitione vitati humores expurgantur, partum eo quod coquantur natura minime in cibis distracta: nam plerumque feminae sic affectae exiguum cibi ingerunt ob fastidium: partum etiam quod multitudo indies magis minuitur, quia primis duobus mensibus foetus parum ad se sanguinis trahit, plurimum uero, cum magis augetur.

C Longè quidem aliter haec accidentia curare oportebit in feminis utero gerentibus, quam in reliquis corporibus: nam neque purgationibus, neque alijs, quae vehementer abstergant pharmacis utendum esse censo, ob periculum abortus, maxime primis mensibus, ubi haec accidentia viget. Triplex igitur erit medendi ratio: una quidem, qua alimentis tantum studeat attemperare, & moderari deterrimam humorum conditionem: ob id iura gallinarum, & caponum, & carnum optimae substantiae adhibenda sunt; sicut extremitates porcellorum: confert, & succus cotoneorum vel malorum puniceorum cum pane: prodest, & abstinencia a dulcibus: & ijs, quae terram appetunt, nil commodius adhibebis, quam amyllum recens: reliquis uero confert oliuas albas ante cibum muria conditas, cum pane molli exhibere: post cibum uero uis passulis, auellanis, & ciceribus tostis cum sale, & sinapi cum obsonijs, ac ultimo malis puniceis utantur. Vinum etiam ex usu illis est, uel si aduersentur, aqua cinnamomi. Confert mali punici cremor cum puluere menthae: portulaca comesta, uel eius aqua, & syrupus: prodest in sumina sic affectis polipodium exsiccatum, quod efficacissimum est praesidium. Secunda autem curandi ratio docet humores abstergere leuissimis tamen medicamentis, & non nisi urgente maxima necessitate: ut ubi

Contrarij
ratio.

com-

cōpertū fūerit ab acido, acrive, aut falso humore morderi, si leniter vomuerit, id excitare aqua tepida cum modico oximelite oportebit. Nihil enim commo-
dius est vtero gerentibus, maximè in primis mensibus: nam & vniuersum cor-
pus expurgat, & fœtum ab humorum spurcitia liberat, vegetioremq; reddit, ve-
rum si difficulter vomuerit, abstinendum est. Prodest & purgationis loco mel
rosaceum adhibere, ac si plurimum necessitas postulauerit, aliquid ex ijs, quæ
leniter purgant adhibeto, dum periculum est, deprauatum appetitum in aliud
gravius malum commigrare, cui vsui proficuum est rhabarbari modicum cū
conserua rosarum. Tertia verò methodus consulit, exterius ventriculo adhibe-
re, quæ roborent, & conterant humores ibidem contentos, ob id palmularū car-
nes vino decoctæ cum rosis & fœniculo ventri adhibemus, vel malum cotoneū
vino rosaceo, & nardino oleo exceptum, & ventriculo appositum. Confert &
vinum cum oleo rosaceo, & modico aceto, ac mica panis tosta, aut oleū nardi-
num cum vino. Item cataplasma, quod recipit corticum citri, melissæ, calami o-
dorati, & olei nardini, ac maltichini quantum sit satis, vt cum pane tosto, & ui-
no rubro cataplasma possit efformari, & ventriculo adhiberi.

De pregnantium inappetentia.

Cap.

II.



MOX quidem à mensium suppressione, & in grauidis, & in re-
liquis experimento comperimus, fœminas cibos fastidire, &
abominari, iuxta illud Hippocra. 5. aphor. 49. Si mulieri ces-
sent purgationes, neque horror, neque febris superueniat, &
fastidia incidant, iudica ipsam in vtero habere. Atque licet
non sit certum, ac proprium grauidationis indicium, cibus fa-
stidire, si quidem plerunque virginibus ex mensium suppressione accidere cō-
spicimus, cum hoc tamen in ijs, quæ vtero gerunt, certum est ea occasione pro-
uenire.

Causa.

Verum, vt ex autorum decretis de promere potui, ex duarum causarum oc-
casione id malum provenire certum est: prima, quia plerique obseruauerunt in
plenilunio, & fœtu capillum germinante, fœminas fastidire magis, & tedio fa-
tiscere, quia per ea tempora pueros etiam in lucē editos deterius se habere no-
runt, & cum id quoque in vtero contingat, fœminæ tediosæ existunt, & nil gu-
stare appetunt. Altera verò causa ad sanguinem menstruum referenda est; quip-
pe scimus grauidis ex suppresso menstruo tria accidere: primum quidem, ope-
rationem seminis in sanguine: secundum, separatiorem dulcioris partis pro a-
lendo fœtu: tertium verò, effusionem reliquæ partis prorsus excrementitiæ in
vteri cavitatem: vnde vapores ascendentes appetentiam omnino deiiciunt, &
hæc est huius mali immediata, & potissima causa.

*Curandi
ratio.*

Licet dictum sit ab omnibus peritis in re practica, qualiter cibi fastidium, li-
ceat curare, in ijs verò fœminis, quæ vtero gerunt, secus agendum est. Quippe
expurgantibus medicamentis id efficere non datur, licet vomitibus id malum
curare

A carare frequentissime alluescat naturā, quam Medicus imitari tenetur, p̄sertim si femina sua sponte leuiter vomuerit. Præter quæ ijs etiam aptissima sunt, quæ austera, quæ acida, quæ etiam admixto modico sale existunt. Confert ad alimoniam auis omnis, quæ ex venatu capitur, præsertim si assa adhibeatur: tandē caro omnis inacta potius q̄ pinguis: vinum etiam generosum, & aromatis cōditū sed quam parcissimum, & per intervalla exhibitum, & ieiuno ventre.


Item profunt pyrum, cotoneū, palmulæ, nuclei pini, oleæ albæ ex muria, & aceto, vel nigræ, quæ in arbore optime præmaturuerint. Ex vsu etiam sunt, vel frigida, vel feruentes potiones iuxta ventriculi intemperamentum persentitum.

B Cui consimilem curationem adhibebis, si ventriculus aqua inundauerit, cui præter dicta, malagma porriges ex folijs vitis, cinnamomo, cotoneis, dactylis immaturis, calamo odorato, spica, & absinthio pontico. Exterius item ea medicamenta adhibebis, quæ ventriculum roborent, veluti sunt inunctiones ex oleo absinthij, menthæ, & cidoniorum cum pulueribus diarrhodonis, aut coralli, & rosarum. Confert & mica panis tosta vino albo irrorata supersparsa puluere cinnamomi, vel aliquo ex prædictis. Cui vsu proficuum est aliquod ex emplastris, quæ pro ventriculo passim adhibentur. Cavendum tamen est in hac curatione a copiosis medicamentis, & validioribus, quod hæc omnia accidentia sua sponte, & crescente sæta cellare soleant.

De prægnantibus, quæ ciliū cumunt.

Cap.

12.



C prædicta mensuum suppressione, dum vitiosus ferulentusque sanguis in utero redundat, idem quoque vapor ad vniuersam ventriculi cavitatem peruenit, ibidemque vitia excitat acitioribus ipsius partis respondentia. Est enim illius partis munus cibos ad coctionem continere, & prædicto halitu in eam partem conscendente euenit, ut frequentissime cibus, aut mox ab assumptione, vel multo post reiciatur, aut nauseam implacabilem excitet. Item nonnunquam alimentum ipsum vitiat, ac in nidorosam naturam commutat, vel in acidam cruditatem. Ea tamen parit mala partim acrimonia lacessita expellente ventriculi facultate, quæ si levis fuerit, nauseam: si verò intensius mordeat, & velliçet, vomitum excitabit. Verum si vapor ventrem ascendens, calidus exustusque fuerit, credibile est alimenta in nidorem commutanda fore, sicut si frigidus, aut calore diminutus, in acidam cruditatem. Ob id quidem iuxta naturam elenati halitus præsidia adhibere oportet, idq; cautè, ne gravior malum eo præsidio succrescat.

Cum in hac curatione vacationibus, & vniuersali prouidentia utendū non sit: ad particularia primo accessū deueniendū esse consulit rei natura: præmissō hoc fundamento: topica auxilia huic vsui necessaria discutientia, & roborantia esse debere: sic enim confert seminis apii aridi drachmas tres, coralli rubei ʒ. j. spica

*Crut. li
v. 10.*


spicae nardi, myrrhae, piperis longi, singulorum g. ij. mellis quantum sit satis, ut
 coquendo fiat electarium; cuius 3. aut. drachi. j. ieiun praebeto: post prandium
 vero conferunt cidonia in musto decocti ad mellis spissitudinem, vel mala pu-
 nica cum sorbis. Item confectio haec in tabellis facta, incredibili efficacia pro-
 desse fertur, quae recipit anisi, cinnamomi, corticum citri ana 3. j. & s. pulueris
 rosarum rubearum, coralli, & margaritarum preparatarum, & electarii de gé-
 mis ana 3. j. sacchari quantum sit satis, ut fiant tabellae cum aqua ferrata. Exte-
 rius tamen non erit ab re ventrem inungere oleo absinthij, nardini, abietis, &
 naptae cum modico puluere coralli vel diarrhodonis. Prodest, & mica panis to-
 sti succo cotoneorum vino, & aliquo ex praedictis pulueribus irrorata, vel suc-
 co menthae madefacta. Confert etiam sacculus ex puluere diarrhodonis, rosa-
 rum, santholorum, cornu cerui, absinthij, cinnamomi, & spicae. Ex usu quoque
 est, micam panis leuiter torrefacti vino odorato madidam ante praedium sume-
 re cum modico puluere cinnamomi, vel modicum vini aromatici, Hip. appel-
 lati. Quod si ad nidorofam naturam vergat ingestum alimentum, nullum aliud
 praestantius reperies auxilium, quam prima mensa parum aquae frigidae praebe-
 re, & paulo crassioribus uti alimentis, fugiens pingua, iurulenta, & reliqua, quae
 facilis sunt corruptionis. Si tamen corrupti cibarii, vel humoris aliquid ibidem
 esse persenseris, nullo alio auxilio citius huic malo medeberis, quam exhibito
 bolo armeno vel terra sigillata cum saccharo rosaceo: item prodest pulvis diar-
 rhodonis vel electarii de gemmis cum eodem saccharo, aut in tabellis formatus.
 Si crudum autem acidumve supersit alimentum: calidis & quae robur addere
 possunt, adhibenda sunt; qualia existunt, quae praecedenti c. retulimus. Praeter quae
 prodesse quoque ferunt potus vini uel aquae corticum citri uel cinnamomi; sicut
 frequenter masticare, ac deuorare parum cinnamomi uel radicis angelicae. At
 si forte accidat uomitum fieri ex humore aliquo ad os ventriculi conflante cum
 dolore graui, & cardiacis accidentibus, aut citra ipsa, ut in primiparis (quae pra-
 uis alimentis uti consueuerunt, uel uitam egerunt laboribus, & curis plenam)
 non raro accidere conspiciamus, iecore aut uniuerso corpore in uentrem referre,
 te, quod illi est molestum post uteri gestationem, maxime si foemina ante uel post
 tempus menstruationis, uomitus uel dolores pati erat assueta. Primo etenim morbi
 accessu coniectandum est an urgentior sit uomitus uel doloris indicatio, ea quae
 praestat humoris affluxus. Nam eo tempore dubium non est, quin frequentiori-
 bus aquae feruentissimae potibus subueniendum sit, aut uini, si pituitam subesse
 conperiamus, uel aliquo ex medicamentis quae nuper retulimus. Quo facto, ven-
 tri imponens cataplasma, quod recipit pulueris rosarum, & absinthij pontici ana
 3. ij. pulueris coralli 3. ij. & s. pulueris lignialoes, & diarrhodonis ana 3. j. furfu-
 ris quantum sit satis, ut fiat cataplasma cum vino rubro, ter quaterve calidum die
 appositum. Cuius efficaciae aliud efficies, quod recipit miche panis tosti 5. iij. ma-
 de fiat uino rubro, & succo citoniorum; uel, si astus fuerit uehemens, succo pla-
 taginis; aut aqua ferrata cum succo granatorum acrim, pulueris coralli, diar-
 rhodonis, rosarum, absinthij pontici, lignialoes, & terrae sigillatae ana 3. j. olei ab-
 sinthij, & rosacei omphancini ana 3. j. pistentur, & fiat cataplasma. Confert etiam
 inunctio ex eisdem oleis superasperfis praedictis pulueribus. Quod si uomitum im-
 moderantia poposcerit, non erit ab re emplastrum de crusta panis apponere.

Qui

A Quibus factis, & ventriculo iam quieto rhabarbari siue masticati, siue infusi, siue pillularum forma adhibiti vsus proficuum, & necessarius existit, per aliqua intervalla inter quæ vel syrupis pro humoris idæa, vel pulvisculis, aut bolis ex conserva rosarum cum prædictis pulveribus utendum est. Quia in re umbilico ponum assuum pulveribus dictis sparsum cum modico vino apponere oportet, & quæ dicta sunt reicere, donec fetus crescat, aut affectus subideat, ni propter urgentiam maiora postulaveris, quæ de vomitibus sistendis lib. 1. indica. & li. 2. c. de purgatione particulari reperies. Quod si illa non profuerint, huic vsui maximè proficuum experieris saluatellam dextræ manus iungere: quod auxilium securissimum abortus esse scio, & iccori, alioqui affectionis origini incredibile subsidium.

De ventris dolore in pregnantibus. Cap. 13.

B



A spiritu flatuoso tam immanes, & acerbi excitantur in ventre dolores, & cruciatus, ut ferè ad pulsus abolitionem res tēdat. Nam cum ex genitura tum intestinorum, tum reliquarum veteri, & ventris cavitatum vias coarctari sit necessum, eleuatis ex indebito vitæ instituto, vel ex eodem sanguine menstruo flatibus, facillè cum inclusi existant, & crassi, qui difficulter excutiantur prædicta accidentia circa umbilicum moliuntur: quæ vel abortum minantur, vel tormina efficiunt tam graua, quod periculum minari videantur, quæ sanè vitæ in utero gerentibus vitare summo perere oportet, ne inopinatò aliquid ex ijs, quæ nuper diximus, superexcreseat.

C

Cui affectioni medeberis præmisso loco vniuersalis providentur, in cibo, & potu moderamine, siccis fomentis superiori ventris parti adhibitis ex semine feniculi, cimini, anisi, anethi, & reliquis huius nature in pulverem reductis, ac vino, vel aqua irroratis. Cataplasmate etiam uteris ex ovis, oleo de bacis lauri frixis cum pulveribus supra dictis: calida item inunctione ex oleo liliorum, & anethinos ex quibus cum decocto prædictorum seminum clystere in parua quantitate inijcere poteris. Profunt quoque aquæ calidissimæ potus, aut vini aromatici, vel denubus frangere cinnamomum, & diutius ore agitare: quod etiam præstat anisum, vel cortices citri: quas vino denoratas, experimènto comperimus plurimam profuisse: sicut, & aquam stillatitiam ex cinnamomo, ciminio, aut corticibus citri. Fugendum insuper est in hoc affectu a fomentis humidis, & immodicis inunctionibus, utpote faciētibz abortire ob flatus dilatationē quam antequam resoluantur, moliuntur, ex quibus dubium non est, quin si uterus, & eius vasa dilantur, semina abortiat. Cui medeberis per assum ponum pulveribus dictis inspersum, & umbilico appositum.

Cutab. Tano.

De cordis saltu, ac de syncopi in praegnantibus.

Cap.

14.



QUEMADMODUM graues dolores ex flatu fieri posse dictum est: ita & ob eandem causam saltus cordis in praegnantibus fieri arbitramur. Nam flatulenta illa substantia si per arterias, aut venam canam ascendentem in cor, sese insinuet, saltus & cordis palpitaciones fieri rationi consonum videtur. Nitens enim cor, quod sibi praeter naturam transmittitur, pellere, miri nihil est, si motum illum extra ordinem, & proprii motus concentum edat. Quod sane accidens maioris mali praesagium esse solet: nam facilis est ab eo ad cardialgiā, syncopimve, & asphixiā commeatus: ob id quidem omni arte curandum est, praedictum accidens, quam citissimè mitigare.


*Cardi-
tatio.*

Nec parum haec affectio praerequirit in cibo, & potu, ac reliquis rebus non naturalibus commodationem, ut quae citra huiusmodi prouidentiam facile in praedicta mala commigret. Quapropter transactis primis grauidationis mensibus, & tentatis leuissimis auxiliis primò: audacter ad rhabarbari usum, vel coctionis amech sine scammono, & colocinthide confugiendum erit, maxime si corpus prauo aliquo succo abundare cognoueris, quo tempore rhabarbari modicum cum conserua rosarum porrigito, vel praedictae coctionis amech tantundem cum eodem rhabarbaro. Quo facto huic affectioni medeberis calidissima aqua epota: sic & aceris radix cum vino tussa. Sed inter oia conserua de hiacintho vino, vel aqua naphthae sumpta, electarium de gemmis, lapis bezoar, & reliqua, quae cordi opitulantur, ipsūq; tuentur à venenosorum halituū contactu prodesse, experimento didicimus. Sic scordij aqua, vel scorchiōnera, aut carlinae incredibili efficacia profunt. Sed efficacior multo est cardiaca herba per instillationem extracta, aut aqua cinnamomi, vel gariophyllorum arte chimica extracta. Exterior quoq; adhibere oportet, quae eandem usum praestent, halitusq; vel dissipent, vel ad extimas partes euocent. Ob id quidem mungere cordis regionem opus est vnguento, vel oleo naphthae, aut iasminorum admixto modico rosaceo, quibus si addideris theriacae modicum, probè factum existima, maxime si admiscueris aquae cinnamomi, vel olei eiusdem modicum, quae quoque usum praestat oleum de Mathiolo experimento nobis comprobatum: Conferunt saeculi ex pulueribus coralli, cornu cerui, carlinae, santhalorum, diambrae, diamulsci, seminis angelicae, & florum cordialium: item corium cerui, aut capreoli, ambaro, & moschu praeparatum eidem parti appositum. Eiusdem utilitatis sunt epithemata, quae sunt ex mica panis tosti, & aqua vitae, aut vino, aliquo ex praedictis pulueribus superparso, vel facta ex succo pomorum redo lentium, & vino, & eisdem pulueribus. Tandem omni arte curandum est flatus coris irruentes discutere, & odoramentis gratissimis spiritus reficere, donec suspiria, & anxietatem mitigaueris. Verum si ex copia tetri sanguinis malū fiat, sanguinem semel mittere opus est.

De

De pregnantium tussi.

Cap. 15.



IL equidem pregnantium partus equè accelerat, ac vt rectius loquar, abortum excitat, vires prostermit, & vniuersum corpus conterit, perinde ac tussis: siquidem capitis dolorè accersit per cōmōtione, vigilias infert, difficilem respirationē mouet, ac febrem aliquā accendit. In qua sanè affectione musculos plures laborare est opus: & ea ratione curandum est id malū lenire, & quā citissime mitigare, ne abortum promoueat, qui sanè certior, erit in masculis, quam in foemellis, maiores. n. hæ sustinent labores citra abortum, idq; maximè post primos menses: nam foemellæ initio prægnationis periclitantur magis, sicut mares, cum auctiores sunt, & moueri incipiunt.

Scimus quidem id malum plerumq; grauidis succrescere ex halitu aliquo tetro & mordaci à sanguine menstruo elato asperā arteriam, & reliqua respirationis instrumenta peruadente, irritantēq; facultatem ad tussendum. Præterea fit etiam ex albis, aut vitiosis mensibus, qui ante grauidationem fluere solebant retentis, vt testatur Hip. li. i. de mor. mul. dicens. Contingit. n. ipsi fluxū aquosum fieri, aut purgationem occultari, & ad ventrē conueniri, & ad crura, aut ad pectus, aut ad aliquam harum partium. Item suboritur prægnantibus hæc affectio ex peculiari aliquo capitis defluxu, tenui, vel nimis crasso, cuius etiam, ne idem malum accidat, ediscere prouidentiam conueniet.

Causa

Licet affectus ad sui cognitionem signis non indigeat, eis tamen opus habemus ad causas dignoscendas. Sic etenim dignoscēs à flatu proficisci, q; foemina, quantumuis tussiat, nihil excernit, neq; leuatur vllō medicamentum genere præterquam flatu per suctum excreto, & ips medicamentis, quæ vel flatus discutiant, vel leniores reddant. Dignoscēs ex albis mensibus suppressis malum proficisci, ex relatione, & ex foeminae prauo colore, totius corporis lussitudine, & grauitate, & ex nimio oris madore, ac spuitione crebra. Insuper causam huic malo caput præstare discēs, q; foemina multa tussiendo expuat, & crebra excretionē à tussi liberetur, & etiam quod à somno deterius se habeat.

Signa.


Etia si in hoc affectu, p̄sua sit vniuersalis prouidentia quatenus pertinet ad expurgationē corporis: id minime pfert grauidationis status, & ob id moderatione victus & potus, re agere est opus maximè si halitus malo causam p̄stiterit. In qua re purgandum nullo mō est, sed eo præsidio vtendū, quod leniendi solū vires hēat, in quo genere nil magis prodesse cōperies, q̄ potus calidissima aque ante cibū & somnum ingestus. Cui consimilē vsum præstat potus vini, aquæ cinnamomi, vel floris eiusdē cinnamomi, seminis angelicę, aut ipsum cinnamomū frequēter masticatū, vt ascēdens halitus vi horū medicamentorū digeratur. Labendo quoq; si fortē aliqd asperæ arteriæ adhaerit, porriges, potissimū cinnamomi decoctū, & gariophyllorū cū saccharo & melle. Ex vsu itē sunt tragacantha, amyli, & mucilagines psyllij, ac seminis citoniorū, vel ex eis cōfectū serapium.

Cura
ratio.

rapium. Si tamen affectio prodeat ex suppresso albo menstruo, vel nullam admittit curationem peculiarem (nisi rhabarbari modicum aliquando exhibere placuerit) vel ei similem, quod capitis affectio expostulat. Sic etenim cum ex peculiari aliquo capitis defluxu prodire comperimus, proficuum est alimenta siccioris naturæ, & boni succi porrigere, velut anium, maxime venationis, assatatum: quod si elixas porrigere placuerit, earum iuscula non adhibeas. Prodest amylo, vel pulvis ex farina hordei, & potus quam parcissimus. Docet quidem huic malo Hippo. lib. 7. popu. tex. 7. in historiam sororis Harpalidi subuenire, maxime cum ex aquoso humore cum sanguine redundante principium traxeris fabarum farinæ, quam Gal. 7. supplicium excitationi facilitandæ esse proficuum fatetur, cum melle, qua uti poteris, forma pillularum, aut in bolis, vel linctus modo cum dispumato melle, quod etiam cumini genus omne cum vino præstat. Sed huic vsui utile erit, præter exhibitionem bechlicorum pharmacorum, ac reliquorum, quæ leniendi vires habent, ad purgationem eius, quod à capite instillat, epocare mastiche ore masticata, vel quouis alio mastichario ex ficibus, pipere, mastiche, & reliquis. Nec fortui nocebit ex mastiche, & rhabarbaro pillulas conficere, quarum quinto quoque die. 3. ij. sumat femina. Cui etiam affectioni profunt brachiorum frictiones, vel ligaturæ, ac potissimum cucurbitulæ: & si femina ex timidioribus non sit, cum scarificatione. Sed noctu, ut somnum concilies seminis papaueris, & sacchari puluerizati modicum porriges, vel serapij ex papauere, & violis, an. 3. s. Item ouum sorbile cum amylo, vel tragacantho, terra sigillata, aut pulueribus seminis papaueris albi, uel alia, quæ tuta, & proficua expertus fueris.

De alio suppressa, aut nimis citata in prægnantibus:

Cap. 16.



DOEMINIS quoque prægnantibus, & magno sæpe cum abortus periculo aluius supprimitur: quippe sæx indurata, magno, ut pelli possit, indiget enixu: quo frequentissime dirumpitur ex vinculis aliquod, ac sanguis profilit, abortus quidem præludium. Ob id in ijs, quæ iecore sunt sicco, & squalente, & meseracas habent voraces, maxime gravidationis tempore, omni diligentia curandum est, lubricam reddere alui prunis, saccharo, & aqua hordei, vel maluarum decoctis: ite prodest aqua maluarum, & saccharum, aut syrupus ex mucilagine psyllij, & seminis citoniorum cum aqua maluarum, aut portulacæ, & saccharo confectus. Pro sunt clysteria ex iure anium, & butyro recenti, oleo amygdalarum dulcium, & saccharo rubro. Confert & prima mensa ante omnem cibum parum aquæ ingerere. Nec diutius licet protrahere alui purgamenta, etiam si femina ad excitationem minime excitetur, ne deinceps difficilius excernantur, & maius periculum subeat foetus.

Præterea, si defectu alimenti, eo quod multum in summat foetus, excrementa hæc nimium à iecore, & meseraicis exsuecentur, nullo alio præsidio citius huic malo subuenies, quam copiosioribus cibis, maxime virulentis, & decoctis.

Citatam quidem aluum mox cohibere curandum est: nam ipsa fluere, & ligamen-

A gamenta fœtus laxiora fiunt, & ipse imbecillior factus ocysimè eiicitur, & mater alimento fœtui commodo destituitur, præsertim si lyentericæ specimen fluxio retulerit: quæ profectò neq; matri, neque fœtui alimentum, quod superest, sufficere valet. In qua equidem curatione, verendum plurimum est, indistinctè & quemuis fluxum sistere, ei tantum sistendo niteris, qui aut disentericus, aut lientericus fuerit: nam si ex prauorum humorum colluie grauidationis tēpore aggregata fiat, cauendum est ab adstringentibus, & his quæ sistendi potentiam habent. Quippe hæc excrementa primis mensibus collecta, si fluant periculum est, abortus ob mordicationem, aut laxitatē partiū vtero vicinarum. Si verò cohibeantur certius adhuc apparet abortus periculū, ob prauī succi abundantiam; quo fit, vt cautè agendum sit cibus, & his q̄ in melius habitum mūtēt, ne fœminæ accadat, quod Stymargi uxori euenisse Hip. retulit lib. 2. popu. p. 2. tex. 4. quæ ex ventris perturbatione cum multum cepisset sistere, fœtum quadri mestrem corruptit. Sic, his medeberis iuxta fluxus naturā, & conditionē; etenim dysenteria (ut paulò inferius referā) rhabarbaro cū saccharo rosaceo bis terve exhibito cōpescitur, quatenus ad humoris fluentis copiam attinet, quē temperabis ante id syrupis ex portulaca, ex niolis, ex rosis, borragine, & buglossio: aut si nimis acer fuerit, ex succo acetosæ cum aqua hordei, aut ferrata: cauens, ne nimium clysteribus utaris, quibus non parum fœtus oblaeditur. Verūm si opus fuerit, eis utitur, q̄ abluendi, ac sedandi dolores vires habeant: quippe dolorum vehementia non tardius fœmina abortit. Quapropter adhibenda sunt q̄ oleū violarum, rosarum, amygdalarum dulcium, & butyrum recipiunt, additis vitellis ouorum cum pinguibus iusculi, & decoctis ēt anodynīs. Cæterū si vitio ventriculi aliquid crudum, aut semiconfectū uel fœtidū excernatur, eadē prorsus medendi rōne curari desiderat, ac uomitum exposcere antea dictū est: adhibitis ventri, quæ eadem parte retulimus, & affixis ēt umbilico, quæ robur fœtui, & ventri quodammodo præstent, uelut est pomum odoriferum assūm cū theriaca, cinnamomo, gariophyllis, mastiche, & pulueribus myrtillorum, rosarū, coralli, & diarrhodonis appositum: item frustum semiascæ carnis cum prædictis pulueribus. Nec omnino si diutius affectionem duraturam speraueris, posthabēdus est rhabarbari masticati vsus, uel pulueris eius cū saccharo rosaceo: quo facto, summopere conferre scimus mastichis. gr. iij. aut. v. cum eodē saccharo rosaceo. Quod item beneficium præstat idem saccharū cum bolo armeno, aut terra sigillata exhibitum. Sic languidioribus matri, & fœtui benefacit electariū de gemmis in tabellis confectum, & de margaritis præparatis maximè cū modico myrtillorum puluere, coralli & rosarum. Item his confert aqua, in qua aurum ignitum pluries extinguatur, uinum aliquando tenue, & aquosum, aliquñ nigrum aqua chalybeata dilutum: cibaria item optimæ substantiæ, & facilis cōfectionis, quæ maiori ex parte assā exhibeantur. Si autem uelis exquisitiore methodum, & curandi rationem legere, lib. 2. nostro indicationum c. de sistendis fluxionibus, adamussim reperies.

Supersedeo: consultò hac in parte à disputatione, de vrinæ difficultate, quæ instante iam iam partu frequentissimè corripuntur utero gerentes: siquidē ex vesicæ compressione fœtu iam prolabente potius fit, quàm morbosa aliqua causa, quæ auxilium expostulet.

Dd

De



In quibus mulieribus vberima menstruorum copia fluere ante grauidationem solebat, post conceptum quidem, ipso nequeunte tantum sanguinis contere, & in proprium alimentum eommutare, recrudescit sanguis ille, & qui denuo in iecore cōfiscitur, aquosior existit, facultate iecoris sanguifica ob immodicam copiam nequeunte probè ipsum parare, haud secus quàm in hydropē. Quo fit, ut tanquam inutilis matri, & fœtui delabi ad crura natura patiatur: quæ sanè adematosa fieri eo tempore necessum est. Ac si corrupti aliquid obtinuerit, uel tenuioris, & calidioris bilis admixtum, inflammari quoque contingit, & non rarò exulcerari, præsertim si fœmina antea uel obstructions, aut vitiosi succi redundantiam perpessa fuerit. Alijs quidem id malum prodit, q̃ in grauidatione fluxus aliquis aquosus suppressus fuerit: quòd Hip. insinuare videtur lib. 1. de mor. mul. dicens; Contingit ipsi fluxum aquosum fieri, aut purgationem occultari, & ad uentrem conuerti, & ad crura. Quapropter verendum est, ne hæc affectio in cacoethica ulcera commigret, aut in quid grauius. Nanque nouem mensib. t̃m mali partes suapte natura frigidas saltem à fonte caloris distitas perferre, haud tutum est. Cum hoc tamen experimento cōperimus, à partus purgatione citra auxiliares Medici manus, mulieres sic affectas in pristinum reduci statum. Ratio procul dubio est, quia aquosus ille sanguis nondum falsuginem, aut corruptionem adipiscitur: & ob id uel solo lectuli calori uel partus purgationi cedit. Verum in ijs, in quibus immodicus fit tumor, & noctu crura non detumescunt pertimescendum est, nequid mali eueniat. Expendendum tamen hac in parte, hoe malum plerumque accidere, à 4. mense ultra, uel quod alij affectus quos accersuit grauidatio cessent, & in hunc mutentur, uel quod ex nimia vbertate sanguinis iecur refrigeretur, uel quod sanguinis frigiditas ipsum iecur in consensum accersat, & vitiosum sanguinē gignere cogat, qui in hos tumores commigret, ad quæ omnia opus est 4. mensium spatio: quod probat historia sororis Harpenlidæ, lib. 7 popu. text. 7. ab Hippo. adducta.


Cutāli
ratio.

Præmissa ea uictus institutione, ut facillimè confici possit, & optimi, ac paucissimi, & siccantis sit nutrimenti: opportunissimum est præsidium, Actio præcipiente, citrinorum malorum decocto pedes leniter abluere, perfricatis ipsorum plantis ex aceto rosaceo, & sale, uel alumine cum uino. Prodest etiam non parum emplastrum ex caulibus uino, & aceto incoctis, & pistatis: uel chimolia terra cum aqua chalybeata, uel ea, quæ in officinis ferrariorum reperitur, dissoluta modico aceto admixto. Confert, & oleum rosaceum, & chimolia, uel solum ipsum rosaceum cum aceto: aut (quod experimento probatum est) papyrum aceto infusam, & parti impositam diu ibidem affigito: item fomentum ex uino ex aceto decoctionis rasuræ cornu cerui. Quod si in ruborem alterati partem comperiamus, præcauendum est, ne in corruptionem uel exulcerationem degeneret, adhibitis brassicæ folijs cum modico rosaceo, & chimolia

A molia terra. Cui vsui confert cataplasma ex cicerum, & fabarum, & orobi fari-
nis, succo caulium confectum. Vltimo (sperandum est) ne maximam praesidio-
rum siluam inutiliter profundamus) à partu foeminam liberam euasuram. Sed
interim, vt Hip. lib. 7. pop. tex. 7. docet in historia sororis Harpalidæ, cui crura
etiam tumore afficiebantur, & difficultas aderat spirandi, vtendum est eo, quod
ipse consulit eadem parte, dicens in fine textus. Fabis autem melle admixto va-
sa, & eclegmate ex melle, & cum ex vino bibilet Aethiopicum cuminum, me-
lius habuit, postea tussiens excreabit multa cocta pituitosa alba spiratio cella-
bat, peperit verò foemellam. Quæ sanè mala in grauidationibus foemellarum fre-
quentius fieri arbitramur.

*Cum hoo
tamen fo
res urge
tissimæ
nō sis nō
iusta cō-
mittēda
est, ne
ad prin
cipalium
mēbrū
affectio
ittināda*

De sanguinis profusione ex prægnantium vteris. Cap. 18.

B  **V**M frequentissimè vtero gerentibus menses, aut serosum aquosū-
ve aliquid erumpere comperiamus, idq; vulgatum sit abortus esse
prælium expendere hac in parte in animo est ex quibus partibus
& qua de causa, & qualis substantiæ in grauidis profiliat, vt innore
scat mediantibus signis, qñ auxiliares manus adhibere oporteat, & quando se-
cus, ac rursus quando vtendum sit non solum, tanquam inutile, sed tanquam
pernitiosum aliquod adhibere præsidium.

Ex Gal. euidenter constare arbitror, maximè 5. apho. § 8. ad vterum duplices
venarum propagines excurrere: quædam ad corpus, & cauitatem ipsius, alias
quidem ad collum, os, & ceruicem, ac scimus per vtrasque diuersimodè mēses
vterive purgatione profluere. Per eas, quæ in collo sunt, proculdubio virgi-
nibus maiori ex parte menses prodeunt, in quibus hymen obstare poterat san-
guinis euacuationi. Per eas vero, quæ in vtero ipso sunt, in reliquis, vel in gran-
dioribus etiam virginibus, aut sanguine inundantibus, & in cæteris, quæ aut
pepererunt, aut deuirginatæ sunt: per quas alimentum foetui impartitur natura
& per vtrasque sese expurgare aduēscit.

C Quibus sic statutis, cōstat trib. ē partibus in grauidis posse sanguinē ex vtero
psilire. Quippe in nonnullis grauidarū ordinatim & feliciter cōperimus mēses
fluere, quod nulla alia ratione posse fieri arbitror, q̃ eo q̃ plus sanguinis in cor-
pore præsit, q̃ foetus dispendere possit: & per ea vasa, q̃ in vteri collum degene-
rant, irruat. In alijs ēt per interualla inordinata (quod frequentius est) vel statu-
ta, sanguinē pfluxisse cōperimus: cuius sanè profusionis occasione foeminę mo-
lestius se habet, & foetus debiliores existūt, iuxta illud Hip. 5. aph. § 8. Si mulie-
ri vtero gerēti purgationes cent impossibile est fētū esse sanū. Quam sniam licet
Gal. ad fluorē ex venis colli factum referat: mihi quodammodo vī perdifficiliē:
nam purgationes copiosiores, quales ea parte intelligit Hippo. per vteri collum
fieri à ratione dissonum videur. Quinimmo censet idem autor ore vteri con-
cluso, & complicato cessare menses, & eo existimo dictum fuisse ab eodem li-
bro de natura mulierum. Si complicatum fuerit os vterorum, menses non pro-
deunt: si verò prodeant, pauci & parui sunt. Et eadem refert verba lib. de morb.

*Primus
locus.*

Dd 2 mul.

mul. Cum hoc tamen adhuc videtur idem dubium superesse, licet ab vtero pro
deat: siquidem os vteri clausum non minus impedit sanguinis ab vtero exitu,
quàm si ex proprio collo fluat. Verum huic dubitationi respondendum est: dū
collum complicatur, eius vasa ita ob compressionem coarctari, vt fluere ab eis
nihil, vel quàm parcissimum possit, vt Hip. mens est. Nihilominus tamen collū
vteri libentius admittere fluxionem ab vtero prodeuntem, eo quòd caritas non
possit tantum coarctari, quantum vasa ipsius colli.

*Secundus
locus.*

Quibus rationibus persuasus arbitror (vt ad secundum locum fluxionis ac-
cedam) non raro in grauidis ex venis vteri internis posse sanguinem profluere:
argumento est fœtus imbecillitas, qui per easdem venas suscepat alimentum.
Sed existimabit aliquis, & meritò perdifficile esse credere, ab vteri venis sangui-
nem, fœtu superstite, profluere: siquidem venæ adhærent fœtui, ita vt conceptus
fieri minimè possit, nisi vbi semen affigitur acetabulis, quæ sunt ora vasorū in-
teriora vteri penetrantium: quod Gale. dixisse lib. de vuluæ dissectione per hæc
verba constat. Corion vuluæ inhærescit, hoc modo, vasorum vuluæ, quæ inte-
riorem partem penetrant, ex quibus etiam menses expurgantur, cū femina con-
ceptura est, ora aperiuntur: conceptionis verò tempus est, vel incipientibus, vel
cessantibus mensibus. Itaq; nisi hæc vasa dirumpantur, videtur non posse san-
guinem profluere. Cui dubitationi respondemus, verum esse vasa hæc ad vteri
earum permeare, & corio inhærescere: verum cum hoc, duob. modis citra abor-
sus periculum arbitror sanguinem profluere ab his posse. Vno, quòd aliquot
vasa supersunt libera à fœtus alimonia: alio verò, quod sanguinis profusio fiat
per anastomosim. Quippe noo est credendum omnia vasa corio ad hærescere,
sed quædam ex ijs, quæ ad vterū pertingunt, vt euidenter probari potest: equi-
dem fœminas non paucas superfœtare conspiciamus, quod proculdubio fieri
non posset, ni aliqua in vtero superessent vasa, per quæ natura nouo fœtui im-
partiretur alimentum. Qua sola ratione constat, vasa intra vterum existentia
posse innoxie sanguinem fundere, quamuis mulier grauida sit: siquidem non
omnia vasa, per quæ menses fluebant, ad fœtum sanguinem producant, sed quæ-
dam etiam supersunt, per quæ menses innoxie descendere possint. Quo fit, vt li-
cet fœtus ob id imbecillior existat, cum hoc tamen abortu non periclitatur fœ-
mina, maximè si in corpore, aut vtero subsit plenitudo, quam fœtus cōterere ne-
queat. Secundo autem modo sanguis innoxie prodit, dum non perruptionē eo-
rum vasorum, quæ fœtui adhærent, neque aliorum, sed per anastomosim san-
guis profluit. Nam aut ita laxæ existere possunt venarum tunice, aut sanguis
nimio potu adeò dilutus, vel ex aliqua alia occasione tenuis, vt facile existi-
bus poris adhuc secundum naturam sanguis instillet: velut in pinguib. femi-
nis, & ijs, quæ molles sunt carne accidere non rarò conspiciamus: quamobrem
credendum protinus non est abortus esse præludium. Cuius etiam causa Hip.
meminisse constat lib. 1. de mor. mul. per hæc verba: Si quidem igitur præ pleni-
tudine fluat sinere ipsam optimum est: si verò vterus latus fiat, diætā sit alica, ca-
ro, suilla, aut palumbis, & vinum nigrum: potiones verò, quæ ad fluxum descri-
buntur, & subdit. Pronuntiato autem de muliere in ventre habente, duos, aut
tres menses, & vtrā, si menses statim prodeant, singulis mensibus necesse est te-
nuem ipsam fieri, ac debilem.

Quam

A Quandoque etiam febris ipsam corripit his dieb. quādo mēses prodierint, & dum prōdeunt, & postquam prodierint, pallida fit, sed & pauci prōdeunt. His vteri magis, quam opportunum est, hiant, augmentum fœtus diminuunt. Descēdit. n. cum mulier in ventrē habet sanguis paulatim in vteros à toto corpore, & in orbem circa id, quod in vteris est, circumstans illud auget, si verò hiat int vteri magis quam oportet, sanguinem singulis mētib. velut procedere solet, dimittunt, & quod in vteris est tenue, ac debile fit. Si verò curetur mulier, melior & fœtus, & mulier euadat, si verò non curetur, fœtus corrumpitur, sed & ipsa periclitatur, ne diuturnam habeat morbum, si purgatio plus quam oporteat p̄deat. Placuit quidem ad verbum hanc sententiam scribere, quā euidenter constat de affluxu earum venarum, quæ ad vtericatum perueniunt, loquutū fuisse earum præsertim, quæ fœtus nati attingunt, si quidem refert superflitem, etade re fœtum. Quod si de reliquis fœtum alentibus velis audire sententiam, iterum legas prima verba huius loci, quippe de vteri laxitate mentionem fecisse reperies, quibus verbis anatomosis includitur, quod ex modo fluendi, & sanguinis paucitate, ita esse intelligendum discēs.

B Tertio verò & ultimo sanguis, p̄dit in gravidis, ex vtero, vinctis ipsis, & vasculis, p̄ quæ fœtus alimentum & beneficium susceperat, diruptis, & utrunq; dilaceratus, ex quo quidem fieri abortus necessario censemus. Natura. n. in ijs, q̄ vtero non gerunt, sanguinem non colligit intra vterum toto mēsis spatio, sed in venis ipsis ad tempus adseruat, ac post paulatim profundit. In gravidis verò semper in puerū p̄ in olucra affundit, quod monstrat in puerperio sanguinis adseruari copia. Quo fit, vt si vasa hæc, casu aliquo dirumpantur, fœtui alimentū defit, & reliqua ligamenta laxiora facta dirumpantur, & abortus oestime, & ferrè inuitabiliter sequantur. Quibus constat per quæ loca, & quib. de causis sanguis in p̄gnantibus ab vtero profluat. Quod sanè dānatum reperimus apud Hip. mille locis: nam & fœtum significare imbecillum in aphorismis scripsit, & abortus esse præludiū, aut grauis, & molesti partus, & qui ad decimum mēsem prorogabitur. Si fœtus virib. constet, & rursus octimestrib. laborib. plerunque assimilatur, vt euidenter Hip. docet li. 2. po. par. 3. tex. 34, docens. Quapropter menses quales octimestrium, qui sunt ad decimum tendentibus malum.

*Tertius
locus.*

Experimento in quibusdam fœminarum nobis etiam compertum est, p̄ maius grauidationis tempus purgamenta quædam ab vtero instillare, quædā alba alia pallida, sanguinolenta alia, nonnunquam fœtida, aliquando crassa, sed plerunque tenuia. Quæ vitia eis feminis succrescere existimo, quæ vitam agunt sedentariam, cum hoc tamen robusta constant natura, & eis etiam, quibus sanguinolenta aliqua purgatio suppressa, est maximè per hemorrhoides vteri, aut ant, in quibus purgamenta hæc ob defectum exercitii abundare inecessum est, grauidationis tamen tempore, boni consulens natura per venas, quæ vacuæ sunt persunt à fœtus alimonia, excernit, partim cum doloribus, maximè si hæc purgamenta detineantur, partim citra ipsos plerunque tamen per vteri hemorrhoides transiitit maximo cum fœtus, & matris beneficio: iuuant tamen huiusmodi excrementa ad faciliorem partum.

Dd 3 Di

Signa.

Distingues autem, ac nosces à quibus ex prædictis venis sanguis fluat, primò ex relatione: quippe si ex alio, casu, percussione, subita etiam animi perturbatio ne, denegata re ardentè expetita sanguis denudè inopinatò, & subito fluat; dubium non est, quin ex vasis alicuius diruptione id malum fiat, præsertim si accedat lumborum, & partium circa umbilicum dolor. Quod etiam colliges, si præcessit, aut præest cruciatus aliquis maximus ex flatu, aut morbus aliquis partium spiritualium, velut tussis, aut respirandi difficultas: item fœcum immodica ariditas, tenesmus, alui importunus fluor, & alia deniq; quæ vel animum, vel corpus vehementer turbare possunt: atque etiam immodicus æstus, aut ingens frigiditas, & reliqua, quæ naturæ modum excedere videntur; quorum copiam e de abortu, reperies.

Verum si sanguis ex vasis colli vteri fluat citra euidentem aliquam occasionem, ordinatimq; prodeat sine dolore, ac molestia, & fœmina boni coloris existat (quo signo cognoscimus iuxta naturæ leges profundi, præsertim si fœmora & inguina, veluti dum vtero non gerebat, doluerint) non licet tunc temporis turbari, neq; abortum vereri; sed fœminam optimo alimento alere, & copioso. Quod si ex venis internis, quæ superuacua sunt à fœtu, sanguis prodeat: idem quoque considerabis: nam si ordinatè prodit, sine manifesta causa, citra dolores, & accidentia, quæ prædiximus, ac fœmina fuerit boni coloris, coniectandum est citra abortus periculum profuere, & ob id nec turbari, nec auxiliares manus porrigere peritum medicum decet. Si tamen sanguis quàm parcissimus fluat, aquosus, nimis dilutus, citra euidentem occasionem, aut præsens aliquod damnum: coniectabile est per anastomosis venarum vteri affectum fieri. Quo fit, ut fœtus imbecillior indies fiat, & diligentiam medici prærequirat, quemadmodum nuper adducta Hip. sententia euidenter monstrat.

Curatio.

Hinc e enim si diligens fueris, facile discies cui harum fluxionum auxiliares manus adhibere tenearis: nam in albis vteri purgamentis, quæ retulimus, nullo indigemus auxilio, nullaq; curandi ratione; siquidem hæc natura transmittit per dicta loca, vt se tueatur à suppressa aliqua vacuatione, vel sese exoneret ex recrementorum abundantia: quippe ea si suppresseris, dubium nò est, quin vel fœtum interimant, aut in morbum aliquem grauissimum, vel imbecillitatem deferant, vel saltem matri perniciosum aliquem affectum accersant: & ob id super sedendum est ab omni curatione, vitæ ratione optimè instituta.


Sanguine autem fluente ex venis colli vteri, aut ex internis superuacuis, & quæ nullum præstant fœtui alimentum: vel ex illis, quæ fœtum quidem alunt, disruptis tamen, & dilaceratis: nullum quoque auxilium adhibebis; præter quam optimam victis, & vitæ institutionem, quietem, & animi tranquillitatem; ac si quid appetierint, id liberaliter porriges, etiam si paulò sit deterius. Umbilico insuper quæ tobur fœtui addant, & calorem, apponenda sunt: non quòd sit ob id sperandi, abortum præpediri posse, sed quòd viribus, & cum efficacia viuis exiliat, ne si antea intereat, sancto baptisinate careat. Qualia autem huiusmodi auxilia sint, tribus præcedentibus abunde diximus. Itaque præsidij nil aliud eo tempore efficere poteris, quàm sanguinem comprimere, densare, & cohibere, qui dum semel in vterum à venis disfluxerit, detentus vel concreuit, vel corrumpitur, vel mille alijs modis vitatur, ita vt in grauissima accidentia prom-

A promptissime degeneret, factu non ob id superstitie manente. Quamobrem licet non desint qui aliquot auxilia huic vsui scribant, ego tamen subtrahere malui, ne quis imprudenter eis vtens, maius malum manu faciat: quod si aliquibus vti velis, iam audies.

Superest sola curanda ea sanguinis profusio, quæ ab internis venis ex ocula aliqua occasione profilit: ex qua vnum duorum vereri oportet iuxta Hip. decretum. 5. apho. 58. vel factum esse imbecillum, qui nequit alimentum sibi commissum commutare; ex quo periculum vitæ impendet, & ob id perniciosi abortus: quippe magis morte periclitatur fetus ex morbo proprio, vel matris (quod fecundò veteri oportet) quàm ex sanguinis defectu: nam cum deest illi alimentum, curat diligenter sagacissima natura defectum supplere, metuens ne morte præueniatur; quod semper ipsa præcauet. In qua sine curatione primò considerabis, an vitium aliquod sanguis obtinuerit ex tenuitate, acrimonia, ac serositate; quibus lacerata natura eum expellere nitatur, aut continere præ imbellicitate nequeat. Qua in re omne curantis consilium sit sanguinem ab aquoso humore vel seroso acri, & mordaci immunem reddere, rhabarbaro sumpto per se pillularum forma, aut cum modico conseruæ rosarum ea quantitate, quæ expurgare sanguinem, & firmare, ac roborare partes citra corporis turbationem nata sit. Quo facto, alimentis, & medicamentis, quæ vim habeant condensandi, ac solidandi sanguinem vti liberè poteris: sic amylo ex lacte amygdalarum aqua chalybeata extracto, probeq; confecto vtendum est: illis carnibus, mīa citoniorū, & reliquis huius naturæ. Manè aut porriges saccharum rosaceum antiquum solum, vel cum pulueribus boli armeni, terræ sigillatæ, coralli rubei, cornu cernui, electarij de hiacinto, aut margaritarum præparatarum. Huic quoque vsui proficuum est porrigere syrupum de rosis siccis, ex myrro, aut rosarum; vel portulacæ, si acrimonia particeps sanguis fuerit: frictionibus item brachiorum frequentioribus ieiuno ventre vtendum esse consilium diuertendi necessitas. Vmbilico, vt superius dictum est, quæ vim calorem fetui addere possint, adhibenda sunt: & præter illa, quæ retulimus, prodest quoq; mica panis recēter cocti vino odoratissimo, & succo pomorum redolentiū supradictis puluerib. admixta: vel emplastrū ex palmulis vino austero decoctis cū farina volatili, & p̄dictis pulueribus factum; vel citoniorū caro assa vino rubro, & puluerib. rosarū, & coralli admixta. Quo facto, frequenti experimento cōpertū habeo in femina virib. cōstante, iuuenula, multi sanguinis, abortiri assueta, copiā deponere non solū vitæ parsimonia, verū, & sanguine missō ex brachio, si necessitas plurimū videretur: quod canē, & cum p̄meditatione esse faciendū arbitror. Præter q̄ oīa expendenda est Hip. nuper adducta sn̄a, in qua q̄ fluxum sistunt coramēdat. Sunt aut hęc, vglut emplastrum ex farina lentum, balanstiorum, glandium, gallarum, Karsabe cum farina hordei, & aceto. Præstant trochisci de terra sigillata, de bolo armeno: præterea, emplastrū, qd recipit boli armeni, mastichis, sanguinis draconis, terræ sigillatæ, thuris ana 3. j. acatæ, hypocistidos, verberis, nucis cupressi ana 3. j. farina volatilis 3. j. & scum vino nigro, ac modico succo plantaginis, vel aqua chalybeata fiat emplastrū. Ferunt in prodesse cineres corticum, vstarum cū vino, admodum linimenti pari appositos. Sic. n. laxitatem comprimere, & exsiccare oportet, maximè si addideris aliquid, quod vires habeat roborandi.

Dd 4 De

De maximis pregnantium gracilibus, aut lacte turgentibus. Cap. 19.



PRÆTER id, quod mammae, vel turgentes, vel flacida in prægnantibus, abortus, vel foetus aliquod malum præmonstrant, ipsis quoque graues, & dolorosæ, vel tædiosæ lacte copioso fluente existunt. Quamobrem hac in parte studendum est docere quas ob causas lacte abundantiori turgant, vel post turgorem flaccescant, ut illis quo fieri possit modo, præsidium aliquod præstare possimus. Circa primum docet Gal. 5. apho. com. 50. molles, & laxas mammas fieri ob lactis defectum, solidas vero ob eius abundantiam. Quod sanè dogma cum multa ex mammis prædicere doceat, non vtiacet, & à Gal. scribitur, intelligendum puto: res quidem ita se habet.

Mulier, cum concipit, statim mammae fiunt paulò duriores, & tumēt paululum, deinde manente magnitudine indies fiunt solidiores. Cum verò durities ad extremum peruenierit, tunc crescunt manente duritie, ferè ad finē octauæ mensis: deinde incipiunt laxari, donec partus tempore mediocrem habeant duritiem, magnitudinem verò eximiam.

Quæ proculdubio res ita venit expendenda, ut rectum iudicium de turgentibus, aut gracilibus mammis proferre possimus, aut ipsis proficuum auxilium. Magnitudo & paruitas mammarum fit ex multa, aut pauca factis materia, id est sanguinis, qui in lac mutari debet. Præterea mollietis in eisdem fit ex lactis substantia: lac. n. cum molle sit & humidum, mollem facit tumorem in mammis. Si verò mammillæ sint ab omni substantia vacuæ, neque antea fuerint repletæ, parue sunt, & mediæ inter laxas, & solidas, molles, & duras (inter quas nō levis viget differentia, quam qui rectè curaturus est, aut verum studerit proferre iudicium, admodum expendere tenetur) a si antea repletæ fuerint, & postmodum exinaniantur, remanent magnæ, molles, & laxæ. Sed ut ad institutum redeam, cum plenæ mammillæ extiterint crudo humore, sanguine nimirum non concocto, tunc sanè duræ sunt phlegmonum instar, qui ante suppurationem duri fiunt, ac solidi, suppuratione verò facta molles redduntur & laxi. Quod pari

proprius modo mammis accidere cernimus: quibus sanguine crudo repletis tenduntur glandosæ carnes, sed non extenduntur, quia calor extensionis est autor materia verò duritiem affert.

Ego mammae, antequam calor & coctio præualeant, duræ sunt, & solidæ, si materia adsit, gracilitas verò, seu tenuitas tria in mammis comprehendit, paruitatem nimirum mollietatem, & laxitatem. Quibus sic constitutis docet Hip. sententia ex mammis laxis, ac mollibus, è quibus multum lac fluit, venari foetum esse imbecillum, & non probè a ligamentis contineri: ex soliditate verò, & duritie saniores esse. Sed mox ex hac sententia sic intellecta, & ijs, quas nuper diximus, succrescit dubitandi ratio, nam cum dictum sit laxas, & molles mammas coctionem maiorem significare, duras verò cruditatem, admiratione dignum est, cur Hip. duras & crudas saniores laxis existimauerit. Sed rei ratio in hunc modum se habet. Multum. n. lac è mammis fluere, signum est foetum esse imbecillum: ratio est, quia monstrat, ut Gale. cæset, multum

A multum sanguinis mammas suscipere, ac tantum fœtui deficere, & ob id necessario proprii alimenti defectu imbecillum esse. Cum verò mamme duræ sint, ut § 3. sententia eiusdem lib. §. docuit, tantum quoque sanguinis redundare, & tantundem fœtui deficere est credendum: siquidem ex redundantia quasdam corporis partes dolere dixerat. Cum hoc tamen censemus eam sanguinis redundantiam, quæ duritiem efficit, ea ratione, qua cruditate arguit, sanum esse fœtum ostendit. Cuius rei ratio est, communicatus calor ab utero ad mammas: arguit enim mammarum cruditas maiorem caloris copiam in fœtu, & ob id credendum est, redundantiam illam sanguinis, in mammas confluere, crudumq; superesse, quia fœtus calore viget: argumento est mammarum calor secundo, aut tertio die à partu. Mammas verò graciles malum ostendere docet, sed ut clarius constet, præmittendum est, quod omne id, quod rumpitur secundum naturam, prius laxatur: omne autem, quod laxatur, ut exinde abruptatur quandam vim corruptionis persentiscat. Tunc sic, cum fœtus laxari incipit, siue partus, siue abortus tempore, gignitur quidam calor in illis vinculis, similis putrido, quem natus semper refugit, & calor ille naturalis confugit cum sanguine illo ad mammas, quæ tunc incallescunt, & uterus calore nativo destituitur: ac fœtus si propè debitum tempus sit, nascitur, deficienti optimo, & sufficienti alimento. Calor autem ille naturalis, qui se ad mammas contulit, sanguinem in lac (quod antea nequiverat) melius convertit, facta coctione ob novi caloris adventum, & tunc lac effluit laxatis carnibus mollioribus. Ob id quidem lactis defluxus significat, non quidem sanguinis abundantiam ex se, ut solida mamme, sed corruptionem vinculorum fœtum continentium. Quia profectò ratione dictum est ab Hip. huiusmodi mammas fœtum non esse sanum monstrare. Causa igitur est caloris naturalis, transitus ex utero ad mammas. Quas duras fœtum esse sanum monstrare probaverat ex professo Hip. §. apho. § 3. dicens: Quæcumq; fœtus corrumpitur sunt, his mamme gracilescent. Quod si rursus duræ fiant, dolor aderit in mammis, vel in coxis, vel in genibus, vel in oculis, & non corrumpitur. Quia scilicet videri monstrare duritiem mammarum non degenerare in abortum, sed in coxarum, vel oculorum, vel genuum dolores, ut confirmavit. 2. pop. tex. 6. & lib. 6. par. 5.

C Fiunt insuper mamme solito minores, ut Hip. recenset §. apho. 36. deficiente fœtui alimento, ut. n. fœtui deest: ita & mænis, maxime si de repente parus fiant. Nam potissima ratio, propter quam mamme crescunt, & duritiem contrahunt in gravidis, ea quidem est, quæ Hip. recenset lib. de nat. fœt. dicens: Lac autem ob huiusmodi necessitatem sit, cum uteri tumidi præ puero sunt, ventrem mulieris comprimunt: eius autem pleni, ubi compressio contingerit, pinguisimum de cibis, ac potibus foras profilit (ac subdit) Et à pingui parte calfacta, & alba, quod edulzatū est à calore, qui ab utero accedit, expressum venit in mammas, & in uteros quoque parum venit per easdem venas: tendunt. n. in mammas, & in uteros venule hæ, & consimiles aliæ, & ubi peruenit in uteros de lacte paululum, ipso fruitur puer: mamme verò suscepto lacte impletæ attolluntur. Ex qua scilicet liquet, quod dum fœtus est in utero, trahit ad se sanguinem, cuius potissimam partem absumit: aliam verò præpinguem comprimendo pellit, ad mæmas: ex quo constabit, si fœtus non allicit sanguinem, neq; mammas posse ipsum obtinere, ideoq; graciles fiunt, & ob id ostendunt fœtum esse imbecillum. Evidens igitur est, ex extracto sanguine


sanguine duas fieri partes: vnā, fœtui alendo idoneā: alterā, si Hip. sententia standum est, virtute seminis in lac commutat natura, ipsam ad mās trāsmittens, qm̄ substantia earum similis est illi: non obuenarum solum, quē muli censent, consensum, sed vt Hip. intelligendus venit loco adducto, ob consensū substantiæ, licet vt lib. seq. referam, per oscula venarum aliqua reperiatur consensus, quippe mammæ ab axillaribus sanguinem recipiunt, vteri ceruix à seminariis vasis, fundum vero, & ab his, & a caudice venæ cauæ, vt Vesalio placuit li. 5. c. 12. Quod vero is consensus verissimus sit, constat et ex Hip. qui li. de nat. fœ. ex lacte, quod sibi principium suscipit in vtero, quodāmodo aliquid fœtum sumere profert. Trahit. n. a sanguine ad se, id quod est dulcissimū, & simul et lactis parre aliqua fruitur, labiis nimirum clausis, vt expresse faretur idem autor loco citato, & lib. de carn. ib. quod vi naturæ vī asserere potius fieri, q̄ per euidentes vasorum ductus, præter eos, quos iam retulimus. Ratio quidē huius Hippocratici dogmatis est, quia si lac in mammis fieret tpe grauidationis ex solo sanguine per venas axillares illis tributo, quo imbecillior esset fœtus, minus sanguinis alliceret, & eo magis redundaret in patribus supremis, & maiores fierent mammæ, cuius contrarium euidenter apparet, nam quo minus se habet fœtus, eo magis trahit, & cum hoc maiores, & duriores apparent mammæ. Quod et constat, quia fœtu octimestri, vel nouimestri existente mamme longe maiores sunt, q̄ reliquo grauidationis tempore, & tunc fœtus magis attrahit, q̄ pluribus indiget, quo vī minores debere esse. Ex his itaque euidenter constat, quo magis fœtus attrahit, maiores fieri mammæ, & quo minus minores. Quod profecto certissimum abortus, seu imbecillitatis fœtus existit signum. Cum hoc tñ quantumuis turgidæ sint mammæ, si lac effluit, vt probatum est, certum quoq; erit imbecillitatis, seu abortus indicium. Si igitur quod ex sanguine delabente ad vterum redundare solet, deficiat ad lactis materiam, deficiet quoq; ad fœtus alimoniam, & sic præsagium erit certum. His omnibus sic constitutus, considerabis mammæ turgentes ne sint, aut lac instillantes adeo, vt affectum generent, tunc. n. id mitigare studebis iuxta naturam causæ, a qua id prouenire cōperies, reuocans in memoriam ea, quæ nuper diximus, expendensq; modum generationis lactis, quem ex Hip. retulimus, materiam, aut causas copiosioris, aut diminuti, vt lib. seq. latius sum monstraturus.

*Curādis
ratio.*

In huius affectus curatione turgorem immodicum miticabis, paruitatē emēdabis, & laxitati, ac lactis fluiori prouidebis, fœtui adhibitis omnibus præsidiiis per eam victus rationem, & peculiarem prouidentiam, quam reperies præcedētibz quatuor cap. nil enim prodest aliquid mammis adhibere, nisi in maximā duritiem creuerint. Quo tempore adhibenda sunt, quæ emolliendi, ac digerendi vires habeant, ne forsan in grauissimos dolores incidunt, in quo degenerare dixit Hip. lib. 5. apho. 53. aut tumorem aliquem præter naturam, qui in suppurationem ocysime commigret, qualia reperies lib. seq. cap. de lactis abundantia. Nam mihi non fuit in animo hac in parte, accidentia hæc recensere, vt aliquod illis præstemus auxilium, nam & leuissima sunt, & pauca admittunt, sed potissimum, vt horum omnium innotescat causa, & ratio, quæ sanè res scitu ad præsagationem summo opere erat necessaria.

De

De pregnantibus quibus aqua ab utero profluit. Cap. 20.



NON est profectò ita faciliè docere ex qua parte, vel qua ratione ab utero, grauidationis tpe aqua profluit. Si quidem a venis siue colli vteri, siue cavitatis eius posse fluere, perdifficile est credere, aut periculosum, si ita fiat. Quippe vel vteri hydropem, vel falsam esse grauidationē aperte ostendit. Nam in venis huiusmodi substantiā vagari, aut generari, timore plenum existit, ne vel febris succendatur ipsis putridis factis, vel sanguinem vniuersum conspurcent, aut ob id, si verè grauidationi is affectus coniungatur, fœtui desit conueniens & opportunum alimentum. Non quidem loquor hac in parte de mucoribus, aut pure, quæ aliqñ ab vteri cervice instillare, in quibusdā scimus, sed de aqua, quæ partum præire solet, q̃ aliqñ multo ante id tempus fluere contingit. Præterea, si a fœturæ inuolucris excernatur, non minus periculū infert, nam probabile vñ, vel fœtū periclitari suffocatione, vel laboris inuolucris quodammodo solutis. Sed qua in parte hæc aqua generetur, expendendum est. Dū fœtus quidem crescere cœperit, membrana illa, quæ amnios appellatur, ipsi adhæret ad vsus, quos in i. huius lib. capite subinde diximus. Hanc circumdat corion, membrana neruea, crassā, dura valde, multis vasis, ac vinculis intertexta, & exterius carnea substantia tota obducta, vt firmior esset, atque inter hanc, & amnion vrina fœtus continetur, præter hanc est carnea placentula, stratū quod dā suppositum vasis crassum, carneum firmum, quod iungitur vtero. Quibus ita constitutis in partu naturali primo frangitur à p̃tero amnios mēbrana, & vrina mox fœtum tangit, & tanta molestia afficit, vt cogatur et corion lacerare, quo fit vt aqua hæc, siue vrina copiosè perfundantur. At in grauidis nondum aduētante partus tempore, non capit intellectus, qui possit fœtu superstitē manēte, aqua profluere. Cum hoc tamen haud rarò conspiciamus prædictam aquam instillare, & nihilo minus fœtum superstitē euadere.

Quod sanè opus, vt optimè intelligamus, expendisse oportet hanc effluere aquā, vel ruptis casu aliquo mēbranis, quod est aborsus pludiū, vel eodē casu, aut animi p̃turbatione (p̃sertim in delicatiorib. fœminis) venis plus iusto tēsis, ita vt aqua p̃seruaionē pororum. hoc est per anatomosim effluere possit, illud quidē, vt dictū est, semp̃ aborsum p̃cedit: hoc verò minimè: illud itē dignoscēs faciliè, quod subito, cōfertim, & copiosè profluet, hoc vtero, q̃ sensim, & paulatim. Fluit quoq; nō raro valetudinarijs quibusdā fœminis, dū vtero gerunt, humiditas q̃dā, ex superfluis albisq; purgamentis, quorum occasione plerunq; septimestres edunt partus. Sunt p̃ter hæc saniose, vel sanguinolentæ humiditates aliqñ profluentes, quibus manum adhibere non licet. Quæ sanè vitia frequentissimè grauidis, q̃ lienis vitio, aut malo corporis habitu laborant, accidere conspiciamus, vt Hip. scripsit li. 2. de mor. mul. dicens: Si verò mulier in vtero habēs lienosa sit, a relatis actionibus in hoc morbo menses hydropi similes, & pituitosos dimittit, & partus purgamenta procedunt hydropi similia, & prodibunt modo multa, modo pauca, & fiunt quemadmodum aqua a carnibus, velut si quis carnes cruentes abluat. Aliquando verò crassiora, & non congelantur.

Et

Causa.


Et patietur eadem omnia etiam ea, cui menses aquosi prodeunt.

*Curadi
ratio.*

Potissima in hoc affectu providentia habenda est circa victus, & vitæ institutione. Sic etenim plurimum prodesse comperimus, in victus ratione assas carnes præbere, amygdalas tostas in prima mensa, passulas, aut mittam citoniorum cinnamomo aromatizaram. Potus sit aqua auro ignito sapius extincto præparata, aut chalibeata, vel mastiche suffumigata, vel radice chinæ decocta, quod tanquam peculiare præsidium laudo. Quam in re scio prodesse plurimum syrupum ex radice chinæ confectum, quo solo præsidio plures hoc morbo affectas liberari posse arbitror: maximè si hac forma conficiatur, excipe radice chinæ .ʒ.ʒ. sparte parellæ .ʒ.ʒ. decoquantur in libris octo aquæ lupulorum, & horraginis ad consumptionem medietatis. Cui adde in ligatura pulueris coralli rosarum, & granæ ana ʒ.ʒ. & facta colatura, adde sacchari quantum sit satis, ut fiat syrupus. Exterius verò ea adhibenda sunt, quæ roborandi, & astringendi moderatè vires habent, qualia sunt, pomum vel malum cidonium assum mastiche, gariophyllis, cinnamomo, rosas, & corallo inspersum, & umbilico appositum. Prodest & inunctio olei omphancini, si in eo incoxeris cinnamomum, rosas siccas, myrtillum, & gariophyllos. Confert & frustum carnis cum eisdem puluerib. Sed præstat non parum temperatæ alicuius feminae manus prædicto oleo, vel de styrace, aut balsamo inuncta durissimè super umbilicum apposita. Quam quoque usum præstat sacculus ex mastiche, angelica, cinnamomo, gariophyllis, rosas, & corallo. Vtilissimum quoque censetur emplastrum confectum ex prædictis pulueribus cum ladano, & oleo styracis, ac balsamo electissimo. Quod si ferrosi aliquid in sanguine redundare sit compertum, cuius ratione plus prædictæ aquæ in ea parte colligatur, quam par sit, non erit ab re. ʒ.ʒ. rhabarbari masticeandum præbere, aut deuorandum cum modico saccharo, cuius loco tabellæ diarrhodonis duplicato rhabarbaro, confectus adhibere poteris, idque cum præmeditatione faciendum, & cum periculum est ne præ nimio madore fortus ligamenta dirumpantur, & abortus fiat. Verum si ex suppressa aliqua vacatione malum oriatur, innitendum plurimum est cibis mollioribus corpus reficere, & præexistentes humores corrigere, & attemperare.

De pregnantium moderamine, & custodia.

Cap. 21.



OGNIT O igitur ante dictis signis vteri conceptu, curandum est, ut quæ minimè laboret femina, ne fœtum imbecillū, & valedudinariū efformet, ac sibi aliquod vitium in posterum accersat. At ne ex errato, vel imprudenti vitæ instituto in abortum, aut in mancū ac defectuosum partū vteri gestatio commigret, ita ut steriles, vel morbosæ supersint feminae, huic operi innitendum plurimum est. Est igitur vteri gestatio naturalis, sed grauissima affectio, quæ coctione, seu (vtrèctius loquar) maturitate natura perfecit, à quo quidem opere si aliqua occasione, intercipiatur, in mille vitia prolabitur. Quamobrem vterogentes, maximè quæ primiparæ, delicatiores natura, aut vitæ instituto sunt cautè, & prudenter tractare oportet, ne quid mali inopinato accadat. Cum hoc tamen plurimum non est medicamentis, aut exquisito viuendi generi innitendum

A dum. sed quantū sat sit, vt neq; fœtui alimentū defit, neq; p̄ter naturæ modū vi-
tātū sublit. Sed in hoc opere studendū plurimū est, ne qd vel inopinato accidat
aut p̄ter modū & necessitudinē à medico assistentib. aut grauida fiat, ea vi & ef-
ficacia, q; fœtus vincula dirūpere, aut vtcunq; aliter vitare possit. Simile. n. vtero
gerenib. accidit, ac ijs, q; grane aliquod onus filis tenuissimis appēsū manib.
asportant, quod si lentē, cautē, & moderatē cōmouerint, ad statutū terminū in-
noxie adducunt: sin aliter motu aliquo violento inordinatove agitent, facile &
ponderis grauitate, & ligamentorū tenuitate, vel procidit, vel malē afficitur. Sic
profectō in ijs, q; vtero gerunt, rē se habere credimus: nā si vehementer moueā-
tur, si violenter agitent currū, lectica, aut quouis alio equitationis genere, vel si
animi subitō affectus patiat, vel cibis vtatur prauis, aut graueolentia, & sonit-
grauis p̄sentiscat, intueaturq; res aspectu horrendas, & immundas, ob motus,
quos, fœtus his oībus alteratus in ligamenta infert, vel procidit, vel eadē malē
affecta relinquit, vt sanguis ocyssimē, prosiliat, signum alioqui futuri abortus,
vel causa imbecillitas fœtus, aut matris. Sic & medicamēta vehementer purgan-
B tia, aut vtcunq; corpus mouētia, aut victus parsimonia, vel nimia vbertas, aut de-
pranata qualitas, vel ingens alicuius rei vitia appetitus: itē parentū labes. Qd
& alia plurima expressis verbis retulerat ēt Hip. li. i. de mor. mu. dicens: Pronū-
tio autē de muliere in ventre habente duos, aut tres menses, & vltra, si mēses sta-
tim prodeant singulis mētib. necesse est tenuē ipsam fieri, ac debilē. Idē accidēs
haud paucis ex ijs, q; grauida fiunt, accidisse cōspicimus. Et subdit recēdens alia
mala, q; p̄gnanti euenientia ipsam, & fœtum perdunt. Qñ ēt febris ipsam cor-
ripit ijs diebus, qñ menses prodierint, & dū prodeunt, & postq̄ prodierint, pal-
lida fit. Hec quidē & plura alia, q; breuitati consulens p̄termitto, eadem parte
recenset, quæ p̄cauere oportet ob pericula à me superius relata. Nā eam arbi-
tratur Hip. lib. 2. pop. par. 3. tex. 25. non abortiendi potissimam rationem, nimi-
rum nihil intra constitutum tempus p̄ter rationem accidere, inquit. n. Quib.
nihil intra constitutum tempus, singuli partus vitales fiunt, quæ autem accidere
possint, iam retulimus. Sunt tamen inter fœminas nō pauca, quæ licet concip-
pant, parere tñ debito tempore nequeunt, quas Hipp. lib. de Sterilibus, steriles
C etiam nūcupat, quarum suo loco cap. de abortu, latius meminero.

Sed anteq̄ vltra pergā, expendere hæc in parte mihi visum est, cur quædā
ex p̄gnantib. melius se habeant grauida, quæ dā verò deterius. Cuius dubita-
tionis occasione, in memoriā reuocare oportet, oībus ferē grauidis cōe pathe-
ma esse, ut menses supprimantur, ex quo vtrunq; p̄gnantibus accidere certū
est. Qñ. n. corpus sua sponte ante grauidationis tēpus vitiosis succis oppletū fue-
rit, quia eosdē fœtus ad sui aliūonem excurrit, & matrem ab eorum spurcitia
liberat, sit faciliē, vt toto grauidationis tpe melius se habeat. Alius verò contra
accidit, nam si per menses expurgari à vitiosis recrementis assuescunt, & ob id
vitā degunt salubrem & incolumē: grauida verò factæ agrius longe se habeāt.
Quippe mulieres, quæ otiosam, ac sedentariam, & inordinatam vitam degunt,
excrementa haud pauca sibi congerunt: quibus deinceps vtero gerētes, tristius
degunt: argumento sunt agricolæ, quibus facile est vtero gerere, quippe eis la-
bor excrementa absūmit. Sed maximam horū causam esse censo, q; mulieri
sic affectæ vitiosa, vel plurima purgatio eueniebat, q; cū vteri gestatione defie-
rit,

rit, apprimè vexat, atq; magnopere inturbat. Cuius rei rōnē reddens Hip. lib. A
 de mor. mu. & cur et grauidē mulieres palleſcant, inquit: Cū mulier in ventre
 habuerit, tota fit cū virore pallida, qm̄ purus ipſius ſanguis ſemp̄ quotidie ex
 corpore diſtillat, & in fētū deſcendit, & augmentū ipſi accedit, & cum paucior
 ſanguis ſit in corpore, neceſſe eſt ipſam eſſe pallidā. Cui et rōni alia nō minoris
 momenti adiungit ex Hip. dictis deſumpta, nimirū, bono ſanguine laudabiliq;
 à fētū attracto, deteriore, qui antea expurgabat, ſuper-eſſe, atq; mirū ob id nō eſ-
 ſe, ſi p̄dicta mala p̄gnantib. frequentius accidunt: maximè cū primis mēſib. neq;
 boni, neq; deterioris ſanguinis multū inſumat fētus, quo fit, vt neceſſū ſit vtri-
 uſq; plus iuſto redundare, & in p̄dictos affectus prorūpere. Scitu tñ dignū arbi-
 tror, infantes ab his fēminis productos, vegetiores eſſe robuſtos, & ſaniores, q
 puriori, & craſſiori ſanguine vtant: alij verò, q ex fēminis prodeunt, q grauida-
 tionis tpe melius ſe habent, valetudinarij, imbecilles, & macilenti naſcuntur, q
 deteriore, & minore ſanguinis partē in alimētū alliciant, & maiore, ac pingui-
 ſiore matres. Atqui cū varia p̄dictis fēminis ſuccreſcere poſſint accidentia, meri-
 to dixit Hip. li. nup̄ citato, multa opus eſt cuſtodia, vt in vteris geſtent puerū, & B
 emittant, & vt euadant ab ipſo in partu. Sic proculdubio p̄gnantiū cibaria eius
 natura adhibenda ſunt (maximè earū, q deterius ſe habent in grauidatione) q
 copioſi, & facilis ſint nutrimenti, ac laudabilis ſubſtantia. Vt non ſolū debitum
 fētui alimētū ſuppeditent, verum & attēperamento ſint vitioſi, qui ſuperſunt
 ſuccis. Copia verò ſemel exhibita poſſimū in principiis parca ſit oportet, tū ne
 plurimum ab vtero calor diſtrahat: tum verò, quia eo tpe ſanguine abundare,
 & fētum, q parciſſimum contereſce ſcimus. Salius. n. eſſet, ſi fēmina plurib. ſit aſ-
 ſueta, per vices ipſum partiri: praterq; q plurimam in ventre excrementorū co-
 piā congerere, ſuſpicionē non caret, cōprimitur hiſ prater modum vterus. Præ-
 terea edulia, neq; acria; neq; flatuoſa, neq; diuretica, neq; mēſes prouocantia,
 vt ſunt capparis, cepæ, cicer, phaſcoli, oliuæ immaturæ, allia, crocus, & vinū me-
 raciuſculum, vlla lege adhibere oportet, neq; acria, aut acuta clyſteria. Potus q-
 dē ſit parciſſimus, ne ligamenta laxiora ſiant, iſq; calfaciens, & roborans ex vi-
 no, vel aniſo, & ſimilib. q minimè euocent mēſes, niſi ex vſu ante id tēpus fue-
 rit, vt pleræq; ex magnatibus de more habent, q cinnamomi, vel alterius aro-
 matis aquā guſtui, vel valetudinis gratia bibere aſueſcunt. A tenebris et à ſolitu-
 dine, & triſtiū auditu præcauebis. Linteis mundis vti: caput & thorax cuſtodia-
 tur à frigore: caput more ſolito, abluatur: cæterum à rubificantibus abſtineat. C

At primo mēſe nō exerceri oportet, ſed corpus quieti mandare, ſecundo tñ
 raro, & lēte, tertio expeditius, quarto, quinto, & ſexto audacius, ſed moderato
 exercitio, & p planū, ſeptimo, & octauo, & vſq; ad dimidiū noni mēſis detra-
 here de exercitio oportet, deinceps verò exercitiū intendere; circa octauū mē-
 ſem, q oīum moleſtiſſimus eſt, alimētum contrahere oportet, & motus vehe-
 mentiores interdicere. Cæterū mēſe nono, relaxādi corporis gratia, exercitiis
 frequentiorib. & balneo vtendum eſt, vt paritura futurus partus dolores forti-
 ter ferre poſſit, & ipſi minores exiſtant. Reliquis verò mēſib. exercitiū ſit leue,
 moderatū ante cibum: ſaltum, iētum, maximè coxendicium, & vteri, omnino ſu-
 giant, necnō & geſtationē in curru: prater id graue onus minimè eleuerit, neq;
 in duro folio, vel ſede quieſcant. Quæ ſanè oīa genituræ vincula ita premunt,
 vt

A vt facillimè sanguis profiliat, ac ex cōsequenti fetus abortu periclitetur. Coitus itē primis mensib. vitandus est, potissimum si fœmina ex salacibus fuerit, superfœtationis p̄cauendæ gratia: nā cōperimus haud rarò, vel molas hinc generari, vel fœtum, qui abortus, vel laboriosi, ac periculosi partus sit causa. Vitumis verò mensib. copiosiori vtatur coitu, dum vir suis ipitatur brachijs, ita vt ventrem nō grauet: sanguinis itē fluxio, siue ē naribus, siue ex hēmorrhoidibus, aut alio quo cunq; loco in p̄gnantibus prodierit, periculum ipsi accersit. Animi quoque pathemata vitanda oīno sunt: nā hæc subito & inopinato casu sanguinē intro pellunt, à quo fœtus suffocari periclitatur, vel vasa distenta rumpunt, quod plerunq; in ira, vel grandi mœrore contingit. Somno vtantur largiori, à quo lentè, & paulatim, aut sua sponte excitentur. Præmunire itē grauidas à ventorū vehementia, tonitu, & ab alijs, q̄ terrorem incutiunt, oportet: & in ijs, quæ vitari non possunt, hilari animo, & bona spe alere, distrahere, & consolari opus est: præsertim eas fœminas, quæ delicatiores sunt, & facile expauescunt, vt nec subito terrore corripiantur, nec sine præstantioris, vel dilecti viri patrocinijs sint.

B Quod si mox à cōceptu cōquerat, maleq; se habeat, impatiensq; laboris extiterit, ventriculo prouidendū est ijs, quæ ipsum roborēt, & modicè calfaciāt: nā cū vterus ad se maiore caloris copiā trahat, facillè reliquæ partes calore, & spiritu inopes existūt: quo fit, vt cruditates, flatus, & acidi ructus plerūq; succrescāt. Verum in hoc opere nec plurimū calfaciendū est, ne immodicè astringendum, sed vtrunq; moderatè præstandū: qualia verò huic vsui proficua sint, superius abundè diximus. Et p̄uidebis vētriculo inunctione olei absinthij, nardini, masticeis, aut citoniorū, sparsis pulueribus diarrhodonis, corticis thuris, ligni aloes & gariophyllorū. Ore autē sumat conseruā rosarum cum modico puluere ligni aloes, & gariophyllorū, vel tabellas ex puluerib. macis, gariophylli, & coriandrī præparati, cinnamomo, & saccharo. Præstat itē ventri adhibere cerotū, quod recipit mastichis 3. ij. rosarū, coralli, coriandrorū p̄ r̄pa. balaustiarū, bistorte, corticū granatorū, an. 3. ij. nucum cupressi. 3. iij. pulueris sanguinis draconis, serici, & boli armenij, an. 3. j. olei masticeis, & citoniorū lotorū aqua acetosa, & plātaginis ana parū, cum modico picis, & ladani fiat cerotum. Sed oībus proficiuū est ex Aui. decreto mel rosaceū, tertio quoq; die ingestū, & exterius absinthij, & menthæ oleū cum pulueribus coralli, rosarū, diarrhodonis, & similia. Sic cordi prouidendum est siccis epithematis ex florib. & puluerib. diambre, diamusci cū oleo naphæ, iasminorū, & similia, vel sacculū cōficiēs, ex infra scriptis puluerib. vel vnguento vteris naphæ porriges, & tabellas ex electuario de gēmis, aut aliquo ex laxificantibus, vel confectionē Gentilis, quæ recipit margaritarū 3. j. f. hiacinti. 3. f. cinnamomi, gariophyllorū, macis, ana 3. ij. limaturæ auri & argenti, an. 3. j. sacchari albi lib. 1. dissoluatur in 3. iij. aquæ rosarum, & fiāt tabellæ. Cuius census esse creditur alia, q̄ recipit succi pomorum dulciū, & bu glossæ despumatorū an. 3. v. doronici, corticū citri, florum boraginis, rosarū rubearū, been albi, & rubri, coralli, limaturæ eboris, ana 3. iij. spodii, nucis, galliæ muscata, charabe, ossis de corde cerui, santalorū ru. an. 3. iij. seminis basiliconis florum myrti, melissæ, coriandri, cinnamomi, galangæ, cedoarię, spicę nardi, ligni aloes, serici minutim incisi an. 3. ij. mirobalanorū 3. iij. smaragdorum, hyacinto rū, zaphirorū, granatorū præparatorū ana 3. j. margaritarū præpa. 3. iij. limatu-

ræ auri, & argenti ana 3. ij. ſambra g. x. moſchi 3. j. fiat ſecundum artē confectio, A
 quæ guſtui grata ſit. Ex hoc autem puluere, addito puluere roſarū, ſeminis an-
 gelicæ, & ſanguinis draconis cum bolo Armeno, lodano, therebenthina, & ce-
 ra, emplaſtrum mirè corroborans fœtum, vterum, & partes vicinas, cōficere po-
 teris. Cuius etiam efficaciz aliud conficies; quod recipit tonſuræ ex panno coc-
 cinco 3. iij. zinziberis, galangæ, cinnamomi, cubearum ana 3. ij. ſanguinis dra-
 conis 3. j. maſticis 3. ſ. moſchi g. vj. mellis, aut therebinthinæ q. ſ. vt fiat empla-
 ſtrum. Ac ſi fœtus lentè ægrèq; moueatur, vmbilico adhibenda ſunt quæ robur
 illi præſtent, velut eſt pomum odoriferum aſſum cum gariophyllis, puluerib.
 roſarum, coralli, & cinnamomi: vel carnis fruſtrum cum eiſdem puluerib. uel
 philtrum ſericum cum oleo iaſminorum, naphæ, & pulueribus ſupradictis, ac
 modico vino odorifero: quod ē præſidium cordi adhiberi poteſt. Imbecilles
 autem ſæminæ ſacculum vmbilico adhibeant, ex lana, aut ſerica tela, ex am-
 bra, moſcho, corallo, roſis, gariophyllis, margaritis, ſemine angelicæ, & maſti-
 che: his etiam præbebis vinū ex forniculo, zinzibere, gariophyllis, & cinnamo-
 mo. Si tamen aluus ſuppreſſa fuerit, ob inteſtini recti anguſtiam ab vtero illatā, B
 quod vltimis grauidationis menſibus accidere ſolet, edulia exhibeantur ſubdu-
 cendo ventri apta, velut eſt hordei ſuccus cum cinnamomo, malua, lactucave
 cocta, & reliqua, quæ antea diximus: Et tandem ea prudentia res omnes mode-
 raberis, qua ſecurius ſæmina ad partus portum peruenire poſſit. Aſuetas vero
 abortire, anteq̃ grauidæ fiant, curare ſtudebis, ut dictum eſt c. de abortu humi-
 das per ſudorē cacochimias, expurgatione, & tandem eas quibus, ſanguis abū
 dat ſanguine miſſo. Poſtea vero vtendum eſt his, quæ viſcera roborant, ut aurea
 alexandrina, theriaca, mithridato, & alijs naturę huius, iuxta cuiuſq; indigentiā.

De pregnantibus morbo acuto correptis. Cap. 22.

HABET inter pleraq; difficilia ars medica vnum hoc tanq̃ grauiffimū
 ac difficillimum onus, vt neq; rerum abditiffimarū in ea cognitio, ne
 que recta medendi ratio, neq; particularium notitia, & in eiſdem ſuf-
 ficiens experimentum, & vſus (quæ ſanè ſolet ad morbos omnes propellendos C
 idonea eſſe) ſufficere in aliquibus affectionibus poſſint. Nō quidem quod hæc
 oīa eiſdem proprijs viribus non ſufficiant, ſed q̃ corpori ita diſpoſito adiungā-
 tur, vt neq; adhibere poſſint, neq; adhibita citra periculū operentur. Quod pro-
 culdubio (ne dicam de pueris, & ſenibus) peculiari quodā periculo vtero gerē-
 tibus accidere frequentiffimè cōperimus. Nam cum morbo aliquo acuto corri-
 piuntur, omni ferè auxilio deſtitui vident. Hinc quidē periculi magnitudo, id
 anxie expetit, corporis ſtatus mille rōnibus tenuit, ita, vt non magis contingat
 vi morbi periclitari, q̃ ex auxilijs vel perperā, vel importunè adhibitis. Quam-
 obrè multa in prægnantium acutis affectionibus expendere oportet, vt in rē du-
 bia, & anxia. Sed primo ſcire oportet, nō ſemp̃ equali periculo grauidas ex mor-
 bo acuto abortire. Nam qua rōne à 4. d. 7. tutius q̃ cæteris temporibus medicari
 ſic affectas præcepit Hip. pari prorsus cenſendum eſt, non eſſe par periculum.
 Quod ipſe monſtrauerat lib. 1. popu. p. 3. in hiſtoria mulieris quæ decumbebat
 in litore, quæ cum trimēſtris eſſet, 14. die ſudauit, & liberata eſt: & lib. pop. par.
 2. tex. 4. in Sty margi vxore, quæ quadrimēſtrem corrupit fœtum, & liberata eſt.
Cum

A Cum hoc tamen factum abortum, cum indicatus matri salubriorem, qui in-
 portē proiecit infantem, ut ipse testatur lib. 2. pop. p. 2. tex. 14. inquit enim, Sex-
 aginta dierum masculi corruptio in detentioribus partus salubris. Quo etiam lo-
 co subaudire oportet, fœmellas non pari securitate eisdem diebus corrumpi,
 quia in totum, & partus, & corruptiones habent grauiore, licet securiores: nā
 quæ fœmellas conceperunt, morbis ex retentione, excrementorum (quæ multa
 in his sunt) obnoxie magis existunt, & ob hanc familiaritatem, securius tran-
 seunt hos affectus, quàm quæ mates conceperunt, quia his non sunt hi affectus
 equæ familiares: quare filias patiunt in letales morbo magis incidunt, sed ab
 æqualibus magis liberantur.

Primò quidem ex omnium ferè antiquorum decreto constat vtero gerentem
 ab omni auxilio medico maximè abhorrere: quo probato, constabit quantum
 periculū inferat, vtero gerentes acutis affectionibus corripī. Quippe purgatio-
 nem interdicit Hip. in vtero gerentibus, nisi materia turgat 4. aphor. 1. Venæ
 sectionem vero 5. apho. 30. dicens; Mulier vtero gerens sanguine mīssō ex venā
 abortit. Vehementem quoque in ediam, alioqui morbis acutis proficiam, Gal.
B perhorrescit commento imperitæ sententiæ. Externa item, & leuia medica-
 menta nihil prodesse constat, ut ex Hip. colligitur euidenter 1. aphor. dicente;
 Extremis morbis (quales acuti sunt) extrema exquisitè remedia optima sunt. I. e.
 cum duplex sit acutorum morborum natura (nam quidam sine febre existunt:
 quidam sibi comitem eam habent) duplex quoque periculum grauidis hac ra-
 tione ex acutis morbis succrescit. Primū ex ijs, q. sine febre sunt, qualis attonitus
 est, & epilepsia, ac his per similes: periclitatur quidem fœtus, sed magis, & primò
 mater: cum non solum morbi acuti sint, sed valde acuti, ut Gal. 5. aphor. 29. recē-
 set. Sed clarius ex Hip. elicitur dicente; Soluere morbum, quem apoplexiam vo-
 cant, fortē est impossibile, debilem verò non facile. Item de distensione sic lo-
 quitur. Quineunque à distensione corripuntur, in quatuor diebus pereunt: &
 5. apho. 1. & 2. conuulsionem exitialem existimat, idq; ex causæ ratione nimirū
 ex elleboro, ex nimio sanguinis anulnere fluxu, superflua purgatione, ebrieta-
 te, aut febre. Ob reliquos verò affectus, qui cū febre sunt, periclitatur fœtus ma-
 gis, & protinus, & fœmina abortu, idq; vel ob calorem, vel ob humorem putri-
C dum. Vltimò tamen ob necessitatem detrahendi sanguinem, ex qua (ut dictum
 est) abortire fœmina cogitur. Quibus etiam accedit vtero gerentes ex status il-
 lius natura imbecillas esse, & deterioris habitus: quod probat Hippo. lib. 1. de
 mor. mul. dicens; Cum mulier in ventre habet, tota sit cum virore pallida, quo-
 niam purus ipsius sanguis semper quotidie ex corpore distillat, & in forum de-
 scendit, & augmentum ipsi accedit. Et cum paucior ipsi sanguis in corpore sit,
 necesse est ipsam esse pallidam, semperq; alienos cibos appetere, & sanguinea
 in ventrem intrare, & debiliior sit, qm sanguis minuitur. Neque obstat Hip. di-
 xisse lib. de nat. fœ. vtero gerentes pinguiore fieri: nam quæ tales sunt, imbecil-
 liores sunt in partibus externis, licet primò accessu videantur, robustiores esse
 factas: in super, & fœtum habent languidissimum. Præterea constat, prægnantē
 morbis acutis premi, multis posse modis, primo, q. ferè omnia auxilia renuat, se-
 cundò, quia obnoxia est abortus periculo, & auxilijs, & vi morbi; tertio, quia
 deterioris fiat habitus, pallida. n. & decolor protinus apparet: & ob id vehemē-
 Ec tius

Purgan
di ratio
in graui
dis
 tius premittitur: quarto verò, quia imbecillibus constat viribus, quam sanè imbecillitatem auget perpetua respirationis magnitudo, ac celeritas. Itaq; & curare, & à curatione abstinere, periculo non vacat in vtero gerentibus. Quocirca cū auxilio destituti non liceat, moderari in his auxilia opus est, sumpta ad id indicatione ab statu foeminae; & ab affectionis natura, & periculo. Quid verò agendum sit in purgatione, & sanguinis missione, iam monstrare aggredior. Ceterū in purgatione duo pulchra, & necessaria perpendit, iudicio nostro, Hip. Primū quidem id tempus ad eam, eligendum fore, in quo vinculum cum matre firmū obineat puer: a quarto nimirum grauidationis mense vsq; ad septimum. Nam eo tempore purgandas esse censemus, quae vtero gerunt, quo maximè fortis heret matri, ne facillè medicamenti commotione dirumpat vincula, discedatq; ue. Expendendum praeterea est, minus esse septimo mense purgandas, q̃ antea, iuxta verbum illud Hip. Et vsq; ad septimum. Primis etenim tribus mensibus, ac duobus vltimis, scilicet octauo, & nono, medicamenta dare non possumus citra euidens, & maximum periculum: septimo quidem minus est inconueniens: magis verò tutum a quarto ad sexum inclusiue, vt fertur. De primis refert. 5. pop. historia de vxore Anthimachi, cui, cum esset praegnans secundi mensis, exhibito catapotio, mortua est. In octauo verò cū periculosissimus sit abortus, plerumque mater moritur, tum ob foetus magnitudinē, tum verò ob mensis conditionem. Cuius rei exemplum est. 7. pop. vxoris Olimpiadae, quae octimestris erat, & cū ex casu abortisset, mortua est: quò fit, vt verenda sit summo opere in his mensibus purgatio: nam inter menses purgationi ineptos pessimus est octauus: inter priores aut minimè periculosus est tertius de abortu, sed de vita, primus: medius aut inter vtrosq; quoad abortum, & vitam matris, secundus. Difficultas tamen non parua de nono vrget: nam cū sit mensis partui opportunus, ṽr esse securissimus: qua in re considerandum est ex ea parte, qua potest parere vitalem, securissimus esse: verū si nō peperit vitalem, periculosissimum existere propter foetus magnitudinem. Quamobrem cauendum etiam est eo tempore a medicamentis purgantibus: nam si foetus intereat, cauendum quoq; est, ne matrem interimat. Quod si quis dixerit eadem ratione periculosiorem esse quarto sexum: dicemus plus beneficii prestare vinculorum robur, quàm eam foetus magnitudinem: ob id magis minusve praedictis temporibus pharmaco est vtendum, qđ citra ipsum grauior fieret affectio: nam semper medicari licet a quarto ad sextū mensem satis tuto, in septimo non adeo tutum, a septimo vltra, & ante quartum maximo cum periculo. Itaq; purgare oportet vtero gerētes, cum foetus maximè adheret matri. Ceterum in mensium natura collatione facta ad periculum, nō paruum ingerit dubitationem, q̃ Hip. lib. 1. pop. part. 3. in historia mulieris, quae & litore habitabat, cum trimestrem foetum gestasset, ipsam a morbo acuto, & prauis accidentibus liberam dixit. In cuius sententia comm. Gal. inquit, iam illud quoq; meminisse conuenit, foetum trium vel quatuor mensium pra alijs maximè resistere: q̃ non ignorans Hip. dixisset. Vtero gerentes purgare, si materia turgēt, quadrimestres, & vsq; ad septimum mensem, minus verò has iuniores, & seniores vitare oportet. Et parum inquit, Ob haec trimestres, & quadrimestres pra alijs magis seruantur. Cū tamen in aphorism. praedicto tres primos menses excludat, & tres postremos. Tunc sic infero rationem, si trimestres seruantur magis,

A magis, tolerabunt etiam facilius absque abortu purgationem. In qua dubitatione prætermisisti, varijs, & multis, quæ in illius sententiæ expositione auctores asserunt, ego ita sentio, nimirum ex historia, quam Hip. nouit lib. popu. non euentu veritatem, quæ superius adduximus, videlicet, tribus primis grauidationis mensibus, & tribus vltimis non esse tutas purgationes: nam ea parte euidenter constat, non locutum fuisse de purgatione. Emanat tamen maius dubium ex Gale. verbis, qui tertium, & quartum mensem alijs præfert, & ratione euidenti vñ probare, siquidem ad ferendos morbos acutos, eos præferendos esse hac ratione arbitrat. Nam morbi acuti abortum asserunt ob id, quod febres continuas ferre habent adiunctas, à quibus vtero generantes periclitari constat ob auctum calorem, & alimenti defectum, quæ sanè mala trimestres, & quadrimestres facilius ferunt, cum adeò magni non sint fetus, vt calore, & angustia loci suffocetur, aut ob alimenti inopiam deficient velut magni. Quò fit, vt melius, q̃ maiores seruari possint, & melius, q̃ minores: nam ob tenerriam eorum substantiam, quæ ante tertium mensem sunt, a febris, & alimenti inopia citissime dissoluuntur & pereunt.

Cum hoc tamen licet trimestres minus alijs molestantur a febris, & alimenti inopia, motionibus quidem, & laboribus minus resistunt, quam qui sunt a quarto ad septimum: mollitudo etenim, & substantia fetus in minoribus, & in maioribus grauitas maior, & alimentorum inopia cum febris vehementia abortus causa existunt, vt recenset Hip. 4. apho. 1. Qua ratione, ex illa sententia nititur Gal. suum axioma de trimestribus probare: quippe obdictas causas non ferunt fetus commotionem, q̃ inferunt purgantia medicamenta, quibus trimestres non resistunt, neq; commotionem ferunt: ob tertiam tamen, & quartam causam trimestres magis alijs seruantur, siquidem maiorem inediam ferunt, quam minores, qui dissoluuntur facilius, sicut & februm vehementiam. Quamobrè cum fetus in primis mensibus ob mollitudinem, & in postremis ob magnitudinem, & grauitatem, non ferunt medicamentorum purgantium commotiones: necessario etiam sequitur trimestres, & quadrimestres, cum minus molles sint, minoribus minus dissolui a febris acutis, & minus suffocari, q̃ maiores, & minus et lædi ab alimenti inopia. Verùm quia ex auxiliorum adhibitione in morbis acutis, qui vtero gerentibus accidunt, non solum vereri oportet abortum propter fetum, qui perit, verum etiam propter matrem, quæ periculum non contemnendum subit, si vno mense magis, quam alio abortiat. Ob id ex arte me fecisse arbitror, si exposuero qualis mensis sit abortus fetus periculosior, & qualis matri magis, & rursus qualis vtrique grauis existat. Inter omnes itaque menses minus abortu periclitantur in quinto, & sexti initio: secundo loco sequitur quartus, & sexti finis, tertio verò septimus: mox tertius: deinde secundus: tandem primus: & vltimo nonus, & rursus post ipsum octauus, qui citra comparationem est lethalis. Sic profectò femina si abortiat primo mense, minus periclitatur, magis secundo tertio deinde magis: in quinto pari pensu, & in sexto: in septimo verò, & nono si fetus vitales non exeant, periculosissimum est, alioqui securissimum. Tandem omnium pessimus octauus. Sic generaliter si femina abortiat, sibi, & fetus minus periculosus est simul quartus, deinde quintus, post sextus: & 4. loco primus: & a primo deterior 2. deinceps tertius: &

Ec 2 sepi-

septimus ab eo, deinde nonus, tandē deterior omnibus est octauus. Quod si ali-
qñ contrarium accidere reperias, non ob id existimandum est, hanc considera-
tionem esse à ratione alienam, sed aliquam aliam causam interfuisse, cuius rōne
aut melis, aut deterius, quàm pronuntiatum est, id euenerit. Interim tamen ad
maiora auxilia prægnañibus adhibenda, hanc rationem adseruabis.

Secundum, q̄ Hip. proponit circa expurgans medicamentum prægnañibus
propinandum est, eas esse pharmaco medicandas, quibus materia turget. Nam
triplex ex materia turgenti insurgit in vtero gerentibus ad expurgandum com-
moditas, & indicatio, periculi. scilicet magnitudo, materiae caliditas & facilitas par-
gandi ob humoris motum. Prima quidem harum indicationum cogit medicū
purgatione vti, quantum vis suspectum sit opus: salius. n. est dubium periculū
aggredi exhibito pharmaco, q̄ non exhibito, in certa desperatione versari, q̄ p-
pe promittit expurgans medicamentum, si rectē cesserit, matrē superstitem eua-
suram, & fortasse puerum. Secunda sanē indicatio, & puero, & matri pronidet:
nihil. n. certius, & citius puerum interficere valet, ac ingens calor, acris & mor-
dax, qui materiae subiicitur mobili. Quamobrem licet ex pharmaco ipsum pro-
labi aliqñ conspiciamus, cum certius sit, ni cito praeueniatur, solo calore peri-
re, multo rectius existimamus pharmacum sub dubio periculo propinare, q̄ q̄
non adhibito fetus certō pereat. Tertia verō & ultiima indicatio facilitatem pur-
gationis promittit: ex quo prodiit mitius medicamentum sufficere, & profutu-
rum esse, quod sanē abortus periculum quodammodo interdicat: motam enim
materiam, vel leuissimo pharmaco adminiculans natura facillimē pellit. At si-
cut de materia turgente dictum est, eadem ratione intelligendum venit de ea, q̄
iuxta alium existit, vt in ventriculo mesereo, & intestinis, quippe hac ratione
loci vtero, & foetui vicini ipsum promptissimē perdere nata est, & gratia viarū
cōmuniū iuxta quas huiusmodi materia immorat, vel lenissimo medicamē-
to excernes, quod securiorem efficit purgationem. Ex his oībus, quae hucusque
deterior est mor- dicta sunt, & quae Hip. preced. loco proficitur, optima ratione elicitur in vtero
in arduis ex hu- gerentibus longē deteriore esse morbum acutum ex humore quiescente, q̄
mae quiescente ex humore turgente excitatum. Quippe cum auxilio sectionis venae destituatur
vt mox probabo, ac rursus non liceat illi ministrari exquisitum & tenuem vi-
tū, q̄ longior sit eo, qui turget, ac purgari non possit, nisi cocta materia, &
paulo validioribus pharmacis, q̄ materia non ita promptē cedat, vt turgens:
ideo proculdubio lethalior efficitur. Econtrario tamen qui ex materia turgēte
prodit, securior videtur, quia breuior, & quia purgationem protinus admittit.
Cum hoc tamen euidenti ratione constat, & experimentis frequentissimis pro-
bamus, non minus conuenire coctis humoribus, & quietis purgatio, quā tur-
gentibus. Nihil enim vetat in febribus, aut aliis morbis, vbi humor coctus fue-
rit, ipsum medicamento ducere, cum morbus iam minor sit in fine status, aut
in ipsa declinatione, quod his temporibus naturam habeamus adminiculantē,
vt minori etiam pharmaco exhibito, minus turbetur, & magis expellat. Cuius
medicamenti vsum neque ipse denegasset Hippo. humoribus coctis, de quibus
Gal. refert non egere, nisi veluti manu ducente, & perducente ad locum vacua-
tionis: quo fit, vt his tutius, ac facilius vti possimus.

De

A De medicamentis verò quibus id opus fieri liceat, cum legem, & methodū generalem tradere non sit opus: satius duxi, tyrones monere de incumbenti periculo ab eorum exhibitione. Quia in re utilitatem, necessitatem, & noxam perscrutare prius necesse est arbitror, quibus constabit euidentius, quale medicamentum adhibere oportet. Prima autem noxa est, quæ agitant vniuersum corpus, & vomitum mouent: quorum motuum occasione abortire feminam non raro contingit. Secunda quæ mouent dolores. Tertia verò, quæ febres succendunt, aut præ-existentes exacerbant, quia purgantia omnia suapte natura calida existunt. Nec desunt qui amara quoque medicamenta velut aloë, & rhabarbarum propinare interdican, quod puerum amare, interfici arbitrentur. Verum nequius prædictis malis perterritus, dum vsu venerit, purgantia pharmaca ex toto renuat diligenter expendat, ea esse in triplici differentia: quædam. n. valida sunt, alia debiliora; & vltimò quædam mediocria existunt. Valida quidem sunt, vel ut elleborus, colocintis, turpetum, & reliqua, quorum compositionem hæc eadem ingrediuntur, licet composita simplicibus sint moderatiora: omnium tamen conditio grauidis est aduersissima: nam hæc sunt procul dubio, quibus corpus conturbatus, vomitus, mouentur, & abortus facillimè fiunt. Et plerumque matrem vel disenteria, vel syncope interficiunt, vt Hip. accidisse referat lib. 5. pop. vxori Antimachi, quæ eadem die ab elaterio sumpto, mortua est. Sunt et inter imbecilla pharmaca quædam huic vsui probatiora, velut manna, casia fistula, syrupus ex infusionibus rosarum rubrarum, decoctum foliorum senæ, & epidymis: quibus tutius vti conceditur, vt quæ parum, aut nihil corpus perturbet. Cum hoc tamen vereri oportet, ne, cum pleraque ex his laxiora sint, & mollissima, ob id fetus ligamentis laxioribus factis, licet turbationem non inferant, abortum tamen promoucant. Quibus ratione huius prouidentia admiscere oportet, quæ roborandi, ac firmandi vias, & vires habeant, velut sunt myrobalani omnes, rosa, iuncus odoratus, & reliqua huius naturæ. Mediæ autem sunt efficaciæ, & conditio nis plurima, velut est rhabarbarum, agaricus, catholicon, confectio hamec sine scammeo, & colocintide, ac reliqua, quæ prædictorum vires non exuperent. Neque credendum est, eò quod ex his aliqua sint amara, protinus amarorem ad forum peruenire: neque si perueniat, posse fetum interimere, cum medicamentum sit ea quantitate exhibitum, quam nobis licet vtero gerentibus porrigere. Præter id quod antequam fetus degustare ipsum possit, mille alijs rebus in corpore admiscetur, & ars ob id consulit semper admiscenda esse prædictis, quæ gustui sint gratissima, & naturæ amica, ac familiaria. Ego tamen in vtero gerentibus, vel non grandi morbo affectis, dum purgare vsu uenit, non recuso rhabarbarum porrigere, verum vt securius, & cautiùs fiat; vno è duobus modis ipsum præparo, nam in grauioribus malis vrgentia consulit, rhabarbaro audacter vti (vno quidè facto ex eodem rhabarbaro hac lege cidoniato; excipe cotonea ab omnibus suis interaneis repurgata, & in partes diuisa, sed superstite pellicula, & cutis summa quæ valde est odorata) in qua, donec tabuerint, coquiro; postea per linteum collata, ac violenter expressa, excernantur, & cum optimo saccharo coquantur: quod dom sit adijcies ad lib. j. huius condituræ 3. j. rhabarbari, cuius 5. j. aut. j. & si porrigere optimè poteris. Verum cidoniatum aliud, quod absque molestia gratius, & efficacius vacuet, hac forma parare poteris: diuidat cidonium, & sublati semini-

Ec 3 bus.

bus cū folliculis impleantur partiū cavitates pulvere optimi rhabarbari negligenti triti pondere 3. j. & s. aut. ij. vel si affectio postulauerit, agarici tantundem, vel foliorum senae, deinde vniantur dictae partes, ac papiro inuoluantur, & ligatae coquantur in elibano vel furnello; & absoluta coctione cidonium aperiauit, & abiectis medicamentis internis, pulpa manducetur, qđ proculdubio medicamenti genus purgabit sine molestia, securè, atq; praeter id viscera omnia roborabit. Cum hoc tamen praegnautes purgare cautè aggrediendum est, & eas quidem solū, quarum salus in dubio existit; aut, eas quibus licet sanae videantur, aliquod impendet periculum. Praeterea, si morbus primū suapte natura lethalis sit, & ex his, qui medicamentis cedere nequeunt, tutius esse existimo eas non purgare, ne nostro errori morbi periculū ascribatur: nisi abortus gratia id fiat, sub certa vitae matris desperatione. Item eas quoq; à purgatione ablegandas esse existimo, quibus salutis spes effulget, ac certa promittitur. Quia rōne Hipp. dixisse censeo. Praegnantibus si nihil praeter naturam accidat, vitales sunt partus. Atqui cū morbi, & pharmaca res sunt pter naturā adeo, vt et ab infantibus medicamenta arceantur, eisdem aut abortu periclitantur, aut inbecilles superflui, ita vt paulo post intereant. Reliquis vero non posthabita omnino infantis noxa, sed aliquid ipsi donando, si periculum vitae matri impendat, propinanda sunt purgantia medicamenta, ne vterq; simul vi morbi pereat: in aliter, uerendum est. Nam ubi morbus suapte natura salubris existit, non licet medico Christiano aliquid moliri opus, quo abortu periclitetur infans. In morituris uero, si qđ licet, id est abortus gratia, ne matre in morbi interitū praefatus quoq; citra baptismatis sacramentum sanctum intereat. At in reliquis minus damnum est, dum in dubio res uersant, pharmacum exhibere, qđ posthabito morbo factum, & matrem mori permittere. Quod si futurum esse mortuum cognouerimus, purgatione audacius prauenire oportebit, extrahendi fetus, & humoris peccantis gratia. Inter reliqua auxilia, quibus tutius, & citius acutus morbus corruptis capitulatur, nullum idq; praecipuum est sanguinis detractio, ut Hipp. dictum esse constat. At quis morbis sanguinem detrahet. Quia profecto rōne morbos acutos grandis esse lethales ipse dixerat, quia sanguinis detractionem expolulant: & ob id 4. aphor. facta mentione de expurganti medicamento, nec uerbum ullū sanguinis detractionis protulit, quin potius eam omniō exprellis uerbis interdixit. 5. aphor. 30. dicens. Mulier utero gerens sanguine misso ex uena abiret, & magis si fetus sit maior. Vtero enim gerentes cum incidit in morbos acutos a sanguine octos, missione quidem sanguinis egent, eam tñ ferre citra abortus periculum non possunt, quoniam fetus sanguine detracto priuatur necessario alimento, non solum quia sanguis nimitur, sed quod alio auertatur sanguis, qui in uterum affluere solebat. Quamobrem censeo lib. de nat. fetus Hipp. dixisse fetum impelli ad ortum ex alimenti defectu, siue defectus sit naturalis, qualis nono mense accidit, siue ex aliqua occasione sanguine misso, aut quauis alia uacuatione. Verū licet Hippo. dictum sit, sanguine extracto protinus foeminam abortire, non ob id credendum est, id auxilium ex toto interdicare. Sed hac in parte eius sententiam intelligendam esse arbitror eo modo, quo alias, quae ad praefagandi rationem attinent, ipse protulerat. Dixerat enim 5. aphor. 21. Mulierem utero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale. Non tñ ob id credendum est oēs protinus morituras, sed magna ex parte id accidere. Pari quo-

De sanguine detractio in gravidis.

A que prorsus ratione existimabimus sanguine misso neq; omnes abortum passuras, sed magna ex parte. In hac tñ re ego proculdubio sentio, prægnantes ad sanguinis detractiōem similem scopū præstare, ei qui ab ætate desumitur: nā ætas non renuit suapte natura sanguinis detractiōe, sed ob certas ipsius cōditiones quantitatem moderatur. Quamobrē in gravidis duplici rōne vñ sanguinis detractiōem moderari oportere. Prima ne vires foeminae fortē ita deficiāt, vt ipsi, foetui, & morbo sufficere non possint. Secunda, quia periclitatur sanguine detracto abortui: nam si primis mēsis mittatur, tenerrima admodum sunt foetus vincula, & quouis leui motu dirumpuntur: præterq̃ quod dissoluntur nō pauci spiritus in ipso opere, quorum defectu deterius se habet infans. Verū si auctior nimis existat foetus sanguine misso facilius corrumpitur ob alimentū defectum. Quibus sic stantibus, rei ratio consulit, vtriq; esse subueniendum, morbo quidem sanguine misso: foetui uerō, minori eius copia extracta. Docet iudicio nostro Celsus uerum illius Hip. sententiæ interpretationem li. 2. c. 10. hæc referens verba; Si quidem antiqui primam vltimamq; ætatē sustinere non posse hoc auxiliij genus indicabant: perluaferuntq; sibi mulierem gravidā, q̃ ita curata esset, abortum esse facturā. Postea uerō usus ostēdit nihil ex his esse perpetuū, aliasq; posteriores obseruationes adhibendas esse: ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest. n. non quæ ætas sit, neq; quid intus in corpore gerat, sed q̃ vires sint cōsiderare. Ex quo loco infero, quod si mulier utero gerens acuto magno morbo corripitur, & vires ipsius constiterint, ac nihil fuerit aliud, qđ obstet, sanguinis detractiōe citra euidēs abortus periculū optimē tolerare poterit. Quod tñ intelligendum est, dū vitæ periculū impedit, atq; cū hoc tātō minus ex extrahendum, qđ foetus fuerit auctior, quod eo tpe ad foetus alimoniam & lactis generatione multo sanguine sit opus. Sed uidetur quodammodo huic sententiæ aduersari Arist. qui 4. de gen. anim. c. 8. hæc refert uerba; Sed cum foetus magis, magisq; perficiatur, plus excrementis superest, minus. n. absimitur, idq; dulcius est, cū non bene trahatur, qđ bene coctum sit: non. n. insuper ad foetus formationem consumitur, sed ad incrementum mediocre, quasi iam foetus constet adeptus finem suum. Qua snā minus alimentis assumere, & conterere foetum maiorem, & conformatū, q̃ eum, qui conformationem adhuc agit, euidenter constare vñ: ob idq; optimō ducta ratione, iuxta huius auctoris mentem, minus nocebit eo tpe sanguinis detractio. Neq; eō sibi erit contrariū Arist. qui lib. eodem. c. 6. reddens rationem, quare utero gerentes ab initio turbationem patiantur dixit. Principio potius cū concipiunt, perturbari solent magna ex parte, conceptus. n. purgationem impedit: & præ sua exiguitate absumere copiam excrementi inter initia non potest: qđ post, ubi iam plenus absumere cœperit, leuat. Qua parte tñ intelligit foetus ab initio suis primis mēsis parum accipere, licet. n. plurimum augeantur q̃uitatis suæ ratione id totum, quod in eo augmento absumit, q̃ paucissimum est: sed c. 6. dixerat parum absumere alimentū foetus, cum maiores sunt. Quod intelligendum esse censeo, ac si dixeris, sed minus ad portionē corporis, q̃ ubi erant quatuor, quinque aut sex mēsum: siquidē his mēsis foetus conficitur, ac partus oēs integrant, licet antea conformationem habeant: cum hoc tamen (ut dictum est) ijs mēsis integrantur, postea uerō conformatus, & confectus minori augmento, & minori alimento ad portionē

Ec 4 indige-

indigebit. Ex quibus verbis prodit difficultatis ratio: nam si verū est, quod Aristot. dixit, minus alimentum ad portionem suā molis capere fetus, quo grandiores sunt, non ita facile corrumpuntur sanguine misso. Cui dubitationi dicendum est Arist. eo loco tñ disquirere eam, quare lac vltimis mensibus generari incipiat, & ipsa reiecit in copiam sanguinis, qui iam ex utero ad mammas regurgitare incipit, copiosius: qđ verū est: sed nō eo qđ minus sanguinis fetus absumat, quod maior existit. Atqui licet aliqui existiment, plus abundare, qm pluribus mensibus sanguis retentus est: ego tñ cenſeo potissimum rōnem esse, qđ antea diximus, nimirum quia fetus eo tpe plurimum attrahit alimēti, qđ plurimo egeat, a quo plus partis butyroſa, & pinguoſa ad lactis confectionem separari est æquum. Nam coniectabile vř, ex maiori alimenti copia maiore quoque portionem pinguoſa substantiæ suppressa, qđ ex minori, & ob id vltimis mensibus plus lactis est, quia plus trahit fetus, & plus ob id mammas transmittit. Quod cenſeo intellexisse Arist. cū dixit, Sed cum fetus magis, magisq; perficiatur, plus excrementi superest: ex quo copiosius lac abundare est æquum: qđ nomine excrementi intellexit Arist. Quō fit, vt dum vsu venerit, & affectus grauis exiterit, non tñ formidare oporteat vltimis mensibus sanguinis detractiōnem, sed eam non nisi plurimum exposcente malo administrare oportet. Constat igitur ob id frequentissimē feliciter accidere, si in grauidarum morbis sanguinem detraxeris, parcē tñ, & moderatē: quā moderationem veteres non obſeruarunt. Quō fit, vt mirum non sit, si tantum vetuerint sanguinis detractiōne. Sed nos hāc seruantes moderationem, audaciores tuto erimus, maxime si mox a morbi principio id studeamus efficere, ante quidē quam febrilis affectio sanguinem in vtero adseruatū, vel in secunda retentū, calfaciat putrescat vř: quippe eo tpe, vel grauior efficitur affectus qui præsuerat, vel denuo grauissimus aliter succreſcit, vt multis qui timore abortus praeteriti, praeterita principij occasione, miserē contingit. Itaque a quarto ad septimum sanguinem detrahes ab ea copia, quam affectus exposcere videatur, tñ remittens, quantum fetus ad sui custodiam postulauerit. Primis verō, ac vltimis mensibus, id opus non aggredieris, nisi maiore, & vrgentiore existente necessitate, idq; moderatius facies, quod fetus tenuior sit, ac faciliē dissoluatur, & discedat: uel qđ grandior exſtat, & plurimo quoq; indigeat alimento. Tandem hoc tibi semper in memoria sit, in nullo menses sanguinis missionem periculo vacare. Est tñ in hac re aliud, qđ prætire non decet, nimirum in iuueniculis, & boni habitus feminis citra morbum aliquem, sed eō, quod abortiri frequentissimē assueſcunt, necessum esse plerumque sanguinem detrahē, vt latius sum probaturus c. de abortu. Nam feminae, quibus plurimum sanguinis abundat, dum vtero gerunt, ob id abortiunt frequentissimē, quia a primis ſcætationis mensibus nequit ſcetus tñ alimenti consumi: ideoq; suffocatur, vel praximia copia vincula dirumpuntur. Quamobrē habitum illum quātumuis bonum statim soluere expedit, nedum cū morbo aliquo acuto corripitur: quo tpe duplex inſurgit necessitas mittendi sanguinē: prima ab affectu: secunda a copioso corporis apparatu, quibus satisfactū erit sanguine misso. Verū in omnib. sanguinis detractiōnibus, qđ grauidis profuturæ sunt, eam venā eligere conuenit, qđ maxime ab vteri venis dissideat, ita vt quā minimam cum eis communiōne habeat, qualis est vena humeraria, vel vrgenti ma-

*Vena quæ
abſcūda*

Ati malo, cōis à reliquis verò abstinendū, quippe q̄ facile alimentū adimunt. In quo sanè opere id vnū in periculosissimis affectionib. obseruare oportet, vt sanguis nō mittat, nisi in p̄dictis, vel dum experimento disceris, eā mulierē a venæ sectione, dum vtero generet, & fœtus esset tantus, quantus eo tpe est, nihil passā fuisse, adq; ē in p̄dictis actionib. adseruabis, ne aduersus, vel p̄stantis alicuius viti suā, vel fidissimi autoris decretū, sanguinē mittas, vel aliquod graue op̄ efficiendum aggrediaris. Graue, p̄fectū est, & timore plenū contra Hipp. mentē in grauidis audacter sanguinē mittere; cum hoc tū cum matri certū periculum impenderet, minus malum est sub dubio abortus sanguinē mittere, q̄ ipso nō extracto, matrē & puerum simul necessario perdere. In quo ē opere oētimestres cauere oportet: nā rarum est fœminā oētimestrem morbo acuto correptā, & superstitem esse, vt ē Arist. refert 7. de hist. ani. c. 4. Qua p̄fectū rōne maturo admodum consilio, & accersito aliquo ex p̄stantissimis Medicis id opus tentare optimū semper duxi. Quod si vires non constiterint, aut p̄missā sanguinis deductione, si plenitudini satis factum non sit, frequentioribus vti oportebit cucurbitulis, & aliqñ cum scarificatione: nam à ventre calorem febrilem distrahere natæ sunt, quod grauidis proficuum existit. Poteris quoq; hirudinibus brachijs affixis vt: nam minori sanguinis, & corporis turbatione ipsū educunt citra id quod fœminæ expauescant, aut animi deliquio corripiantur.

B Qui plurimum verentur sanguinē mittere in grauidis, vniuersum ferē curationis negotiū victus parsimoniæ in totum cōmittunt, existimantes minus esse periculū abortus ex tenui victu, q̄ ex venæ sectione, aut purgatione, decepti iudicio nostro, iucata, & apparenti quadā rōne, quippe existimant plerūq; ex vtero gerentib. facillimē mediam ferre posse, quod cibi fastidium citra noxā diutissimē patientur, & ob id morbo acuto correptis tenuissimū instituunt victus rōnem, credentes id quoq; posse citra abortus periculum perferre. Ex qua ē fallaci ratione inferunt in grauidis minus esse periculosū acutum morbū q̄ diuturnum, q̄ victus exquisitus non ita facile abortum excitet paucis morborū acutorum dieb. Verum rei veritas euidenter monstrat non minus esse periculosū acutum affectum hac ratione, quinimo grauius: nam quantitas cibi nulla lege, vt par est, institui in morbis acutis matri, & infanti proficua pōt: nam si cibum eligas copiosum, matrem interimes, q̄ morbi ratione victum exposulet tenuē, quod si parcum tenuemve exhibeas, qualem morbus acutus exposcit fœtus alimenti defectu peribit. Neq; valet ratio eorum, qui existimant eo quod sana, & fastidians cibum aueretur fœmina, ideo in acutis idem perferre innoxie posse. Fert quidem natura non rarò simplicem affectum, cui si alium superaddas, citra periculum tolerare nequit. In morbo igitur acuto, ubi tot sumi, q̄ fœtum p̄dere possunt, si victu simul priues, nil mirum si ocysimē interficias. Consulit itaque in re tam dubia medendi ratio vtriq; esse prouidendū tali victus ratione instituta, q̄ nulli eorū manifestē noceat. Quod si fieri nequeat, quin aut mater pereat cibi copia, aut fœtus inopia: satius erit matri prouidere: quippe fortasse infans ea ratione à periculo euadet, quod mortua matre nequibit. In qua re eum victū institues, qui copiose sit alimonie, & substantie, in parvissima tū copia. Puerō etiam prouidendum per ea, quæ umbilico esse apponenda antea diximus. Non quidem quod ea parte puer alatur, sed roborandarum uirum gratia.

Hęc

De vi-
tus m-
stutio-
ne ingra-
uidis.

Hæc quidē sunt, q̄ in cōi omnibus vtero gerentibus morbo acuto correptis proficua sunt. At in reliquis auxilijs parum, aut nihil euariat curandi rō ab ijs, q̄ reliquis corporibus sunt proficua, siue angina, siue pleuritis, siue phrenitis, aut soporosa affectio sit, nam in particularibus nihil habent, quo differre possint, præterquam q̄ in phrenitide, & reliquis huius naturæ affectionib. neq; acribus clysteribus, aut suppositorijs vtendum est, nisi dum vsu venerit ex nimia necessitate abortum pronocare.

Præterea in quibusdā ex ijs, quæ vtero gerunt, vtendum est expurganti medicamento, si affectio postulanerit, ocylsimè: in alijs remorandum. Nam quibus alius fuit, cum id malum, vt Hip. refert 5. aphor. 34. grauidis sit periculosum, ac periculum proficiscatur, non solum (vt Gal. recenset) ex defectu alimēti, sicut in sanguinis detractione, sed ex alijs causis, quæ eam diligentiam in artifice requirunt: cōtundendum non est, nam pituita redundans faciet ad vterum demissa citius effluere fœtum vinculis laxatis, & bilis amara ipsum occidet nō secus, ac venenum. Significat. n. magnam causam, cum prægnantes plurimo opus sit abundare alimento. Quibus accedit periculi alia ratio, quæ nos ad properandum cogit, q̄ fluxum ocylsimè sequitur tenesmus, promptissima quidem abortus causa, vt Hip. placuit 7. aphor. 27. Quamobrem credendum est lienteriam defectu alimenti abortum minari, reliquos verò fluxus alijs de causis: in quib. sanè purgare ocylsimè opus est, & in lienteria mox constringere. Inquit. n. Hip. 1. de morb. mul. Concludere autem statim, atque constringere oportet. In reliquis verò affectionibus, vt naturam habeamus adminiculantem, & minori sit opus medicamento, coctionem expectandum esse consulit rei ratio: qua expectata, sæpe abit purgandi necessitas.

Mirum profectò est, quantam requirat diligentiam in sanguine detrahendo vterus erisypelate affectus: siquidem 5. apho. 41. expresse docet Hip. lethale esse, quod non v̄ minus mirandum, quā citò præueniendum, etiamsi erisypelas suapte natura affectio lethalis non sit, neq; vterus membrum princeps. Si quidē Auic. testatus est. 44. tract. 2. c. 10. se vidisse totum vterum funditus excidere, & fœminam cum hoc superuixisse: quibus accedit, grauidationem quoq; affectū esse secundum naturam. Cum hoc tñ hæc tria simul iuncta lethalem efficere affectum experimento, confirmatur, & Hip. decreto li. 1. de mor. mul. vbi sic loquitur. Erisypelas si in vtero fiat, mortem necessario adfert. Subdit rationem lib. 2. de mor. mul. dicens. Si ignis sacer in vteris fiat; tumores fiunt linidissimi à pedibus exorfi vsq; ad crura tota, & ad lumbos. Quantò verò tempus amplius progressum fuerit, et pectus percipit, & intumescit, & tota perfrigeratur, & febris habet magna. Et in vltima parte textus subdit. Hic morbus, si prægnantem inuasit, occidit. Cuius causam esse scimus, q̄ abortum facit ob vehemens incēdiū: ex abortu autem, & erisypelate necesse est mulierem mori. In qua sanè affectione licet Hip. locis nuper citatis aliam scribat curandi rationem: ego tamen eadem minimè auderem vti, nisi sanguine sufficienter prius misso, & pronunciatò abortus, & mortis periculo: tandem verò mollibus, ac refrigerantibus clysteribus rem omnem agerem, adhibitis etiam inunctionibus dorso, & inguinibus iuxta Hip. curandi rationem loco nuper citato adductam.

Est tamen non minus graue febribus alijs grauidam corripi dum ab his extenuari

A tenuari contingat. modo lente sint, modo vehementes, vt facilè colliges ex Hippo. 5. aphor. 55. Quæcunq; (inquit) vtero gerentes febribus capiuntur, & valde extenuantur absq; manifesta occasione, difficilè pariunt, & cum periculo, aut abortus facientes, periclitantur. Itaq; duobus modis extenuantur scemina, in validis quidem febribus, ob vehementiam, in debilibus uerò, ob durationem: quibus ita sceminas extenuari contingit, vt neque parere, neq; partus, aut à partu labores, & vacuationes ferre citra maximum periculum possint. In qua sanè re expendendum est maturo iudicio, quid agere oporteat: non enim, sicut in acutis, vt possumus sanguinis detractione, aut purgatione, nisi ex vehementib. fuerit febris, in quibus melius est anceps experiri auxilium, quàm ferre citra auxiliares manus præsens interitum, eò qd tempus, & naturam in diuturnis affectionibus curandis præualere nobis constet. Quamobrem proba victus institutione leuissimis medicamentis, & aliis his similibus corpus moderari oportet, donec partus tēpus instet; Nā grauius fiet malum, si abortus ex præsidio sequat corpore febriente, & præ nimio labore, ac febre languido, & extenuato.

B Præterea sunt plerq; scemina, quibus ex intemperato habitu, aut ex prauis humoribus ante conceptum, aut post genitis, frequentissimè febribus corripiuntur, à quibus factæ imbecilles, vel abortiuæ, vel malè se habent toto grauidationis tempore, vel septimenses frequentius edunt partus. Quod quidem ante conceptum curandum est præcauere purgatione, balneis, sudoribus lenibus & optima victus, & vitæ institutione præmissa, quæ corpus ab huiusmodi spurcitia ante conceptum liberent.

Quæ omnia ob id hac in parte scripsi, vt quisque debita prouidentia cuique harum affectionum consulat, ne si eas à principio neglexerit, postmodum curare non possit.

DE PVERPERARVM ET NUTRICVM AFFECTIONIBVS.

LIBER QVARTVS.

De Partu.

Cap. I.



B

ON immeritò Hip. dixisse comperimus lib. de genitura. Omnia lege fiūt. Est autem lex certa quædam ratio, & modus quò ex natura fieri solent omnia, & naturæ quædam institutio, secundum quam cuncta agit. Quippe licet aliqua est in quavis re efformanda peculiaris, & propria ratio generationi pficiuā (nam vnā est, quæ chilum generat, sanguinem alia, bilē vtrāq; alia, & alia medullam, vrinam ac reliqua, quæ in corpore sunt: in quibus efformandis eundem generationis modum semper adseruat potentia, cui id munus incumbit) ita pro: lus eam, & vnā seruare naturam ipsam rationem, & modū in fatus conceptu, motu ac partus tempore existimandū proculdubio est. Maxime cum stabilita habeat propria opera ipsa natura, & certus perhiodis ac legibus circumscrip: talie conceptum, forinationem, motum, integritatem, vitam, & in lucem productionem, seu partum, ac post in matris alimentum t: ta solertia meretur, & perficit, vt sui occasione statutam operandi rationem nunquā enariasse comperiamus: ni forte quid præter naturam illi accidar, cuius vi & efficacia cogatur a constituta lege deflecti. Quæ sanè duo vitiorum genera id nimirum, quòd puerperis, & id quod nutricibus accidere potest, quatto hoc volumine complecti fuit in animo, initio sumpto à fetus forinatione & partu.

Dictum est præc. lib. quatuor temporibus partum esse vniversam forinadi factum perfectionem: quorum primum septem dierum spatio circumscribitur, genituram appellatam effingens: secundum carnis, & ossæ substantiæ molē præparans esse constat, licet integram delineationem ante triginta dies nō adipiscatur: tertium quidem principia viuentis effingit, ac efformat: quartum verò & vltimum perfectionem omnium membrorum præmissa delineatione p: stat, præstaturum deinceps infantis nomen. Ex quibus constat decuisse naturæ maiestatem, & ministerium hæc tempora, hos motus & labores mouere, vt operis sui perfectionē iuxta institutum consequatur. Nā cum natura re quandam simplicem & homogeneā struit, mirum non est, si vnica motus sorte, vnico tātum tpe vni solā operi innitens ipsius perfectionem adipiscatur citra vllam varietatem. Verum cum rem aliq̃ ex varijs diuersaq; naturæ, ac potissimū perfectionis diuersæ, fabrefacere studet: necessum proculdubio est, tot tempora, tot labores ac mutationes instituire, & mōliri, quot sunt opera, quæ ipsam effecturam spectamus. Cum hoc tñ constat non vnicum esse in mare, ac femina forinationis tempus, de qua re prætermis: sis varijs antiquorum opinionibus, mediam inter omnes seligimus, quæ magis Hippocratico dogmati adherere videtur.

Forma-
tionis tē-
pus.

Exurgit

Exurgit quidem puerperij formationis longissimus terminus numero quadraginta quinque dierum constans, quem hac lege auctores partiuntur; Solibus quidem sex spumificationi (vt dictum superius est) tribuentes; quatuor lineationi: octo lineationis repletioni: quatuordecim carnificationi: terdecim efformationi: ex quibus quadraginta quinque dierum numerus constat. Numerus autem minimus triginta dierum spatio adimpletur: quoniam Soles sex spumificationis: duo lineationis: quatuor lineationis repletionis: notem carnificationis: totidem efformationis proculdubio sunt. Quos sanè terminos de masculo puerperio subaudire tantum oportet; nam de femella aliter statuendum est, q̃ longioribus (vt inter omnes conuenit) temporum interuallis absolnatur: decem quidē dierum spatium (etiam si maturius plerumque, viginti quinque dierum tractu fabricari illustres auctores obseruauerunt) vltra maris spatia ad sui formationem exigit: cuius figura per id tempus post abortum in humido haudquaquam permanet, sed ocysimè planè dissoluitur: contra mas si in aquam frigidam diffundat̃, in membranula cogitur, consistitq̃. Neq̃ nos tertere debet, q̃ ex antiquis multi (vt Straton Peripateticus, & Diocles Charystius) concepti corporis fabricā per septenos dies obseruatione dispensant, Platonica septenariorum maiestati alludentes: vt hebdomadæ primæ genituris intra inchoandi hominis rationē locatis, genituum humori folliculum artifex natura primum circumdet. Secundā crebas extimam conceptabilis superficiem cruoris guttas passim gestare putat. Tertiā hebdomada de foris introrsum verti eas, demergiq̃. Quartā humorem ipsum ita coagulari, vt inter carnem, & sanguinem liquida adhuc soliditate cōcretioneq̃ conueniat. Quinta, partu mense septimo maturaturo, figurā integrā confingi. At si nono à conceptu mense absolutio futura sit, siquidem femina fabricationi accedit, sextā hebdomada membra diuidi: sin masculus septimā proculdubio arbitrantur. Ex quibus constat non longè à nostra veritate deuiare antiquos, siquidem trigesimo quoq̃ Sole hominis efformationem, vel paulò plus fieri censet. Hec itaq̃ est omnes configurationis ratio, quam multis de causis sic natura fabrefecit: primò nanq̃, ædificat sibi domicilium, & firmitudinem, qua subijciatur natura vegetabilis, dirigaturq̃ in actum: in quo veluti in arce propria munia perficiens ad altiora progreditur, non solum contenta plantam effinxisse intra vterum, sed sensui carnem, & ceteras partes disponens, & configurationem fabricans sui naturam transgreditur. Quo facto, maiorem in corpusculo illo apparatus effingens, animæ rationali domum præparat, cuius imperio tot facultates, tot instrumenta mira quidem varietate confecta subijcit. De cuius autem ea omnia sic fieri: nam cum quædā nostri corporis membra habeant rationem principij, quædam verò rationem organi, & quædam rationem finis, necessum profectò fuit, aliquo ordine naturam se gerere diuidentem, vniuersū formationis tempus in quatuor partes, quibus vteri gestatio perficeretur. Vt quis parturitionis tempus adamussim callere possit, motus & labores infantis in vtero expendat satis prius oportet, quod iuxta prædictas mutationes metiri quoque tempus partus opus sit. Expresserat quidem hæc omnia Hip. lib. 6. popu. par. 7. tex. 29. dicens. Dolores per circuitus fiunt, qui autem in septuaginta mouetur, is trinmero perficitur: qui verò in nonaginta, is etiam triplicato numero absoluitur. Qua sententia videtur complexum fuisse duo tantum pariendi

Ratio,
& tempus
motus
incantis
in vtero.

A pariendi statuta tpa, nimirum septimum, & nonum mense minam qui septuaginta diebus mouentur, septimo mense in lucem produnt: qui verò nonaginta, nono. Eandem quoque sententiam scripsit idem Hipp. ad finem libri de alimento, addens id, quod summo opere ad prædictum dogma existimabat necessarium fore: nam postquam de eare uarias opiniones recensuisset eosdem terminos statuens, in fine inquit. Est, & non est: vt aperte doceret incertum esse tempus gestationis, formationis, & partus etiã, sed illa duo esse potissima plus minusve euariantia, & licet locus sit li. 2. pop. p. 3. tex. 30. huic apparenter contrarius, nimirum labores, circa tertium diem supra quinquaginta, & sextum supra centum, menstruales secundo, & quarto, que oportet nosse ad septimenstrem. Quo videtur constare, septimenstrem indicari partum laboribus mense incipiente tertio aut in fine, secundi quos complectitur 3. dies, aut quarto mense qui constat 106. diebus, qui sanè termini longè videntur diuersi: ab his quos li. 6. docuerat arbitror quidem non esse integrum, & Hip. dignum locum. 2. li. aut, eo voluisse idè intelligere, de masculis, in quibus mirum non est, aliquot dies ante septuagesimum moueri, & labores præstare: at lib. 6. suspicor generalius præstitisse, præceptum. Quapropter credendum est, eadem parte scripsisse varios labores, & motus ad partum terminos, dicens; In longius autem tps labores. 3. & 5. & 7. & 9. mense. 2. 4. 8. quæ ex parua tabula consideranda, censeo tamen certius loquutū fuisse lib. 6. quam in reliquis locis. Sed duo circa primum oraculum Hip. expēdisse oportet: quales sint terminis motus infantis i vtero, & quid ex illis ad partum prædicere liceat, secundum, an sint tantum hi duo pariendi termini. Ad primum igitur accedendo, existimo Hip. voluisse dicere terminum partus esse indagandum ex principio motus infantis, ita vt qui septuaginta mouetur, uel nonaginta, triplicato numero absoluat, quia potissima ratio pariēdi, & tempus ex labore, ac molestia motibus infantis illata perficitur, instat reliquarum naturæ actionum. Nunquam. n. ipsa expulsiōem aggreditur eius, quod cōficit, donec ex toto perfecit. Præterea minimum subit natura laborem in confectiōe humorum, donec in perfectiōe consistat, & sese ad expulsiōem præparet: exemplo est crisis in morbis, q̄ antea motus, & labores quidam desinunt. Sic profecto in infantis exortu labores, & dolores per circuitus fiunt, puero ipso, mediante motu, designate sui exitus terminum: nam hi sunt labores, quos licet ex Hip. mente intelligere, & hi sunt motus, nimirum cū infans primò se posse moueri percipit, & facto motu laborem, & dolorē infert, præfagium quidem futuri exortus. Ex quo quidem tpe computationis initium ad partum sumit Hip. quem et doctiores insequitur. Subit aut in examen hac in parte, si statutum tps formationis fœtus contineri Hip. dixit, ad summum quadraginta, & duobus diebus, quorum computationis principium ad partum à septuagesimo in septimestrib. parubus, & à nonagesimo in nouimestribus sumat? siquidem à quadagesimo secundo ad summum fœtus moueri possunt. Non ne statutū hēt natura tps, ac determinatum huic operi, in quo motus motibus correspondere tenentur, & actiones actionibus ita, vt neq; natura, neq; fœtus vsquam ab opere cesent? Quorsū item totum illud tempus à quadagesimo secundo die ad septuagesimum, aut nonagesimum otiose pergit ipsa ita, ut nullam præstet computandi notū, neq; vllum huius operis indicium? Cui sanè dubitationi, quam maximi esse momēti scio,

scio, vnico verbo satis faciam in memoriam renocans, naturā in morbis triplex A
ad sua munia exequendo obtinere tempus: vnum quidem in quod aliquod indi-
cat aggredi opus; aliud, in quo monstrat perficere inceptum: reliquū vero, quo
vtriusq; operis perfectionem monstrat. Quod pulchrè dixerat Hip. 2. aphor. 24.
Septenorum quartus est index. Qua sententia constat ex temporibus quādam
nil manifestum efficere, licet omnino natura ab opere nō subsistat: quādam indi-
care: quādam verò iudicare. Quod pari fermè ratione in fœtu efformando, ac
propellendo, naturam obseruare comperimus. Nam vitalem esse fœtū quadra-
gesimo secundo die indicat, septuagesimo motum edimurum: intermedio autem
tpe fœtum perficit natura, vt motui statuto tempore designato sufficiat. Non n.
mox vt viuit, mouere seipsum valet, saltem vt dolores, & labores inferre possit.
Præterquā quod motus, in fœtu duplex cognoscitur: alter vitæ manifestatiuus,
qui quadraginta, & duobus diebus effulget, alter verò præfagus, & index par-
tus, qui septuaginta, aut nonaginta diebus euenire refert Hip. prædicta senten-
tia. Quapropter partum consideramus veluti quādam morbum, eumq; longis-
simum, ex sorte nimirum eorum, qui dierum hebdomadarum, & mensium nu-
mero indicantur. Pro cuius rei probatione expressum Hip. testimonium lib. de
sepūmes, partu, quo hæc refert verba: Mulieribus fœtum conceptus, & abor-
tiones, & partus, eodem modo iudicantur, quo & morbi, & sanitas, & mors cun-
ctis hominibus. Sed omnium istorum alia quidem diebus: alia mēsis: alia die-
rum quadragenarijs: alia verò annuo spatio euenire videntur. Cum ergo partus
morbus sit longissimus, certè in eius tempore diffiniendo eandem sequi oportet
bit computandi rationem, q̄ in alijs morbis longis dierum hebdomadarum, &
mensium numero obseruamus. Itaq; quemadmodum quartum diem septimi
indicem esse Hip. testatur, vndecimum decimi quarti, decimum septimum vi-
gesimi: ita prorsus in partu quadagesimum nonagesimi, centesimum, & vige-
simum centesimi octuagesimi, ducentesimo ducentesimi quinquagesimi in-
dicem in idem esse experimento deprehendimus. Habent. n. inter se hi numeri q̄-
dam similitudinis analogiam ita, vt quam rationem habet quartus ad septimū,
eādem habeat quadagesimus ad nonagesimum. Quare sicuti decimus quartus
dies ex duplicato septenario cōsurgit, & dimidium circuitus lunaris explet: ita
centesimus octuagesimus dies ex duplicato nonagesimo cōsurgit, eumq; cen-
tesimus, & vigesimus ita indicat, vt vndecimus decimum quartum. Deniq; vt vi-
gesimus, dies finem ferè facit trium partium lunaris circuitus, eumq; indicat de-
cimus septimus: ita ducentesimus, quadagesimus, qui terminus est partus na-
turalis, q̄ legitimus, finisq; est, & terminus trium partium anni, eum proculdu-
bio indicat ducentesimus. Qui sanè termini sunt omnes, quibus fœtū designantē
sui ex ortu ipsi in vtero moueri cōperimus; & fœmina ipsa apertissimè eos ob-
seruant edocē laboribus, & doloribus, quos per certos quosdam circuitus sibi
signatos persentiunt. Sic apud ipsas vulgariter fertur dolores illos fieri, quia est
principium mensis: nos autem colligimus esse motus partuum designatores. Ex
quibus euidenter constat naturam in fœtus formatione, motu, & partu propor-
tionem, & mensuram semper seruare (dummodo aliunde non impediatur) plus
minuere, q̄ insinuauerat dictum illud Hipp. Est, & non est. Sed licet dictum sit
duos esse solum legitimi partus terminos, septimum videlicet, & nonū mēsem
do-

A doctissimorum virorum decreta, quæ aliter sentire videntur, nos cogunt id diligentius expendere, & cuiusque rationes examinare, ut constet (p ingenii mei viribus) de partus tempore veritas: initium autem sumam à partu naturali.

Partus igitur est actio partim quidem vteri, partim verò ipsius fœtus, vteri quidem, quoniam ille offensus gravitate fœtus iam multum adducti, & excrementorum redundantia, vi propria expultrice, fœtum in lucem edit: fœtus verò, tunc quod auctior satis alimenti à matre non capiat, tum quod partionis tpe plus calidi natiui habens, magis quoque refrigerari postulat. Quamobrem cum non sufficiat aer, quem illa per arterias subministrat, ad exitum concitatur: idque non certo statoque tpe, ut paulò inferius latius monstrabo, contingere scimus. Fit itaque partus tum maximè cum puero alimenti inopia, & loci angustia oppressio motus validus accedit, quo manibus pedibusque calcitrante pelliculam quandam inter nam rumpi contingit: rupta autem una, alia ob id debiliorem vim habent, & rumpuntur: primū quidem illæ contiguæ, & coherentes, postea externæ. Cum autem ruptæ fuerint pelliculæ, tunc fœtus à vinculis exsoluitur, & agitatus foras prodit. Atque hæc sunt Hip. verba lib. de na. pueri. Constat igitur naturalis partus triplices esse causas: unam cum calor cordis adeò crevit, ut amplius siue ventilatione & refrigerio inspirato aere infans viuere non possit: alteram, quoniam alimentum, quod à matre sumit, non ei satisfacit, sed cogitur quod deest, aliunde disquirere, & autore Hip. loco nuper citato, calcitrat & acetabula dirupit, & matri pariendi initium affert: tertia verò causa est, quoniam vterus ipsū iam grandiore factum non capit. Quas sanè causas in pullorum inuolueris euidenter conspicias: nam ubi oua inania videntur, volucer rostro putamen ferit, olfaciens quidem desiderium fœtus ad exitum, ubi deficit alimentū, inquit enim Hip. loco citato. Pullus non habens sufficienter unde viuat, fortiter, motoretur in ovo vberius alimentum quærens, & pelliculæ circundi rumpuntur, ac ubi mater sentit pullum vehementer motum putamen scalpens ipsū exedit. Id quod pulchris verbis constat Aetium dixisse tetra. 4. ser. 4. c. 21. mutata oratione ab Hip. li. de superfætatione, inquit enim. Talibus vteri puero augescēti, & bimestri, aut trimestri, aut quantumcunq; tempus transgredienti, si quando aliās augescit in maiorem amplitudinem non porriguntur, ita ut non amplius sufficiant capiēdo fœtum, sed propterea proditur eodem tempore. Atque hæc de partu naturali dixisse sit satis, quæ necessaria mihi erant ad veram computandi rationem in partu. Reliqua verò, quæ de partu naturali videntur esse necessaria, reperies 3. cap. seq. de partu naturali, & laborioso.

De hominis partu, eiusque tempore, tam est difficile proferre iudicium, quā de his omnibus, quorum variæ & inconstantes autorum reperientur sententiæ. Quippe Hipp. medicæ artis princeps, & dux non docet, ut arbitror, huius difficultatem de partu tam multiplicem, tamque ambiguam, & multis tenebris submersam, utcunque diffinire. Quamobrem studendum nunc est ex bona philosophia, & probatissimorum autorum scriptis aliquid utile haurire, quod huic rei lucera afferre possit. In qua sanè re primò, quid astrologi sentiant, expendendum est: secundò, quid arimhetici: & vltimò, quid in bona philosophia, & Hippo. doctrina tenendum sit, clarius constet, quot sint legitimi partus termini.

FF Itaque

De partu naturali.

Plin. 7. nat. hist. referi ex seminis, quoque, diuersa natura prodire. & scribitur Vestiliæ ex diuersis maritis facta alium 7. alium 8. alium 10. peperisse

De partus temporibus.


De par-
tu astro-
logorum
dogma.

Itaq; (vt ab Astrologis incipiā) conuenit inter ipsos corpora inferiora a supe-
rioribus affici, & septem planetas in hominis exortu, & dum in vtero est impe-
rium obuinere: idq; ordinatim, & serie quadam. Sic Saturnus (vt apud ipsos fer-
tur) primus cum genitura connexionem, & conuenientiam habet, illiq; ex sua
natura dominatur: nam cū genitura humida sit, & liquida, inspissari necesse est,
vt hominem gignat, quod proculdubio beneficium facillimē illi Saturnus præ-
stat: planeta alioqui frigidus, & siccus, cui ob id inest siccādi, inspissandiq; atq;
cogendi potentia. Verū cum semen increfcere teneatur, impleriq;, Ioui subij-
citur: quippe is augmentum præbet, & calorem, vt qui calidus sit, & humidus:
ob idq; Iouem incremento maximē præesse dicunt. Sed cū auctum iam pue-
rum moueri oporteat, cui actioni calore, & siccitate erat opus, post Iouem Mars
puerum suscipit, qui cū calidus sit, & siccus, fetui motū concedit. Quamobrē
tertio mense infantes moueri assolent. Succedit quarto loco Sol, qui ex cauā-
dis ossibus proficius existit, cuius ē beneficio meatus corporis euadūt amplo-
res, & singula membra suam perfectionem adipiscuntur: est enim huius atri
calor viuificus, & maximē efficax. Cæterum, quia periclitabatur calore, & sicci-
tate fetus ex vi præcedentium planetarum, subuenit quinto mense Venus fri-
gida, & humida respectu præcedentium caloris, cuius beneficio siccitatem ca-
loremq; à prædictis impressum natura corrigit, & attemperat. Mercurius verò,
qui operi ab alijs inchoato colophonem addere dicitur, absoluit motus perfe-
ctionem, & instrumenta expolita, ac firmiora reddit. Vltimò tamen accedit Lu-
na, cuius efficacia multa succrescūt infanti beneficia: nam quā frigida est, & hu-
mida, adipe munit, & vterum humiditate, ac molliē ad faciliorem partum præ-
parat. Quibus beneficijs præmunitus in lucē vitalis prodit septimo mense pue-
rulus: & hæc est cā quare septimestres partus vitales, & maximē genuini apud
astrologos existant. Verum si aliter contingat, & cogatur vsq; ad octauum men-
sem remorari, iterum reuertentem ad se Saturnum sensurus est, sed non ita mi-
tem, & placidum, ac primo mense conceptus degustabit. Quippe sua frigidita-
te puerilem calorem minuet, & internam vteri partem cōstringet, cōprimēq;
præter modum siccitate nimia, ita vt accedente externa causā protinus parien-
di occasio subsequatur, & ob id partus, & mater magno in discrimine versant
ex inclementia huius planetæ, adeo, vt partus saltem viuere minimē possit, ac si
eius malignitatē superet, viram deget ærumnosam, & laboribus, ac morbis ple-
nam. At si nihil eo mense præter naturam ipsi accadat, Iupiter, qui iterum redit,
nonum mensem saluberrimum efficit, & omnia Saturni maleficia protinus de-
let, q; suo calore, & humore, quibus potissimū viuatur, puero vitam instaurat
atq; conseruat. Verū quia is, qui Ioui succedit ex beneficiis est, & suo calore fa-
cilē cum vita nostra conspirat, ideo si quis ē decimo mēse nascatur, vitalis plu-
rima ex parte euadet. Hæc proculdubio sunt de partu, astrologorū sententiæ: cū-
ius factiois ē Proclus inter philosophos præstātilimus (fuisse) creditur: siqui-
dem scripsit non modo infantibus dum gestantur vtero prodesse planetarum
adhæsus, & vultus, sed ē ex ortis. Nam per vniversū vitæ curriculū refert ab
eisdē affici, & foueri: quippe Luna (inquit) iam natum infantē ab vtero non re-
linquit, sed primā eius ætatem moderatur, præstans suam gratiam humiditate
media nutritiua, & augmentatiua potentiæ. Adulto tñ tam puero literarum, ci-
uili-

Acharæ, & consimilitum studium præstat Mercurius, qui cum indifferens sit, puerilem ætatem talem efficit, qualis fuerit is planeta, cui adhæserit. Sic Venus tertiæ ætati dominatur: Sol quartæ: Mars quintæ: Iupiter sextæ: ac postremæ Saturnus, qui frigideitate siccitateq; nimium pollet. Atque hæc sunt, quæ breuitati cõsalens ex astrologorum libris inter alia multa quæ inutilia repeiuntur, mihi magis placuit scribere, vt non desit studiosis occasio disputandi: neq; quidquæ eorum quæ huic operi vilia esse possint.

Placuit etiam hac in parte quid arithmetici de partus tempore sentiant, breuissimè ostendere, supponunt quidem pro hypothese numerum imparẽ, perfectum, & mari similem esse, parem verò imperfectum, & fœminæ congenitum: sic profecto alibi patrem imparẽ, & parem matrem appellant. Ex quo inferunt septimum mensem, & nonum vitales partus addere posse, octauum verò minimè: ferentes eum hoc de mense decimo, qui par etiam est in eo sæpe vitales nasci fœtus, quoddam perfectioribus numeris sit absolutus: & ob id existimant ipsum numerorum omnium esse perfectissimum, & completum, ac perfectionem reliquorum, atq; eum ex paribus solum esse perfectum, quia antecedentes numeri denario maiorem perficere nequent, & subsequentes ex decem, & præcedentium aliquo perficiuntur. Continet enim omnia numerandi genera, vt par, impar, quadratum, longum, compositum, & si quæ alia sunt: præterquam quod ex quatuor cubalibus numeris (ex quibus Pythagorici vniuersum constare referunt) constituitur. Sunt autem dogmata hæc difficilia, & quæ probari difficulter possunt, cum octonarius numerus par quoque sit, & de eo malè sentiant, & loquantur, etiam si solidum ex eo corpus, & verè perfectum componatur: nam de eis est, qui nec generantur, nec generant, ex monade, & septem constitutis: aut ex eo, qui num generatur, tum generat, nempe quaternario duplicato. Octonarium quidem Pythagorici iustitiam vocauerunt, quod primus omnium soluat in numeros pariter pares, hoc est, in bis quaterna.

CQuamobrem cum, & contextio ipsius pari æqualitate procedat, & resolutio æqualiter recedat vsque ad monadem, merito propter æqualem diuisionem iustitiæ non eum meretur: cum hoc tamẽ fœtui summo opere inconuenit. Hęc diximus vt quisq; intelligat parem numerum non esse semper imperfectum. Verum, vt ex Pythagoricorum sententia colligere potuit, & septimum, & nonum mensem vitales esse, octauum verò minimè, non solum ob adductam rōnem credendum censeo: sed ob aliam longè, præstantiorem. Est autem ea hmoi, vt optime Gorreus vir doctissimus aduertit, q̃ hac in parte ad verbum trāscribere placuit ne doctis & ingeniosis desit materia speculationis: quippe hæc prodesse, & delectari aliqui solent. Constituitur igitur triangulũ scalonẽum, hoc est, tribus lineis inæqualibus constitutũ. A. B. C. cuius latus, B. C. sit vnitatis quatuor, latus autem. A. B. sit vnitatum. 5. perspicuum est, ex disciplina Pythagoreorum. 3. & 5. esse masculos, vt impares, sed 4. fœminam, parem. Multiplicentur igitur 4. per 5. fient 20. sed 5. per se multiplicentur, consurgẽt 25. simul iuncti numeri fient, vt euidenter constat. 45. C



De partu
arithmetico-
dogma.

Hæc rursus per medium spatium trianguli, id est per 6. multiplices fient. 270. A
 quæ nouem menses constituunt. Rursus multiplices quatuor per 5. fient 20. &
 similiter 3. per 5. fient 15. simul iuncta erunt 35. Hæc per medium spatii trigoni
 multiplices, hoc est per 6. fient 210. quæ septem menses complent. Iterum du-
 cas 3. in 5. fient 15. ducito in sese, emergunt 25. si simul composueris, erunt qua-
 draginta. Hæc multiplicata per modum spatium, hoc est per 6. fient 240. q̄ pro-
 culdubio tempus octo mensum complent. Quamobrem in nouem, & septem
 mensibus duntaxat per naturalem coniunctionem masculi, & fœminæ, quæ 5.
 & 4. & 3. numeris significantur, numeri dierum proueniunt, qui nouē septēq;
 mensibus continentur: merito, qui istis mensibus educuntur fœtus vitales sunt.
 In mense autem octauo non est vlla masculi cum fœmina coniunctio, neque. n.
 5. neque 3. ducuntur per 4. quod fœminam repræsentat. Atqui cum huiusmodi
 copulatio præter naturam sit, merito partus isti vitales non existunt. Verum cū
 ex his numeris nulla demonstratio haberi possit quæ scientifica sit, quod pla-
 cita hæc incerta proculdubio videantur: sit subinde, vt numeris tantum tribue-
 re, neque viris doctis, neque mihi rationi consonum visum sit. Sed ea quidem B.
 diximus, vt quantum fieri possit, opus hoc absolutum euadat, & vt constet quā-
 tum vtilitatis arithmeticoꝝ dogma obtineat.

*Quid in uera phi-
 losophia
 & Hip.
 mēse de
 partus te-
 poribus
 sententiā
 sit.*

Iuxta optimam rationē addubitabit aliquis, cur Hip. non statuerit, nisi duos
 tantum partus naturalis terminos, septimum quidem mensem, & nonum, si qui-
 dem experimento comperimus aliis temporibus vitales partus fœminas edere.
 Præterquam quod ipse Hip. (forſitan ſui oblitus) decimo mense frequenter fie-
 ri partus dixerit. Sed & alii quoque autores alius non paucos pariendi statue-
 runt terminos. Cuius sanè rei tanta est varietas, vt non vno statōq; ac certo tem-
 pore partus contingere videatur: cum tamen in aliis animalibus statuta sint pa-
 riendi tempora, homo autem solus non vno, & incerto gignitur spatio. Quam
 etenim varietatem nonnulli ad imaginatiuam, quæ homini perquam varia est,
 referunt, alii ad motum fœtus primum, qui fit in vtero: alii verò ad formationē,
 quæ infantibus quibusdam celerius, quibusdam tardius perficitur. Ad cuius
 formationis pensum motus fit, & exitus, ac demum tempore bis tanto acceden- C
 te a quo moueri cœpit, vt autor est Auic. in lucem venit. Ac de his quidem tri-
 bus mensibus, septimo nimirum, & nono, aut decimo facillè inter medicos, &
 philosophos conuenit. An uerò aliis etiam mensibus nasci vitales possint, ma-
 gna est controuersia. Cuius rei gratia ex doctissimorum scriptis referam, quæ
 experimento, & ratione vera esse constat. Nam occasione sumpta ab Hip. li. de
 alimento, qui loquens de termino partus profert, est, & non est, licet cuique
 philosophari, vt sua mens fuerit. Recensebo tamen primo, quæ de vnoquoque
 mense, seu partus tempore autores scripserunt, vt facilius rei huius abdita, &
 obscuræ varietatem venari possimus.

Arist. quidē partum, qui maturius, quam septimo mense prodeat, vitālē nul-
 la ratione esse arbitrantur. Sunt et qui quinto mense: sunt qui citius vitales fœ-
 tus editos esse scripserunt. Fertur quoq; haud paucas fuisse fœminas, quas ultra
 nonum & decimum mensem peperisse verum fuit. Refert quoq; Plin. li. 7. nat.
 histo-

A hist. c. 3. Vestilliam Caij Herdici coniugem Suillum Rufum vndecimo peperisse mense. Item Aulus Gellius ex Varronis decreto scribit, vndecimo mēse aliquando nasci hominem posse. Fertur etiam mulieris cuiusdam, quæ vndecimo mēse peperit, causa ad diuum Adrianum delata, qua cognita decreuisse, in vndecimo mēse partum edi posse, ex requisitis veterum Philosophorum, & medicorum sententijs. Scribunt item ex Homeri decreto duodecimo mēse ex Neptuni complexu puellam fetum edidisse. Quid etiam q. Plinius secundus scripto manda Licij Papiri prætoris edicte bonorum possessionem infanti datā esse contra secundum hæredem, cum tamen inter partum se terdecim mētribus diceret tulisse. Sed licet hæc ab aliquibus tanq̃ vera habeantur: multi tū ab omni naturæ ratione aliena censent. Nam Vlpianus iuris cōsultus in l. In testato, post decem menses. ff. de suis, & l. hæ. post decem menses natum ad legitimam hæreditatem non admittit. Cui simile decretum protulit Imperator Iustinianus, q. epistola quadam, quæ in nouis ipsis constitutionibus habetur, scribit idē suis accidisse temporibus. De quo cum apud eum esset questio in lituta, pronunciauit partum illum non esse legitimum. Itaq; vt inter autores non cōstat vnica de partus tempore sententia; ita quoq; neq; vnicam reperies apud nostrum Hip. Nam lib. de nat. pue. refert, in decem mētribus nasci, quod longissimū est: quippe eas, quæ longius, quā decem mēsum spatium vterum gestare visæ sunt, deceptas esse testatur. Quam etiam sententiam eadē parte p̃obat, quod alimentum, quod a matre foetui suggeritur, non amplius p̃tero sufficiens sit, vbi decem præterierint menses. Refert tamen cum hoc idem autor lib. de septimest. & octimest. par. in vndecimum vsq; mēsem proferri partum posse. Porro, inquit in vtraque parte mulieribus, & partibus fidem derogare non oportet: dicunt. n. omnia, & semper dicunt, & semper proferunt; neq; enim aut opere aut sermone perfrasa sunt, sed ex eo, quod cognouerunt accidisse in corporibus suis. Quæ verò iudicio prædicta sunt, & victoriam de hac sententia pronuntiant, semper dicunt, ac testatur nasci septimestres, & octimestres, & nonimestres, & decimestres, & undecimestres: ac subit lib. de octimestri partu. Ceterū decimestres, & vndecimestres partus ex septem quadragenarijs eo modo fiunt. Et paulò inferius inquit; Ex his igitur omnibus necessarium est plerasq; mulieres circa plenilunium, & vltra in ventre concipere, vt ducenti, & octuaginta dies sepe vndecimum mensem comprehendere videantur: tot. n. dies septem quadragenarios constituunt. Cui etiam dogmati astipulari Arist. sententia vñ lib. 7. de hist. ani. c. 4. qui admiratus humani partus varietatem, in hunc modum habet. Cum vteri animalia omnia singulari, & simplici modo partum suum perficiant, vnū enim pariendi tempus statum omnibus est, homini vñ multiplex datum est: nā & septimo mense, & octauo, & nono parere potest, & q. plurimum, decimo, nō nullæ etiam vndecimum attingunt. Quibus procul dubio sententijs iuriconsulti, & reliqui percelebres viri innitentes, mirum non est, si aliquando decreuerint vndecimum legitimum esse partum, aliquando verò secus.

Antè tamen quam ad veriore sententiam accedam, ab Hip. dictis pugnantiam tollam, quæ videtur maximum scrupulum inferre. Ex doctissimorum igitur decreto iudico, iustum, & maximè secundum naturam grauidationis limitè decimum mensem esse, neq; vltra illud tempus ob alimentū penuriam, & loci

Ff 3 angu-

angustiam consistere fœtus in vtero posse, nisi fortè ad duos, vel tres dies vltra **A**
decimū mensem partus se extendat: nā totos vndecim menses consistere in vtero
fœtū, naturæ rō non admittit. Et hoc est, q̄ intelligunt Hipp. li. de octimef. pat.
& Arist. 7. de hist. anim. c. 4. quasdā nimirū mulieres vndecimum attingere, hoc
est, vndecimi mensis paucos dies insumere, idq; esse q̄ rarissimum. Id qd Gel. li.
3. noctium Attic. c. 13. ex Varronis decreto reuulit: has quasi monstrosas rarita-
tes non recepisse, sed nono mense, aut decimo, neq; præter hos alias partiones
mulieris secundum naturam fieri existimasse. Hac via intellecta Hipp. & Arist.
sententia, superest, rationem huius varietatis in partu hominis docere.

Non. n. huiusmodi varietas prodit, q̄ homini desit pariendi certa lex & rō,
sed q̄ eā anteuertat, aut remoretur, quodam modo natura ipsa iuxta varietatē co-
piæ, aut defectus alimenti, vel roboris, aut imbecillitatis fœtus. Verum hæc cā,
iudicio nostro non valet partū protrahere per plures dies, sed vt Hipp. visum est
non per multō plures, neq; pauciores. Quæ tñ varietas non duceret partum ad
vndecimum mensem, ni alia accidisset causa, quæ maiorem in computatione
varietatem efficeret: quam mox recensere aggredior. **B**

Hanc sanè varietatē in partib. cōputandis suboriri ego arbitror ex varia prin-
cipij grauidationis cōputatione: nā difficile quidem est nosse, nunquid a men-
struis faciendā sit grauidationis cōputatio, an potius ab ipso conceptu. Cuius
dubij principium præstitit Hipp. 2. pop. par. 4. quod quidē citra enodationē re-
linquit, cui cū satisfacere studuisset Steue Valentinus, respondet ab vtroq; tpe
esse faciendā. At cū ille minimè explicuerit, vtrū esse potius, aut saltē qñ ab al-
terutro, siue distinctione de re controuersa discernit. Cū tñ notum sit apud phi-
losophos, tempus, durationis rerum esse mensurā: constat ab eo tpe subducēdū
esse calculū, a quo res ipsa consistere incipit, q̄ cum a die cōceptionis illud verè
obineat, ex eo proculdubio cōputatio grauidationis extat nobis ineunda, a mē-
struis verò non, nisi cū nentiquā constiterit de die conceptionis, cui fidē attri-
buere possimus. Itaq; prodiit huius rei difficultas, & ex alimento, & ex fortis ro-
bore, & ex vario cōputationis principio, & tandem ex Hipp. qui lib. de alimēto
refert fieri parius dieb. plurib. aut pauciorib. quasi non vnicū statuens temp⁹
formationis. Quæ proculdubio omnia coegerunt priscos illos sapientissimos **C**
varia, diuersaq; partus tempora præfinire. Referam tantum hac in parte, cui ma-
gis innitendum sit ad veram computationem eliciendam: vt si fieri possit, vna tū-
tum ex Hipp. & aliorum mente subsit computandi ratio.

Et cōi itaq; oīum philosophorum snā constare arbitror, cunctas, q̄ hic cōin-
gunt mutationes, a cœlestibus pendere, vt q̄ maiores longè, & efficaciore in
agendo vires obineant. Quas tñ proficisci maxime a Solis, & Lunæ vi experi-
mur. Solis nanq; accessu, vel recessu diuersas Luna patitur mutationes, & ob id
varia in his inferioribus operatur, eaq; p̄cipuè iuxta congressum, aut discessum
Solis, quibus Luna quatuor mutationib. afficitur: plenilunio, coniunctione, &
duabus intermedijs, nimirū, cum media est ad augmentum septem dieb. cōstās,
& media ad decrementum alijs dieb. septem finitura. Apparet igitur quatuor
esse Lunæ mutationis momenta, & ea septimo quoq; die euenire: nā & post se-
ptē a prima apparitionis die p̄ mediū secta, & septē postea dieb. orbe pleno vi-
situr, quod die cōtingit 14. Ambo igitur, & Sol, & Luna pp vim, q̄ a Sole ipsa su-
sceptat,

A ſceptit, magnas vires proculdubio habent. De quorum viribus & efficacia exi-
ſtimarunt Hip. & Gal. in illis mutationibus, quæ breues ſunt, & paucis diebus
finiri ſolent, negotium omne ad Lunam referendū eſſe: in alijs verò, quæ non niſi
longo tempore iudicari poſſunt, & perfici, ad ſolis curſum maximè attenden-
dū fore. Quamobrem acutos morbos quatuordecim diebus iudiciū ſubire
ſtatuunt: quartanas verò febres non diebus, ſed menſibus ſex iudicari: die it. n.
circuitus qui diebus aliquot concludi poſſunt ſeptimani ſunt, & Lunæ modo
circumuagantur: ſed qui menſibus, ad Solem referuntur, eandemq; quam ſep-
tmani, rationem ſortiuntur. Cum enim à menſis principio ad pleniluniū vſq;,
quatuordecim prope dies ſint, dimidium nimirum lunaris circuitus: ſc. profe-
cto à hyeme ad æſtatem, quæ ſunt duæ totius anni extremæ mutationes, ſex mē-
ſes ſunt, anni dimidium. Eodem prorsus modo à plenilunio ad occultationis tē-
pus ſex alij meſes reſpondent, ab æſtate quidem ad hyemem. Quippe ſi Lunæ
quidem curſum per ſeptimanas diuidas, quatuor reperiēs mutationes, quas du-
ximus per quatuor ſeptimanas: Solis quoq; iter in quatuor anni tempora ſecās,
B ſingulis etiam Lunæ ſeptimanis proportionē reſpondebunt. Quo quidem mo-
do, ſicut dies ſeptima, quæ pars quarta eſt totius menſis lunaris, morbos acutos
iudicat: ſic anni temporis mutatio diuturnos affectus diſcutit aded, vt hyeme ge-
nitum ver ſoluat, in vere excitatum æſtas: in æſtate autumnus: in autum. no vero
ortum hyems. Quibus definitis, partus proculdubio erit criſis quædam, vt ſupe-
riùs dictum eſt, vt Hip. protulit, qui Mulieribus, inquit, & fœtum conceptus, &
abortiones, & partus eodem tempore iudicantur, quo & morbi, & ſan- tas, &
mors cunctis mortalibus. Sed omnium iſtorum alia quidem diebus, alia men-
ſibus, alia dierum quadragenarijs, alia verò annuo ſpatio euenire videntur. Ex
quibus conſpicuū ſit in tpe partus definiendo Solis, & Lunæ ſimul curſum ma-
ximè obſeruandum eſſe, ſed Solis præcipuè. Quod quidem vt optimè fieri poſ-
ſit, per dies numerationem efficere opus eſt: ſi quidem vniuerſam etiam occa-
ſionem habitam eſſe apud antiquos arbitror ex diuerſa menſium, & annorū cō-
putatione, vt paulo inferiùs monſtrabo. Conſtat igitur ex Hip. partum legitimū
eſſe, qui ducentis, & octoginta diebus integratur ad ſummū: vel ducentis, & de-
cem: ac, vt Hip. ipſe cenſet, paulò plus, aut minus. Ex quib. proculdubio primus
C ſeptenarius diſcernendi vim habet, cui meſes anni tres reſpondent: non quòd
meſes tres vitales partus edere poſſint: nam ad id non ſolum prærequiritur le-
gitimum tps, ſed et fœtus ipſius firmitas atq; robur, q̄ ſanè eo tpe fœtū in eſſe ne-
queunt. Præterea quemadmodū alij à ſeptimo ad decimo quartū diē nullā ha-
bent, aut leuiſſimam ad iudicandos morbo autoritatē: ſic quartus quintuſq; mē-
ſis ſunt ad fœtum promouendum inepti. Quamobrem ſi qua occasione illis mē-
ſibus prodeat, violenta proculdubio cenſenda eſt fœtus emiſſio: haud ſecus q̄
diebus non decretorijs vacuationes ſymptomaticæ: etiam niſi quinto meſe ro-
buſtus exiſtat fœtus, & aliquñ prodixiſſe cōſtet, ac vixiſſe: qd magis rōne proprij
rōboris, q̄ legitimi tps fuiſſe arbitror. Quinimmo credendum eſt, ſi extra debi-
tū tps exierit fœtū futurū valetudinarium, & maximè morboſum, ac debi-
lem. Sed quoniam rōne ſingulis menſibus, quos iudiciarios ad partū eſſe ſcimus,
res ſe habeat, atq; celeſtis vis cuiq; adſcribēda ſit, facta ſigillatim de vnoquoq;
mentionē iam audies: quæ. n. huc uſq; dicta ſunt tanquam præludium quoddā

De septu
mestris
partu.

ad ea, quæ scribere studui æstimabis, vt locus clariori doctrinæ citra varietatē, **A**
& confusionem eorum, quæ diximus, superfit. Septimestres edi partus duabus
de causis accidere rationē, & experimento comperimus. Prima ex occasione, q̄
debitum tempus anteuertat fœtū existente robusto: secunda verò ex naturæ in-
stituto, & decreto. Quo fit, vt ex septimestribus quidam vitales existant, multi
vero fœtus pereant ex ijs maximè, qui ex causa externa aut præter naturam pro-
deūt. Ex quibus dum robusti sunt, viuere aliquos comperimus, valetudinarios
tamen, & pumiliones. Verum ij, qui natura agente sola prodeunt, validi sæpè,
& robusti existunt. Quod dixerat lib. de carnibus per hæc verba; Septimestris
puer ratione fit vt viuat, rationemq; habet, & numerum integrum ad hebdoma-
dam. Cuius rei rationem reddit Hip. lib. 1. de octimest. par. computationem scri-
bens ad vitæ rationem aptam, dicens. Septimestres dimidia anni parte nascun-
tur centesimo octuagesimo secundo die, & reliqua insuper particula. Sed ratio,
quare sic nati viuant, est quia habet tunc proculdubio fœtus perfectionem, tan-
tumq; roboris, quantum expedit ad tolerandas partus molestias, & vitam po-
stea salubriter degendam, præsertim si robustorum patrum semine progenitus **B**
fit, & in plenilunij die concepti nati sunt. Docet enim Plinius li. 7. c. 5. septimo
mense non nisi pridie postero vè plenilunij die, aut interlunio conceptus nasci
vitales, aut ex valentiori parentum bene habitorum, & ætate media consuetu-
tium semine sunt procreati. Nam tales quanquam septimestres sint, vitam tamè
postea salubriter degunt. Tales fortasse fuisse quis existimabit septimestres il-
los ambos Cossos Corbulones Vestillie filios, quam semper septimo mēte par-
tus esse enixam, loco nuper citato refert idem Plinius. Constat id etiam vltius
ex occasione, quam natura accipit, vt hos partus producat. Nam æquiparantur
septimestres nonimestris quatenus attinet ad rationem, & tempus. In tempo-
re quidem, vt inferius probabo: in ratione verò, quia robustissimos, & vegeto-
calore præditos esse septimestres pueros naturaliter in lucem editos, certū est.
Qui sanè ob eandem causam sanguinem oculus exhaurientes, ac deuorantes, pe-
nuria alimenti coguntur, carceres abrumperè, & externum auxilium petere: Se-
cundò, quia crathiores facti capi ab angustia vteri nō possunt: quibus simul iun-
ctis cogitur natura partum emittere salubrem, & robustum. Sed rōne temporis **C**
constat septimestres vitales, & robustos quoq; euadere, si quidem hebdomadū
decade trina septimestres absoluuntur, sicut alij quaternis, seu septenis quadra-
genariis. Cuius computationis, vt vim, & efficaciam discas expendere oportet
varias sententias quas Hip. & Gal. proferunt de hac re. Hip. quidem inquit lib.
de sept. p. Septimestres centum octuaginta diebus cum dimidio, & octaua parte
sunt. Quod vt planum faceret, exemplo de mense conceptionis accipiēdos esse
quindecim dies, quinq; mensium intercedentium centum quadraginta septem
cum semisse, qui oēs centum sexaginta duos cum dimidio conficiunt. Quare re-
ctè colligit ad numerum constitutum, nempe centum octuaginta duos cum se-
mis: in quo septimestres partus fieri affirmavit, superesseq; non plures, q̄ vi-
ginti; centum quippe sexagintaq; duob. dieb. cum semisse, si addantur viginti;
p̄dictus numerus resultabit. Cum hoc tñ li. de carn. ad finem, ducentos, ac decē
septimestrē fœtū obtinere pronuntiauit, dicens; Septimestris partus tres cōtinet
septimanarum decadas, quarum vnaquæq; septuaginta dies cum hēat, ducenti
decemq;

A decemq; dies erunt vniuersi. Præterea circa finem lib. de sept. par. taxauit quadragenarium sextum, qui circa octauum mensem voluitur, ea (vt cenſeo) de cā, qua in ſeptimo, & quinto quadragenarijs genitos fœtus approbaſſe vñ. Quamobrem cum ſextus quadragenarijs damnetur, ſeu tyrāni regis æmulus, & malignitate donatus, quintum ſeptimumq; ſicut, & dies illis reſpondentes cōmendauit ingenuē Gal. quorum quintus ſeptimeſtribus, ſep̄imus verò nonimeſtribus pariter, ac decimeſtrib. quos eſſe vitales arbitramur. Sed quinq; quadragenarij ſiquido ducentos dies conſiciunt, qui neq; præſtituto numero ab Hip. li. de ſept. par. correſpondet, neq; tribus decadibus hebdomadarum, quarum meminuit li. de carn. Turbat etiam veritatem huius rei, & iuſtam computandi rōnē, qđ dimidium anni lunaris, quem menſes lunares metiuntur, de quibus Hip. age re paulò inferiùs monſtrabo, ex centum ſeptuaginta ſeptem conſtat diebus: & idem ſolarem eſt amplexus, qui quinq; dierum ſpatio, & quadrante maior exiſtit. Quæ dubia, vt exactè abſoluamus, & Galeni commentaria intelligantur, coharereq; cum Hip. diſciplinis poſſint, præmittere oportet Gal. lib. de ſeptimeſt. par. aſſerueraſſe ſeptimeſtres partus centum octuaginta duobus diebus cum ſemiſſe, quod minimum eſt, iuxta primam Hip. ſniam terminari, ac perfici: quod vero maximum eſt, nunquam vltra ducētos, & quatuor dies vtero fœtum geſtari. At in medio temporis ſpatio celerius, aut tardiùs maximam ſeptimeſtriū edipartem, prout calida conſtitutione ipſis, vteri calido temperamēto, & victus rōne calida citius matureſcit, aut à contrarijs cauſis tardiùs ſuam adipiſcitur maturitatem. Rurſus (vt ſoluas reliqua dubia) in eadē obſeruatiōe perſeuerans Gal. neq; minori ſpatio, qđ in dimidio anno ſolari gigni poſſe ſeptimeſtres partus aſſeruit. Neq; in minori, qđ in dimidij menſis ſeptimi ſpatio, ſi perfectus eſt oriturus: quippe in dimidio anno lunari fieri nequit perfectus ſeptimeſtris, qđ intra ſex menſes ea rōne gigneretur, ac vitalis non eſſet, conſtat igitur in dimidio anno ſolari, qui ſeptem menſes lunares (vt Hip. decreto, qui de menſib. lunaribus loquitur, reſpondeamus) cōtinet quadantenus. Rurſus, tres decadas ſeptimana rum, vt de Hip. anente li. de carn. retulimus (qđ erat aliud dubiū) ducentos decēque dies habent, in eiſq; quatenus ſextū quadragenarij minimum capiunt, abſolui poterit ſeptimeſtris partus, quare ducentos, & quatuor dies attinget circiter (qđ experimenta Gal. atteſtantur) nil amplius, aut rarillimè. Quinvis præterea quadragenarijs ducētos ſanè dies amplectit, ac plures, qđ ab Hip. li. de ſeptimeſt. par. proponuntur: cum hoc tñ minimè ea aſſertione conſicit amplius, ac ſi ſpatioſam partus ſeptimeſtris latitudinē inſinuaret duobus terminis cōcluſam, intra quos feriùs, ac citius liceat ſeptimeſtri fœtui vitalem prodire. Sed, vt cōputatio optimè fiat, expendendum eſt ex Hip. & Gal. decreto in ſeptimeſtris partus ſupputatione primi menſis, & ſeptimi plus dimidio ſore cōputandū, vt illorū vis queat eluceſcere, & in tñ breui tpe fœtū conſumere. Quæ proſectò de cā in ea cōputatione ſufficerent & ſ. dies primi, ſeptimi mēſis. ſi dimidiū anni ſolaris, aut ſeptimi mēſis, vt dictū eſt attingeret. Sed quia minimè attingūt ſeptē mēſes, ſed intra ſex mēſiſſe intelligunt, oportuit aut primi, aut ſeptimi plures qđ & ſ. acciperet: aut ſi primi & ſ. duntaxat dies numerari fuerint, viginti ſint capiendi ipſius ſeptimi, qđ minimū eſt, vt dinumeratio ipſa de ſeptimo mēſe aliquot dies, quinq; ſ. accipiat. Quā porro cōputadi rōnē alijs partib. minimè eſſe neceſſariā ceſet

Hip.

Hip. vt lib. de octimest. par. ad finem ostendit. Nam cum nonum, aut decimum **A**
 fœtus attingere debeat, & maturaciones eius in his multo tempore efficiantur,
 sufficit, si aliquantulum temporis ex primo postremoq; mensibus desumatur.
 Sic genitos post plenilunium (vt loco nuper citato inquit Hipp.) necessario ad
 mensem vndecimum durare est opus: quod quidem neutiquam fieri posse, nisi
 per paucissimos dies, etiam si de primo mense paucissimos quoq; sumpseris. At
 in computatione septimestrium quindecim cœpti fuerunt dies de primo mēse,
 quinque; vero, sequentium, centum quadraginta septem cum semisse supersunt:
 ex quibus constat desiderari ad propositum numerum viginti, non plures, & re
 sultant, ex omnibus centum octuaginta duo cum semisse; dimidium nimirū an
 ni solaris. Quod sanè tempus vehementem obtinuit in decernendo facultatē:
 quippe est diei decimo quarto as similis, quorum vt is est mensibus lunaris di
 midium, ita illud totius anni, quod maximam habere vim, & absolutissimam
 dictum est paulo superius, de viribus Lunæ, & Solis loquentes. Quod aut Arist.
 7. de histo. ani. dicat mares magis quam fœminas fieri septimestres, & has quidē **B**
 decimestres, non omnino improbandum est, quia rōne non caret, licet contra
 rium contingisse constet. Octauo mense natos mille rationibus non esse vitales
 oēs ferè autores probant: ob idq; Hip. dixisse autumant. Ad partum ducenti qua
 draginta dies, est, & non est. Quibus verbis tam obscuris præcisq; indicat eum
 qui natus est mense octauo, nam ducenti, & quadraginta dies menses octo con
 ficiunt) aliquid modo esse, atq; natum videri, sed re vera nō esse, qm̄ paulò post
 morti accedet. Libris et de septimest. & octimest. par. millies proferat, & stabilitū
 relinquit, nullum hm̄i fœtum vixisse, & probat etiam suum dogma testimo
 nijs ab ipsis mulieribus petitis: Quibus studet octimestres partus prorsus vitu
 perare. Sed, & nostra tempestate vix reperiatis imperitissimam quamq; fœminā,
 quæ non detestetur partus octauo mense editos. His etiam accedit, quod li. de
 carni. ab iis, quæ experimento didicit, & ab alijs accepit, in hunc modum pro
 ferat. Septimestris puer ratione fit, & viuit: rōnemq; habet, & numerū integrū
 ad hebdomadam: octimestris verò generatus nulla ratione viuit. Cuius et sen
 tentiæ fuit Gal. 6. pop. p. 7. tex. 27. De octauo. n. inquit, certum est non edi in ip
 so vitales partus, sed inter cæteras causas, quibus id accidere credimus, non mi
 noris est momenti, plurium causarum subitus occurfus, & insueta consuetudo **C**
 quod intra vterum sexti quadragenarij, vt mox probabo, & violentam, ac parū
 propitiam mutationem experiantur. Verum octimestres partus cur ita in vni
 uersum mortales pronuntient, aut quæ sit tanti discriminis ratio, haud facilè in
 ueniens: Cum Auic. & Arist. 7. de hist. ani. c. 44. Aegyptios octauo mense natos
 vitales esse proferant. Sed cur illi vitales, alij verò minimè, nascantur, iā audies.
 Primo quidem constat ex tempore octimestres vitales non esse: ac relictis rōni
 bus arithmetcorum, & astrologorum, comperimus de hac re Hip. lib. de septi
 mest. p. hæc verba scripisse; Aliter quadragenarius est, in quo quidem fœtus in
 vtero existens circa octauum mensem ægrotat. Qua sententia quadragenarium
 embrionibus morbosum esse ostendit: quod subaudire oportet de duobus tem
 poribus, nempe de primo quadragenario, qui post conceptionem computatur
 & de secundo, qui sextus est ab ipsa computatione, quinque mensem octauum
 ambit, aut circiter cōstituit: de quo millies Hip. protulerat eos, qui in eo nascū
 tur mor-

De octi
 mestri
 pariu.

A tur morti fore proximos, quod illis tunc agrotare contingit. Confimile porrò iudicium faciunt scriptores de sexto quadragenario, quia sextum diem tyranni regis æmulum efficiunt, omnino infidelem, & omnium malorum conciliatorē predicantes. Sic. n. Hip. inquit lib. de octimest. par. Quod si in huiusmodi quadraginta diebus natus sit, impossibile eum euadere, propterea quod ipsi in vtero adhuc agrotanti transmutationem, & afflictiones post partum superueniāt. Patitur autē in vtero gestus arumnas, quas per sextum quadragenarium infestare gravidas dixit, & ipsarum met testimonijs egregiē comprobauit. Succedunt etiam, & aliæ ipso partus tempore, vt est ipsa fœtus incommoda versio ob id imbecillitatem, siue in caput, siue in aliam figuram commutetur; & peregrinæ alię quas ab aere, victus noua specie, & vestimentis insolitis mutuatur improuidēs: ob quas omnes difficillimum est viuere. Similis nanque est huiusmodi partus morbo cuius, in quo cum octonarius neq; index sit, neque decretorius, sit, vt si quando accadat, difficulter, aut perniciosē iudicet. Sic, & in octauo mense res omnino se habet. Omnes enim, qui numerorum rationem calculo adipiscuntur

B octonarium imperfectum, & materiam appellant, ac fœminam; & ob id vterus partus edere innoxie minimē poterit. Ex quibus constare arbitror neq; ex ui, & efficacia temporis, neque ex propria natura, quia tunc minimē sint perfecti, tales fœtus vitales existere. Quod licet alicui regioni ob ipsius, & corporum temperaturam, ac mulierum robur id accadat: in vniuersum tamen verum non est octimestres vitales esse: quid vltimō probauerat Hip. argumento sumpto à noni mēstribus partibus, qui frequentissimē graciles eduntur ex perpellis ab octauo mense laboribus. Inquit enim; Manifestant autem de morbis, & passionibus in octi mēstribus contingentibus, & noni mēstres partus, qui graciles eduntur, pro temporis multitudines corporis magnitudinem educentes: prægressi quidem post afflictionem morbificam neutiquā, vel vt septimestres carnosī. Quib. verbis quæ dicta sunt, probari euidenter arbitror. Ac si quando contigisse constet octimestrem viuere, id quidem censeo potius fieri, quod matrem deceperit computationis principium, quàm quod verum sit.

C Non est levis controuersia apud peritissimos scriptores, an mulieribus (vt antea dictum est) statutum, & præfinitum sit pariendi tempus. Retu' erat quidem Marcus Varro lib. 2. de re rustica, quæ tempora cuique animantium speciei statuta sint. Quod sanè dogma Hippocraticum est, & Galenicum: id quod Aristot. lib. 4. de gen. ani. c. 10. magna ex parte pro vitæ spatio cuiq; animalium concessio contingere docet. Sed dimissis in hac re autorum decretis, firmissimo experimento innitendum est, licet quarto, quinto, septimo, nono, decimo & undecimo mense mulieres parere multi scripserint. Constant nanque his omnibus temporibus iuxta eorum decretum, vitales posse partus edi: sed quantum id veritatis obineat, disputandum aggredior. Cuius difficultatis gratia præmittendum est, actiones naturales determinatas esse, iuxta vires passī, & agentius: verum quia hæ vires variæ in omnibus reperiuntur, & in singulis: ob id suis cuique ad actionem constituitur agendi terminus: quia inter se agens, & passum pro vtriusque natura certa quadam proportionē dissident: atque cum hæc sit varia in variis, ob id mirum non est, si varia in eodem actionis genere statuta sint actionum tempora. Id quidem probat euidenter morborum ratio: nam licet

*De noni
mēstri
partu.*

omnes

omnes habeant vnā communemq; terminandi rōnem, nimirum per actionē naturā, & victoriam supra causā morbificā, aut è contra, cum hoc tñ pro varia hac proportione, aut disproportionē varios dies criticos reperimus, ita vt iuxta cuiusq; morbi naturā vnus constituendus est iudicatio: is dies, ac terminus, pro humoris maturitate, & vitium potentia, & pro diei fortitudine, & natura. Sic pari prorsus rōne, hanc varietatē in mulierum quoq; partibus accidere considerandum est, non tñ in reliquis animalibus. Cuius sanè rei potissima ratio est varia, & inordinata in mulieribus viuendi ratio, & forma, ita vt naturā adeo turbet, q̃ fetus maturitatem, & vitium robur eadem diuersitate paret. Quo fit vt partus diuersis temporibus iuxta primi axiomatis rationem varij quoq; fiant. Quod proculdubio in brutis nunquam conspiciamus, ob vniformem viuendi modum, & alimentorum vnitatem. Itaq; ex hac vitæ varietate duo in partibus mulierum accidere scimus: vnum quidem, q̃ varijs temporibus iuxta varium robur ab alimenti varietate acquisitum, variè et̃ fetus ad maturitatē perueniant: aliud autem q̃ licet diuersis temporibus, & prædicta varietate id accidat, sunt tamen aliqua statuta, & certa, in quibus iuste possint, & innoxie fetus in lucem prodire: quod si in cæteris accidat, periculosum, & abortiuum est. Legitimum igitur tēpus experimentum frequentissimum probauit in communi hominum natura esse nonum mensem, vel ad summum decimum, vt paulò inferius probabo, ac vltimò septimum: qui sanè menses sunt ex natura, & iudicandi ratione efficacissimi, & maximè potentes. Denique possunt partus edi in diuersis tēpibus ob naturarū diuersitatē: cæterū in diuersis, q̃ vim habeant iudicandi, ac roborandi actionem illam. In reliquis verò mensibus quantumuis ad iudicandum videantur idonei, fetus perpetuò valetudinarij nascuntur, quòd tantum vnā causā partus legitimi nanciscantur, nimirum mensem iudicatorium, integram verò maturitatem nondum. Sed experimento quoque eodem comperimus in nono, & decimo, viuidiore, & maximè salubres esse partus tēpis, & naturæ perfectione, ac rōne maturitatis: nouem. n. menses cū primo constet septenario, quod perfectissimè iudicat, perfectissimos edunt partus. Sed vt vera computatio nouem, aut decē mensium magis elucescat, expendendum est constare ex Hip. lib. de alimento, & lib. de carnī. dies grauidationis non excedere quatuor decadas, quæ constant ex ducentis, & octuaginta diebus ad summum, licet non rarò ante id tēps partus in lucem edi contingat: constituit. n. hic dierum numerus nouem mensem solares, & decem dies; & ex cōi. f. è omnī sententia hoc est frequentius pariendi tēps, q̃ in ipso fetus maturiores existant, & numerus perfectior. Quod Macrobius lib. i. in somnum, apertissimis verbis protulerat. Humano partui (nq̃t) frequentiorē vsum nouem mensium certo numerorum modulamine natura constituit. At refert puerum vinculis solutum contestim foras prodire mense, vt longissimū, decimo, vt comprehenderet partus, quos ducentesimo, & octuagesimo die fieri refert Hipp. qui nouem menses, & decem dies complectuntur. Cuius sententiæ confirmationem adduxit Hip. lib. de carnī. per hæc verba; Editur verò in lucē partus mense nono, diebusq; decem, qui & vitalis est, ut qui legitimum hebdomadarum numerū (quatuor scilicet decadas hebdomadarū) consecutus. Qui sanè dierum numerus non prærequiritur ad legitimū partū exquisitus: quippe is pōt fieri, aut in pluribus, aut

A aut in paucioribus: sed nec multò pluribus, nec multo paucioribus, vt Hipp. refert: nec huic sententiæ videtur contrarius lib. 2. pop. par. 3. tex. 31. qui docens a quo principium computationis in partu debeat fieri, inquit. At a mēstruis numerandi sunt nouem menses, aut à conceptione, & in 270. dies Græci menses fiunt, & siquid insuper, aut feminas, aut maribus hæc fiunt, aut contraria. Nam vltima contextus verba videntur cōcedere plures dies, quod alibi dixerat paulo plus, aut minus. Sed quo die sit hæc compositionis ratio ineunda superius diximus lib. 3. c. de conceptu.

Sed, vt res clariùs constet, habebis quatuor decadas hebdomadarum, si quatuor in decem, quadraginta, septies quadraginta computaueris, ex quibus sic computatis reperies ducentos, & octuaginta: numerum quidem quatuor decadam hebdomadarum. Hebdomadarum autem singulæ diebus septem, aut (exactiori calculo) diebus sex, & horis viginti constant: quælibet autem decas diebus septuaginta. Efficaciam insuper partus nouimestris ostendit, fœtum nullo alio tempore commodius posse vel exire, vel solidiore cibo uti, quàm præhabito: cui sanè neque alimentum satisfacit, neque aer ventriculationi dicatus, neque vteri angustia. Atque cum tres necessariò concurrant causæ ad legitimum partum, tempus scilicet statutum vterus, & fœtus ipse: nullo profectò in partu, æquè omnia cencurrere comperimus, quàm in nouimestri. Vterus quidem mole pondereque grauatus, vi sua expultrice ad propellendum fœtum eo tempore insurgit. Fœtus ob loci angustiam, & aeris atque alimenti defectum, exitu affectans, valde sese agitat, & faciliùs, membranas dirumpit. Tèpus etià, vt ex Hipp. lib. de nat. pne. antea probaueram, præscribi certò potest a formationis tempore facta computatione: inquit enim. Feminam quidem conformationem primum duobus, & quadraginta diebus, quod longissimum: masculum verò in triginta diebus est, quod lōgissimum est, eam adipisci. Ex quo etenim ratio partus nouimestris, & legitimi formatur: vt ex Auic. aliqui referūt, quod ego hucusque non legi, nimirum tempus partus id esse legitimum, quod bis tot additis ad tps motus, diebus constat. Secundum quam rationem masculus, qui efformationē habet die trigesimo, mouebitur die nonagesimo, & nascetur ducentesimo septuagesimo die, hoc est, nono mense. Fœmella item, quæ die efformatur quadragesimo secundo, mouebitur die centesimo vigesimo sexto, hoc est, quarto mense, & diebus paucis superabundantibus: nascetur autem ducentesimo septuagesimo octauo, hoc est, nono mense cum diebus aliquot. Qualiter verò Auic. computandi ratio in fœmella verum obtineat, alij disputabunt. Constat igitur veram computandi rationem pendere ex diebus illis, quos ex Hipp. mente partum legitimum continere diximus.

Quibus sic constitutis, expendendum est, partum initio noni mensis editum in lucē, id est, a decem vltimis diebus octauæ ad decimum vsq; noni vix vitalem esse, aut si vitalis existat vrsanus est, & morbidus. At verò a decimo die noni ad decimū vsq; decimi mensis vitalis est, & bene valens: eoq; magis quò proprius ad decimum decimi mensis diem accesserit. Dictum superius est in partu septimestri primi mensis, & septimi plus dimidio fore computandum, vt illorū vis queat elucescere, vt in tā breui tpe fœtus consummari possit. At in reliquis mensibus non opus est de primo, & postremo plus dimidio accipere, cum constet
aper-

apertissimè de primo fore capièdos per quam paucos, si ad decimum, & magis A
 si ad vndecimum peruenire debeat fortus. Quo fit. vt Hip. dixerit li. de octimesi.
 par genitus post plenilunium necessario ad mensem vndecimum durare. Legi-
 tumum esse partum ad decimū vsq; decimi mensis diem, abunde nunc probasse
 arbitror, sed egor ob Hip. obscura decreta in partibus annuerandis disputa-
 re, an vltra decimum decimi mensis diem partus in lucem edi possint. Prestitur
 huic dubitationi ansam Hip. qui lib. de octimesi. par. ad vndecimum mēsem par-
 tum prorogari affirmat, at lib. de alimento, & septimesi. par. per dies facta cōpu-
 tatione, vt dictum est, ad decimum decimi mensis diem extendi posse partus as-
 seuerat. Verū, vt breui me ab hoc nodo expediam, tria in doctrina Hip. confi-
 deranda sunt. Primum dies partus ad summum non esse plures, q̄ ducentos, &
 octuaginta. Secundum ex hismet diebus aliquā computasse partus tps per mēses
 solares: mensis. n. solaris dī spatium illud temporis, quo Sol in vnoquoq; signo
 zodiaci fertur, quā qm sunt duodecim, mēses quoq; totidē in anno numeran-
 tur, & sic constituit decimum diem decimi mensis tanq̄ vltimum partus tēpus.
 Et li. de nat. pue. multis ē rōnib. probare nititur, vterum plusq̄ decē mēses fer-
 re non posse, & id tps posse attingere, probat ē li. 5. pop. in historia mulieris La-
 rise, cui cum pragnans esset, decimo mense sanguis multus fluit, & fētum pro-
 iecit mortuum. Aliqñ verò considerasse mēses lunares: in qua computatione
 non solum mirum non est ad vndecimum mensem peruenisse, meum consti-
 tuisse terminum ē partus, verum eodem calculo facillime ad duodecimū men-
 sem, & vltra (vt ex antiquis autoribus aliqui censuerunt) peruenire posse con-
 stat. Probari optimè hoc assumptum potest, si mēses tres esse, iuxta antiquorū
 computationem, intellexeris, differentes in oēs temporis duratione, inter quos
 ille maximus est, qui latinis dī ciuilis, constat ex diebus viginti nouem, & ho-
 ris terdecim propemodum: tot. n. dies sunt inter vnum, & alterum Lunæ cū Sole
 congressum. Ex quo sanè mense, & similibus si annum constituas, centum, &
 octuaginta dies in septimum mensem incident, nanq; centum, & septuaginta
 septem dies sex hmoi mēses integrant, & quinq; , qui supersunt reliqui cum
 aliquot horis, iam septi mensis erunt. Componesq; nouum, & decimum men-
 sem eadem ferè calculatione facta. Si tamen mensem proprie lunarem dictum C
 consideres, longè aliter computationem efformare tenebis. Is aut diffinitur Lu-
 næ zodiaci puncto idem punctum profectio, & reditu, in q̄ viam Luna vi-
 ginti, & septem dies cum horis octo insumit. Quibus equidem mensibus si par-
 tum nouimestrem constituas, continebit ducentos, & quadraginta, ac sex dies:
 constat igitur ad integritatem ducentorum, & octoginta dierum, quos Hip. cē-
 set esse legitimi partus dies, deesse dies triginta, & quatuor, qui decimum men-
 sem integrum, & principium vndecimi constituunt. Quod si tertiam mensis lu-
 naris dīam (q̄ fit a primò exemptis trib. dieb. coniunctionis lunæ) accipias, repe-
 ries continere sex, & viginti dies, & horas duodecim: ex quibus sanè nouē men-
 ses continebunt dies ducentos, & triginta, & octo, & horas quasdam: quibus
 deesse constat ad integritatē dierū, quos legitimū partū constituere refert Hip.
 quadraginto, & duos, qui ē ex solaribus ferè vndecimū mensem constituunt.
 Ex quibus iā constare arbitror, quā nam rōne dixerint Hip. & Plinius, & Ari. ad
 vndecimū mensem partus posse peruenire. Ac si mireris, et rōnē q̄ras, cur mē-
 sum

- A** sum lunarium potius, q̄ solarium definita sit apud antiquos pariēdi rō, defines protinus mirari, si adueras, antiquos (græcos maxime) annum totum ad rōnem lunę subduxisse, & alios menses non habuisse, quā lunares, nondum reducto in eam formam, anno, quæ nūc vsui nobis est. Atq; hæc de nono, decimo, & vñ decimo mense dicta sufficiant. De alijs verò, quæ sequuntur, pleriq; dubitant, vtrum ad eos vsq; differri possint partus. De qua sanè re sentiēdum, puto, aliquñ vel ex alimentis vbertate, quo fetus gaudet ad integram perfectionem adipiscēdam, vel ex matris labore, aut impotentia in plures dies posse partum extendi: verum id quidem rarissimum est, & monstruosum. Quin, & Hip. lib. de nat. pue. negat, vtrum plusq̄ decem menses ferri possē, his verbis. Quod si q̄dam mulieres arbitratae sint, se vterum plusq̄ decem menses tulisse (id nām saepe audiui) id sanè est, q̄ vteri saepe spiritum capiant in se ipsos à vtre flatum exhibere, eleuato tñ atque intumescēte vtero, videntur sanè sibi tunc mulieres concepisse. Quñtiam mensibus non prodeuntibus atq; in vtero congregatis, aut calefcentibus, aut flatib. mixti, falsam q̄dam grauidationis speciem non rarò mulierib. præbent, vt sibi in vtero habere videantur, nimirum menstruis non prodeuntibus, & vteris eleuatis. Quæ sanè feminæ sic affectæ, si postea cōcipiāt, putant se plus q̄ decem menses vterum gessisse, dum falsò suppurationē ineunt ab eo ipe, absq; vterum intumescere vel flatu, vel mensium suppressione senserunt, non aut ab eo, quo re vera conceperunt. Quamobrem credendum est potius eas deceptas esse, si rigide re iudicare velimus, vt Hip. q̄ malè cōtulens mulierū pudicitia aliquot argumentis loco citato probat, vtrum plusq̄ decem menses ferri nō possent. Verum ne ex toto corruere videatur feminarū vis, eo, quo dictū est mō, suppurationē undecimi mensis instituere oportet, & pari suppuratione poteris 12. vsq; ptingere, qd̄ verò Aul. de 14. mēse scribit, id arbitror aliorū mēte scripsisse.

De Abortu.

Cap. 2.

- C** Abortiunt quidem adeò frequenter mulieres, vt, si quis id diligēter examinet, facillè inueniat plures esse vteri deperditiones seu abortus, q̄ legitimos partus. Quo sanè multi filijs orbat, miserè vitam degerunt: quamobrem, vt huic malo prouidere possimus, quid abortus sit, primo expendendum est: quas cās habeat: & qua lege præcauebimus quominus feminæ abortiāt. Est igitur abortus, vt Gal. placet. 6. pop. p. 1. cōm. 2. imperfecta fetuum emissio, seu immatura, & violenta fetus excretio. Fetus (inquit Aris.) duobus modis corrumpitur, effluxione nimirū, & abortu. Effluxiones quidē iudicāt, q̄ intra septimū diem corruptiones incidunt: abortiones aut, q̄ intra quadragessimū: sed non hæc solum, verum oēs ēt, q̄ ante legitimū pariēdi tps adueniunt abortus dici merent. Est igitur abortus vteri offensio primò, & principaliter ad vterum pertīnens quatenus illi inest concipiēdi officiū. Sic abortus symptoma est vteri consistens in noxa functionum naturalium, & maxime retentricis, q̄ debitum tps anteuertit: ac nonnūq̄ expultricis, q̄ ex aliqua cā lacessita pariēdi tps accelerat. Sed reuocare hac in parte in memoriā oportet, gratia p̄sagiendi de futuro abortu, fetus quibusdā mensib. eidē esse prōptiores, q̄ alijs: nam quintus, & sexti iniū minus abortui sunt obnoxij, postea verò 4. & sexti finis, post septimus,

Abortus

*Abortus
causa.*

*Abortus
causa
externa.*

mus, deinde tertius, mox secundus, & ab hoc primus, & mox nonus, & post octa
uus, vltimò verò decimus, vt latè probatum est lib. huius operis tertio. Quæ om
nia adamussim considerare oportet, vt pro cuiusque efficacia prouidentiam in
stituas. Affectum quidem vterum, nuper retulimus, primam potissimam quæ
abortus esse causam. At vero ipsum vterum lædunt, & ad id opus incundum ex
citant tres potissimum internæ causæ: siquidem vterus vel humorum pondere,
quos supra vires obtinet, oppressus, vel morsus humore in eum effuso rupis ips
in quibus fœtus continebatur membranæ, vel propter fœtum putrem, & sanio
sum irritatus. Cui etiam causæ accedit pueri, inutilis, & vitiosa moles, quæ ani
plius, quàm par est, distendi vterum cogit, & ob id irritatus expellit, aut vteri
coarctata nimis capacitas, vt in fœminis quæ minuto sunt cupore, vel teneris an
nis concipiunt. Item si aliquid præter naturam in vtero creuerit, quod ipsum di
stendi, quantum par sit, non permittat, velut mola, aut scirrholus tumor vtero
adnascens, quæ sanguinis nimio fluore fœtum præter id etiam perdunt. Atque
hæ sunt omnes causæ internæ, quas diligentius expendisse oportet, si prius di
xero, maiori ex parte abortus vitio causarum externarum fieri, vt febre vehe
mente, alui profluuiò, sanguinis immodica vacuatione, expurganti vel quouis
alio acri, & efficaciori pharmaco, saltu, ictu, clamore, ira, trilitia, timore, victu
partiore, re ardentè appetita, & denegata, vel subito aliquo casu, aut alijs, quæ
suapte natura abortum prouocare nata sunt: sicut quædam anni temporis dispo
sitio, & innumera medicamenta, ac cætera, quæ certum quendam spirant odo
rem: quorum pertimesco mentionem facere. Sed ne quis inopinato, & inscien
ter in turpem, & rusticum errorem incidat, quæ huic vsui sufficere videntur, re
feram. Si prius dixerò abortus plerumque ab interno vitio fieri eo tempore, quo
ante grauidationem fluere assolebant, vt accidisse vxori fratris Apemanti, fert
Hip. lib. 4. pop. tex. 50. nam eisdem diebus videtur partus posse perire. Ante ta
men, quam harum causarum naturam, & signa expendam, iuxta optimam ra
tionem me facturum arbitror, si affectus quosdam vtero, & aliquibus fœminis
connaturales, quibus ipsas (præsertim valitudinarias) abortire conspiciamus, re
censuero. Inquit itaque Hipp. lib. 3. aphor. 12. Si verò hyemis australis, & plu
uiosa fuerit, ver autem siccum, & aquilonium, mulieres, quibus partus ad ver
ineft, ex quacunque occasione abortiunt. Constatque id fieri necessario, quia
imbecillitas prægnantium illius temporis inclementiam perferre nequit, ne
que tanto labore ad illud vsque tempus perdurare, sed mox à quibusuis causis
abortit. Nam tria sunt, quæ non sinunt expectare, donec tempus mutetur: ma
gna nimirum mutatio in qualitatibus: peregrina, & aliena temporum constitu
tio: & imbecillitas, ac præparatio passurorum corporum. Ex quibus fit faciliè, vt
instillationibus concitatis, & in vterum prolabantibus, eo prædicta temporum
inclementia abortum premoueat: non quidem (vt Gal. existimat) ex repenti
no frigore, quod fœtus perferre nequit: nunquam enim vterus ex ambientis fri
gore adeo refrigeratur in communi vitæ more, vt fœtum interimat. Præterquã
quodd si id esset verum, citius morerentur nuper nati infantes in frigidis regio
nibus, ac temporibus, ob subitam illam mutationem, quàm qui in vtero sunt.
Quo fit, vt verior mihi videatur prima ratio. Refert quoque Hippocr. tan
quam abortus causam, grauidam esse gracilem, & extenuatam nimis: inquit
caim

A enim lib. 5 aphor. 41. Quicunque præter naturam tenues vtero gerunt, secundo mense abortiunt prius, quam crassescant. Quam sanè causam præstat uel alimenti penuria, vel humorum prauitas, aut vteri imbecillitas, quæ nec trahere potest, nec vnde trahat, habet. Quibus proculdubio fit, quod fœtus duorum mēsum spatio uiuat quidem, vt qui paucis fœmitib. eger, deficiente tamen ad augmentum alimento, ocylimò corruptatur. Inquit. n. Hip. de nat. mul. vt has causas insinuet. Quum in ventre habens fœtum mēstruum, aut bimestrem corruperit, & ad p̄fectionē gestare non poterit, & tenuis p̄ter naturā fiat: huius vteros purgare oportet, ac corpus pingue facere: non. n. prius fœtum perferre poterit, quam vteri ipsius crassi fiant, & robusti euadant. Sunt item inter mulieres quæ os vteri minus claudunt, & constringunt, & ob nimiam humiditatem fœtus prolabantur. Cōstat præterea mulieres abortire ex alijs quamplurimis causis, qualis est immodicus acris estus, ciborum parsimonia, flatus in utero coaceruatus, uel in ipso vulcus, aut tumor præter naturam. Tandem ualitudinariæ fēminæ plerunq; si debiles sint, abortiunt: si vero robustæ, salubrius degunt. Itē ex ijs, quæ præhumidos habent uteros, & ipse pingues sunt, molli carne op̄rassē, plures abortiunt, & aliæ septimestres pariunt, quas suapte naturæ abortiuas esse arbitror, quo malo eo usq; præuuntur, donec ætatis mutatione in meliorē habitum fiat conuēntus. Præterea fœtus imbecillioris causa abortus fieri, haud rarò cōspicimus: nam dum genitura, vel pauci est calor, vel pusilla in ea adest virtus, ligamēta, & inuolucra tenuia, & leuia adro generantur, ut crescente partum fœtu, ipsum sustinere nequeant, vel ipse, valetudinarius est, abortus quoq; moueat. Id quod docuerat Hipp. lib. de octimes. par. dicens. Quare multi pueri principium morbi intus nati prodire, & consequēter alij petierunt, alii morbosē uixerunt. Verum si ob maiorem corpulentiam fœtus pereat, ab prædicto abortu distingues, quia illi primis mēnibus prodierunt: ij verò, qui grandiores sunt, non nisi prope septimum, aut prope nonum, idq; vel alimenti defectu, vel vinculis præ grauitate disruptis. Nocet et̄ vinculis, & inuolucris fœtum coitus immodicus, q̄ eadem vincula præ nimio madore laxentur: quo fit, vt non rarò hac cā abortiant mulieres, præsertim quæ delicatiores sunt. Idem quoq; malū proficiscitur, cum ex aliquo uteri, uel totius corporis uitio, uel suppressione hē morrhoidarū, aliquid virulentum, saniosum uel putridum per os vteri instillat, siue ex mola prodeat, siue ex imbecillo fœtu, siue ex prædictis causis, quib. necessum est fœtum irritari, ac vincula laxari, & subinde abortum sequi. Sequitur insuper abortus, quib. fœtus ita debilitat alligatur, & affigitur vtero, ut facile possit a quauis causa moueri: quo motu prodit multa humiditas, qua uincula laxantur, & os vteri nimis aperitur: quo fit, vt fœtus facillimè prociat, cū neq; vinculorum robore, neq; vteri compressione id interdici possit. Futurum abortum, si possibile fuerit, multò ante cognoscere opus est, vt vel prouideas, quo minus fiat, vel saltem matri opportunè opem ferre possis. Sic profectò si utero gerentib. lac multum ē mammarū fluat, fœtum imbecillū significat, & abortus periculum: fastidit. n. fœtus alimoniam oblatā. Quod si papulæ prauo aliquo colore fēdentur, vterum imbecillum, & laborantē significatur, vt ex Hip. constat li. 6. pop. p. 5. tex. 17. dicente, Si marinarū propulæ, & rubrum chlorum sit, ægrotat vas, hoc est uterus: ob cōsensum, siue ex venis musculorū ab dominis quē ali-

*fœtus imbeci-
litas causa
abortus*

*coitus nimis
abortus causa*

*Signa
causarū
abortus*

Gg

qui

qui arbitratur has partes obtinere, siue eo modo quem nos antea ex aliorum A
sententia exposuimus, id quod etiam docuit li. 2. pop. p. 6. tex. 23. dicens; Si mul-
tum fluat lac, necesse est, ut langueat quod in ventre est. Matrima etiam, si graui-
lescant, idem periculum praesagiunt ob alimenti fetus defectum: sanguine igitur
deficiente, aut alioqui modico gracilescent vbera, ac nonnunquam perimi-
tur fetus, quandoq; verò ad excretionem excitatur. Siquidem infans corporis
constitutionem: mediocrem consecutus plus alimenti requirens, quam ex hau-
sta matris tenellum corpus suppeditare possit, calestrat, ut Hipp. recenset lib. de
nat. fœ. ac membranas dirumpit, initiumq; parturitionis affert. Hinc quoq; fit,
ut mulieri utero gerenti si altera mamma gracilis fiat, geminos habenti, altera
abortiat: si dextra, marem: si verò sinistra, foeminam. Proceedit autem futurum
aborsum aquosior primum euacuatio, deinde saniosa, & cruenta velut carniū
lotura, verò planè ex solutio venerit, purus sanguis, deinde grumi si ac demum
fœtus ipse forinatus, aut in formis egreditur. Plerisq; etiam in umbilico, & coxa-
rum grauitas adest, & superioris ventris capitisque dolorum dolor, stomachi
morsus, extremarum partium frigiditas, animi deliquium, horror febrilis: B
quibusdam etiam conuulsiones retrorsum iēque ipsi prae illud, quae medica-
mentorū violentia aborsum procurarunt. Sed nosse Hippo. lib. de nat. mul.
aborsum ex uteri hydropē his verbis docere: Si verò non circūiūta, sed diu
iam mouetur, fœtus ipsi corrūpatur, ac suffocet, tunc, & vterus intumescit,
ad contactum dolet, velut vlcerē praesenti, & febris ipsam, ac dentium strigunt
corripit, & dolorem habet acutum, & vehementem circa pedenda, & in
ventrem, & lumbos, & latera mollitudinem, ac tendentes. Quae porro signa
eodem prorsus modo comperies cum ex febre, vel morbo aliquo acuto mater
vel fœtus corripitur, praesertim si vi morbi fœtus intereat, ut et de fœtu mortuo
de cebo. Verum si ex casu vel plaga, aut alia simili causa doluerit venter, ut
ut aborsum minetur, id intra tres dies sese ostendet, ut Hipp. visum est lib. 7. pop.
tex. 71. dicens: Quibus praegnantibus ex casu, aut conuulsione, aut plaga dolo-
res moderare fiunt, in tribus diebus manifestè constat, an fœtus corruerit;
quod de moderatis doloribus subaudire oportet. Nam immoderati dolores
certum est, aborsum citius moliri, aut intra hos dies, quippe vulnera, ut Hipp.
visum est lib. de fracturis; tertio aut quarto die resoluuntur: quum igitur his
diebus cessauerit dolor, signum est, nil esse disruptum, aut vulneratum: & fœ-
tum superstitem fore. C
In omni igitur aborsus causa praecauenda, hoc tibi primum expendendum
arbitror nimirum, praecauendi rationem, variam fore ob variam fœtus aetatem;
quippe, grandiores fœtus aliter praecavebis, his nimirum quae minus turbent
magisque roborent, ac parum euacuent, reliquas verò, roborantibus quidem;
sed euacuantibus, etiam audacius, si copiam sanguinis causam praestare co-
periamus. Fuit igitur prima aborsus causa, humorum nimia moles, quibus fœtus velut
suffocari videtur, & vterus pondere nimio premi: Contingit itaq; iuueniculis, & bo-
ni, ac densi habitus foeminis tanto sanguine abundare, ut suppressa sensel men-
strua purgationis, neq; menstruis, neq; himestris, aut trimestris fœtus eam co-
piam conterere possit, subindeq; corruptis vitculis ob plenitudinem aborsus
ocysimè

♂cylime fiat. Quod sanè malum præcipue ijs sceminis accidere conspiciamus, quibus aliqua sanguinis euacuatio vel per nares, vel per hæmorrhoides grauidationis tempore supprimitur: præsertim si accesserit cibus, à quo largior, & mucosus succus prodeat acetabula vitæ opplens, & ligamenta laxans. Præterea ex hac causa abortus fieri cognoscet, quia citrà manifestam occasionem euenit: euenit etiam totius corporis plurimum in ea turgent, & veluti varices in cruribus aliquando sunt: respiratio difficilis primis mensibus accidit, capitis dolor, & oculos non cum grauitate dorsum & inguina dolent: mammae plurimum turgent: profluit sanguis enaribus, vel per os, tussis aut vomitu reijcitur: ac nonnunquam per colla vteri venas ordinate vel citrà ordinem profluit.

Quibus proculdubio in debetis sanguine nullo his, aut ter ante conceptum vel statim, nimirum secundo, tercio, quarto ve ad summum mense: nam grauidiores fixius cauere, oportet, ut Hip. consulit quippe, præceptum aliud quo refert à 4. ad 7. subaudiendum censeo de purgatione, idque si morbi alicuius necessitas urgeat ceterum parcius, & per interualla. Fiet etiam id victu partiori, & modico exercitio, dixerim, diutius facto, sed lentè, & sensim. Hac quippe causa præsentè, nulla alia commodior existit præcauendi abortus ratio, & via, quam vena scissa ex brachio, ut dictum est: ac si mulier multum sanguinis reijcere per menstrua consueuerit plus, & audacius ob id sanguinem deirahere oportebit, dummodo atque subito, neque semel extrahas: sed interpositis decem, aut viginti diebus, aut mense vno vel duobus: idque potissimum ad quartum mensem, usque grauidationis tempus, nisi post id tempus abortire allueuerit, nam tunc non erit ab re hac necessitate viginti quinto, & sexto sanguinem mittere, sed prudenter, & cum prælagio. Tandem parum ante id tempus facies in quo scemina abortire alluescit. Quo sanè præsidio, sceminas, quæ frequenter abortiunt, plures ad statutum patiendi tempus incolumes deduximus. Nos tamen experimento comperimus, non solum ad retentionem scetus, sed etiam in ijs, quæ difficilè pariunt, sanguinem mittere, summè vtilissimum fuisse. Nam cum scetus abundat multo alimento, cum eo non indigeat vel suffocatur, vel non conficit, & corrumpitur, vel in magnam molem crescit si ipsum commutare prosit, maxime si scemina, vterum, habeat amplior, ex quo post ea ob magnitudinè exire non possit: quo casu vltimis mensibus sceminà quiescere, iubere est opus, ne nimio pondere scetus vincula discumpat, & abortum molietur. Neque erit ab re tenuem regionem oleo vel vnguento aliquo inungere, quò sanguis feruorem compescere possis.

Quod si ex laxitate ligamentorum, ob mucores, vel quamuis aliam humiditatem redundantem scemina scetum retinere non possit: id cognoscetis summo principio à signis, quæ Hip. refert lib. 2. de mor. mul. per hæc verba; Si acetabula pituita plena fuerint, menses sunt pauciores, & si in ventre habuerit, corrumpit, vbi scetus validior factus fuerit: non enim corroboratur, sed defluit. Cognoueris autem hinc: humida sit, & quod defluit, mucosum, & tenax velut a ventre deferitur, & non mordet, & in mensibus postquam sanguine purgari delierit per duos, aut tres dies mucci ex uteris prodeunt, & horror tenet, & calor non acutus, verum non deficit.

*preservatio
abortus a mul
titudine.*

negle.

Quæ verba lib. de natu. mul. ad verbum scribit addens, hanc affectionem secundo vel tertio mense certius euenire. Quas autem partes per acetabula seu corylidones liceat intelligere, non satis constat apud autores: ego tamen omnia vteri vasa, & cavitates intellexisse Hipp. cenfeo. Quibus medebitis facta ante conceptum frequenter purgationa pilulis de hiera Gal. mastichinis cum aromatis addito zingibere, & sale gemmeo, item pilulis ex rhabarbaro cum agarico, & mastiche, aut pilulis ex agarico. Pessarijs etiam vtendum est, maxime pituitam trahentibus, & post menstruam purgationem. Suffumigia quoque, & emplastra adhibebis, qualia ad vterum humidum superius scripta sunt. Sed inter omnia auxilia vtiliores mihi vitæ sunt semper sudationes ex decoctione radicis chinæ, quas magni momenti in hac re scio, vel sulphurea balnea.

Verum si mulier vterum habeat paruum, ac densum, & constrictum, ita vt non facile dilatari possit ad fetus incrementum, & ob id ipsum expellat: cognoscas quidem ex priuatione signorum aliarum causatum. Cui vtilissimum erit ante conceptum balnea laxantia adhibere, foris & linimenta, quæ vtero sicco prodesse quoque diximus. Ceterum gravidatam facta huiusmodi muliere, caute ijs erit vtendum, ne abortus facilius subsequatur: verum octauo die à defectu menstruum fortibus vtendum est, oleis & vnguentis, quæ emolliendi efficaciam habeant, qualia abunde dicta sunt c. de vtero sicco. Quæ sanè proficiant erunt, si addideris ex roborantibus aliquid.

Abortus, mereturatio ab acris humoribus

At si abortus fiat ab ijs, quæ vel in vtero continentur, vel alicunde in ipsum defluunt vitiosa, acris, & mordaces, sine medicamento purgatis sit, sine humor acris, & erodens, aut vitiosum aliquid alimentum: aliter prouidendum est, & maxima cum diligentia. Nam de his causis loquens Hip. lib. i. de mor. mul. hæc refert verba. Eadem verò sunt affectiones ex puerperijs purgamentis, & ei, quæ corrumpit fœtum, & ei, quæ peperit: si menstruum corrumperit fœtum, & quæ corrumpunt, magis periclitantur. Corruptiones n. grauioribus sunt, quam partus: non n. fieri potest, vt circa violentiam fœtus corrumperetur, aut phatimaco, aut potu, aut subditis medicamentis, aut aliqua alia re: violentia verò malum. In huiusmodi enim periculum est, ne vteri exulcerentur, aut inflammantur: hoc autem periculum est. Quod sanè non minus suboritur ex quavis alia re, quæ grauare, aut irritare uterum possit ita, vt ipsum excitet, & ante tempus laceret, vt de mola, & duris tumoribus dictum est. Medicamentum sanè cognoscas ex relatione, cuius damnum ab assumpto inceptum præcauebis ijs, quæ cuiusque vim, & acrimoniam retundat, velut est amyllum, aqua calida potui sumpta, syrupus violarum, de portulaca, aqua hordei, vel sacchari, & census pleraque. Humores porro acres, & mordaces, quos ex doloribus lumborum, inguinum, & pendendi cum orosionis vel exulcerationis sensu discis ex reliquis signis, quæ prædominium humoris monstrare habent. Hos quidem ante conceptum purgabis, & cibis boni succi reficies. Reperies aut inter feminas non paucas, quæ cū sanæ ante grauidationem degerint, ipso tamen gestationis momento, ocysimè valetudinariæ, & morbosæ viuunt: ratio quidè est, quia cum habitum habeant biliosum, aut vtunque morbidum statim a conceptu, ex menstrua suppresso, & ex ea humoris portione, quæ in vterum fœtus gratia confluit, præne in vtero se ha-

A se habent, & mille symptomatum generibus corripiuntur, a quibus, nisi per va-
 cuationem alibi sponte, aut medicamento factam non liberabis. Quibus ante
 grauidationis tempus peruenies, prauum habitum, in meliorem commutando
 facta aliqua sanguinis detractio, & purgatione iuxta humoris redundantis
 ideam. Quo quidem facto, precautionis, & purgationis in his, & reliquis vsus
 census, modus erit per epierallim, ex habito rhabarbari diluto singulis diebus,
 aut tertio die quod si humores adusti fuerint, id facies decocto foliorum senae
 exhibito vel confectioe simplici Ameech cum rhabarbaro. Postquam verò cō-
 pertum fuerit mulierem factam esse grauidam, ab expurgationibus abstinen-
 dum est. Verum si praedictos succos plurimum abundare sit certum: vt factum
 perdere constet, rhabarbari modicum cum saccharo rosaceo porriges, aut ma-
 sticatum, vt sanguinem ab spurcitia liberes, ac partes internae viscera roboren-
 tur: tamen quies omnino imperanda.

Atqui si tumor durus abortui causam praestiterit, antè quam grauida fiat mu-
 lier, curanda est ipsa, c. de vteri scirrho dicta sunt. Si autem molam id efficere
B visum sit, pari lege id praecavebis eo modo, quo dictum est c. de mola. Prius tñ
 nosse curabis, tumor ne sit, an hydrops, vel mola: nam tumores ex dolore, & ta-
 ctu facile percipies: molā verò, eò quod serè toto praegnationis tpe vel sanguis,
 vel virulentum aliquid per vterum instillat: impedit. n. haec, quominus optime
 os vteri claudi possit. Praeterquam qd cum venas non habeat mola, quibus a va-
 sis vteri capere alimentum commodè possit facile ob id ipsum prolabi contin-
 git, quia solum alimoniam suscepat per adhaesum, & contiguitatem, qd cum
 osculis venarum obtinet, quo fit, vt frequentissime sanguis in vterum instillet,
 qui vel oculissime procidat, vel ibidem detentus vitetur, & postmodum purga-
 mentorum forma exeat, aut fortum perdat. Vter hydropem causam huic malo
 praestare cognosces ex signis, quae Hip. scribit lib. de natu. mul. per haec verba.

Si aqua in vteris gignatur, menses pauciores fiunt, & deteriores, & per longius
 tempus, praegnans est semper per duos menses, aut paulò amplius. Quum autè
 hoc tempus aduenerit, & corrumpit, & aqua multa in ipsa gignitur. Et paulò
 inferius eodem loco subdit. Plerunq; verò ante hoc corrumpitur, & per abor-
 tum extruditur, & vteri sanguinem manant. Haec autem patitur nihilo magis ex
C labore, quam aliter: hoc autem cognosces ex digiti cōtactu. Comperies. n. oscu-
 lum ipsorum gracile, & obscuratum, ac plenum humiditate. Si verò non circa
 initia, sed dum iam mouetur, fetus ipsi corrumpat, ac suffocetur: tūc & venter
 imus intumescit, & ad contactum dolet velut vlcere praesenti, & febris ipsam,
 & dentium scemtus corripit. Et dolorem habet acutum, & vehementem circa
 pudenda, & imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem, ac coxendi-
 ces. Qua etiam parte curandi rationem scribit plerunq; mitigatoriam. Ceterū
 artificiosius lib. i. de mor. mul. Nos etiam c. de vteri hydropem, curationis metho-
 dum, & medicamenta huic affectioni apta, abundè docuimus.

Quod frequentissime abortum promouere conspiciamus, proculdubio est,
 externarum causarum vis, & efficacia: quod sanè malum vt varium est, ita diffi-
 culter praecaveri potest. Ceterum Auic. latissime causarum omnium externarū
 meminisse constat Fen. 2. 1. 3. tract. 1. cap. 8. sed haec studiosis legenda relinquo.
 Quippe siue casus aliquis sit, siue subita alteratio, habent hoc propriū oēs cau-

Gg 3 se ex-

neque me

Mola dicitur
de A. la tur.

Hydrops vteri
causa abortus

Cap. xv
262

se externa si abortum factura sunt, ut prius vincula, & inuolucra foetus abrum-
pant: quo facto instillatocyssimè sanguis, quem supprimere deinceps minimè
potes, nec licet: cuius sanè ratione abortus protinus sequitur. Dixerat quidem
Hip. lib. de natu. pue. nonnunquam accidere, ut ante præfinitum tempus ruptis
pelliculis ob aliquam violentiam, pueri nascantur: perinde, ac morbis, & aliis
vnde cumq; illatis noxis corripì solent. Sic, l. pop. par. 2. Abortiunt mulieres (in-
quit Gal.) cum vehementius salierint, ut subito horrendum suspicatur timue-
rint: & cum ex dolore, vel ex insigni cruditate, vel ex medicato quopiam cibo,
vel puri portione, aut medicamento, in quo insit aliquid abortiuum. Iam etiam
propter sanguinis missionem, & sanguis ex vulnere profluuium; aut ex nimia
hæmorrhoidè quædam abortiunt. Noni profectò quædam, quæ ex vuluæ cer-
uicè profuso sanguine, prægnantes iam diu partum eiecerunt. Pari quoq; ratio-
ne, 5. aphor. ex nimio alui fluxu scribitur plurimas abortum fecisse. In quibus
præcauendi ratio duplex in genere est: quas sigillatim distinguere est in animo.
Vna quidem est, quæ causis internis debetur, pugnans aduersus vnāquāq;
ut superius diximus: quibus adicere oportet quæ cor, & viscera roborare, ac fir-
mare habent, velut sunt pulueres cordiales, & ea, quæ spiritus reficere possunt.
Alia verò, quæ causis externis sita, ut plurimum in optima moderatione, & tu-
tela, præcauens diligenter vtero gerentem ab iis, quæ subito, & inopinato oc-
currere possunt, velut sunt omnia, quæ vtiā, & menses mouent, & alia, quæ
c. de fœtu mortuo recensbo.

Si enī hinc
de fœtu mortuo

Verum si ex causa aliqua prægressa aliquod malum fœui vel matri illatum
cognouerimus: eruperint sanguis, vel quoduis aliud malum conspicuum sub
sequutum sit, præuidendum est. Nam si sanguis profluxerit, nullo alio auxilio,
quam quiete, & optima victus ratione, eamque quodam modo comprimente,
& roborante vtendum est, ne si sanguinem profusum compresseris, corruptio-
nem subeat ipse vel særum suffocet, aut si liberè fluere permiseris, maior fiat
profusio eius, quàm par sit. Caterum si fœtum diuulsū non esse, neque liga-
menta disrupta cognoueris, eò quòd sanguis nullus, aut quàm parcissimus in-
stillauerit, sed solum imbecillum, & deiectionum aut aliter præter propriam na-
turam commotum, quòd mater sit perterrita, defessa, dolens, percussa, vulnera-
ta, aut alio quouis damno affecta: prouidendum est fœui per corroborantia au-
xilia vmbilico, & dorso affixa (qualia diximus lib. præcedenti cap. de vteri ge-
statione) alimentis, quiete, animi tranquillitate, & omnibus, quæ vires roborare,
ac spiritus reficere habeant: velut est confectio alchermes, electuarium de
hiacinto, de gemmis, diamargariton, cardiaca herba saccharo condita, terra si-
gillata, bolus armenus, amyllum & reliqua huius nature. Sed plerisque proba-
tum reperio puluerem qui recipit granæ infectorum ʒ. j. pulueris. g. x. in ouo
sorbili cui, & coralli, & margaritarum non nihil commisceri potest. Sed ali-
menta pauca pauci, nutrimenti & assa, præsertim columbarum carnes assæ
præbeantur. Venter etiam roborare oportet, ac flatu ab eo, & vtero di-
scutere, qui non rarè abortus solent præstare causam, idq; facies oleo de spica,
cironiorum de mastiche, cum puluerib. diarrhodonis, aromatici rosati, coralli
rubei, rosarum; & calami aromatici cū g. iij. musci. Vteri verò flatu antea discu-
tere docuimus lib. nimirum huius operis secundo. Appones aut vmbilico mē-
cam

Expēde
faminā
curandā
esse, ante
quā gra-
uidā fiat
ex lege
quā ue-
ri affe-
ctio po-
ssit aue-
ri ut di-
ctum est
c. de pra-
ga. mod.

exēplū .
g. r. ion-
sua ex
panno
coccine .
3. ii. 2.
giberis ,
galēga ,
cinna-
mō, cube-
barū an.
3. ii. 4. sin-
guinis
draco-
nis 3. i.
mosci g.
4. masti-
chis 3. s.
mellis
q. s. fiat
emplas-
trum .

Acam panis leuiter torrefacti vino irroratam, super sparsis pulueribus rosarum, granorum tinctorum, coralli, cinnamomi, & aliorum, quæ superius rerulimus. Prestat pomum odoriferum asium eodem vino, & pulueribus inspersum, sicut & carnis semina frustum cum prædictis puluisculis. Sic prosunt inunctiones, cerata, emplastra, velut est illud, quod scribitur a Montagnana de corticibus castaneæ. Vel aliud à Varignana probatum, Comitissæ appellatum: item alia, quæ conficiuntur ex prædictis, & oleis odoriferis cum vino, & aqua cinnamomi, & aliis, quæ ferui calorem, robur, & spiritum quodammodo addere videantur, qualis est instillatio arte chimica in vitro alembico facta ex pane recentè cocto imbuto melle, vino, aqua rosacea, confectioe alcherimes, electario de gemmis sine speciebus, & pulueribus rosarum siccarum madefactis aqua chalybeata. Sed non est mihi in animo hac in parte huiusmodi topica auxilia speciatim recensere, quia prædictis cap. ea abundè docuimus. Sat enim est ea, sicut prædictos affectus, exempli causa adduxisse, ut ad pensum eorum, sic in similib. prouidentia vtaris simili.

B

De partu naturali, ac de difficili, & laborioso.

Cap.

3.



PER difficile quidem est ea, quæ a natura aliena existunt, nosse, & rimari, quin prius ea, quæ secundum naturam sunt, cognouerimus: rectum enim (ut ferunt omnes) iudex est sui, & obliqui. Ob id licet cap. i. de partu naturali, quæ portiora sunt, scripsimus: placuit tamen in hunc locum quædam adseruare, quæ ijs, quæ dixero, maiorem lucem asferre possint: & sic prima huius cap. parte in animo est ea disserere.

CSicut in fructibus ac reliquis, quæ opem naturæ in perfectionem veniunt, se gerere ipsam conspicimus, quæ primo ad integritatem & maturitatem perducit, quam in lucem producatita prorsus in hominis, & aliorum animalium productione peragit. Quippe puero efformato, ad perfectionemque diducto, & uberior alimentum exposcente, ipsum ad calcitrandum, & membranas dirumpendas stimulat, donec ab innolucro liber exitum querere nitatur. Dictum quidem antea est ex Hippocr. mente lib. de natu. pue. membranas dirumpi; prima quidem ac extrema, quod fasciæ modo puerum innoluat: non equidem vnde quaque, sed per mediam regionem ab ilium elatissima sede ad ensiformis ossis mucronatam cartilaginem, spleni ipsi simillimam, quantum attinet ad nigredinem, friabilem substantiam fungosamque, & quatenus frequentissima vasorum serie implicatur.

Hæc verò solas venas & arterias recipit innumeras ab hysterio derivatas, corio, vel secundina appellata. Secunda verò membrana fœtus circumquaque tegens, nulli vtero adhærescit, præterquam ea parte, qua iam prædictæ conui circūspicitur per venuillas illas a primo in umbilicum penetrantes. Tertia, tenuissima pelle constans, fœtum inuoluit. Exemplo itaque spicarum comprobauit Hipp. hanc

Gg 4 vio-

violentam velamentorum diruptionē. Nam sicut ille similiter, & mala granata, amygdalaq; dehiscunt sapius ligneo illo cortice rubro ob molis intus incrementis violentum impetum: sic quoq; quæ cooperire fœtum dicta sunt inuolucra. Ex quibus euidenter constabit, quos cruciatus, quosve dolores mulieres perferant parturitionis tempore: atq; non solū in separatione fœtus ab utero, & diruptione velamentorū, verū in exito fœtus per tam angustas vias, & meatus, quantum Hip. & Gal. ac reliqui antores depixerunt. Aperitur itaq; in hoc opere os vteri tantum, quantum sufficiat embrii præbere exitum: qualiter autem hoc fiat nescimus, neq; aliud, vt refert Gal. quā admirari possumus. Sed natura hæc alia oīa circa parturitionem animalis machinatur eximia sōphismata, & commenta. Item qualiter fœtus in decenti figura ipsi collo uteri propinquet, & æqualiter exeat non vulnerata aliqua particula, non paruat monstrat prouidentiam. Inquit etenim Auic. lib. 3. Fen. 2. tract. 1. c. 2. Et quando separatur, aperitur maris apertura tali, cuius similem efficere non valet in suo simili, & necessarium est, vt separentur quedam iuncturæ, & sustententur adiutorio Dei excelsi, post illum, & propter illum redeunt in proximo ad continuationē naturalem, & est operatio illa de operationibus fortibus naturalibus. Quibus Auic. verbis modum parturitionis, & doloris acerbitem euidenter monstrat. Atque licet Gal.asserat, non vulnerata aliqua particula fœtum educi. Auic. contrarium videatur asserere: arbitrantur cum hoc anho iuncturas laxari, nec tamen ex articulari solui quidem iure dici possunt, q̄ summa illa distensio, species quedam solutæ continuitatis esse videatur, & ob id dolores acerbis, & cruciatus prope os pubis, & sacrum proculdubio percipiuntur. Sed huic & operi non exiguam opem præstare ab dominis mulculos, retulerat Gal. li. 3. de facul. na. c. 13. Ob idq; censeo ipsum dixisse. 5. apho. 5. ad bonum partum duorum corporum vigore esse opus grauidæ mulieris nimirum & infantis. Erit igitur, his præmissis, partus naturalis quando ex naturæ modo huiusmodi actio perficitur: id autem fieri contingit, cum eorundem fœtum consumatorem, ac perfectorem naturalem emulsionem molitur: natura idq; debitis, ac statutis iurb. Quibus euidenter constat differentia inter naturale n, ac legiūm partum, & abortum: ille quidem est naturæ actus: hic verò violenter fit, & præter naturæ institutum. Cui operi necessaria hæc sunt, fœtus perfectio, tempus statutum, matris & ipsius fœtus conatus & enixus, & vltimò certa debitaq; in exeundo positura. Quam sanè antequam exponam partus instantis signa breuiter referam, ne in cauta & improvida obstetrix, ante tempus opportunum partui mulierem exponat: antea etenim quā occasio instet, irritus labor est, qui à nixuriantē suscipitur, & ipsa parturiens vano labore contabescit, vt cum postea laborandum sit, labori non sufficiat, vel rursus, occasio prætereat, ac fœtum subinde inopinato prolapsum perdat, aut matri, vt par est, non prouideat.

Signa
partus

Si igitur ingestibile fiat fœtus onus, ac sub vmbilico grauitas appareat, & in lūbis, inguinibusq; cōtinuus cruciatus sentiatur, si ventris caliditas, si genitalis natura tumeat, si locelli humectetur, si vrine sit incōtinentia, si vterus solui atq; laxari sentiatur, parturiginis indubitata signa existunt. Grauidas aut si tormina vexant, pessimè parere ceruicem est: difficulter, cum lumbi dolent. At cum instat iam parturitionis tempus, superiores partes graciliores fiunt, & extenduntur loca

Aca super pectinem & inguina, immissoq; digito ad magnitudinem oui quid in orificio inuenitur. Humor verò, qui effertur, primò lentus, & postmodò plurimus, ac demum sanguis, ilq; aquosus, si femina nascitura est, aut ruber & purus si masculus. Quæ etenim signa puerum se iam ad uterum ventissem comonstrant: apparet et eo tempore in prægnantibus plerisq; stomachus uteri, & propior efficitur, ut ex Gal. euidenter constat lib. de fetus formatione. Incipiunt tunc dolores vexare confertim femora, lumbos, ventremq; ipsum: cum hoc tamq; neq; prius in sella patiendo idonea locanda est utero gerens, q̃ uteri osculū hians digitis occurrerit, & preminuerit, ac prædictarum humiditatum effluxus compa- ruerit, ut Arist. 7. de hist. ani. c. 9. & Aetius de partu difficili consulunt. Sed si Gal. credas. 14. de usu par. & 3. de facul. nat. os uteri perpetuo directum instante par- tu apparet, sicut & in conceptu: quare quo tempore sedere festinat grauida, re- ctum apparere os uteri oportet: appropinquantis etenim partus euidentis existit signum. Cognito his partus instanti, cum esse naturalem, ac soli naturæ, & ipsi parturientis diligentia, ac viribus committendum est; quem naturalem esse, inter dictas hæc una ratio monstrat. si in caput infantem nasci. Cuius rei optimā cau- sam vñ Hip. dixisse, partium quidem quæ sunt supra umbilicum, grauitatem: q̃ tamen non oportet tantam esse putare, ut satis ea per se sit, ad inuertendū fetum: nam toto, quo utero geritur tempore, fetum in caput propendere oportet, nisi insuper infantis matrisq; motus accessisset. Sic enim natura præiudic, Deo Opt. Max. adiuvante, ut capite primū infans prodiret, quo magis molestis, peri- culisq; puerperas subleuaret, quæ utiui proculdubio non possent, & vitio ali- quo infans aliter, puta in ventrem, in laus, inq; pedes exitum affectaret. Quia fieri profecto non potest, ut infans pedes manūq; ita coniungat, & reliquo cor- pori applicet, ut nusquam vel in hanc, vel in illam partem diducatur: eā ob cau- sam qui sic prædeunt, difficillimum efficiunt partum, & matri ingentes crucia- tus excitant, ac se ipsos in maxima pericula conficiunt, licet non omnino, pedi- bus antea emissis, difficilem moueant partum. Quamobrè sic natos Latini Agrip- pas appellarunt, licet alii a difficili partu nomen inditum esse fateantur. His ve- rò omnibus periculis vacat, qui naturali modo nascitur, in quo caput primo se- cerens, minore cum dolore os matricis, totumq; ipsis collum aperit, ac dilatat

C & viam reliquo corpori parat fructuorem.

Laborem quidem & difficilem partum cum esse existimo, qui cum fetus, *De par- tu diffi-*
vel matris periculo, & grauissimis accidentibus sit. Eūq; symptoma sub genere *cili.*
contorum immodicè comprehensum: siquidē fetus non sunt utero gerentiū partes, sed proportionē respondent ijs, quæ adhaesunt, familiarium inquam. Quemadmodum oua & fructus à natura ad generis propagationem creati, ut ex Gal. testimonio elicitur. 11. simpl. sic & parus: ob id dum præter modum, & naturæ institutum detinentur, symptoma hoc efficitur: nō solum ea ratione, sed quia cum grauissimis accidentibus excernitur, longè grauiora, & diuersa ab ijs, quæ suo pre motu natura mouere solet. Vnum tamen habet peculiare signū difficultis partus, quod diebus aliquot ante partum copiosè profluat ab utero a- qua nam partus tempore, cum nihil profluat, eo quod iam profluxerit, ob sic- citatem prolabi nequit fetus: itaque nihil insillare tempore parus, ipsum dili- cilem reddit,

Fit

Fit proculdubio difficilis partus vna potissimum quatuor causarum, vel duab. A
aut omnibus simul: nam vel accidit ab extrinseca aliqua occasione vel ex femi-
næ vitio, & impotentia, vel ex ligamentorum, aut tunicarū, quibus fetus inuol-
nitur ratione, aut vltimo ex parte nascentis fetus. Partum igitur efficit laborio-
sum (vt à prima causa initium sumam) aeris præsens constitutio: si quidē aequi-
lonia difficilem parit, austruina facilem: sicca fetum, & mulieris corpus exsiccan-
do, difficilem; sicut & nimis calida, vires exsoluendo; ac frigida, partes contrahē-
do humida verò ad partum faciliorem omnium aptissima est, & quæ modicè
calida existit, ob id profecto videndum est. ne in cubili exstat aer frigidus, aut
plus æquo calidus. Dixerat. n. Hip. li. de loc. aqua & aere, eas feminas difficulter
parere, quæ regiones habitant frigidas, ob id quod virtus expultrix his in locis
labefactatur à crudis aquis, & aere frigido: pueri etiam debiles sunt, & os vteri,
ac pudendum muliebri adstrictum: quæ omnia impedimento sunt partus faci-
litati. Difficile quoq; partum efficit ita, vbi in parturiente plurimum creuerit,
ita Zelotypia, aut si femina primariola fuerit, timor, & verecundia, aut quæuis
alia animi passio, si adeo creuerit, vt potentias distrahere ab incepto possit. Sic B
vehemens dolor partus difficiles reddet, & gratio odores qui sursum vterū euo-
cant. Simili quoq; ratione, & experimento didicimus, multū conferre quo situ
loccetur paritur: nam si sedeat, impeditur dilatio: cauda si recta stet, in longū
extenditur vterus, & vtraq; positura difficulter, ac laboriose pariet: monstrabo
aut paulò inferius qualis positura partui sit cōmodior. Ex parte verò ipsius par-
turientis plures comperimus succrescere posse difficilis partus causas. Quippe,
aut imbecillis admodum est mulier ita, vt enixu se ipsam iuuare non possit ex
morbo contracta impotentia, vel ex natua sorte, iuuenili atate, vel ex labore
aliquo pcedente, aut difficulter spirat, & anhelosa est ita, vt non valeat spiritum
cohibere, opus alioqui summopere ad partum necessarium: qm̄ hmōi expulsio
fit retentio spiritus; quod anhelosa citra suffocationē efficere nequeunt, vel si ni-
mis dormiat, affectu aliquo caput grauante, vel ob vigilandi impentiā. Itē ob
dolorum priuationē, vel māsuetudinē, aut insensibilitatem, q̄ sanē oīa graue pe-
riculum minantur. Accedit et his tanq̄ causa, si ipsa puerpera crassa, obesaq; sit,
& vteri exiguis dolorib. impedita, aut umiscula, vel nimis extenuata, in quibus C
musculosa, & ligamentosa partes, duræ extensaq; existunt, nihilq; partui ce-
dunt. Præterea id malū quoq; affert mulieris vteri, aut mala vicinarum partiū
constitutio, vel est vteri magna distensio, & oris structura, & colli ipsius longi-
tudo: quib. fit, vt ab vtero difficulter egrediatur fetus: nā in collo plurimū im-
morabit, & per angustum oris foramen nō libere exhibit. Idem malū efficiet ni-
mia omenti, & vicinarū partiū obesitas: nam quārōne conceptum impedit, qd̄
os vteri comprimat, eadē partiū efficiet laboriosum, sic & tumentes hæmorrhoi-
des. Cui et malo alui excrementa dura, & vrina diu retenta plurimum addunt:
sicut dum ante ips partus mulier inflammationem aliq̄ perpeffa est in locis ge-
nitalibus, aut parte aliqua eis vicina. Potest & difficultas pariendi contingere,
si ossa pubis nimium conferta fuerint, vt fertur: ego tamen existimo ossa illa pa-
rum, aut nihil dilatari (et si Anic. id asserat) sed totam illam dilatationem perti-
nere ad caudam ipsam siue ad os sacrum, aut (vt rectius loquar) ad ossis sacri cū
cauda articulationē: nā cum os sacrum in caudam desinat, ita cum eo articulan-
tur

A tur sua ipsius ossa inter se, ut reflecti possit cauda in partem exteriorem, quo si
 ut foramen reddatur latius multo. Facta est aut cauda potissimum ad sustentan-
 dum rectum intestinum, & musculos ani firmandos, quibus utimur ad alui du-
 ra excrementa vi expellenda. Hæc itaque cauda in partu, ita erigitur in extero-
 ra, ut facile id opus conspicui videri possit, & vulua hac rōne potius in partem
 posteriorem extenditur, & amplior efficitur, eo quod cauda cedat, q̄ in partē an-
 teriorem, in qua os pubis minimè cedere pōt, licet aliquibus, tanq̄ verū, & vul-
 gatū habeatur. Difficilis quoq; sit partus, si secunda vel pp crassitiem non ab-
 rumpatur, aut pp tenuitatem, ante q̄ oporteat, diuellatur simul cum aliis mem-
 branis foetum ambiētibz: quippe hac occasione humore euacuato partus ob
 siccitatem difficilior redditur, q̄ per collum vteri foetus difficulter elabatur. Re-
 fert quidem Gal. lib. 1. §. de vsu par. c. 5. huiusmodi humorem summo opere pro-
 desse viis omnibus lubricandis, ac facilioribus ad dilatationem efficiendis, a p-
 dicto nanq; humore collum humectatum mollius redditur, dilataturq̄ faci-
 lius. Ob id quæ multis ante diebus mucorem, vel aquam sensim expurgat, dif-
 ficulter parit: dilabitur. n. ocyus per madidas, & lubricas partes foetus, q̄ per
 siccas. Contingit et partum fieri laboriosum, cum amnion membrana ante frā-
 gitur, q̄ puer in vtero voluatur, ita ut in maximo versetur periculo ob loti mo-
 lestiam, quia totus afficitur, & ne aliquid eius per eos ingrediat, nam a suffoca-
 tione illum tueri respiratio per arteriam, quæ in vmbilico est. Et ob id labo-
 res in partu, & innumera alia incommoda, quæ lib. de octime st. par. annu-
 rat Hip. debilitant foetum adeo, ut nonnunq̄ ante exitum, nulli in exitu, multo
 plures paulo post, & maxime intra diem, alii intra septem dies, tandem intra qua-
 dragimum intereant. Cui et causarum generi reducere oportet vteri imbecil-
 lam facultatem exercetricem, aut vehementem retentricem, nam ut superius di-
 ctum est, mater abdominis musculis, puer propriis viribus, & vterus otante re-
 tentrice, & expultrice irritata, ac operante, partum facile parant. Idem quoque
 accidere cōspicimus, & longè difficilior, si vel mortuus, vel sideratus puer fue-
 rit, ut refert Hip. lib. de mor. mul. Foetus si maior sit, quam pro fœminæ constitu-
 tione, & partum figura opus est, difficillimū & periculosum sibi, & matri pa-
 rat partum. Pari prorsus ratione, si monstruosus sit, vel magni capitis, vel nimis
 parvus, aut parui ponderis, tum quia seipsum non præstat adminiculantē, tum
 vero, quia ipsi non aptè adequatur vterus. Itē si vel numerosus sit foetus, vel infor-
 mē aliq̄ carnē secum afferat. Præterea, si imbecillus existat, ita ut neque vincula
 dirumpere possit, neq; ad exitum vehementer inniti, difficilē quoq; inferi par-
 tum. Sed longè difficiliorē, cum depranata aliqua figura exire nititur. Nascuntur
 quippe pueri, aut in caput, aut in pedes, aut penitus obliqui, & cōtorti, vel mil-
 le aliis depranatis figuris affecti. Sic enim lib. de nat. pñe. Hip. scriptum reliquit.
 Porro diruptis pelliculis si pueri momentum in caput inclinauerit, mulier faci-
 le parit, si aut obliquus, aut in pedes processerit (contingit enim hoc sepe, si pau-
 lulum huc inclinauerit, siue præ vterorum spatiositate, siue si mater in laboris
 partus primum non quieuerit) & si sic processerit, mulier difficulter pariet. Mul-
 tæ autem ipsæ perierunt, vel puer, vel simul ambo: de quibus rursus libro de
 morb. mulie. Hippocra. scripsit in hunc modum. Si vero mulieri in uentre ha-
 bentū tempus partus iam affuerit, & dolor partus tenuerit, & ad multū tempus

Ex parte
 membræ
 MAT 14778.

Ex parte
 fœtus.

mulier puerum edere non potuerit, omnino obliquus, aut in pedes procedit; A
 vtile autem est in caput procedere, & si obliquus iter capefferit, difficilis est affe-
 ctio. Sicut. n. si quis in vas olearium angustioris nucleum immiserit, non procli-
 ue difficile est ipsum extrahere. Sic et mulieri grauis affectio est, vbi fœtus fue-
 rit obliquus: graue item est, si in pedes inclinauerit, & sæpe aut matres pereunt,
 aut pueri, aut ambo. Est autem magna causa, vt non facile exeat, si mortuus, aut
 fideratus, aut duplicatus fuerit. Paulò autem inferius eodem lib. sic scribit. Qui
 cumq; vero duplicati complicantur, & in osculo vterorum incumbunt, eos siue
 viui fuerint, siue mortui rursus retrò protuosos vertere oportet, q; secundum
 naturam in caput exeant manibus ad vtrumq; femur extentis. Cui proxima fi-
 gura est, si in pedes procedat, cetera verò omnes (neque hæc admodum tuta
 est) præter naturam, & periculose existunt: vel dum caput in dextram vteri par-
 tem vel sinistram inclinat, aut altera, aut vtraq; manus (vt Aetius aduertit) exer-
 tur, aut crura intus inter sese diducunt. Fœtus verò, q; altero pede prorupit, al-
 tero intus detento, aut duplicati alicui parti vuluæ innituntur, periculosissimū B
 efficiunt partū, sicut ij, qui manus expansas habent. Qui uerò obliqui prodeunt:
 tripliciter id faciunt; aut enim in alterutrum latus, aut in ventrem prodeunt:
 sed tutius est in latus progredi: ita. n. obstetricis, manibus locus superest, vt in ca-
 put, aut in pedes nascentem dirigat. Tripliciter aut, inquit Aetius, duplicati so-
 lent fœtus: nam vel capite, & cruribus vel ventre, vel coxarum vertebis vtero
 incumbunt. Atq; hæc sunt omnes deprauatæ figuræ, quas in temporis præssura,
 q; citissimè cognoscere oportet, & intare, ne vel suffocetur, vel morbosus sup-
 sit fœtus, aut mater pereat. Præter quas omnes causas reperi, apud Hip. varijs epi-
 demiorum locis, eos partus esse difficiliore, quæ folias ferunt, & maximè quæ
 plures. Quod mille historijs testatum reperies, in quibus raro prospere solent
 fluere purgationes, ex quo mille accidunt mala, nam & venter in tumorem at-
 tollitur, & cruor ab ulcere erumpit, & difficiles respirationes, & alia vt expresse
 retulit Hipp. lib. de affect. sed clarius lib. 2. pop. p. 2. tex. 21. adducens historiam
 eius quæ filias gemellas pepereat. Varia quidem sunt, & omnino necessaria, quæ
 partum facilitare possunt. Cui sanè operi præmittenda quædam sunt, q; oibus C
 difficulter parientibus proficua esse comperimus: deinceps pro cuiusq; cæna
 tura, & varietate auxilia quoq; adscribam. Principio etenim mulier admonen-
 da est, vt ædificio perlucido aerem calidiusculum habente habitet, lætamq; &
 placidam vitam antea degat, ac somnus vigilia longior sit. Pinguibus et carnib.
 & thollientib. iusculis, ac oleribus vtatur: vina neq; generosa admodum, neq;
 dilutiora, alba, prædulcia potui dentur. Sese item mulier deambulatione, & le-
 ni cursu exerceat: ceterum hanc exercitationem faciet recta magis, q; flexuosa,
 & sub vmbra, non qui de intra parietes, aut in pratis, & viridarijs: finis sit cum
 modica lassitudine, q; defatigatione non attingat. Præterea enixuras eo tpe, quo
 partus instat, non esse multa alimentorum copia grauandas consulit ratio: neq;
 per id tempus varia alimenta, & crebra sunt adhibenda: distrahetur. n. calor ad
 confectionem alimenti, & minus intendet operi parturitionis. Item parturien-
 tes non protinus in sella locandæ sunt, sed obstetrices prius os vteri tangere de-
 bent, & cum paulò apertum non inueniunt, mox expectandum est, an tunc, vt
 surgat mulier iubere dēnt, moueaturq; parū, ac iterum in loco sibi apto sedeat.

Fa-

De labo-
rio par-
tu facili-
tando.

A Facilior item reddetur partus ex optimo parturientis situ: quinimo maxime id parturitioni conferre experimento comprobatum est, nam est ut iam diximus ad partum faciliorem necesse est, ut vulua dilateatur, id quod a parte anteriore, quam paucissimum fieri possit, superest ut caudæ os ad posticam partem extēdatur. Quo fit, ut si sedeat, eius dilatio omnino impediatur. Itaque si natibus innitatur, cum non possit retrocedere cauda, partus impeditur, si vero stent, non satis ad enixum viribus pollent, quæ in situs conuenientior sit, modo in anteriora se flectat. Quare manibus contra lectum, aut mensam, aut aliud quod vis innitatur oportet, ita ut sit sufficiens spatium pro obstetrice susceptura puerum, parturiens uero sustineatur a uiris fortioribus, sin minus decumbat, sed dorso tantum, ac cruribus innitatur in parte quidem paulo sublimiore positus, & apertis, ita ut manibus, pedibus, & dorso uehementer innitatur. Cui sanè renixui quod plurimum prodest respirationis cohibitiō, dummodo non retineatur in partibus superioribus. sed propulsio, & renixus fiat ad anum & uterum, velut ij faciunt, qui aluum exonerare nituntur, aut calamos inflant, & hæc est communis difficilis partus positura, alia necessaria sunt pro infantia nascentis situ.

B Alia est eōdem faciliandi partum ratio, quæ medicamentis, & perita, ac diligenter obstetrice perficitur, in cuius officio haudquaquam permittendū est, ut uolenter parturientium uterum dilanient, sed leniter placideque ipsius partes tractare consulito, quo facilius grandiori fœtui cedere possit, ac magis citra dolo-rem, dilatari, inuncta parte oleo dulci, sesamino, amygdalarum dulcium, vel liliorum, ac pinguedine anatis, & gallinæ cum mucilagine seminis lini, ex quibus hoc modo linimentum conficies, adipis anatis, olei liliorum alborum, & sesamini, an. ʒ. j. mucilaginis seminis citoniorum, seminis lini, summatum althææ, & seminis senu greci ʒ. j. & fiat linimentum. His quidem prouida obstetrix, uteri ostium, quod iam dehiscit pertingat, sensumque premendo minimum digitum immittat, subito iam (paulatim tamen) magis os dilatat, quod fatiscere perpendens, linimento de mucilagibus dicto uteri ceruicem, ut lubrica reddatur, quo facilius partus exiliat, uberrimè illinia, necnon & os ipsum sacrum, & totam caudæ regionem, quo facilius exeunti puero cedere possit. Quibus factis iterum gravidam in sede commodius locare oportet, atque ut prompte infantem pellere tentet, eidem blandis uerbis persuadere, ut Galienus 3. de facul. natu. c. 3. Ipsa autem obstetrix sedeat in humiliori loco, ut ite facillimè manus immittere possit, ac ex superioribus partibus infantem adducere. Quod si hæc prodesse non videant, fortibus easdem partes lenire oportet, ut & calore modico, & lenitate maiori partes promptius aperiantur. Hoc sanè præsidium conficies ex floribus chamæmali, & meliloti, ex floribus maluarum, bismaluarum, & uiolarum, ex semine cotoneorum, lini, & fœnugreci, ac radicibus liliorum alborum, quæ omnia cum ex aqua ad tertias deferbuerint, suscepto uapore, exinde abdominis imam partem, & caudam uti liter ea aqua spongia fovebis. Sed in iis, quæ difficulter parere assuescunt, tutum, & utilissimum mihi uidetur Hip. consilium, quo iubet sanguinem mittere prope partum, inquit enim lib. 1. de mor. mul. Si uero prægnans multo tempore cohibeatur, & parere non possit, sed diebus pluribus ea partus doloribus laboret sit autem iuuenis, in vigore, & multo sanguine referta, secare oportet uenas in malleolis, & sanguinem detrahare uirium respectu habito, & postea calida lau-

ri corticibus coctis lauato. Viticis aut semen, & dictarum creticum, vtrūq; pa-
 ri portione in vno albo, aut aqua bibendum dato. Quo facto, per aliquot ante
 partum dies, opus est etiam ex catinsmate vti, quod recipiat bis malua cum radi-
 cibus m. iij. malua, chamomilla, meliloti, apij ana m. ij. foliorum lauri, m. f. se-
 minis lini, & citoniorum ana. lib. f. fiat decoctum, in quo femina ante prandiu
 insideat. Verum in harum infussionum vsu, cenſeo ſatiuſ eſſe per dies aliquot
 ante partum, quam in ipſo parturitionis tempore, ne deieſte calore vires minu-
 partui ſufficiat, ni plurimum neceſſitas vrgeat. Partus quoq; difficultatem mul-
 cet eclegma, quod habet daſtylorum ʒ. iij. mucilaginis pſyllij, & ſeminis cito-
 niorum ana. ʒ. f. ſeminis pœoniae, cinnamomi ana ʒ. j. caſia lignea, croci ana. ʒ. f.
 pulveris pencedani obolum, oſſis de corde cerui g. vj. his contritis, ſacchari al-
 biſſimi ex aqua ſabinæ diſſoluti, quantum ſatis eſt ad ea mollienda atq; cogen-
 da adijciatur. Ego autem in horum trium auxiliorum adhibitione (nam balnea
 quæ plerique autores præcipiunt, non probo) ſemper obſeruo, vt diebus ſingu-
 lis ad partus vſq; diem vnum adhibeatur, ne omnibus modis puerum turbe-
 mus, ac totius ſeminæ humores exagitentur. In omni etiam partu citra cauſæ re-
 ſpectum ſi difficulter fiat, vtiliſſimum experimur dextro cruri alligare corallū, B
 lapidem aquilæ, ſtyracem, coriandrum viride, ſeu poligoni radicem. Referunt
 quoque non contemnendi autores prodeſſe accipitris ſeu falconis ſtercoris. ʒ. j.
 cum vino albo, aut aqua capillorum veneris: uel tātundē cinnamomi ſeu caſia.
 Proſiciuſ item maximē cenſetur pulvis, qui recipit ſimi accipitris, ʒ. j. cinnamo-
 mi, caſia ana. g. vj. croci g. iij. miſceantur, & cum pauco vino albo, vel aqua ci-
 trangulorum, aut adianti exhibitio. Interim tamen ſi difficilior fiat partus, caſſia
 rei ʒ. j. cinnamomi. g. iij. propinabis. Prodeſt, & phaſeolorum vel cicereum ru-
 brorum decoctum, vel decoctum ſœnugræci cum croco, & oleo amygdalarū
 dulcium, addita ʒ. j. trochiſcorum de myrrha. Confert quoque decoctum galli
 veteris cum modico caſia lignea, croci, & vini: vel ſuccus pori cum aqua tepi-
 da hauſtus, vel menthæ decoctum, aut ſuccus, vel thymi, vel leucovi ſicci deco-
 ctum, aut decoctum malua. Sic & inunctio pubis, vel ſub vmbilico facta cum
 oleo liliorum, mucaginæ ſeminis althææ ana ʒ. j. & ſmedullæ cerui. ʒ. j. Appen-
 ſus item iaſpis, radix ariſtolochiæ, cyclaminis pudendi oriſicio, aut femori allig-
 gata. Valet etiam hoc medicamento, quod recipit radicis graminis, petroſelini
 ana ʒ. j. artemiſiæ, nepetæ ana. p. f. ſeminis aniſi, & ſeniculi, ana. ʒ. j. fiat decoctum,
 cuius accipe ʒ. iij. & adde cinnamomi ʒ. j. caſia lignea. ʒ. ij. ſacchari. ʒ. j. Verū
 ſi hæc omnia adhuc prodeſſe non videantur, vereri eo tempore oportet, ne cau-
 ſa alicuius ex ijs, quas retulimus interuentu, & efficacia difficultas ſuboriatur.
 Quippe tunc temporis aduerſus ipſam pugnandum primò eſſe conſulit rei ra-
 tio. In qua curandi ratione aduerſiſſe oportet, ea omnia auxilia, quæ hucusque
 retulimus, communiter omnibus partibus eſſe proficiua, quæ verò propria cui-
 que ſunt iam referā, initio ſumpto à frigore, ſi malo cauſam præſtiterit. Multis
 compertum eſſe legimus, gtauidas mulieres, quæ ſaluiam manducarunt, pro-
 ſperè peperiffe: ſic tradunt lænas eam quærere, & manducare ad partus facili-
 tatē. Sed vteri ore conſtricto, craſſo frigidoq; prodeſſe ſciimus forus, qui conſi-
 ciuntur hac forma: excipe malua, biſmalua. an. m. j. ſeminis lini ʒ. iij. ariſtolochiæ
 lib. j. fiat decoctio in aqua, & oleo violarū, & camæmali, quibus fiat forus cum:
 ſpon-

De par-
 te facili-
 tando in
 xia cau-
 ſa ratio-
 nem.

ſi ex fri-
 gore.

A spongia, aut filtro. Post verò prædictas partes inungito linimēto, quod recipit mucilaginis fenugraci, & seminis lini, ana ꝑ. j. extrahatur cū vino albo, & adde aristolochiæ longæ & rotundæ, & clematis puluerizatæ, an. 3. ꝑ. styracis myrrhæ, styracis liquidæ, an. 3. ꝑ. propoleos. 3. ꝑ. olei amygdalarum dulcium, & liliorum alborum, an. 3. ꝑ. reducantur ad formam linimēti. Quibus etenim calidis actu & aliis, quæ superius retulimus, hydræleo & aliquo ex oleis calidis, aquas artemisiæ, fenugraci, & similib. partes dilatare, atq; calfacere opus est. Quod si speretur fetus emissio, abstineat oīno à cibo femina, sin aliter, assumat parū vini dulci aqua artemisiæ, vel aristolochiæ rotundæ, vel modicum panis intincti in vino hippocratis appellato: incredibili ē efficacia iuuat aqua cinnamomi cū modica aqua angelicæ, vel cardiacæ, itē & oleū cinnamomi eiusdem cū modico vino, ad oleū macis injectis tribus guttulis in coctile iuris, benefacit ē oleum gariophyllorū. Sed cum iterum dolores creuerint, ac puer apparere inceperit, tunc retento spiritu nouetur expellere, ac innitatur capite, & manibus, donec infans oriatur. Et si hæc prodesse non videantur, inungere iterum pudēdas partes pectinem, & os sacrum oportebit oleo sambucino, vel iasminorū, & summat eo tpe decoctum, quod recipiat corticum vtriusq; cassiæ, ana 3. ꝑ. cinnamomi 3. ꝑ. croci. 3. ꝑ. aquæ artemisiæ. 3. ꝑ. & fiat potio tepida. Præstat ē etundē vsum pessarium, quod recipit Hyssopi, radicis lilii, origani, calamenti, ana 3. ꝑ. terebinthi. 3. ꝑ. conuassentur, & fiat cum lana pessarium. Simile beneficiū præstat suffumigium ex stipite caulium, myrrha, & felle tauri.

Verum si ob immodicum calorem, qui vires exsoluat, pariedī difficultas oriatur, curandum est omni arte vires reficere, & spiritus præcauere quominus dissolutione pereant. Ob id quidem cibis & potionibus optimi, & facili nutrimentū vires reficere oportebit (sed maxime odoramentis, quæ ex alimentis spirant: nam alia vterum sursum euocant) dum eorum omnium quantitas modica sit: admixtis semper quæ vires habeant roborandi, & astringēdi, vt cidonij, malis punicis, & reliquis, quæ firmate vires possint, & quodammodo frigida sint, & dicta cinnamomi aqua vel eiusdem cinnamomi oleum vino sumptum, aut oleū gariophilorum. Arcet insuper animi deliquium panis vino, aut succo granatorum imbutus; Præterea quæ sic afficiuntur, in aere parū frigidiori degant, quarum facies spargenda est aqua rosacea frigida, & eadē aqua, & flabellatione aer temperandus est. Timidis, autem ac puellis mentis robur addendum; quem admodum eis, quæ dolorum in expertes sunt: rursus exhortāda, vt ualidissime spiritum comprimant, & ad inguina pellant. Quod si imbecilles ex morbo sint, cibis boni succi, ac potibus reficiendæ sunt, & alendæ bona partus spe, semotis animi affectionibus, quæ vires ab incepto munere distrahere nata sunt.

Intlāmationē, vlcus, tumore laxū, ac durū, vel aliud vteri vitium, si causam difficilis parturitionis præstare cōperias, curandum omni arte est, patres ita leniter, & blandē tractare, vt citra maximam dolorum exacerbationē partui cedāt: quod facies vnguētis, fqtibz, & pinguedinib. quæ id nata sunt efficere, quæ ha superius diximus. Verum si ob lumborum cauā ad interiora luxationē, auisiam pinguedinē pariendi difficultas cōrgerit: potissima facilitandi partus, stat in cōgruo parturientis situ. Ob id puerpera in sella prona flexis genibus collocetur, seu in lecto, ut uterus delabens cervicem rectam extendat, atq; idē ē dire-

Si ex calore, aut imbecillitate.

Si ex pinguedine, & alijs corpulentie causis.

è directo ostioli habeatur. Deinde ceratis oleis, ac pinguedine lenire oportet, & sensim digitis aperire: tandem mixtus procurandus est flexis genibus, & pro na existente quæ parit. Cui consimilem curatione adhibebis si os uteri, vel ceruix stricta admodum fuerint, tunc enim alui excrementa primitus mollienda pellendaq; sunt blandis clysteribus ex oleo amygdalarum dulciū, & iure. Caudam item inungere oportet prædictis vnguentis, & linimentis, quo facilius foetus cedere possit.

*Si nilio
membra
naturum
fiat.*

Si causa membranarum difficulter foemina pariat, considerabis, an ob crassitatem & soliditatem secunda, quæ rumpi nequit, difficultas suboriat. Tunc etenim Aetii consilio abrumperè ipsa oportet, aut obstetricis unguib. aut scalpello, quæ sanè res cautè agenda est, ne fœtui, aut matri graue aliquod malū subsequatur. Verum si tunicarum tenuitate nimia (in quibus humor continetur) difficilis fiat partus, quod humor in membranis contentus, ante debitum tempus effluerit, ita ut uteri supersint resiccati, eis albumina ouorum cum malua, aut fœnugræci decocto excolato, vel cum prisanæ cremore regido infundantur eiusdem Aetii decreto, vel pudendum, & uteri cerutem, inunges oleis, aut lini mentis prædictis, quo mollior, & humectior fiat locus.

*Si ex
praua
fœtus fi-
gura.*

Fit cunctis partibus difficilioris, in quo fœtus praua aliqua affectus figura, perumpere tentat. In quo sanè casu multa fieri, & considerare docet Hip. li. de nat. pue. dicens. Quicumque uerò duplicati complicantur, & in osculo uerorū incumbunt, eos siue uiui fuerint, siue mortui, rursus retro protrusos uertere oportet, quo secundum naturam in caput exeant. Cum autem retrudere uoles, aut uertere supinæ ipsæ reclinatæ molle quoddā sub coxas sustinere uoles, aut uertere pedes, quo altiores sint hi, à pedibus, semper aliquid apponere, sed & coxæ altiores capite sint, & ut nullū cervical sub capite, si prouidero. Cū uerò retusus fuerit fœtus, & hinc atq; hinc euoluitur, & secundum naturā constituitur, quicquid sub lecti pedes supposuisti, ac lapides, & quod sub coxas subdidisti, subtrahito. Quicūq; uerò fœtus uiui manū, sicut cruris foras præmittunt, aut etiambo eas oportet q̄ celerrimè, ubi exitum significauerint, prædicto modo intro retrudere, & in caput uertere, & ad uiam reducere: quicumque fœtus complicantur ad lateris mollitudinem, aut coxam in partu prolapsi, eos diligere oportet ac uertere, & in aquā calidā desidere facere, donec mulier refocilletur. Hæc quidem uolui ad hunc locum adducere, ut admonuisse uidear tum medicos ipsos, quorum iure est maximè obstetricum imperitiā, quantum datur, aperire, & eas disciplina corrigere, ac ut moneā et quanta diligentia opus sit, ut difficilem partum prædicamus, si ex deprauata fœtus figura fiat. Quamobrem considerandum est, qua diligentia opus sit ad extractionem fœtus, & quibus medicamentis, ac ingeniis id fieri expediat. Primum igitur, si propter deprauatam figuram partus difficilis fiat: tribus omnino modis ipsum præcauere oportet, situ nimirum parturientis, & infantis: secundo quæ medicamentis, quæ fœtum, utcumque sit, expellant; tertio uerò & ultimo facta aliqua continui solutione, vel operatione manuali, ne uterq; pereat. Itaque si prædictis signis partum esse difficilem compertiamus, parturiens competenter in lecto locanda est, ut altū habeat corpus, ac si in priorem partem ab orificio uteri fœtus infixus est, supina est collocanda: si in sinistru, in dextrum cubet. Si uerò matris positura infantis situm corrigere non possit:

A possunt tunc diligenter vnguibz in scillis, & oleo inunctis, ac in vnum cōductis digitis, sinistra manus in orificium vteri immitti debet, introq; paulatim, ac sensim fetum pellere opus est, & si caput proximum est, ipsum componat, & adducat. Si verò ambæ manus apparuerint, duob. humeris eius manus suas ex vtraq; parte infigens, retrorsum eum reuocet, vt superius dictum est, manibus ad latera compositis, & apprehenso capite, adductoq; foras paulatim, & leuiter. Verū si infans caput interius habuerit, inq; duas manus eiecerit, oportet obstetricē prius immittā manu caput ad orificium alligere, & comprehensis manibus instantis coronari oportet, ne caput eius orificiū vteri obtureet: sed inunctio vteri osculo, quò facilius quā manus exhibent, totum corpus prorumpat. Quod si ne his quidem situm acceperit convenientem, tunc pedibus mulieris comprehensis, ipsam concutito vehementer, & paulatim, hypochondria composito, donec aliam representare figuram comperias. Idem quoq; præceptum obseruandum est, si altera manus exierit. Verū si supinus prodeat puer, manibus super collū extensis, tunc quidem manibus oportet puerum euoluere paulatim, quo facto, vel iterum infante propulso, respiratione cohibita, & vtero p̄dictis inuncto, ipsam inniti plurimum iube. Obseruandū insuper in p̄dictis reductionibz est, ne manus, aut brachia pueri plurimū tractemus, ne fortē exarticulāri cōtingat: sed innitentes super humeros pueri, intro pellere ipsum oportet. Sic quidē si alterū aut vtrūq; pedē immiserit, manib. obstetricis inguinib. pueri affixis, ipsum intro reducere opus est. At si coxas vsq; foras misisse cōperiamus, sternutamentū mouere conuenit, & ipsam verbis exortari, vt plurimū innitatus: sin aliter (ut dictū est) intro pellere, & vteri osculū inungere, ac fomētis emollire, & pessariū ex myrrha apponere quo facto, compressa respiratione, & manibus cōpresso ē ventre, ipsam inniti plurimū, iubeto. Cui cōsimilē diligentia adhibebis, si sup genua, latus aut quāvis aliā partē procubuerit, vel cōplicatus exierit pedibus capiti adiunctis. Ois itaq; cura habenda est, vt Hip. consiliū lib. i. de mor. mu. de reducendo fetu ad partem internā: nā proprio, & nativo excundi conatu contingit non rarō, sua sponte optimā nācisci figurā. Quod si hæc satis esse nō videantur, medicamentis curandum est partū iuuare: sunt autē hæc varia, nam qdā ex vī propria partus propellunt, qdā verò ex ocula proprietate. Sic emollitis primò partibus pudendis, & ventre dum res in periculo est, & alijs auxilijs partū facilitare nequimus, exhibere oportet cinnamomi ʒ. sabinæ ʒ. j. cōficiat cū melle, & cū vino parturienti p̄beat. Eiusdem vsus est potus hoc forma confectus: excipe aristolochiæ, myrrhæ, piperis. ana ʒ. s. cū vino aromatis condito, bibat. Præstat, et peucedani puluis cum ouo sorbili exhibitus: item betonicæ, scobes cum aqua mulsa: cinnamomi ē, castorei, myrrhæ, styracis, sabinæ, singulorū g. x. ex melle vtiliter lingitur, absorta insuper aqua cinnamomi. Prodest, & singulis horis abforbere croci. g. x. cum modico vino albo: itē anguium senecta lūbis alligata: de coctum adiantū in hydromelite cū oleo sambuci: nidus hirū dinis ablutus aqua calida, & ipsa aqua exhibita q̄titate. iij. ʒ. suffumigiū itē ex ungula muli. Cōterunt quoq; pilule q̄ recipiūt cinnamomi, castorei ligni, cimini, aristolochiæ, myrrhæ, costi, ana ʒ. iij. styracis, rubæ ana ʒ. ij. sabinæ ʒ. ij. & s. opij. g. viij. fiant pilule, cuius q̄titas sit ʒ. ʒ. Idē proculdubio p̄stat beneficiū medicamentū, qd cōficit ex myrrha, oppoanace galbano, sinapi. ā. ʒ. j. itē ex assa. cōfice bolos cū aqua rutæ, &

Hh

por-

porrige. ʒ. j. cū aqua decoctionis dactylorum, idē valet decoctū dactylorū cū croco & fenugreco, sic & cortex castæ, antrasura eboris cū vino. Sic p̄stat non parū illud medicamentū, quod recipit fabinæ. ʒ. iij. ruta. ʒ. ij. cicuta ʒ. j. hyssopi, cinnamomi, ruber tinctorū, ana ʒ. iij. fiant pilulæ, quorū porrigere poteris ʒ. j. aut ʒ. .i. cū decocto fabinæ. Valet itē suffumigium ex stercore vaccæ, & pessariū, quod recipit myrrhæ, ellebori nigri, opopanacis, fellis tauri, ana partes equales terantur, & fiant pessaria longiuscula. Plura aut̄ alia reperies c. de fetu mortuo, & de secunda relicta: inter quæ non sunt minoris momenti emplastra & cerata, & cucurbita ossi sacro adhibita. In oī tñ partu, cauendum est ab his, q̄ vel maximā inferūt violentiā, vel vterum nimis propellere possunt, maximē si mulier talis sit, q̄ leuī occasione vterus extra laxari, aut prominere possit. Cui quidem, consulendum est, vt pariat decumbens in lecto, ac supina, quod infortunium præcauebis, ad anū imposito panno, in modū pillæ ob lōgæ, quæ fortiter in quo liber conatu obsterix cōprimat. Sed ferunt a proprietate prodesse, si acetes a brachio ad femur transferat̄ itē hio squami radicē, si femori sinistro alligēs. Pulgiū quoq; & artemisiā tritā, & super ventrē positā: sic iaspide sinistro cruri alligatū, sinaragdū, corallū, radicē ocymi, polipodiū cōtritū pedū plantis alligatū radices et aristolechiæ viriūq; p̄sertim longe, multis prodesse credit, & anagyris et femori adhibita, sed oībus prodesse cōp̄tio hautū olei amygdalarū dulciū. Pulpā itē colocintidis cū succo ruta emplastri modo in vniuersa vētris regione partū accelerare fert Aui. cuius sanē cēsus alia reperies c. de fetu mortuo.

Verū licet hæc oīa prodesse nō videantur, ad crudele illud, & inhumanū chirurgiæ opus, quo viuus dissecat̄ puer, dictu profecto horrendū, cōfugiendum nunq̄ est: etiam si ex Aui. Actii, & Moschionis cōsilio, fieri posse cōstet, quod nō liceat Christiano vnū interficere, vitæ alterius gratia. Præter q̄ quod multi citra oēm expectationē, saluantur. Sed implorata Dñi nostri Iesu Christi misericordia, intercessione Beatiss. Virg. Mariæ, & oīum sanctorū, distisq; Euāgeliis, & positis Sanctorū reliquiis, & Agnus Dei, iterum ad tutiora fetui, & matri auxilia, redeundū esse arbitror, & iterū tentanda, q̄ antea diximus, vel alia denuo experiunda: cuius census est, quod recipit corticū castæ fistulæ ʒ. iij. bulliant in uino albo tenui, ad medietatē, cūsus citatum unum cū iure cicerum, & ʒ. j. cinnamomi porriges. Præstat & ʒ. .i. opobalsami in uino tepido sumpta, licet nō desint, qui sterilitatē in posterum ex hoc medicamento uereantur. Quibus factis, bibat parturiens lactis mulieribus haustū, gratia cōpescendi acrimoniā prædictorū medicamentorum, interim tñ in interm, ut consiliū Aui. lubricantia, & cerotaria subtilia, & mucilagines infundes, & adipēs liquefactos, & albumē obi, & vitellū eius. Vtemur et sequenti clysmate, per syringam, aut cannā infuso. Excipe lactis vaccæ ʒ. iij. pinguedinis porcinae ʒ. .i. inuccaginis lini, & radicis altheæ, ana ʒ. ij. misce. Quibus factis, tentet iterum diligens obstetrix, aut peritus chirurgus dexteritate, & vī illata, puerum euellere, nitens & omni arte studens puerum extrahere viuū, licet sit cū periculo aliquo deformitatis, vel q̄ mancus supersit, imbecillus, aut utcuq; læsus, cauens diligenter ne uoluntariē ipsum interficiat, nā si malum aliquod illi hac ratione succrescat, lenius est. Curandū tñ primo, ut sacri baptismatis, q̄ puerulus recipiat, & postea, citra vitæ euidens periculum, ipsum extrahere tentabis, rum manibus, tū verò me-

dica-

Adicamentis, & alijs auxilijs. Interim aut vires parturientis omni arte reficere oportet, & pueri umbilicum non refecare, donec uel mingat, uel ploret, aut aliquomodo ex labore partus reficiatur, quod Hip. docuerat lib. de superfeta.

BSi forte cōtingerit matrē in partu periclitari fetu intus uiuo superstitē, quod ex motib. & subfultationib. infantis conijcies, tunc demū posthabita matris cura, eius tantū habenda est. Principio igitur conuenit morientis os & genitalia patentia adseruare, ut p ea uitale spiritū & anhelitū recipere possit. Deinde hypochondriū sinistrū sectione in trāuersum facta incidimus, dextrū quidē latus nō ita liberū, pp subiectū hepar, ingressum incidenti præbet. Ceterū leuiter iātū nec profundē incisio hæc ducēda est, ita ut peritonæū non penetraret, ne ab intestinis actio præpediatur. Sed facto primo foramine, peritonæū leui foramine aperire oportet, ac missis sinistra manus digitis, sensim toti manū immitteremus ad uterū, & in testina paulatim attolentes, tunc leui scalpello, & leuiori scissura uterū abrumperē opus erit: nā aliter periculum esset, ne penetratis uteri tunis, infans scalpelli cuspidē laederetur. Porro ubi iā eximendi tempus prospexerimus, ita excipiemus, ut eius spina toti palmæ nostræ incūbat; cauendū tamen est, ne aut pedib. aut brachijs, aut thorace, aut capite, aut ventre cōprehendam⁹: id enim sine periculo vix fieri potest. Quod si geminos portet eadē diligentia utendū est, ac si alter mortuum esset, primo uiuum extraheturi mortuus in ostio lo, & ad manum fuerit. Sic nati Cæsares dicuntur, ut Publius Scipio.

De secunda rel. l. i.

Cap.

4.

Studens natura fetum in lucem edere, minori, quo possit labore ipsū ante partum a vestimentis illis, seu inuolucris, quæ ipsam illi præstitisse melioris gratia antea diximus, maxima diligentia exuere curat, ut solus, & oīno nudus in lucē prodeat, nisi aliquā tunicula quadam coopertum emitas, ut suo loco dictum est. Excusso igitur inuolucro, id intus manere necessum est, quod sanē non minores labores, ac dolores, & pericula inferre habet, q̄ fetus ipse, nisi conatu, & diligentia præueniatur, ne diutius in utero maneat. Fetu porro excusso, frequenter accidit, ut secunda in utero firmiter adhærescat, pendensq; ab ea puer per umbilicare vas: quod ubi euenit, tunc interdum os uteri apertum, interdum clausum reperitur, secundaq; ipsa nō nunquam uteri fundo adhuc coniuncta, nonnunquam seiuncta existit. Est itaq; secunda mēbrana quæ dā ex ips, quæ fetū inuoluunt, quæ ueluti radicatio multorū uasorū est, q̄ radicationem præci autores corion nuncupant. Quod sanē nil aliud est, q̄ uasorum multitudo membrana tenui connexorū, quæ haud facildē numerare queas Gal. autore 1. 5. de usu par. c. 5. Quod et alijs nominibus insignitum reperies, ut liquet cōm. apho. 49. lib. 5. & ex Paulo quoq; lib. 6. c. 7. Latini quidē secundā, & secundas nominare solent, q̄ uelut secundum domicilium, ac receptaculum sit, & factus indumentum, ut Aetius inquit. Quæ mēbrana quoniam ex umbilico pueri pendet, & umbilicus postremus ab uteris exit (quippe si prior exiret, non accederet per ipsum puero nuttimentū) propterea fetū excusso, foras prodire necesse est, in naturali partu. Sed quoniam cōtingit interdum fixu in lucem edito, ipsam præter naturam detineri, sit ut in eius retentione uteris quodammodo afficiatur morbo in numero ab ea succrescente. Ve-

Hh 2 rum

rum cum detinetur, vel fundo vteri adhuc conexa est, aut liget seiuncta fuerit, A
 in circa aliq̃ vteri partem, instar pilæ, conuoluta existit, atq; si os vteri ductū
 fuerit, & secunda, quæ inibi relicta, est alicui parti vteri orbiculatim conuolu-
 ta inhaerit, facile educitur manu sinistra, calida, pinguiq; aliqua illita substan-
 tia infunduntq; immissa. Si aut fundo vteri sit cōnexa, demissa simili mō manu
 trahenda est: non tñ in rectum, ne vterus procidat, neq; violenter admodū, sed
 leniter ac placide, primum in vmbilicum diducemus huc atq; illuc circū agen-
 tes, deinde paulò validiùs attrahemus: hoc. n. pacto solvuntur, & a connexo tra-
 heuntur. Quod si vuluæ osculum clausum fuerit, perfusionibus vtendum est, & fo-
 mentis ætu calidis: postmodū digitis sinistrae manus leniter aperire, ac paula-
 tim dilatare est conandū. Cæterū si, ne his quidē prolabi cōtingerit, & rē: maius
 periculum puero, & matrimoniarī cōperiamus, minimè vmbilicū, resecare oportet,
 ne postea difficilior fiat secunda exitus: sed tunc retentionis cā inquirenda
 est. Verū si quis rē hanc diligentius pensitet, p̃ter has oēs secunda retentiones,
 reperiet potissimam cū huic malo præstare, qđ Hip. li. 1. de mor. mul. per hæc
 verba dixerat. Si mulieri secunda in vteris relicta fuerit, hoc si contingit, si per
 vim ruptus fuerit vmbilicus, aut ab obstetrice vmbilico seca per imperitiam re-
 sectus: quæ videlicet vmbilicū pueri prius incidit, anteq̃ secūda ex vtero existi-
 set, & vteri sursum retrahunt secūda, vt pote lubricā, & diffusā, & in se ipsis
 detinēt. Præter hanc cām, alias nō paucas reperies, inter quas, potissimū obduēt
 locū aīæ pathemata: itē odoramēta narib. admota: vel si vterus ocysimè à partu
 claudatur: potus aque frigidæ, ac deniq; oīa, q̃ subito casu puerperæ acciderint.

Quā verò grane & periculosū sit, sedam nō p̃tinus exire Hip. ipse retulit li. j.
 de mor. mul. dicens: Si mulieri seca relicta fuerit, si non ampli fuerint vteri, pur-
 gatio ipsa minus q̃ oportet p̃cedit, & venter durus fit, ac magnus, & febris acu-
 ta & dolor p̃ totū corpus & ventris, maxime partē eā, q̃ est infra vmbilicu n, &
 grauitas fit in vteris, & tormen velut fœtus insit, & corata, secūda breui eijcit
 putrefactā, & sana enadit. Præter q̃ p̃fectō mala nō raro accidit fœminis ipsis
 suffocatio, & ex putrefactione, vel febris, vel graue aliqd malū ocysimè succre-
 sci. Cuius ēt mali meminerat quoq; Hip. li. 2. pop. tex. 18. de coriarii uxore uer-
 ba faciens, cui secundinæ pars in utero relicta fuit, q̃ stranguriā, p̃moberet. Ve-
 rū q̃a frequentissimā retētionis huius cām, vmbilici intēpestiuā resectione esse
 protulit Hip. ob id pauca quædam hoc in loco de vmbilici sectione referam.

De um-
 bilici se-
 ctione.

Est quidē, ut ferūt, apud germanas fēminas mos, statim vmbilicū resecare, &
 medicamentis secundas conari educere: edoctæ fortasse a medicis, quos decepe-
 rat Arist. lib. 7. de hist. ani. c. 10. dicens: Cum aut inuolucra non fuerint simul e-
 gressa, sed intus permanferint, puero foris existente, ligato vmbilico resecanda
 sunt. Sed meliori multò prouidentia nos vsos esse censebimus, si sedulo, pcura-
 verimus, quo modo sine inuolucris fœtus neutiq̃ emerferit: quod ut fiat cōmo-
 dius, non sunt ab vmbilico secanda, interea dū intus perseverant, sed potius co-
 nandum est quemadmodū perpetua sint, & fœtui maneant cōiuncta. Quā sanè
 doctrinam adduxerat Hip. lib. de superfetatione dicens. Cæterum si secundinæ
 haud faciliè exciderint, sinend. ṽ sunt, maximè ad fœtum appendere: curandū est
 potius, ut absq; violentia vlla trahantur paulatim, tum alijs modis, tū maximè
 si in sella ventri exonerando destinata, sede iubeatur, quo pendens fœtus graui-
 tate

A rate sua secundas secum afferat. Atq; vt hoc fiat, sensim ventrem subijci liquore parum calido plenū imperat, superq; fœtū locat: deinceps verò punctus venter mucrone tenuissimo, cunctanter admodum concidit in seipsum, ac vnā fœtum, & q̄ ab eo pendeant inuolucra deorsum trahit. Quam quoq; fuisse Hip. sententiam li. i. de mor. mul. demonstratur hisce verbis; Si mulieri secundæ relictae fuerint, hoc fit, aut per vim rupto vmbilico, aut per imperitiam ab obstetrice resecto, quæ prius incidit vmbilicum, q̄ secundæ ex vteris exierint. Haudquāq; igitur arbitror expedire, vt vmbilicus dissecetur à secundis, antequam illa prodierint: quin potius vtcunq; factam resectionem, potissimā censeat causam perimāfioni secundarum in vtero. Quamobrem p̄dictis auxilijs conandum est, secundas extrahere, qd si profuisse non videantur, ad maiora perueniendum est, de quo rum sorte, vt ex Hip. constat, sternutamentum est. Cuius naturam, & efficaciam simul, ac tussis in propellendis secundis, nonnulla hic scribere æquum esse dixi; si prius dixerō q̄to tpe ad summum immorandum est ante, q̄ vmbilicum rescēmus: nam si diutius differamus, puer periclitabitur, aut morbosus euadet, ac rursus si citò abscindimus, p̄dictum periculum matri aduenire sperandū.

B Ob id quidem tentatis remedijs si nihil comperiamus profuisse, vmbilicum rescare opus erit, & ipsius caudicē fœmori parturientis vehementer alligare, quominus fugere, ac in fundum commeare possint secundæ: (spatiū autē ad summū sit quatuor aut quinq; horarū. Verū si vmbilici vasa mucore plena apparuerint) p̄ter q̄ puerum fortasse periclitari, aut morbosum fore mōstrat) citius rescare vmbilicum oportebit, & sicciōra medicamenta apponere, quæ ocysimè rescēnt quod pituitosum, & frigidum in illis partib. supererit. Primo considerandum est, an incuria obstetricis, vel alia occasione secunda intro se receperit, & an ab vtero separata sit, aut alicui parti affixa. Tunc quidē ante aliud auxiliū, sinistra manū oleo liliorū alborū, aut dialthee illatē, in profundū vteri obstetrix immittat, & capū secundā, leuiter alliciat, q̄ si in eius extractione, plurimū sanguinis fluat, laudatur Karabe puluerizati. 3. j. in vino q̄ vrinas, moueat, secundas pellat, & sanguinē fluentē sistat. P̄terea de numero eorū auxiliorū, q̄ ad secundarū propulsione plurimū valere cōperimus, vnū porrò sternutatio est, vt millies experimēto facillimo cōfirmari cōstat. Est sanē sternutatio instituta ad propellendā cū molestia, q̄ p̄cipitur in ventriculis anteriorib. cerebri, vnde cūq; molestia illa prodeat, seu ex naribus, seu palato, seu capite ipso, q̄q̄ & ab oculis quoq; contingat: vnde Solē inspiciendo, sternutamentū excitamus. Eodem ēt omnino mō, tussis ad eiiciendā cām, q̄ in pulmone p̄ter naturā inest, conducit. Conueniunt autē in hoc ambæ actiones, q̄ prius extenduntur cerebri ventriculi ante sternutamentum, pulmo verò ante tussim: itē qd in vtraq; membra aerem ad se trahunt: quo fit, vt neq; tussis, neq; sternutamentum fieri possint, nisi post inspirationē; P̄terea conueniunt, q̄ in vtriq; post aeris attractionē, mēbrum celeriter, ac vehementer constringitur: itē q̄ eiiciatur ex ea contractio ne aer per canalē, & quicqd intermediū est, profilit, & cū sono. Quib. etenim p̄missis: videndum est, qua rōne relictis secundis, sternutatio, & tussis prodesse possint: sed videndū prius erit, in quo hi duo motus differāt. Differunt maximē tussis, & sternutatio, q̄ in hac aer trahatur bisariam ad cerebrū, exterius nimirū ab ambiente per nares, & intus per palatū ex pulmone: tussis autem ex sola af-

*Curā de
tussio.*

Hh 3 pera

pera arteria aerem haurit. Pariter in extrudendo idem est discrimen: per tussim **A**
 enim solum per asperam arteriam spiritus effertur, & materia: at in sternutatio
 ne materia solum per nares, spiritus autem, & per palatū, & per nares: licet mul
 ta, quæ in oris partibus sunt, ratione vicini motus, per eam partem quoq; impe
 tu pellat. Causa huius est, quod qui defertur per palatum, minore cum impe
 tu exit, quia locus apertior est, nec retinetur: at per nares eliditur vehementer
 ob angustiam meatuum, unde et ingens ille sonus exauditur. Differt à tussi, q̃
 in sternutatione nares concutiuntur, maximè, pectus valde parum: in tussi autē
 pectus, nares autem minimum, aut nihil. Haftenus de modo, quo hi duo motus
 fiunt, nunc verò, quò quæ in vtero sunt, propellant, videndum. Primò quidem
 præmittendum est, q̃ in sternutatione mediae partes corporis comprimuntur,
 & extremæ exprimuntur. Sic. n. in sternutamēto ex medio cpe spiritus affatim fer
 tur, & media corporis pars affatim cōprimitur: hinc evenit profectò, vt ea, quæ
 in infimis partibus insident, aut supernis, vtraq; vehementer exprimantur, etiā
 ea, quæ minutissima sunt, sic expurgantur, ob id ergo mirandum non est, quòd
 ad secundas expellendas vehementer conducatur. Compendio autem id faciet, si **B**
 quis prius nares, & os constringat, nam quò spiritus diutius, & angustius con
 cluditur eo vehementius erumpit. Qua etiam de causa pueri experientia docti,
 si quid oculis infederit id ipsum protinus excernunt, nares, & os quoq; prius
 comprehendentes. Palam. n. est, ore & naribus apprehensis, protrudi totū aerē
 per palatum, qui ex palato deferri potest ad gulam, & intestina per ventriculū,
 quo etiam intestina, & vterum comprimēte, certum est summopere iuuare. At
 dum truditur aer in sternutatione ad pulmones, & eius per eorum bronchia,
 & septum transversum allidit, contrahuntur interni, vt quisq; experitur in se,
 muscoli longi ventris, & septum transversum collidit intestina compressa, iā
 facto brevior ventris: illa verò cū sint super vtero, è regione illum cōcutiunt
 fitq; non solum propulsio hoc modo, quod parum esset, sed tremulus ille mo
 tus, quo et ex arboribus fructus decidunt, atq; ita laxantur vincula secundarū
 à placentula, & fētus descendit quasi in lubrico. Aer præterea, qui sub septo trās
 verso est, concutit etiam vterum, atq; ex hoc tremulo ictu contingit etiam, vt
 materiae, quæ in aspera arteria sunt, melius quàm per tussim euellantur ab illa: **C**
 ita vt nonnulli, cū nō possunt plenè euellere infarta, sternutatione cum tussi cō
 citata, compotes voti facti sint: licet id ex accidenti strenutationi accidat, vt nup
 dixeram. Quamobrem in præsentī affectu experimentum sæpe docuit id reme
 dium esse præstantissimum, maximè cum opus sit breuiter remedijs vtī, ne mu
 lieres interim putrefactis secundis febres, deliria, capitis dolores, tremiores, &
 animi deliquia patiantur, vt Hip. scripsit.

Principium itaq; curationis auspicaueris ab odoribus fetidis naribus, & ore
 inspiratis, qui & vterum deorsum fungant, & sternutamenta mouent. Sic confe
 stim spiritus detineatur, ac nares, & os obturentur, maximè si imbecillæ mulie
 res non fuerint: & cum circa pectinem dolores, & pondus perferuntur, excla
 mare feminam iube, aliquñ spiritum cohibere inferius comprimendo, ac sternu
 tando: & super ventrem manu vehementer posita, vterum inferius ducito. Si tñ
 vmbilicū refecare ob ingētem necessitatem, & ne fētus pereat, cogaris: ab ex
 cisione semper vno pede retrò saliendo incedat femina oportet. Verum si his ad
 huc

A huc factis, secundæ non cedant, verendū est, ne vterō alligatæ super sint, id sanè deprehendes, qđ ante tempus puer emissus fuerit, idq; citra magnos dolores. Nā cruciatus & labores, qui præcedunt partum, sunt proculdubio, dū rum puntur venæ & arteriæ cotylidonibus vteri alligatæ, ob id quidē si dolor non præcesserit, coniectandum est fractum tantum fuisse secundam, & vterō adhærescentem remanere. Quo tpe manu comprehendenda est, aut vinculo & leuiter in obliquum hac, & illac abertentes trahenda, ne in partes dissecetur, maximè quidem cum diuini retenta fuerit. Quod si ita tenaciter adhæreat, quod vnguentibus extrahi non possit, immitti medicamenta suppurantia autores iubent, vt eis dem putrefacta sensim expellatur a natura. Fieri. n. potest, vt in ea parte putrescat, & sensim excernatur, quod magis esse tutum arbitror. Verum si id fors tulerit, cautè facies, & subinde necesse erit per intervalla iniicere ea, quæ vim habent detergendi, quod putrefactum est. Cui malo ex vsu erit vnguentum basilicon in multo oleo liliorum, vel amygdalarum dulcium dissolutum, vel in decocto, quod recipit radicum maluarum, & violarum, ana ʒ. ij. radice aristolochiæ longæ, & rotundæ ʒ. j. seminis lini, & fenugreci, ana ʒ. i. florū chamemali, & centauri minoris, ana p. ij. fiat decoctum ex aqua, & oleo, & in eo dissolue vnguentum basilicon, vel modicum vnguenti aegyptiaci.

B Oportet insuper si strenuamentis res nō cesserit, vterius remediis progredi tanq̃ in re, q̃ maximam prærequirit diligentiam, qua in re sic loquitur H. p. li. j. de mor. mul. Quum mulier peperit, & a secunda non fuerit liberata, præstat dare ea, a quibus maximè purgantur puerperii purgamenta: allia cocta, aut assa vino, & oleo cum polypis, & sepiolis super prunas tostis. Castoreum verò, aut nardum bibat: bibat et rutam in vino nigro dulci ieiuna, aut sine vino: si vero vinum non fuerit dulce, melius est vel admiscere. Edat et braslicam coctam cum ruta, & mercuriali, & semen aliquod utero commodum bibat. Ac subdit idem autor eodē lib. Et sambuci foliorū decocto prius fomentum adhibeto, & id, qđ ex cantharide fit, apponito. Sed placent magis, qđ ad puerperium ea parte recitaret, quippe cantharides partē exulcerant, ac erodunt. Anguis refert senectā præstare tribus obolis vino exhibitam, itē myrti baccas decoctas, & p dies quatuor decoctū ingestū, vel farniculi radicē vino, oleo, & melle feruefactā, & erotā.

C Item paulò inferius ad secundam frigore emortuam, hæc refert. Quam a frigore mortificata computruerit, vbi ventris frigus fuerit, crocum leuiter tritum ʒ. j. pondere cum adipe anserino infundito, & plurimum tempus finito. Ad idem etiam & sanguinem retentum eodem loco, suffumigium ex foliis salicis pbat. Præterea lib. de nat. mu. sic ad eandem affectionem refert. Si secundæ decedere non possint, conyzam tritā lana exceptam ponito. Sed plura alia adducit ad pelendas secundas, & sortum mortuū eodē loco, dicens: Viola, & portulacæ semē contundito, & admisceto, & vino albo veteri exhibeto: pterea leucoyi nigri radicem in vino eodem modo sumat. Anchusæ foliorum p. ij. in vino albo equali aqua admixta, potui dato. Braslicæ & porri succū ad vtrunq; succi sylphii obolis tribus admixtis ex vino albo cum pari aqua bibendum dato. Fragini grana decem in vino bibenda dato. Mercurialis folia, & semen in vino bibenda præbeto. Quo equidem loco pleraq; alia reperies auxilia non solum potu sumenda, sed per subductionem: quale est illud, quod conficitur ex folijs mercurialis

Hh 4 lis

lis pessarij forma adhibitis item artemisiæ trita, & vnguento rosaceo admixta. A
 Salvia præterea hortensis bibita vel supposita, vterum purgat, & secundas à par-
 tu remorantes reducit, necnon cunctantes fetus excludit. Idem beneficiū præ-
 stat succus borraginis, porrorum, & petroselini cum vino vel olco amygdala-
 rum dulcium, maximè si addideris suffitum ex cornibus, & vnguibus capræ. Itē
 decoctum seminis thymi, vel pessus ex laudula: vel semen lilij hortensis tri-
 tum exhibitum cum vino albo. Fetus insuper ex decocto foliorum, & radicum
 eiusdem lilij: præterea iris pessus, aut emplastro admota. Sed facilius parabis al-
 bam radicē vnguento albo subactam ex Hip. decreto, & pœoniæ radicem cū eo
 dē vnguento. Præter hæc autem Hip. p̄sidia, ego etiam referam, quæ mihi vsui
 vtiliora, & multis probata videntur: cuius census est potio, quæ recipit, artemi-
 siæ p. j. sabinæ 3. j. fiat decoctio in aqua, & lib. s. decoctionis adde vini albi 3. iij.
 cinnamomi. 3. j. & si citra febrem sit laborans, modicum sumat: itē in prædicta
 decoctione dissoluantur 3. ij. trochiscorum de myrrha. Valet et decoctum, vel
 aqua fabarum instillata, vel aqua florū croci, quam credimus esse maximi vsus. B
 Item panacis semen vino epotum, appositumq; cū melle: sic & eius radices ap-
 positæ secundas extrahunt. Polemonia ex vino epota: cœtauri maioris radix der-
 rasa, & epota: cui quoq; operi præcipua vis inest dictamo, vt mortuos, & trans-
 uersos et partus, ac secundas deiiciat: bibitur ex aqua foliorum obolus, nec po-
 tu tm̄, sed illitu, & suffitu prodest. Aristolochiæ et longæ radix cruri apposita,
 vel epota: artemisiæ radix, radix eringii, leporis coagulum, illitum quoq; cum
 porri succo, & croco. Præstat & succus artemisiæ bibitus, vel succus politrici,
 marrubij, & pulegij: puluis quoq; lumbricorum terrestrium: tandem conferūt
 oīa, q̄ mēses mouent, nisi maximus fuerit sanguinis fluxus. Arabes aut antiquio-
 res probarunt plurimum præsidium, q̄ recipit sabinæ, aristolochiæ, acori par-
 tes æquales, fricata melle excipito, q̄titas esto 3. j. ex lupinorum, & mēastri de-
 cocto. Aliud item parabis, q̄ recipit opopanacis, galbani, fellis bouis ana 3. j. ca-
 storei 3. s. detur cum prædicto decocto, si maximo in periculo exstiterit femina.
 Item prodest lupinorum, sabinæ ana 3. j. myrrhæ, opoponacis ana 3. s. castorei,
 g. x. in minutissimum puluerem redacta potui dato 3. i. cum brassicæ, & pulegij
 decocto. Conferunt quoq; huic vsui suffumigia ex fimo equi arido, columbo-
 rum, aut aquilæ, vel ex semine porri, vrticæ minoris, alio pini resina, elleboro C
 albo, aristolochiæ, nigella, aut ex prædictis sic suffumigium conficito: recipe ru-
 tam, prassium, & abrotanum simul conquassata cum oleo liliorum, quæ bul-
 liant parum simul, ac postea super ignem posita, suffumigiū excipe. Ex vsu quo-
 que est suffitus aromatum, velut est casia, nardus, flos iunci odorati, artemisia,
 subina, dictamū, pulegium, & hmōi alia; ex quibus fumum parturiens vndiq;
 cooperta susceperet, & obstetrix manu contendat secundas eo tpe educere. Quod
 si non profuerit, pessos concinnato ex allio, asphalto, lafere, balsamo, stercore
 accipitis, galbano, gēuiana, sagapeno, scāmoneo, briona, nitro, dictamo, quæ ex-
 cipienda sunt succo artemisiæ. Vel sic pessarium confice: excipe aristolochiæ
 vtriusq; sabinæ, nasturcij partes æquas, trita in pollinem felle bouis excipe in
 pessos. Si verò neq; sic educta fuerit, eadē dilaceranda non est, neq; pturbari
 oportet, intra paucos. n. dies putrefacta, & insaniem dissoluta excidet: p̄cauere
 tm̄ periculum, qd̄ ex suppuratione impendet, vt antea dictū est, oportet. Si tamē
 his

A his non cesserit malū, enchatismatis vtendū est ex decocto artemisiæ, iridis, sabinae, pulegii, calaminthæ, & similiū, ut uteri osculo, ac partibus ēt uicinis mollioribus factis, reliquis auxiliis, & secundis ipsis facilius cedat vterus. Gratia autē præcauendi caput, ventriculum & reliqua viscera, quæ ex putredine secundarum non rarè afficiuntur, suffitibus utendum est ex cardamomo, & ficu pingui (vt Paulus consulit) vel ex bdellio, styrace, thure, lapide gagates, ungue odorato, & reliquis, quæ cum hoc q̄ odorata sunt, & prædictis malis aduersantur, secundam quoq; subducunt. Quod si res eo desperationis deuenierit, ut suffocari laborante uideamus, ad pessaria deueniendum est, quæ efficaciora sunt, & cōficiuntur ex decocto cucumeris siluestris cum oleo irino, aut succo eiusdē cucumeris, & puluere aristolochiæ, staphideagria, elleboro nigro, & colocintide æquis portionibus, addito fellis tauri modico.

B Secundis extractis antequam umbilicus reficetur, puero prædictis laboribus labefactato prouidendum est: curandumq; primo quominus spiritus eius exhalatur tractato infantis umbilico calidis digitis, modicumq; compressis, & omni calorifico beneficio. Atqui non solum si hac forte nascatur, sed utcunq; imbecillus, & sine ploratu, & cum leui spiritu exeat. Quippe eo tempore seruare se cundi nam uino calido oportet, antequam umbilicus abscindatur, donec calorem, & spiritum suscipiat: postea uiuidiori facto puero, ipsam secato. Itē eandē secundinam cineribus, aut calidis pannis calfacere oportet, uel in peluim calidum inponere, donec sufficienter puerulus incalescat. Sed præcipuè inter pares recenter coctos calidissimo uino albo, & aqua nāphæ irroratos apponere infantem opus est, atque spiritu, & halitu calido fouere eius faminæ, quæ cuminum, cinnamomum, anisum, aut uinum ore detinuerit.

Pueri laborantis ex parua prouidentia.

De fetu mortuo.

Cap. 5.

C Vmana frigilitas & miseria eo deuenire solita est, ut & in utero matris labores quoq; experiamur, & mortē, quod si acciderit, non solū fœtū calamitas succrescit, sed & matri. Quāobrem cognoscere protinus id malum oportet, ne corrupto fœtu matri quoq; irreparabile fiat damnum. Docuit quidē antiquitas fœtum ab uteris educere ante tempus multis de causis: nā cum puella, aut adulta, sed parua concipiebat, eminente ex fœtus magnitudine periculo mortis, gestationis, & partus tempus anticipabant remediis abortum mouentibus, quod sanè ueritum est in sancta religione nostra.

Mortuum uero fœtum conadum est arte, quam celerrimè educere. Sed moritur fœtus in utero ob alimenti defectum, aut eius malitiam, vel plethoriam, ob quā sanguine impletur fœtus, & suffocatur, aut solutis acetabilis saltu, ictu, tussis, aut sternutamento, uel humiditate nimia laxatis. Item ex bibito medicamento, quod ualidè menses prouocet, uel ex potu amarorum, aut nimia inedia præcedente sanguinis missione, aut purgatione: etiam ex morbo aliquo acutissimo, æstuosissimo, & magno, ac ultimo ob partus difficultatem, q̄ optimè aduertit Amic. fen. 22.3. tract. 2. cap. 12.

Causa;

Fœtus quidē mortui signa sunt priuatio, & defectus motus ipsius infantis, cū *Signa* alioqui

alioqui moueri assueuisset. Item decumbente femina in latus, id deuoluitur; ac decidit puer: grauat etiam plus quam ante mortem, & mammae extenuantur: aut altera, si è duobus alter mortuus sit, atq; eandem abortiet. Humiditates in super ab utero manant, corpus pragnantis laeuet, albicat, ac mollescit, & ipsa segnis efficitur. Caput etiam dolet, oris fetor sequitur, palpebrarum inflatio, visus tenebrositas, ciborum inappetentia, & iam putrescente fetu ichores emanant ab utero, tempora pulsant, mala rubent, febres excitantur, & horrores, sius, atq; turbulenta insomnia. Ventris tum demum frigiditas adest, dolorq; iuxta umbilicum: tandem omnia succrescunt, quae ex secunda relicta feminis accidere diximus. Docet id quoq; cognoscere Hip. lib. 1. de mor. mul. dicens: Si verò fetus in ipsa non circa initia, sed iam bimestris corrumpitur, aut suffocatur, tunc, & venter imus intumescit, & ad contactum dolet, velut vlcere praesente, & febris magna ipsam, ac dentium fremitus corripit, & dolor acutus, & vehemens pudenda, & inum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem, & coxas.

Curandi
ratio.

In hoc sanè malo qua fieri possit breuitate curandum est fetum mortuū pel-
lere, ne mala, quae mox retulimus accidere permittamus. Quippe, ut experimen-
to confirmatum habeo, etiamsi ocysimè extrahatur, tanta superest uterus labe
infectus, ut vix ad antiquum statum multo tpe reduci possit. Cum. n. fetus mo-
ritur, intensam, & grandem frigiditatem uterus contrahit, quae mille deinceps,
accidentia concitat. Si vero diu moretur, ut putredinem subeat, mala, quae retu-
limus proculdio succrescunt. Quamobrem medendi ratio in hoc malo quadru-
plex erit: vna, quae uterum dilaret fortibus, & suffumigis: alia, quae fetum euocet
ijs, quae vires habent irritandi uterum: tertia verò per ea fit, quae ore sumpta fe-
tum expellere nata existunt: quarta per ea, quae exterius adhibita eundem vsū
praestant. Implent quidem huiusmodi indicationes, quae praecedenti c. diximus
uterum posse dilatare, fomenta, & infusiones, ac reliqua. Sed fetum expellunt
omnia, quae abortum mouent, siue acria sint, siue id possint alijs viribus effice-
re, vel in uterum missa, aut infusa. Canceris igitur ad mortuos fetus cum lapati ra-
dicibus, ruta, ac fuligine tritis, & in mulso potui datis Hip. uti proditū est: Ver-
benace item radix ex aqua: betonicę drach. j. in vino cinnamomum cum rubea
aqua sabinę exhibitum: aristolochiæ decoctum, gentianæ, baccarum lauri, costi
casia lignea, myrrhae, succus aut decoctum absinthii vel artemisiæ. Thymi etiam
& ditami cretensis vsus in hac re magni est momēti, siue potui dētur, siue subii-
ciantur, siue suffitu adhibeantur: galbanum etiam rosaceo, & myrrha admixtū
potui datum efficacissimum est. Idem quoq; galbanum oleo cedrino ad mixtū,
subditum mire prodest. Verum si frigoris externi vi fetus perierit, ferunt pro-
desse remedium quod recipit croci triti 3. j. quam adipe anserino exceptū in ute-
rum immittes, vel aliud quod fit ex coniza, mentha, melle & resina simul tritis,
maximè si odoratum vinum superhiberit. Quod si fetus mortuus iā intumuerit
praestat medicamentum quod recipit succi marrubij, & apijana 3. ij. linteolo p-
colentur, quibus adde rosacci 3. viij. adipis anserinae 3. iiij. resinę 3. s. quorū medie-
tatem in sinum mulieris infunde. Praestat idē beneficiū parietaria ex vino trita;
itē aliud qđ recipit aluminis scissilis 3. j. veratri nigri 3. s. qđ simul trita vino nigro
excipienda sunt intra uterum, fit etiam cataplasma acceptis calamo odorato, &
interiori cucumeris siluestris, & anserino adipe, ac umbilico appositis. Iridis ē
radix

A radix epota in puluere, vel in vterū immissa, vel medicamentū emagogū Nicolai Ex vsu quoq; est id medicamentū, qđ recipit cinnamomi, aristolochiæ, sabina ana 3. j. myrrhæ 3. j. & cū aqua sabinae, vel cinnamomi porrige 3. j. Idē quoq; beneficiū pstat theriacæ diateslaron 3. j. aquæ ruta 5. iij. aquæ scængræci 5. iij. ficus arida num. iij. origani 3. ij. coquant, & colaturæ sume 5. ij. Prodest, & aqua decoct. da&ylorū. Qđ si hæc prodesse non videantur, purgantib. pharmacis vtēdū est, maximē si sequenti die laborans sumpserit hoc præsidium, quod recipit spicæ nardi, cinnamomi, ruta, singulorum 3. j. myrrhæ 3. fl. cū modicissimo sabinae pecto, aut in largiori copia ex decocto rubeæ p̄beto 3. j. Prodest puluis, qđ recipit sabinae, asari, myrrhæ singulorū 3. l. cuius porrige 3. j. cū decocto gentianæ. Præstant quoq; suffumigia ex vngula asini, succida lana vtero immissa, vel suffitus cum capite sardinae salita, aut lapide gagates. Si tñ efficacius efficere voles, excipe myrrhæ 5. l. cinnamomi, galbani, castorei singulorū 3. l. veratri 3. j. ex vacino felle cōfice, & suffumiga. Os ē vteri inungere oportet oleo susino, anethino, ruta, aristolochiæ, & colocintidis. Præterea galbani, & belzoini vtriusq; 3. j. in oleo irino liquent, in quo pessus madescat. Conficies aut aliū ex succo cucumeris asinini, & melle cum lana succida. Aliū ē facies efficaciorē, qđ recipit elleborum nigrum, staphisagriā, aristolochiam, pulpa colicintidis, & ammoniacum. Præstat & aliud ex lana succida, ammoniaco, & felle taurino.

B Verū sine hæc quidem oīa prodesse videantur, ad manus operationem deueniendū esse cōsulit vrgens necessitas, quas adhibere uenit Aetius, & merito quidē, si femina deiecta, aut languens extiterit. Medicū (inquit li. 4. Ser. 4. c. 23.) ante extractionis aggressionem spectare oportet, resoluta sit ne mulier an non, & an seruari possit, vel sit deplorata, & seruari quidem potentem aggredietur deploratam verò relinquet. Nam prouidendū est ne lethalis affectionis periculum errori, aut nostræ audaciæ imputetur. Docetq; eodem loco, quæ sit lethali-ter affecta, dicens: Quæ igitur lethali-ter affectæ sunt, lethargico sopore p̄mūtur, & resolutæ sunt, ac difficulter reuocari possunt, & ad maximas inelationes reuocatae, debilitat respondentes, rursus deferuntur in soporem. Quædam ē p̄ conuulsionem contrahuntur, aut nervis tremulæ fiunt, & pulsus fortiter tumidus, verum obscurus, ac debilis deprehenditur, at vero quæ euasuræ sunt, nihil tale patiuntur. Itaque colligitur ex eius verbis eam perituram, quæ inter pariedū aīo sepe linquat, & obliuiosa sit, vixq; somno excitari possit, cū pulso paruo, languido, & inordinato, vel langueat, aut lassā mēbra ægrē attollat, & moueat, ac frequenter conuellatur, vel aliis, quæ retulimus, correpta sit malis. Si autem nil horum adsit, bono esto animo, pulso enim partu, saluam illam fore spes est, cum hoc tamen difficillima res existit, & quam aggredi citra maximā considerationem & consilium non licet. Sed quid Hippocra. in hac re velit, audiendum quoque est: inquit enim libro primo de morb. mulierum. Quicunque vero fœtus mortui, aut crus, aut manus foras protendunt, eos optimū quidem fuerit, si id fieri posset, intro retrudere, & ambas partes in caput uertere, si uero hoc fieri non poterit, uterum intumescit, secare hoc modo. Dissectum per scalpellum caput cum contusorio instrumento, vt ne in ramenta fundatur, contundito, & ossa per ossium bol sellam, aut tractorium instrumentum: iuxta clauiculam immissum, prout habuerit, extrahito, non multis simul, sed paulatim
exemptis

exemptis, ac rursus ablatis, curandum tamen integrum caput si fieri possit extra
 here, finaliter findere. Cum verò hæc foras extraxeris, & in ipsis humeris fueris. **A**
 ambas manus in articulis cum ipsis humeris secato, & ubi hac extraxeris, si qui
 dem fieri poterit, ut exeant, et facile reliqua extrahito, si vero non obediant, to-
 tum pectus usque ad iugulum findito. Verum caueto ne in ventrem seces, & ali-
 quid de intestino denudes, exit enim venter, & intestina, & stercus, si vero horum
 quid excidat, maioris negotii res iam fit: contundito autem costas, & scapulas
 contrahito, & facile postea reliquum fetus procedet, nisi iam ventrem tumidum
 habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est ventrem fetus leniter perforare: fla-
 tus enim solum a ventre exit, & sic facile prodibit. Hæc proculdubio sunt, quæ
 Hip. in hac re præcepisse constat: qualiter autem fieri oporteat, expendendum
 nunc est. Conuenit. n. ante omnia, ut Aetius consulit, resupinam mulierem trans-
 uerso lecto sic locare, ut feminibus eius, ipsius ilia comprimantur, quod fit,
 ut & intus venter in conspectu chirurgi, & obstetricis sit, & infans ad os vteri
 compellatur. Hac igitur usus occasione artifex: manum oleo sesamino, aut lilia-
 ceo, vel mucagine inunget, ac inunctæ manus digitum indicem primum immit-
 tet, deinde sensim alios, donec tota esse intus manus possit: vtrinque aut stare de-
 bent peritæ, ac robustæ feminae, quæ illam manibus fortiter retineant, ne vi il-
 lata in fetus extractione commoueatur. **B**
 Ac parturienti tres bucellæ panis in vi-
 no imbutæ offerantur ad arcendum animi deliquium, & in ipso opere eius fa-
 cies assiduo vino aspergatur. Manus igitur in vterum immissa, emortuum puerum
 venetur, qui si capite vteri os contingat, vno instrumento apprehendus est,
 atque attrahendus instrumento cavitatibus oculorum, aut aurium affixo, neque in
 directum tantum huc ducenda manus est, sed et huc atque illuc agitata in obli-
 quum. Quod si caput extendatur aquoso aliquo humore, talis apertione scalpel-
 lo facta minuendus est, ac si ipsum mole grande sit, confringere forcipe, aut ma-
 nibus oportet. Sic reliquæ corporis particulæ, si maiores sint, quæ ut commodè edu-
 ci possint, auellendæ abscindendæque sunt. Si verò clunibus, aut altero pede, aut
 brachio vuluæ immineat, ante educationem eadem hic faciendæ, quæ in labo-
 rioso partu præcepimus. Trahere igitur dextra manus vncum instrumentum,
 sinistra aut intus infantem, simulque ipsum dirigere debet, donec ex toto euella-
 tur: is aut postquam protractus est, vni assistantibus tradatur, isque eum supinis ma-
 nibus sustineat: chirurgus deinde sinistra manu leuiter umbilicum trahat, ita ut
 minimè abruptat dextraque manu eum sequatur usque ad secundas: hisque omnibus
 apprehensis venulas: membranasque omnes eadem ratione manu ducat ab vtero.
 Quod si fortè secundæ subsequi recusent, hic ut in aliis partibus laboriosis,
 secundis relictis, filum promptè habebis, arreptumque subito umbilicum deliga-
 re, femoribusque annexere opus est. Postquam autem secunda, siue statim ab e-
 ducto fetu, siue postea educta fuerit, neque quicquam superuacuum in vtero re-
 lictum, cetera componantur, ut partes distractæ conueniant.

Quo facto quoniam valde deiectæ virib. & prostratæ mulieres remanere solent, ex
 ratione mihi videtur, ut potionibus & iusculis, ac vino odorato & potente reficiantur:
 tum verò, ut locos fouere, ac roborare fotib. & vnguentis congruis prouideas sem-
 per frigus præcauendo, quo nihil nocentius in eo casu puerperæ accidere potest.
 Quam-

- A** Quamobrem post eductū infantem, mox lincis panis calidis fovere loco oportet, & si hæmorrhagia subsequatur, quod frequenter accidit decocto rosarum absinthij, foliorum myrti, & artemisæ, in coctis vino omnibus locis fouēdi sunt postea verò vnguento comitillæ inscripto inunges. Potionem item parare conuenit ex puluere diamargaritonis frigidi, vel electarij de gemmis, ex aqua buglossæ, & vino albo deuorandam. Quod si vlcuscula, aut rhagadix ex vi illata cooriantur, ex vino decoctionis equiseti, & centinodix cum paulo melle rosato ablui iubeto, ac mox vnguento e pompholige illito. Sic superuenientia mala curabis iuxta cuiusq; naturam, & conditionem. Quippe frequentius contingere comperimus vrinam, & aluum post eductum infantem inuoluntarie fluere. Quos affectus curabis, velut partium illarum paralytis curari desiderat, demissa laborante post puerperij purgationem integram, in oleum calens, in quo folia lauri, betonicæ, saluix, libanthis, origani, pulegij cum floribus chamæmali, rosis marini, & stachados deferbuerint, moxque ab infellionibus ex oleo lumbricorum, liliaceo, & vulpino in quo catellus pinguis ad dissolutionem carnis ab olibus deferbuerint, expressione facta vnguentum parabis, addita ity racis calamitidis, belzoini, opopanacis olibani, macis singulorum ʒ. j. aquæ yttæ modico, adipis anserini atq; ceræ quantum sit satis, vt fiat vnguentum.

De mola post partum in vtero relicta. Cap. 6.



- A**CCIDIT non rarò, vt post infantis editum, & secundam etiā proiecta, adhuc super sit in vtero mola vel ipsi vtero adhærescēs, vel separata, & vagans: quæ postea (si parua fuerit) simul cum ex purgatione ex cernitur, aut si fortè ibidem immoretur grandioris mali causa existit. In quo quidem affectu mox ab eius cognitione (quam iam referam) expēdere oportet, an molæ plures sint, parue, & non adhærentes, vel vna grandis adhærens, aut ab vtero separata. Quod si plures sint, & parue, periculi nihil afferunt, præsertim cum adhærescentes non existunt, vt quæ cum sanguine menstruo citra maximaturbationem paulatim, & innoxie cernantur. Verum cum grandis est, periculum non leue affert, vt ex Hip. euidenter constat lib. de sterilibus: in cuius eductione, sicut in fœtu mortuo, vel secunda plurimum insudare oportet, ante quā, aut caro illa informis vitio aliquo conspuretur, aut aliud malum efficiat.

Sic nosse oportet, quando a partu superest informis aliqua superfœtatio, vt quam citissimè eius excretionem curemus. Id quidem cognosces ex toto gravidationis tempore: quippe grauioribus solito existunt eo tempore fœminæ, doleret vteri regio vniuersa, & inguina dolent, & omnia denique signa, quæ c. de mola adduximus apparent. Quod si sic affectis partus tempus accesserit, difficulter pariunt, & a partu nihil aut parum leuantur, dolores circa vmbilicum superant, & in dorso ab inguinibus; grumosis item profluit sanguis multus, carnosus, niger cum torminibus, & anxietate, & ab excretionem nullum sequitur leuamen; nausea, vomitus, & inquietudo, & anxitas subsequuntur, venter in tumorem per intervalla eleuatur, quasi nitēte natura facta contractione expellere: do-

re: dolores per intervalla succrescunt. Ac si mola grandis sit, postquam semel ad
 imas partes descenderit, sursum iterum reuertetur, quod natura nequeat tam
 grandem molem expellere, nec uteri collum capere. Item pulsus fit parvus, fre-
 quens debilis, & febris subsequitur: vrina quibusdam non redditur, alijs gitta-
 tim excernitur: tandem omnia ferè subsequuntur symptomata, quæ sæpe existè-
 re mortuo, accidere diximus. At si mola plures sint, & parvæ, per intervalla
 post partum exaerentur succrescentibus excretionis tempore solum dolori-
 bus: Quæ sanè scemine (vt ex Hip. decreto constat) citissimè in pristinam sanita-
 tem restituuntur: sicut illæ, quibus grandior est mola, ocysimè pereunt. Inquit
 enim Hip. lib. de sterilibus. Mola porro conceptus causa hæc est. Quum muli-
 menses modicum, & morbosum semen conceperint, neque fœtus rectus fit, &
 venter plenus est velut pregnantis, nihil autem in ventre mouetur, neque sæpe
 in matris generatur. Maxime autem turgida sunt, hæc itaque, & ad duos an-
 nos, sæpe etiam tres sic habet. Quam sententiã subintelligere proculdubio opor-
 tet de mola conceptu, quæ fit citra fœtus generationem, dum videlicet solum
 mola generatur: quam postea citra graue periculum natura nequit expellere.
 Et subdit (vt pensum redeam) Et si quidem vna caro fiat, mulier perit, neq; enim
 fieri potest, vt superstes maneat: si verò plures, erumpit ipsi per pudendum san-
 guis multus, ac carnosus, & si hoc moderatè fiat, seruatur, sin minus, affluxu cor-
 repta perit. Quæ omnia expendisse oportebit, vt prædicere, & præcauere quæ
 futura sunt, possimus.

*Curadi.
 Galio.*

Curationem huic affectui non temerè, & utcunq; aggrediendum esse arbi-
 tror: nam vt ex Hip. constat lib. nuper citato, non licet statim mola cognita, eius
 curatione tentare: quippe de grandiori hæc retulisse legimus. Hanc igitur ma-
 ximè quidem ne curato, aut certè cum prædictione. Quam sententiã ego de mola,
 quæ citra fœtus commercium generatur, intelligerem: nam credibile non est,
 ipsum velle locui de mola, quæ superest in utero post infantis exortum: hæc enim
 nisi ocysimè excernatur (ne cum hoc quidem) graue mortis discrimen impen-
 det. Quamobrem illam curare rarò studebis, hanc vero protinus. In cuius cura-
 tione tria obseruasse Hippo. legitimus: primum quidem, uteri & pudendarum
 partium emolliuionem, & apertionem: secundum, ventris inferioris purgatio-
 nem: tertium verò, & vltimum, in uterum infundit, quæ ipsum irritant, & ad
 excretionem lacessunt. Cui operi per cucurbitas principium motus quoq; præ-
 stat: inquit enim loco citato. Et primum quidem totum corpus foueto, deinde
 per sedem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erumpat (existimat quidè
 simul cū copioso sanguine comodius posse educi) fortassis enim quod compa-
 ctum est, commoueris, id quod fœtus esse putatur, muliere à pharmaco concal-
 facta. Sed & uteros colluito, quo sanguinem educas, sin minus, subdititijs utar-
 tur è buprestis, & dictamum creticum in vino bibat, sin minus castoris testem,
 & retrò cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito, & plurimum sati-
 gulinem detrahit, atq; hoc maximè coniectura virium ipsius facta. Quæ senten-
 tia videtur expressisse vniuersam extrahendi molam rationem. At mihi in hoc
 c. nulla alia medicamenta recensere est in animo, quàm ea, quæ ca. præcedenti
 retulimus: nam, & fœtus mortuus, & mola, quæ a partu superest, consimilem
 habent educationis rationem, & eisdem pharmacis perficitur.

De

A

De enixa prouidentia.

Cap. 7.

N T quotidiano euentu comperimus, licet à partu ærumnis, & laborib. infante in lucem iam edito, & secundis proiectis, enixa immunis uideatur, cum hoc tñ alios non minores, neq; minus graues, ac periculosos experiri frequentissimè conspicimus, quibus infans in lucem editi gaudiū interdicatur. Accidunt sanè hi labores, & pericula hæc tribus occasionib. nimirum, ratione ipsius partus, aut uteri, & menstrui etiam sanguinis, qui expurgandus supe est, aut alterius causæ interuentu, quæ affectum aliquem euocat, maxime cum menstruam purgationem interturbat.

B


Sic quidè ex partu multa supersunt vitia, quæ emendare oportet: nā vel rugæ in ventre remanēt, uterorū osculi laxitas, exulceratio, hæmorrhoides, uteri ipsius prouidentia, aut fluxus sanguinis, uteri strangulatio, nam uterus eotēpore tā quā fœtus eluēlis propter subitam euacuationem, quasi nagando hūc, & illuc declinat: unde & suffocationes, & dolores grauissimi non solū in utero succrescunt, & dorso, ac reliquis vicinis partibus, uerum & in capite iecore, vētriculo & aliis partib. Prodit quoq; ob constructionem, quod sanguis supprimatur, & grauiores efficiat cruciatus, ac periculosā accidentia. Verū ex parte sanguinis, qui aliqñ grumosus factus, aut alio traductus, mox a partu, & tormina, & alia penè innumera mala concitare habet. Ex iis aut, quæ aliis occasionibus succrescunt, non minus perfeliāntur enixæ, q̄ ex vitio partus, uteri, aut sanguinis, nā & alui fluxus, & suppressio, & pedū tumor, malus corporis habitus difficultas respirandi, pleuritis, angina, febris ardens, & reliqui morbi acuti, acutiores & grauiores enixis fiunt, quā ex ter' s. Præterea sunt inter enixas aliquæ, quibus plerumq; prostruit puerperium ita fœtidum, & sordidum, ut deterius videat̄ quouis alio morbo. Quod sanè enixis accidere constat multis de causis, præter humorem ex febre corruptorum abundantiam. Prima est putrefactio alicuius substantiæ intus relicte, ut mola, aut tunica uterina aliqua, vel sanguis, qui in inuolutis reperitur: altera causa est purgamentorum suppressio ob lac iam incipiens, & fiens: quo sit, ut detentus putrescat: vltima verò si in infantis exitu aliquid est diuulsum, & ob id suppuratum. Quorum omniū meminisse oportebit, & cuiq;

C

prouidentiam, & curationem iuxta eius naturam, & fœminæ statum, adhibere. Grane quidem, & molestū est, fœminas, quibus curæ est enixā moderari, perferre. Nisi. n. expulis, & vino liberaliter indulgeant, se nihil boni, & vtile enixæ p̄stare existimant. Habent insuper nescio quas leges, quæve statuta misericulis ita nocua, ut maiori ex parte grauiora, & maiora mala inde oriri conspiciamus, q̄ ex ipsis partus laboribus. Quamobrem posthabitis prudens, & generosus medicus eam aggredi prouidentiam tenetur, q̄ enixæ fore vtilem iuxta cuiusq; indigentiam cognouerit. Itaq; post partum ne pūdenda nimio madore, & humorum corruptione exulcerentur, ipsa extergere linteis mundis, aut spongia opus est: mox reponenda est in lectō, obscuro existenti cubiculo, & ex acre, ac frigore præmunito. Stet insuper modicè patētib. pedibus, ut quicquid ex ea foras exire cepit non impediatur: pannis loca ipsa contegantur, ac mutantur eo tpe, quo minimè contrahant fœtorem. Ex pedit et̄ oleo communi cum modico vino calido ventrem inungere: si verò partus laboriosus præfuerit, oleo amygdalarū dul-

dulcium calisto latera, & ventrem fouebis, quietemq; imperabis: ne vocibus turbulenti, & nimia loquela humores ad partes supernas efferantur, præpedianturque ob id necessaria purgatio. Victum his instituere oportet tenuem, & optimi nutrimenti, qualis est qui ex gallinis, & capis paratur, & eorum iusculis cum croco, & ciceribus, cauentes ab eorum cibis ex toto apium hortense. Verum ex carnibus parum primis diebus ministrabis: sequentibus vero plus. Aqua sit ex cinnamomo decocta vel ex corticibus citri, aut ex adianto: vel vinum porrigere, si ei femina assueta fuerit. Utatur etiam conferuis, quæ vires habeant menses mouere, ni sufficienter profluxerint. Eritem somnus imperetur, & omni animi tranquillitate fruatur; ne turbatione, aut animi pathemate aliquo, ad cor, & reliqua viscera sanguis confugiat. Profecto scitum dignum iudicavi, quod Athenis olim braseia in cibo parabatur puerperis, amuleti cuiusdam vice, ut auctor est Athenæus. Præterea vestitum illi immutabis ad minus transactis a partu quinque diebus cauens usque ad vndecimum diem enixam eodem modo, ac dictum est, studens purgatione euocare donec vigesima dies transacta sit: quod si ad quadragesimum usque se extenderit purgatio, dum sua sponte sit, vilius fore cense, sin aliter sat est ad vigesimum usque diem præsidij ipsam excitare. Si autem his res optimè se gesserit, nil aliud agendum est, sin aliter, iuxta superuenientis mali conditionem præsidium adhibebis.

De torminibus à partu. Cap. 8.



TORMINA seu ventris inferioris dolorem ferunt primiparis non accidere: quod tanquam fabulosum aut non omnino verum ab legandum censeo: nam, & primiparis, & reliquis, dummodo causa eadem præsit, idem quoque malum accidere necessum est. Sunt igitur tormina dolores, qui post partum in ventre inferiore, & a renibus in laterum mollitudine, & inguinibus puerperis succrescunt, duorum aut trium dierum spatio per intervalla exacerbati.

Causa.

Fiunt igitur tormina post partum ob sanguinis, qui expurgatur concretionem, & crassitatem, nam cum venæ, per quas natura ipsum expurgare nititur, assueta huic operi non sint, & sanguis ut pote diu retentus, concretus crassius quæ, ac feculentus existat, necesse proculdubio est dolores, & cruciatus maximos fieri, dum eum natura per angusta loca trudere studet. Quod euidenter probari potest, quia per intervalla dolores, & cruciatus fiunt, parum uidelicet, ante sanguinis excretionem, & ipso excreto statim cessant, donec iterum natura plus expellere nitatur. Proficiscitur aliquando idem malum ex acriori, & mordace sanguine, quod comperies extenuitate eius, qui excernitur. Quibus accedit flatuosa substantia, quæ, facta plus iusto uteri tensione, grauissimos plerumque excitat dolores: quod fieri censemus commota crassa materia ad motum, quæ ex se huiusmodi flatus effundit.


Plerisque etiam tormina succrescunt, quod uterus ex laborioso partu in aliquam ventris partem irruat: vel etiam ex suscepto a partu frigore in causa exi-

- A** ta existente enixa, aut obstetricis negligentia. Cuius affectionis meminisse Hip. constat lib. de nat. mul. per hæc verba; Si puerperæ uteri in coxam incubuerint, aut ad lateris mollitudinem, ad sanam coxam oleum ægyptium album, aut bac carim vnguentum apponere oportet, & in sanam coxam decumbat. Qua sententia, & affectum, & præsidium retulisse constat. Quibus cognitis curandi rō tria profectō consulit: primum, sanguis attenuationem: secundum, eiusdem temperamentum, cui reducenda est flatuum dissipatio: tertium verò, viarum apertionem, & laxitatem, quo facilius fluat quod crassum est. Sic iuxta primam indicationem consultissimum est, si feminam cognouerimus biliosam esse, tenuibusq; & acris humoribus abundare, duas vel tres uncias olei amygdalarum dulcium recenter facti, cum saccharo, vel syrupo violarum ei præbere. Præstat quoque syrupus factus ex mucilagine citoniorum extracta decocto violarum: quibus innitendum plurimum non est, sed bis terve die ea tantum exhibebis: interim tamen haustum aquæ schorchioneræ, vel buglossæ porriges. Sunt etiā inter feminas quædam aded audaces, ut innox à partu potum frigidum porrigere audeant, & aliquando non citra felicem euentum. Quod sanè præsidium ijs, quibus acrimonia, & calore tormina fiunt, proficuum esse experimento comperimus; ob id quidem non omnibus, sed prædictis tantum abhibendum, idq; cū premeditatione. Sed studendum magis est sanguinem extenuare, quo facilius fluere possit: cui etenim operi proficuum experimur decoctum, vel serapium adianū, aut cinnamomi: sed efficacius existit quod recipit corticis vtriusq; castiæ, cinnamomi, capillorum veneris, seminis anisi ana ʒ. iij. passulatum sine granis ʒ. iij. fiat boli, aut citra passulas fiat puluis, qui exhibitus vino albo efficacissimus est. Præstant, & pulueris diacimini ʒ. f. sacchari ʒ. v. simul cum vino, vel aqua cinnamomi sumptæ: ex vsu quoque est seminis dauci ʒ. j. cum aqua adianū. Hip. in super lib. i. de mor. mul. huic malo sic subuenit. Si verò puerperij purgantia in grumos fuerint coacta, & dolor in imo ventre fiat, porrum coctū, & quæcunq; siluestria, & hortensia olera dato, verū omnia pingua facito. Ceterum si cum animi deliquio tormina eueniāt, prædictis auxilijs cordialia phar maca admiscebis, quale est qd recipit diamargaritonis frigidi, aromatici rosati, & diacimini ana ʒ. j. sacchari ʒ. v. cum aqua adianū fiat boli, quorum aliquæ cum vino sumat laborans. Sed ut partes patientiores fiant, mox a partu feminæ peritæ haustum olei præbere solent, quod ego probarem magis ex amygdalis dulcibus, vel loco eius aquam calidam cum cinnamomo, adianto, aut coriicib. citri decoctam: ac si femina pituitosa fuerit, & sanguis crassus ex pituita, haustū aquæ naphæ cum semine occimi, vtilius est. Verum hanc, & præcedentem intē tionem implent inunctiones ex oleo anethino calido cū lana succida, vel oleo liliorum, sed quod vtilius existit, oleum de semine lini cum modico croco est, vel oleum ipsum de croco cum oleo naphæ, aut per se solum. Valet item vngnē tum hoc, quod recipit adipis anatis, butyri recētis an. ʒ. j. succi sampsuchi ʒ. j. & smyrthæ ʒ. f. medullæ ceruinæ, terebinthinæ, & mellis an. ʒ. f. corticis castiæ, & aloes ana ʒ. iij. ceræ q̄tum sit satis, ut post succi consumptionē fiat vnguentum. Confert etiā cataplasma, qd recipit farinæ florum chamemali, fenu greci, seminis lini, fabarum, cimini an. ʒ. j. butyri recentis, adipis gallinæ ana ʒ. ij. cū oleo sambucino fiat cataplasma. Præstat quoq; aliud, qd recipit lutea ouorū cocta, & du-

ra numero vj. cumini puluerizati .j.ij. cum oleo liliorum, & anethino pista, & adhibe. Confert etiam plurimum multorum decreto, si cepa in vino vel aqua parum coquatur, deinde exprimatur, & in oleo communi frigidatur, ac vtero imponatur. Atq; hæc sunt, quæ inter alia pleraq; vsui probatoria reperio. A

De immodico sanguinis fluxu post partum.

Cap. 9.



QUANTITATEM certam, ac legitimam purgationis à partu metiri, & rimari, tam difficile, quam esse medicum: nam coniecturam qua id venari autores student, difficilem omnino esse constat. Re-ferunt quidem purgationis tēpus in masculo puerperio finiri triginta diebus, in fœmina autem quadraginta. Verum vt res ita acci-dat fœminæ habitum, alimentum, vitæ studium, & reliqua in vnum coire tenen-tur, si cedere ex voto computationem velis. Et cum hæc omnia raro sic iuncta reperire liceat, ob id difficile est ex fœctu tempus metiri, & purgationis quan-titatem: licet à posteriori non leui ratione certiores fieri possimus. Hipp. autem B lib. de natu. fœtus, volens ostendere purgationis tempus sic scribit. Puer moue-tur triginta, & duobus fœmina in quadraginta, & duobus, igitur puer perfici-tur in totidem diebus, & fœmina in totidem: sed quanto magis fœtus est maior, tanto magis trahit de sanguine, quanto minor, minus hoc. n. principium est na-turale, sicut primum sumptum ab experimento, ergo quanto magis processerint dies fœtus, tanto plus trahitur de sanguine, ergo tanto magis superest: & in principio cum minimum trahitur de sanguine, plurimū supererit: igitur in pur-gatione à principio magna quantitas sanguinis, & præseruabit in masculo ad dies triginta, in fœmina ad quadraginta dies perpetuo minuendo. Cæterū hæc demonstratio solum docet durationem purgationis, non quidem q̃tatem: nā-que non ostendit copiosam diminutamve esse: sed q̃tum durare possit. Quapp-C alia opus est coniectura, quæ doceat q̃tum sit purgandum, & quid tanq̃ immo-dicum, & præter naturam habendum. Quod si Hip. mensurā sequi velimus lib. de nat. fœ. non minus errare nobis continget, q̃ ex præcedente dogmate. Inquit enim in puella ad triginta lebras q̃tatem ferme accedere, in masculo verò ad viginti, & duas: qui sanè sanguis concretus erit, & in frustra prorumpit. Atq; cū (vt dictum iam est) oēs vno mō, vnave viuendi rōne instituere vitam nequeant, sit facile, vt certa lex, & regula in omnibus haberi nō possit. Scribit aut̃ Moschio certam q̃dam coniecturam, qua ipse nititur iustā q̃tatem, ac debitū purgatio-nis tps venari: inquit. n. Eo cognosces, q̃ sanguis vberimus fuit primus, secūdo feculentus, & paucus, nouissimè purulentus. Ex qua quoq; snā non minus ad q̃tatem metienda, q̃ ex reliquis deceptionē prodire credimus. Sed iterū Hipp. lib. i. mor. mul. rursus ad primam coniecturā, sed clariū redit dicens. Prodeunt aut̃ puerperij purgamenta sanæ mulieri sufficienter: primū sesquiheminæ men-sura, aut paulò plura, postea adhuc pauciora iuxta hanc rōnem, donec cessent. Prodeunt aut̃ velut sanguis a victima, si sana, velut dixi, mulier fuerit, & sana fu-tura est, & cito congelantur, ac purgantur, & post partum plerūq; sanæ mulie-ri contingit: vt post puellæ partum in quadraginta, & duob. dieb. diuturnissime purgatio fiat. Extra periculum aut̃ est, et si viginti quinq; diebus purgetur: post masculū

A masculi vero partum purgatio diuturnior fit in triginta diebus: extra periculū est ēt, quæ in viginti diebus contingit. Et in ijs, quæ fetus corrumpunt, secundū horum dierum rationem purgatio contingit, & in iunioribus, quæ corruperūt, paucioribus diebus: in senioribus autem pluribus. Quia in re ego cōem illam Hip. de conferentia, & tolerantia coniecturam, certiore esse arbitror, adhibito in considerationem feminæ habitu, vitæ instituto, & reliquis, quæ his similia existunt. Quia facta coniectura, cum vacationem feminæ vires excedere cōperiamus: tria imprimis animo cōijcere oportet: primum equidem quantitatem fluentis purgationis posse esse vel copiosam, vel immodicam, vel immodicissimam. Primam naturalem existimamus iuxta Moschonis decretum, q̄ sit ex suppressi sanguinis ratione facta: reliquas uero præter naturam. Quatum priorem immoderatam censemus, quod vires prosternat resolutis spiritibus, ac imminuto calore: cuius signum est pulsus debilis, & frequens, impotentia, & cibi fastidium visus tenebrositas, aut imminutio, vel grauis auditus, aut tinnitus aurium. Alteram, q̄ immodicissimam esse diximus, compescere quidem protinus oportet, quia interitum oculissimè minatur: id quod animi deliquium, & conuulsio euidenter docent, vt ex Hip. constat 5. apho. 54. dicente. In fluxu muliebri si conuulsio, & animi defectus aduenerit, malum. Quod uerò conuulsio, & animi defectus, per se malum, sint, nemo ignorat: sed cum dixit, malū, aliquid amplius significare voluit: hoc est, citra hæc accidentia inopinato non raro ex immodico fluxu mortem aduenire, femina somnum simulante; quod medicum cauere magna diligentia decet, quia sepe id euenisse certum est. Præterea, idem Hipp. lib. 1. de mor. mul. signa, & rationem huius affectionis adducens inquit. Si fluxus in utero obortus fuerit, sanguis multus fluit, & grumi compacti excidunt, & dolor occupat lumbos, & laterum mollitudinem, ac inum ventrem, & durus est venter, & ad contactum dolet, & rigor, ac febris acuta corripit, & debilitas oboritur, & omnia, præter humeros, ac scapulas, dolet, & calor inuadit, & rubescit, & venæ duræ fiunt, ac renitentes, morbus hic maximè fit ex abortu. Quia sententia quantum mali afferat huiusmodi affectio, euidenter constat. Ob ea, q̄ diximus, mala, mox a partu puerperi purgationem considerare oportet, consentiā, & tolerantia quoq; Quæ sanè ex pulsibus, & reliquis vitæ actionib; intueri poteris. Quod si immodicam esse vacationem constet, non cōpescas vt in reliquis corporibus, neq; protinus, neq; eiusdem auxilijs, sed moderati opus est victu, potus & ijs, quæ quodammodo firmare habent laxas vteri, partes. Cuius census est, transacto fluxionis impetu, si vires labi comperiamus, syrupus de rosis siccis cū aqua, in qua saepius aurum sit extinctū, leuis ēt brachiorū frictio, cibibus ex carnibus assis, ex amylo, & reliquis, quæ moderata esse lib. huius operis primo retulimus ita, vt non ex toto cohibeatur fluxus, q̄ secundū naturā sit, & immoderata tū peccet. Quippe cum ex toto cohibere, erisypelas, tumores, vel alia præter naturā vtero succrescere efficit, & laboranti ēt difficilè accersit respirationem, suffocationē, ac non raro mortē. Qd ēt veritus fuit Aui. fen. 2. 1. 3. trac. 2. c. 33. Ceterū in his expendisse oportet, an mox a partu sanguinis profusio acciderit, nā euidentis sit argm̄, ex vasorū apertione maiori principium sortiri: vel ex impetu, qui inceptu semel fluxu cohiberi nescit. Quia rōne censeo Aui. li. citato c. 34. dixisse, ex vsu esse manus ligare, & supnas partes, quasi studēs natura im-

Curādi
ratio.

petum frenare dolore & friccionibus ipsa alio euocata. Sic ob viarum laxitatē A
 consulit acetum super ventrem ponere: quod ego non nisi formidanter adhibe
 rem. Docuit ēt (quod securus est) ventrem ipsum inungere oleo myrtillorum,
 sparsis desuper pulueribus succini, balauustiarum, & thuris: vel hæc eadē cū vi
 no austero. Quorum omniū nos lib. j. maximam adduximus copiā. Quod si vltē
 rius fluxus subsequatur, vitium sanguinis cū præstitisse coniectandum est, &
 optima vitæ rōne in cibo, & potu instituta, tē moderari oportet, vt citatō c. dixi
 mus. Verū si immodicissima fuerit sanguinis profusio, ad quæq; auxilia q̄tū
 uis graua deueniendum est, satius quidem existimo, malum aliquod vtero, aut
 toti corpori inferre sanguine suppresso, q̄ in vitæ desperatione dubium pericu
 lum vereri, præsentī, & grauiori posthabito. Quamobrem scito nil huiusmodi
 profusionibus citius subuenire, q̄ viriliter comedere, vt & calor renocetur, &
 natura distrahatur, alliciaturq; ad confectiōem alimenti. Ex quo inter alia bo
 na vires ēt refici contingit, & partes facilē restantari. Quod si id prodesse non vi
 deatur, ad prædicti c. auxilia confugiendum est. Quatenus verō ad somnum at
 tinet, puerperio immodicissimē fluente, scito somnū nulla lege conuenire, ne B
 partes internæ calidiores factæ vberius sanguinē fundant. Quod si aliquis con
 ueniens videatur, id profectō est, cum aliquotulū auxilijs fluxum restitisse cōpe
 riamus. Interim tñ, si diutius duret fluxio, somnus conciliandus est, maximē ijs,
 q̄ frigida, & astringentia existant, parcissimus tñ, & a quo repente, & cum leui
 animi turbatione excitetur. Nec sola permittatur femina dormire, sed præsentē
 aliquo, qui respirationē, & pulsū intueatur, ne vitam in somno deficere con
 tingat. In quo sanē casu exusu fore arbitror, præter alia auxilia, quæ c. sapius ci
 tato diximus, ijs vti, quæ Hip. consulit lib. de nat. mul. dicens. Si fluxus obōria
 tur, caneros fluuiatiles in vino suffocato, & vinum bibendum dato, & quæ sic
 cant, suffito, & apponito. Item eodem loco inquit. Si fluxus suboriat, muli
 stercus combustum, tusumq; ac criatum vino dilutum bibat. Et subdit, Si flu
 xus suboriat, & iam diuturnus fuerit, spongiā combustā, ac tritam vino
 dilutam bibendā dato, & per suffitus resicca, & quæ astringunt appone: & for
 tasse nullo alio in casu licebit, quæ astringunt, in puerperis adhibere. Sic lib. 1.
 de mor. mul. commendat ad immodicā puerperij purgationem præsidia non C
 pauca his simillima.

De diminuto sanguinis fluxu post partum. Cap. 10.



DICTVM præcedenti c. est, naturalem in partu purgationē ne
 cessario copiosā fore: ex quo euidenter constat in medio sitam
 esse diminutē, aut ex toto suppressē ex vna parte, vel immodicē,
 ac immodicissimē profusionis ex altera. Sic etenim, cum copiosē
 natura fundere sanguinem nequit, diminutam, si ex toto cohi
 beat, suppressā efficit necessariā hanc, & proficiuā vacuationē. Quod equi
 dem siue in abortu, siue in partu legitimo, aut laborioso fiat, grande minatur pe
 riculum. Quippe vel febres, vel difficiles respirationes, anginas pleuritides, pa
 raplexias, maniam, melancholiam, ac non rarō phrenitidem fieri cōspicimus:
 vel in vtero graue aliquod malū, vt optime animaduertit Auic. 2. 1. 3. tra. 2. c. 35.
 Quod

- A** Quod intelligere oportet, nisi sudor aliquis copiosus erumpat, quē millies feminas ab his periculis eripuisse experimento didicimus. Eadem quoque mala refert Hip. succrescere li. 1. de mor. mul. dicens. Quum mulieri, aut partus purgamenta, aut menses non prodierint, aut etiam uterus durus fuerit, dolor hēt lumbos, & lateris mollitudinem, & inguina, & femora, & pedes amare dolet, & uenter attollitur, & horrores per corpus discurrunt. Ex talibus aut febres fiūt acutæ. Quæ quidem sententia constant, & signa, & accidentia, quæ in hoc affectu reperiuntur, quæ maioris mali præfagia sepe existunt. Rō quidē in prōptu est, quia licet mensium suppressio omnis, quæ fit ex aliqua causa præter naturā mala omnino sit, ea tamen deterior est, quæ fit in puerperis, a partu, ut docet Gal. li. 3. epi. par. 3. com. 7 3. quod sanē sit, & ratione multitudinis, tum ē uitii, & prauitatis, quia ut idem autor lib. de atra uile refert, si quid boni in mēstruo sanguine est, id in uniuersum absumitur in alimentum fētus, quidquid autem vitiosi, & mali in venis detinetur, & ad tempus vsq; partus adseruatur, quod postea per multos dies excernitur, quo fit ut atrebilis plerunq; naturā referat: immo ut idē refert eodem 3. pop. yrina quoq; idem referunt, nam fuliginosum qd præ se ferunt, itaq; ut ipse dicat. i. pop. par. 3. com. 21. virulentia & mille alia vitia præ se ferre necessum esse. Ex quo sequitur puerperas in quib. purgationes a partu supprimunt, grauissimis morbis semp corripī. Nā si in vtero præsit is sanguis inflāmationes, & alia uitia excitare habet, sin aut in uniuerso corpore ut 2. prorr. com. 48. testatus est Gal. varios morbus, & pericula adfert, pro uaria natura partium in quibus sanguis ille colligitur, atq; his item accidit, præsertim morbo aliquo affectis, album pro utero fluere, q̄ profectō difficilis iudicationis non raro causa existit, quod non sit conueniens illa uacuatio neque regio, cuius etiam prouidentiam obtinere oportet. Quamobrem cunctandum nō est ocysimē præsidium adhibere: nam si semel aliquod ex prædictis acciderit, difficulter, dum inueteratur, præsidium admittit.

- C** Sunt quidem huius affectionis plures causæ, externæ non paucae, & internæ reliquæ: siquidem uociferatio, splendor, risus, subita perturbatio, vel quoduis aliud animæ pathema (præsertim si subito fiat) aut aeris frigidi accessus, vel aquæ intempestiuus potus, aut immoderatus alimenti vsus, & reliqua huius celsus id malum frequentissimē accersunt. Sic quoque sanguinis, crassities, abundantia quæ obstruat, viarum structura, alicuius partis dolor, labor, aut imbecillitas, vel omnino puerperii purgationem supprimunt, vel imminuunt. Adducit etiam Hip. lib. 1. de mor. mul. alias causas, nimirum dum uterus reddit a partu angustior, ut mox clarius monstrabo.

Sed præter signa, quæ lib. 1. c. de suppressione mensium adduximus, placuit hic scribere quædam huic affectui peculiaria, quæ morbi naturā, causam, & sic rurum euentū cōmostrant. Inquit. n. Hip. lib. de nat. mu. Si ex partu non fuerit purgata, tumet uenter, & crura, & rigor, ac dolor in uentre, ac lumbos tenet, qñq; ē ad uiscera ascendit, & animo linquitur Atq; hæc patitur incipiente morbo, progressu uero temporis caua faciei partes rubescunt. Præterea sic scribit li. 1. de mor. mu. Si uero ex partu non fuerit purgata, uenter intumescit, & splen, & crura, & febris habet, & rigor corripit, & dolores profiliunt ad lumbos aliquando, etiā ad uiscera, & perfrigeratur, & febris habet: pulsus debiles

hi 3 sunt,

Causa.

Signa.

sunt, & aliquando acuti, & alias attolluntur, aliàs deficiunt. Lib. etiam eodē in-
quit. Si verò paulò pauciora, quàm oportet prodierint mulieri puerperii purga-
 mēta velut vteris angusto ore præditis, ac distortis, aut aliqua pudendi pars val-
 dè fuerit conclusa ab inflammatione. Mulier acutè febrit, & stomachi dolore
 vexatur, & dolet totum corpus, molestè fert, & ad articulos manuum, ac crurū
 & lumborum dolor procedit, & locum circa collum, & spinam, & inguina do-
 lebit, & quædam corporis partes impotentes fiunt: postea calor quietus erit, &
 valde manifestus. Idem etiam, refert lib. I. de morb. mul. aliam causam scribēs:
 inquit enim; Si vteri angusti oris ipsi fuerint, & puerperii purgationem non
 emisierint, inflammantur; & si non curentur breui, omnia magis ipsi affligent,
 & dolor malus erit, & exitus intumescit. Et si non inflammati fuerint vteri, sua
 sponte exit malum graueolens, & liuidum aut nigrum grumosum, & mulieri
 puerperii purgamenta purgantur. Quandoq; verò non exit, sed mulier mortē
 portendit, nisi quis breui venam secet, aut ventrem emolliat: præstat autem etiā
 clysterem adhibere: si verò ad vomitum facilis fuerit, etiam vomitum induce-
 re. Melius autem est lorium ciere, & exsudare (à quo loco Auic. suum dogma su-
 perius scriptum desumpsisse arbitror) verum in his occasio optima est, cū opus
 his fuerit. Quibus sententiis constant causæ, & cuiusq; signa, & accidentia, ac
 periculum huius affectionis, necnon & veram curandi rationem.

*Curā di-
 v. 110.*

Quibus sic breuiter consideratis, medendi ratio duplex erit, altera quidem,
 quæ causam respiciat, reliqua verò, quæ imminens periculum ob audactam ple-
 nitudinem ex diminuta purgatione contractam demat. Antè tamen quam hinc
 discedam aduertisse oportet, quod si sanguinis purgatio supprimatur, quod ad
 mammas sanguis recurat, considerandum tunc est, an mulier nutrix futura sit
 necne. Si primum non protinus sanguinis detrahes, sed primum naturæ impe-
 tum spectabis, & postea sanguine ex talo misso, aut aliter, vel cucurbitis femori-
 bus affixis purgationem euocabis. Quod si plenitudo in morbum de generaue-
 rit, tertia alia succrescit indicatio, quæ morbo provideat iuxta cuiusque naturā,
 ut c. sequenti docebo. In hac etenim curatione tanquam peculiare præceptum
 expende, præferendam esse (nisi quid aliud obstiterit, ut alui fluxus) indicatio-
 nem futuri, & imminētis mali cæteris omnibus: quod facies proculdubio si
 plenitudine ocysimè dempseris vena scissa. Id quidem hac præmeditatione fa-
 cies: si puerperii purgatio ex toto suppressa sit, id tibi sit obseruatissimum præce-
 ptum, & quod primò fieri debet si verò solum diminuta sit, non est extra ratio-
 nem optimi consilii (posthabita plenitudine, quæ principium futuri, & immi-
 nētis mali est) aduersus causam, quæ plenitudinem ipsam congregauit, primò
 aliquid agere: ac si non, ut par est, profuerit, ad plenitudinem demendam dein-
 ceptis confugito. Sed viuendum est primò quo modo causis internis prouiden-
 dum sit. Si comperiamus quidem alio sanguinem confugere ob dolorem, labo-
 rem, vel quamuis aliam cā, protinus iis, quæ ad vterum sanguinem euocent,
 utendū est frictionibus, ligaturis cucurbitulis suris, & femorib. affixis cū copia
 sa scarificatione, sed primò citra ipsam. Quod si malum vrgeat, in his immoran-
 dū nō est: sed, prius ad inferas partes sanguinē euocabis vena tali semel, aut bis
 scissa, nimirū q̄tū sat sit, ut uel retrocessus fiat, uel copia minuat. Quo facto, mē-
 bri recipiens cura habenda est iuxta eā, quā obtinuerit, naturā, aut affectionē,
 vt se-

A ut seq. c. docebo. Verum si sanguine sufficienter misso quantum vires permiscerint, cognitum sit, suppressionem iuuare ipsius crassitiem (ut ex ipso sanguine facile erit rimari) quæ attenuandi vim obtineant, sunt adhibenda: quem usum præstat oleum de croco, de cinnamomo, de liliis albis, de spica nardi, de napha, de angelica, quibus si theriacæ modicum addideris, multum profuisse comperies. In quem sanè usum adduci possunt Hip. auxilia lib. de natu. mul. scripta his verbis. Si uteri conclusi fuerint, & menses non apparuerint, colocintidem siluestrem, & sulphuris semen, cuminum æthyopicum, nitrum, salem thebaicum, adipem renalem, fatinam, myrrham, & resinam, omnia hæc seruefacito, simulque mixta, ac trita in glandulam efformato, ac apponito. Profunt quoque forus ex decocto rerum calidarum, & tenuium partium, maximè in oleo facti, & ex omnibus, quæ superius diximus, inunctiones posse fieri. Conferunt & infusiones in prædicto oleo calido, vel suffumigium ex bdellio, sinapi, & mirtha, vel cum oculis, aut capite piscis saliti, vel cum ungula equi, aut asini. Post modum uerò si hæc non profuerint (uiribus non plurimum habentibus) ad sanguinis ex talo effusionem venire consulit Auic. quam lato foramine efficere opus est, ut crassioris sanguinis aliquid educi enacuarique possit, si prius, quæ per superna sanguinem extenuare posse diximus, exhibueris. Inter quæ primo porriges succum borraginis, porrorum, & petroselinum cum uino, uel oleo amygdalarum dulcium, maximè si utaris suffitu ex unguibus, & cornibus capræ. Quo facto adhibebis decoctum graminis, cinnamomi, adianti, pimpinellæ, casia, satureiæ, & similitum cum croco, quorum magnam copiam capit. de suppressione mensium lib. 1. reperies.

At si ab osculorum venarum structura id malum proficiatur, quæ molliendi, & laxandi uentrem, & uicinas partes vires habent, adhibenda esse consulit rei natura. Quamobrem primò sanguinem copiosè fundes, ac si facta semel, aut bis sanguinis detractio vires non suffecerint, cucurbitas quoque, fœmoribus aut suris affixis scarificabis, quo facto uentrem inunges oleo amygdalarum dulcium, sesamino, de uitellis ouorum, de liliis albis, & de bacis lauri cum dialthea, axungia gallinæ, & medulla crurium uituli. Profunt & prædicta fomenta ex uino dulci; oleo facta, maximè si in eis bullierit hypericonis aliquid: cinnamomi, radicis, vel seminis angelicæ, casia, vel quid simile. Quem quoque usum afferunt, præter pessarium superius ab Hip. adductum, infusiones, & clysteria emollientia, & potus aqua calida, præsertim si aqua ex medicatis sit, in qua fuerit cinnamomum, fœniculum, casia, & cortex citri. Quod si sanguis abundantiam suppressioni causam præstare certum sit, nullo auxilio tutius, & certius malo medeberis, quam copioso sanguine per uenas tali effuso: tunc enim natura potentior reddita supra residuum, id facilius consuetum sibi locum expellit. Ac licet non sit quod natura excernitur, aded, copiosum, non ob id mirandum est, si præcessit copiosa sanguinis detractio, quæ maiorem quantitatis copiam imminuit. Atque hanc oportet prouidentiam in ijs, quæ pepererunt obseruare, ne puerperum in aliud grauius malum commigret.

De recta curandi methodo adseruanda in ijs affectionibus, quæ enixis
superueniunt. Cap. II.



IL profectò, iudicio nostro sc̃eminis grauius, molestius, & pe-
riculosius accidere potest, quam a partu, aut abortu, post tot la-
bores, & ærumnas, morbum aliquem succrescere, tum quod
difficiliter eum post partus accidentia tolerabunt; tum etiã
ob corporis imbecillitatem; tum vltimo ob difficilem curan-
di viam, quæ in enixis habetur: quod puerperium neque ipsi
morbo sufficiat, neque alia admittat præsidia. Neque rursus medicis quid an-
xius, & difficilius, & vrgentius in re practica contingere potest. Quamobrem
paulò diligentius rem hanc oportebit, vt prudenter ac generoso, animo quisq;
citra cunctationem quod opus fuerit, aggrediatur, ac vereatur quæ profutura
sunt imprudente præterire.

*Puerperii morbi ex causis
morbi sunt.*

*Morbi ex
suppresso puer-
perio.*

Succrescunt proculdubio enixis morbi post partum vna è duabus causis, vel
ex ipsius puerperii improsp̃era purgatione, modò diminuta, modò exuperans
fit: vel ex morboſo corporis apparatu, quem dolores, & labores partus excita-
runt: præter quos nec tertiam aliam reperies. Nam plerisq; accidit etiam si pro-
be purgentur, in medio purgationis tempore externam causam euenire, quæ
febris vel alterius mali occasionem præstet, vt Hipp. refert lib. 1. popu. part. 3.
Philini vxori in thaso accidisse, cui probè deinceps procedente, fortasse ob cau-
sam externam, aliqua purgatione febricitabit ex recurſu materiæ ad hepar, &
interiores vteri venas, quo eryſypelas vtero succreuisse credendum est, & in he-
pate inflammationem, quod ostendunt hepatis adiecta signa. Quæ sanè historia
constat, non sat esse purgationem ex ratione fluere, sed fluxuram sperare, &
præcauere ne præpediatur. Quippe causæ externæ alteram prædictarum, vt v-
tranq; commouere prius tenetur, quàm in affectum aliquem prorumpere pos-
sint, ni morbus genitus ex solutæ continuitatis genere sit. Sic in miserrimis vt-
cunque suppressa puerperii purgatione conuulsiones paraplexias, ardentes fe-
bres, maniam, melancholiam, anginam, difficilem respirationem, pleuritidem,
sanguinis sputum, alui fluxum, dysenteriam, sanguinis vomitum, hydropem,
animi deliquia, syncopim, & pleraque alia mala accidisse frequentissimè com-
perimus. Quam sanè morborum differentiam faciliè distingues, si puerperi quã-
titatem modum, ac substantiam diligenter intuearis. Quoniam si nihil fluat, si
diminutè, si cum torminibus, & grauioribus symptomatis, si sc̃culentum, corru-
ptumve vtcunque aliter excernatur, vel calore partes pudendas exulceret, vel
ob admixtam alienam extraneamq; substantiam præternaturale & diuersum a
puerperii conditione, siue mola sit, siue quid aliud, quod cum eo excernatur:
credibile quidem est, quod intus relinquitur, morbo materiam præstaturum.
Idq; maxime periculum subeunt quæ abortiunt sc̃eminæ, quibus grauiora ma-
la frequentius succrescunt, vt ex Hip. colliges 3. popu. par. 2. in historia eius quæ
apud Pantimedem ex abortu igne correpta est, & ex historia vxoris Oecete. At
si partus laboriosus sit, sc̃emina primipara, & corpus viuosis succis abundans, si

uita

A vita præcessit intemperata victu, potu, aut exercitiis, si aliquo morbo ante partum præueniatur, etiam si optimè a partu purgetur, rationi videtur consonum morbum non ex puerperio, sed ex reliquo corporis apparatu principium sortiri, ut accidit mulieri, quæ decumbibat in foro mendacii, ut refert lib. 3. pop. par. 2.

Quibus equidem sic cognitis, ut unde morbi principium sit sumendum, & computationem dierum ipsius ineunda discas, expendendum est, a quo morbi principium desumere liceat, cuius rei gratia distingues, an affectus proficiatur ex puerperio, tunc. n. certum est, non a partu, sed ab eo die, quo in puerperio aliquod vitium apparet, computationem ineundam esse. Nam si primis diebus purgationem prosperè successisse constet: postmodum verò, vel supprimatur, vel utcumque aliter vitietur, ab eo quidem die rationabile est computationem esse sumendam; ut in Philini vxore Hipp. apertè docuit. Verùm si certum sit morbosum corporis apparatus affectum prorupisse ob partus labores, mihi non est dubium, quin ex die partus principium computationis sumi debeat, tanquam ex causa, quæ affectum creauit, velut accidisse constat Dromeadae vxori, quæ filiam cum peperisset, mortua est ex febre acuta septimo a partu, & sexto ab acuta febre. Quamobrem mirum videri non debet, si apud priscos illos medicos sapientissimos, & apud neotericos etiam comperiamus nunc a partu, nunc verò a die morbi ceptam computandi rationem, nam prout affectus principium sortiebatur, ita computationem exposcebat. In aliis verò, quæ instante partu agrotare ceperunt a die ipsius mali ineunda cõputatio est, ut in vxore Epicratis Hipp. docuit li. 1. popu. par. 3. Quod si quis a die partus velit computare, non errabit, quia iam labores illi ex instante, & incipiente partu aderant. Quæ sanè mala, & alia quæ puerperis euenire passim conspiciamus grauiora, & plerumque ex filiarum quam filiorum partu cernimus, quæ excrementis magis abundant eaq; sint spurcissima, & grauiora, quod non immerito signat Hipp. dicens filiam peperit, quasi insinuant non esse paruam mali occasionem.

Pari quoque causa in recta medendi ratione, rem hanc varietatem aliquam nancisci comperimus, quippe affectus, quos suppressa purgatio incitat, duplicè omnino medendi rationem sibi acciscunt: alteram, quæ ex puerperio proficiatur: alteram verò ex particula, quæ affectum susceperat. Illa proculdubio duplicem prouidentiam commendati, unam, quæ quantitati prouideat, alteram, quæ qualitati: hæc verò membrum præcauet, quominus recipiat, & impetum humoris ad ipsum fluentis, vel compescit, vel ad vterum transfert: nam ad aliã partem deferre tutum non est. Sic omnes, qui ex puerperio diminuto, vel suppresso proficiuntur affectus, hanc vnum habent communissimam curandi rationem, copiosiore nimirum excitare purgationem. Quod si vel nequiuert, vel remoretur, vel affectus citius, & maiorem prærequirat diligentiam, tunc quidem altera vacatione, quæ ei sit affinis defectum supplere opus est. Quamobrem venas tali inscindimus, vel cucurbitas in suris, & fœmoribus affixas sacrificamus, uel si ex toto puerperium supprimatur, & nullis remediis cesserit, ut non speremus iterum rediturum, hemorrhoides euocamus, quæ ob partium viciniam defectum purgationis vteri mirè adimplent. Quod si vel parum, aut nihil profluxerit ex vtero, coniectandum est, an sanguis a natura purgatus puerpe-

Morbi ex puerperio quomodo curandi.

nj

*Purgatio in
puerperis
et aliis.*

rii quantitati, vt par est, respondeat: ac si ita sit, tunc vltra est considerandum an affectus maiores, & plures præstet cacochimia, quàm plenitudinis notas. Nam eo tempore cessante purgatione vteri, vel si parca fuerit, aut impuri sanguinis, ac vrgenti malo, purgationi humorum innitendum est in quouis affectu pro idea humoris peccantis. Nec vereri plurimum oportet affectu vrgente purgatione vti, etiamsi aliquid per vterum instillet, dummodo sanguis nō sit: si enim purgamentum aliud fuerit, verendum non est. Quippe non raro pleraq; mori conspiciamus, aut in graui aliquo periculo versari, cum medici timidiore facti purgare renuunt sperantes, donec ex toto purgamenta illa fluere desint. Quam obrem tutius mihi videtur consilium, si vacuatio illa sufficiens non videatur, purganti medicamēto vitiosos humores copiosius expurgare, vt deonerata natura facilius, quos adseruauerit, concoquat, ac pellat, modo per vterum, modo per signatam aliam regionem: nam mihi non erit impedimentum: per aliam regionem ab vtero naturam reuocare, si per ipsam vacuatio facta nō sufficit, & affectus vrgētiōr indies fit. Tutius enim est subito causam deponere, quantum affectui sufficiat, quam parca vacuatione à natura facta contenti, auxilium differe, donec ex toto natura succumbat, & nihil subinde proficit.

Cæterum si affectus ex immodica puerperii purgatione suboritur, prudenti coniectura pensandum est, quantum id, quod profunditur, excedat naturalis purgationis puerperarum copiam: vel quantum vires prosternat. Et nulla ratione antè prouidendum est affectui, quàm profusioni, si immodicam quoad debitam quantitatem, vel vires esse comperiamus. Verum si tempore, & duratione copiosior potius, quàm subita quantitate, & immoderantia extiterit; tunc affectui prouidendum primò est, & profusionem moderaberis medicamentis, & alimentis.

*Dextera pueri
oculos habenda.*

Sed maiorem prorsus, & grauiorem infert dubitationē affectus, qui ex morbo corporis apparatu proficiscitur, vtero sese optimè expurgante. (Nam si rectè non purgetur, prædictam diligentiam requirit) quod eo tempore nec reuocare neq; citare vteri purgationem liceat, nec rursus naturam aliis vacuationib. distrahere, aut aliquam illi contrariam monere. In quo sanè ancipiti casu vel affectus exacerbabitur nullo facto præsidio: vel si aliquod præstiteris, natura à proprio munere distrahetur, & fortasse puerperium præpeditum fiet materia morbi. Quam obrem tunc videndum est purgata ne satis semina fuerit, an minime: quod si puerperii purgationem, vt par est, præcessisse compertum sit; aliam, qualem affectus postulauerit, excitare, si vrgentiissimus fuerit, non erit ab re. Si verò mitior, tenuiori victu, & optimo viuendi gñe affectū conterere satius erit, quam ob leue periculum incertum, in grandius, & certius naturam deferre distractam à necessaria, & consueta vacuatione. At si compertum fuerit puerperium satis naturæ non esse, nullum aliud reperire poteris præsidium, quàm vltiorem efficere per vterum purgationem, vel per aliquam ex iis, quas eius defectum antè supplere diximus. Consimilem quoque curationem scribes, si ex causa aliqua procatactica affectum proficisci cognoscas, facta prius coniectura, vtrum ex hic causis continentibus exterior moueat aliquam: nam si puerperium vitiet, vt illi conuenire diximus curationem institues: si uerò morbum corporis apparatus, vt mox dictum est. Verum vt exactius intelli-

gas

Agas quid in unoquoque affectu agendum sit: proponam exempli gratia grauior affectus, quos enixis frequentius accidisse comperimus: illicq; adscribā peculiarem curandi rationem prout puerperarum status exposcere uidetur.

Quod frequentius ijs, quæ pepererunt euenire scimus, febris quidē est, idq; plerunque fixam enixis, ut constat ex Hip. lib. 3. pop. par. 3. in historia eius quæ decumbebat circa frigidum, & lib. 4. par. 3. in historia uxoris Cycici, quæ gemellas pepererat, quibus non solum febrile, sed & periclitari non raro contigit: nam rationi videtur consonum, cohibitam semel menstrui purgationē (maximē quod sæculentum ex fœtu superest) aliquod posse contrahere vitium, quod licet aliquo tempore leue sit, & occultum, ex aliquo tamen partus labore vel errato, aut sola fixus commotione in putredinem, ac febrem degenerat, vel reliquum totius corporis apparatus conspurcat: haud secus, quam vehemētes dolores efficere habent ubi corpus humoribus abundat. Sic. n. Epicratis vxori accidisse retulit Hip. li. 1. pop. par. 3. tex. 2. 2. cui ex partus laboribus præexistēte in corpore apparatu, rigor non mediocris superuenit, quo tertio die a rigore filiam peperit, & omnia ritē habuit. Quam postridie partus febris acuta inuasit: In cuius enarratione constat crudos, & biliosos humores abundare: illos, quia riguit citra febrem; hos uero, ob accidentia, quæ deinceps annumerat. Cui consimilem affectionem recenset eod. li. tex. 28. In Dromeadis vxore, quæ filiā enixa, postridie a partu rigore, & febre correpta est; licet partus optimē successisset tamen ex commotione morbofi apparatus id malum principium duxit. Cuidā ē mulieri, quæ apud Pantimedem degebat, idem malum accidisse refert. 3. pop. par. 2. tex. 7. dicens. Ex abortione infantis, primo die igne est correpta. Quam equidem ex abortus labore febre affectam fuisse euidenter constare arbitror, sicut alteri accidit, cui ex abortione ad quintum mensem febrem succrenisse refert tex. 8. & 9. Plures quoq; alias facillē reperies, & experimēto quotidiano discēs: sed longē plures ex reuētis, vel improbē purgatis a partu mensib. Quod sanē uxori Philini in Thaso filiam enixæ contigisse retulit Hip. 1. popu. p. 2. tex. 21. quæ igne est correpta 14. die a partu, cuius computationem ab eo die instituit Hip. q. ex suppressa purgatione, ut Gal. primis commentarij verbis retulit, laborare cœpisset. In reliquis uero, quas nuper retulimus, iuxta optimam rationem est computationis principium sumere a die laboris & partus, ut ex historijs satis patere censeo. Sed febrem accidisse ex mensium suppressione mulieri cuidam, quæ apud frigidam aquam in Thaso egrotabat, retulit Hip. lib. 3. popu. par. 3. tex. 75. quæ licet ante partum febricitasset, tertio die a partu acutā inceptit febrile præcedente rigore ualido.

In quibus sanē febribus, & in ijs, quæ similes existunt, omni studio curandū est inceptam naturę purgationem cōplere, si eius defectu morbo traxisse principium consterit: sin aliter, & ab apparatu morbofo suboriat, per eandē regionem (nisi urgentissimus fuerit affectus, & ex propinquiori loco expostulauerit euacuationem) euocandam esse naturam, omnes uno consensu docent, idq; euidentius Hip. qui balneis, seu (ut Gale. docet) pēsis utebatur, quibus purgatio euocaretur, & inflammatio subsideret.

*Curatio febri
a refo biver
senio. et a mor
bo apparatu*

Sic

Sic equidē li. 1. pop. par. 3. tex. 21. retulit; & eadem parte in historia Hēpēcratis vxoris inquit. Per suppositum autem hæc releuata sunt. Nos autem eandem rationem in sequentes, suppositis seu pessis, qui menses moueant, vtendum esse censemus. Sed tutius quidem mihi videtur, ad maiora auxilia manus extendere, quia febrium furibunda conditio rarō tandiu differt symptomata, & grauiora mala, quæ solēt afferre, quin aliquod protinus præsidium adhibere sit opus. In quo sanē malo (si nobis constet ex lactis vbertate febrem non oriri; qđ prius, quam auxiliares manus adhibeas, distinxisse est necessum ex mammarum durtie, turgentia, dolore, calore, cum dorsi, & scapularum grauitate, & calore) sanguinem quam citissimē mittes ex tali venis, quantum sufficere videatur ad plenitudinem deponendam, vna aut repetitis vicibus. Postmodum verō si vires vltiorem sanguinis profusionem per venam magnam non posse ferre videantur: purgationem euocabis, & sanguinem quoq; minues, affixis, & scarificatis cucurbitulis fœmoribus, & suris: aut, si mauis, per mariscas id facito. Cessante autem protinus puerperij fluxu, transactōq; statuto purgationis tempore, ex vena iecoris, si distemperiem adhuc præse constet; aut ex venis brachiorum, si plenitudinem, tutō mitti sanguis potest. Quo facto, humorum, qui morbosum continent apparatus, vel eorum, in quos degenerat puerperium, prouidentia habere oportet; & cuiusque naturam tenuatis crassioribus, retusis quæ acres existunt, refrigeratis calidioribus, admixto tamen aliquo ex ijs, quæ tenuandi vim habent, quo promptiores sint ad expurgationem per vterum. Ac si id non tentauerit natura, tu ipse medicamentis per aluum purgato: cessante tamen sanguinis purgatione; vel ad minus solum instillante: nam si necessitas vrgeat, cunctandum non est, quin protinus cessante (vt diximus) sanguine purgemus: præsertim si, quod excernitur, corruptum fœculentumq; est, & parcissimum, & quod magnitudinem mali non minuit. Itaque, & copiam sanguinis, quantum natura assuescit, & nititur expellere, minuere oportet; & reliquorum humorum expurgationem moliri, prædictis coniecturis præhabitis: & vteri curam gerere, vt patentior primo fiat: quo facilius per ipsum prorumpant qui abundant humores, vt vna sequamur naturæ motum, & noxij educationem: quod pessarijs, & inunctionibus. 2. lib. adductis faciliē consequeris. Reliqua verō, sicut in cæteris corporibus agenda sunt, excepto acidorum, & nimis frigidorum vsu, nam semper in his vereri oportet vteri naturam, conditionem & opus, quod eo tempore molitur, nimirum sanguinis, & aliorum humorum expurgationem: quam equidem interdicit frigidorum vsus. Sic & acida vterum quoq; maximē offendunt, iis maximē, quæ nuper pepererunt, nisi constiterit ob ingentem calorem, & siccitatem forsan prohibitam esse humorum expurgationem, quod ipsi crassiores ex nimio calore adurente fiant, & viæ ob siccitatem arctiores: quo tempore paulo liberabilius frigidis potionibus utendum est.

Est quoque alia febris natura, & conditio enixis peculiaris, & propria, quæ nulli alteri fœminarum sorti accidere visa est, aut saltem per quam raro: nimirum cum ex puerperij suppressione, vel diminuta profusione purgamentum ipsum in vtero putrescit, suppuraturve. In quo sanē opere necesse est febres fieri iuxta Hippocrat. decretum. Dum pus conficitur, & cætera. Id certē monstrant, quæ

- A** qua ab utero eo tpe prodeunt graecolentia fetida, aquosa, aut saniosa, vel alia quavis qualitate pessima affecta. Quae febris species eodem omnino modo fit, ac ceterae omnes, quae principium sortiuntur ex minera aliqua putredinis, vel ex bubone, aut tumore alio praeter naturam: nam putrescentibus in utero humoribus cor incalescere, & febrem subinde fieri certum est. Cuius affectionis latè et meminisse Hip. constat lib. 1. de morbo. mul. referentem cuiusque febris à partu perficiendae causas per haec verba. Quum mulieri puerperae purgatio non facile procedit, velut uteris inflammatis, & osculo ipsorum concluso obtorquetur. n. stomachus uteri post pueri egressum. Si. n. quid horum fuerit, purgatio non procedit. Has autem veluti causas primo scribit, & subdit. Si verò non processerit purgatio, contingeret ipsam febrere, & horrorem habere, & ventrem magnū esse & si ipsam attigeris, totum corpus dolere, maximè si quis ventrem attingat, & aliàs atque aliàs stomachi dolore vexatur, & lumbos dolet, & cibi fastidium, & vigiliae, & punctura adest. Postea quinto, aut septimo die quāque; venter turbatur, & succedunt nigra, & valde graecolentia aliàs atque aliàs, & vrina velut asinina.
- B** Quibus verbis euidenter ostendit signa, quae praedictā affectionem apertè monstrant: & pergit dicens. Si verò venter ipsi non turbetur, neque purgatio prodeat sua sponte, neque ea, quae commoda sunt, breui exhibeantur, & ipsi autē progrediatur, multò magis ex praedictis affligetur, & insuper periclitabitur, ne liuida fiat, velut plumbum, & aquam inter cutem incidat: & umbilicus stabit ipsi ab uteris eleuatus, & circuncirca nigrior erit: & ubi haec facta fuerint, fieri non potest ut mulier superstes maneat: pereunt autē alias alio tpe pro corporis, & affectionis ratione: verum unam, & vigesimam diem non excedunt, id quoque plerumque sic contingit. Quae sententia vix complexum fuisse vniuersam huius affectus praesagandi rationem: & mox inquit. Si verò purgatio ipsi eruperit siue a pharmacis, siue sua sponte: sit etenim hoc si uteri os laxarint à sanguine acervatum de repente coacti. Quo verbo complexus est potissimam, & immediatam horum malorum causam. Et si eruperit, graecolentia purulenta depurgantur, quāque; et nigra, & melius habebit, & curata sanescit. Hac. n. vltima suae parte sapientissimus Hip. praesagium ad salutem, & medendi rationem videtur docuisse. Consulit quidem purgandum est, idque duplici modo; altero per vterum ipsum, quo secedat, quod cōfertim ibidem immorabatur. Qualia verò sint, quae id efficere valeant (velut pefalaria, & alia huius generis) mille in locis reperies, praesertim c. de uteri distemperie cum affluxu humorum, & de epilepsia per consensum ab utero. Altero vero per ea pharmaca, quae totum corpus expurgent ab humorum vitio, dum ipsis ex malo uteri aliquid iam cōe factum est. Verum ut quis exactè intelligat, quid in hoc malo agendum sit, expendendū est in eius curatione nil vilius fore, quā menses euocare: quia tñ maiorem calorem medicamenta id efficientia concitare nata sunt, ob id ad sanguinis detractionem ex talo confugiendum est. Quo sufficienter extracto per venae sectionem, aut per scarificationes, syrupis putredinē compescere est opus: tandem vias reserare, humores inscindere, & attenuare. Ac postmodum si febrem cōem factam esse reliquis humoribus cōperiamus, corpus vniuersum purgare dubitandum non est: et si aliquid purgamentorum uteri adhuc supersit. Cognosces autē febrē factam esse cōem, quod praecesserit copiosa fetidorum purgatio: & non solum ob id non est facta minor, verū indies exacer-

ba-

*Si affe-
ctus
est com-
muni
motu
euan-
escit
regio
vter.*

batur magis: quod euidentius est argumentum, reliquos corporis humore vitium iam contraxisse. In hac etenim re scitu dignum iudicavi, solo vteri vitio, quum-
 A
 nis putrido humore scateat, purgandum non esse, nisi per ea medicamenta, & pessaria, quae vterum ipsum purgare solum nata existunt. Ceterum si vel incorpore praesit morbosus apparatus, quo vereamur, ne communis fiat febrilis affectio: vel reliquis venis, & humoribus totius corporis iam putredinosus calor elucescat: tunc quidem mihi non est dubium, quin corpus purganti pharmaco euacuandum sit. Nam si quis dixerit, solum per regionem, cui natura innitur, per loca conferentia purgandum esse: intelligat velim, id non esse semper verum, neque tutum, sed quoniam vacuatio per aliquam regionem facta sufficiens est pro humoris peccantis copia, & regio conueniens est illi humorum sorti. Verum ubi quantitas non satis facit cachochimiae vbertati, aut regio non est in illis humoribus euacuandis idonea innitendum illi amplius non est. Sic profecto vterus humoribus putridi (quos è sanguine separare studemus) euacuandis conueniens regio minime existit. Praeterquam, si alicui sanguis ex nimia copia per nares erumpit, vena in brachio scissa praesidium fit, & si praeter nimiam plenitudinem exudat, sanguine misso leuamen suscipit. Ac rursus est longe maius beneficiū, quod sequitur ex corruptorum conferta uacuatione, quam sit damnum, quod sequitur ex modica distractione euacuationis, quae per vterum fiebat. Hoc tamen intelligas velim, dummodo sanguis non purgetur, nam eodem tempore tutius est alijs uti auxilijs. Quamobrem non oportet ob rusticum timorem differre, aut simulare quod iuxta optimam rationem fieri tutum possunt: nec rursus tam audacter purgationem aggreditur, ut post habitis praedictis indicationibus aliquid inconsiderate fiat. Quo sane facto, ad alia auxilia confugiendum est, quae putredini, & vitio humorum proficua sunt iuxta humoris peccantis ideam, & vitium. Quae quidem (praeterquam quod enixis, & reliquis communia sunt) e. nuper citatis abunde reperies. Solet non leue periculum ijs, quae peperunt, asserre alui fluxus, sicut medicis non paruum haesitationem. Quippe si vterus ad hoc fluat, quis compescere audebit aluum, siquidem eisdem prorsus auxilijs vteri purgamenta cooperimus: si verò puerperium supprimatur, praedictis medicamentis pressius compescere. Itaque aluum fluere graue existit, sed grauius purgamentum comprimere: cum hoc tamen aluus ocysissime est cohibenda, ut Hipp. consuluit lib. de mor. mul. dicens. Si verò mulier cum puero in pario in partu non prodierit humor, velut oportet, sed siquidem in capite habuerit humorem à calore attractum in partu, & antequam, caput dolebit; Si verò in ventre aceruatim descenderit, ubi concitatus fuerit, ipsum turbabit, & non oportet longè progredi sinere, sed auxiliū ferre, ut ne ex partu ventris profluuiū succedens corpore male habente ipsam dolore affligat. Quamobrem in re tam graui & dubia pensandum est primò quum conferat enixae alui fluxus, qualiterue feratur: ac si constiterit vel non conferre, vel ferri non posse: tunc considerandum est, fluxerint et partu purgationes, nec ne: quod si pro voto fluant, optimis alimentis, & recto vitae instituto laborantem moderari oportet, donec alter fluxuum suarum sponte cesset. Verum si alui fluxus immoderatus fuerit, nulla alia ratione melius ad puerperij purgationem naturam reuocabis, quam cessante alui fluxu ijs medicamentis, quae aduersus causam ipsius pugnent, nullo vel leuissimo ex astringentium silua ex-
 B
 C
 hibito: quin immo administratis quae menses euocent, saltem per inunctiones,
 pessaria-

*De alui
fluxu in
puerpe-
ris.*

- A** pestaria, euaporationes, & reliqua, quæ e. de mēsum sup prellione adduximus. At si ex toto vteri purgationem suppressam esse comperiamus, naturamq; fluctu aluo intentam, tunc citra vllam cūctationem aluū suppressum oportet, purgatis prius humoribus, qui ipsam citatiorem reddunt, & exhibito rhabarbaro cū modico saccharo rosaceo: ni fortè defectum purgationis vteri aluo citata natura supplere studeat: quod equidem ex conferentia, & tolerantia rimari est facile. Quod si astringentibus vti quoquo mō cogaris, ea quidem extrinsecus adhiberi ventriculo conuenit: ne intrinsecus sumpta, vias oēs, & quæ ad vterū pergunt, fieri arctiores contingat. In summa aut vetriculi vitio concitatam aluum alimentis, & optimo viuendi genere moderaberis, & adhibita ē vetriculi pudentia externis inūctionibus, & alijs, quæ ipsi robur addere nata sunt: nec displicebit electarium diarrhodonis porrigere cum decocto absinthij, aut modicum rhabarbari, quum satis sit, vetriculus beneficiū susceptet vtero illaeso. At si diarrhæa, sit totumq; corpus fluxu expurgetur, neq; ipsum impedire, neq; vterū amplius citare, sed vires custodire est opus, quum satis sit, vt naturam se exonerasse, & vtriq; vacuationi suffecisse comperiamus. Si verò in dysenteriam fluxū degenerasse constet, ipsum post habita vteri purgatione finire rhabarbaro exhibito oportet, prius in tentatis, q̄ ablunt clysteribus, aut ijs, quæ obleniunt, retunduntve humorum acrimoniam, & mordacitatem medicamentis. Quod si minime profuisse videatur, ad eorum expurgationem veniendum esse consulit vrgentissima morbi natura: in qua non dubitarem ante rhabarbari vsum, ex talo sanguinem mittere viribus nō renacentibus. Postmodum autem ad ea, quæ in quouis fluxu indiscriminatim Hipp. præcipit, adeundū est. Inquit. n. lib. de natu. mul. Si ex partu fluxus corripiat, & cibi in ventre non maneat, vuā passam nigram dato, & mali punici dulcis grana trita, & coagulum hædi vino nigro diluito, ac vtere. Quibus consimilia verba scripsit lib. i. de mor. mul. dicens. Si ex partu fluxus corripiat, & cibi in ventre non maneat, vuam passam nigram dato, & punici dulcis mali corium, & interdum nucleum, & coagulum hædi, hæc vino nigro diluta, & caseo caprino, & polenta triticea inspersis bibenda dato: triticum aut modicè torreto. Ex his. n. sententijs ego methodum generalem, & sistendi tantum eruerem, materiam autem in aliam vsui probatiorem mutare.
- C** Vomunt quidem quæ nuper pepererunt femina, idq; non rarè; plerunque cibum, aliquando crudos, & pituitosos humores, vel quosuis alios iuxta succorum, qui redundant, naturam: ac nonnunquam sanguinem ipsum, vt ex Hipp. constat lib. i. de mor. mul. dicente. Si ex partu sanguinem vomat, hepatis fistula fauciat est, & dolor ad viscera procedit, & conuellitur. Et lib. etiam de natu. mul. eadem iterum verba refert. Vtunque enim vomitus enixis super excresecant, graue & periculosissimum est. Quippe si alimentum excernatur, deficiet ad puerperij purgationem vires, & enixa indices labascet magis, & lacti deerit commoda materia. Si vero reliqui humores expurgentur, vereri oportet, ne pre nimia eorum turbatione, & agitatione febris subsequatur, quæ vomitib. adiuncta, & cacochemie subiecta periclitari procul dubio feminam cogit. Verum si sanguis erumpat ex fauciatâ iecoris vena, peritimescendum est, ne icter impense refrigeretur, & ob id malus corporis habitus, & hydrops subsequantur. Præterquam, quod omnes tres uomitus sortes (sed maximè quæ ex sanguine sit)

na-

De puer
perari
vomitu.

natae sunt puerperij purgationem sistere, & ad supernas sedes ocysimè euocare, quamobrem peculiari diligentia curandum est vomitum compescere. Eum quidem, qui ex alimentis concitatur, roborata retentrice ventris facultate ijs, qui exterius apposita calorem, & viscera firment, & simul corrigant, si quod vteri vitium illuc transmittitur: qualia diximus c. de ventriculo ob vterum affecto: qui referre iterum hac in parte, ne tædiosus fiam, non placet. At si vomitus ex alimentis quoque fiat vitio alicuius humoris aduentrem confluentis, acris nimirum, & mordacis, ea lege compescere opus est, ac si iidem humores vomitibus excernerentur. Quo tpe, præter debitam victus institutionem, vitiosos humores qui primum occasio permiserit, expurganti pharmaco educito, seruatis omnino eisdem legibus, quas in alui in fluxibus adseruandas esse diximus. Verum si sanguis vomitu reijciatur, omni diligentia curandum est sanguinem ad vterum reuocare. Primò quidem ipso per tali venas profuso, & copiosè aliquando: vel si femina non tulerit, per cucurbitas cum scarificatione suris, ac femoribus affixas. Quo facto coniectandum est, an sanguinis profusio ex vbertate, vel ex naturæ errabundo impetu fiat: an potius ex vase aliquo in iecore disrupto, aut exeso (cuius Hipp. meminisse constat lib. 1. de mor. mul. in cuius subsidium hæc adducit præsidia. Hæc lac asinæ bibat, deinde vaccæ nigræ ad quadraginta dies, & sesamum tritum, donec probè habeat) si primum quidem, nullis medicamentis vtendum est, sed deoneranda natura, aut ad vterum euocanda. Si verò secundum, eis vtendū erit pharmacis, quæ vel emplasticam habeant vim, vel agglutinantem non omnino posthabita puerperii fluxione: sed partim euocantibus menstrua per vterum, & inferas partes, partim verò per ea, quæ sanguinem sistunt deuorata, aut epotare: reperiens autem huius census non pauca lib. huius operis 1. c. de immodicis mensibus, & lib. 1. nostro indic. c. desistendis fluxionibus. Dimitto et hac in parte vitus tum parsimoniam, si ex vbertate sanguis fluat, tum tenuitatem, & laudabilem substantiam, & alia itidem, quæ prædictis locis abundè scripsimus. Est, perculdubio in puerperis difficilis respiratio graue admodum malum summeque periculosum: tum ratione signi: tum verò, & quod grauius est, ratione causæ. Vt signum, quia indicat instrumenta respirationi subseruientia purgamentis partus vitari, ac repleti, quod quidè quantum mali sit, nemo ambiget: vt causa verò grauius profectò est, & perniciosius, quod vehemētissima illa, ac velocissima thoracis dilatatione, & compressione copiosius trahetur puerperij humor ad thoracem ipsum. Censeo tñ, utcumque sit, difficilem spiritum, & gutturis inflammationem, vel iecoris, aut cuiusvis alterius partis, præsertim internæ ex suppressio puerperio frequentius aduenire, si utcumque respiratio vitietur, quod quoque aliud malum: & ob id omni arte curandum est per vterum naturam euocare, vel saltem per infernam regionem, & quod in corpore supererit, euacuare sanguine misso ex talo, vel ex suris, aut femoribus. Verum in his omnibus inflammatio nibus, ac difficili respiratione id perpetuò obseruandum est, nimirum quòd si sanguine ab inferis partibus sufficienter misso affectionem adhuc crescere contingat, facta cōiectura plenitudinis affectæ particulæ, siue guttur, siue caput, aut pletura sit, mihi nō est dubium sanguinem ex viciniore parte esse mittendū, et si puerperium fluat. Nullo enim alio modo citius praeuere poteris suffocationis periculum in pleuriudē, difficili respiratione, vel angina, quā ex viciniorebus,

*Vomitum sanguinis
in puerperis
curatio*

*De puerperarū
angina,
& difficili
respiratione.*

Ahus sanguine mīllo: euocatis etiam eo tpe mensibus per frictions, ligaturas, & cucurbitas inferis partibus adhibitas, quibus irruentis sursum sanguinis impetus citius retrahatur: maximè si citior factus fuerint sanguine mīllo ex superioribus. Cetera verò, vt in reliquis corporibus administrabis.

Contingisse aliquando comperimus, præsertim primiparis incautis vel ex frigore compressa purgatione, vel ex intermapparati pleuritide, & perniciosa quidem a partu corripit: graue aliou malum, quod in præfocationis periculum enixas non raro deducat. Quod fecisse Hip. constat lib. de natu. mul. doctem. magnis malis puerperas esse expostas, si parum sibi cureant, & primiparæ sint, quod sane contingit non raro comperimus ex quauis alia mensiem suppressione, vt Hip. refert lib. 7. popu. in historia vxoria Cleomenis, quæ ex ze firi flatu in grauem pleuritidem delapsa fuit, ob mensruorū ad thoracē recursum; quod & his & enixis facillimè contingit, quod sanguis per vterum affluxurus promptè, ab his causis per venas cōes, quas non paucas, neq; paruas vterus cum thorace habeat) regurgitet in aliquod latus, quo sine sit, vt non raro accidat enixis difficilis respiratio, vel grauiorē alia thoracis affectio. Sed in hac quidem re licet ex neotericis aliqui primò morbi accessu audeant ex brachio sanguinem deirahere, mihi id consiliū nunq̃ arrisit: siquidem primò nature motum sequi, & alterum præter naturam motum ab affecta parte ad quā distantissimas auertere, tutius & vilius lōgè visum est, ex talo nimirū sanguine primò sufficienter extracto, quantum videlicet sit satis, & pro puerperij fluxuri copia (si non omni, saltem vti aliunde non facile natura permittat, ex quauis superna vacuatione abire) & pro impetu motus ad partem affectam reuulsionē, euacuationē. Præceperat. n. Auic. in pleuritide nullo adhuc habito ad corpus enixæ respectu sanguinem ex talo, ne dicam contrario, mittere, nedum in femina, cui puerperium adhuc fluitat. Quam ob rem cum puerperium ipsum sua sponte videatur correpugnare mīllo sanguinis ex brachio, quatenus vires vitæq; vacuationem non permiserint: quia brachium contrario in loco existit ei, quem natura, in puerperio sibi elegit, & tuetur, ob id quidem verendum plurimum est, ne illi vim facto sanguinis contrario motu inferamus, retrahamusq; fortasse puerperium ad locum affectum.

B Quapropter consulto primò sanguinem mītu, semel his, aut ter ex talo, postea verò si affectum his non cedat cum iam sanguine mīllo ex talo satis factum sit puerperio, ad venas brachij deueniendum esse consultit, & permittit affectus vrgentia, & ratio. Deinceps vero sicut, in quauis alia pleuritide ad expectrandum humorem confugiendum est eclegmatibus, decoctis pectoralibus, & syrupis. Postea, ne tussis, & dolore puerperium ad superiores partes euocetur, clysteribus utendum est, qui & purgent, & attrahant, ac vteri vias aperiant, purgationiq; aptiores reddant, velut est, qui recipiunt alia, bisualia, mercurialis, blitis, branchæ vtilia, & foliorum caulium rubeorum ana. m. j. horum chamæmali, meliloti, ana. p. j. seminum lini, anethi, alithæ, fenugræci, & anisi conuassatorum ana ʒ. i. fiat omnium decoctio ad li. j. & colentur, ac dissolue in colatura catholici ʒ. i. mellis rosati, olei violarum, & sacchari ana ʒ. ij. Reliqua verò sicut in quauis alia pleuritide facies, semper tñ præhabita vteri fluentis prouidentia, quominus puerperij purgationes cessent, donec debitum ips præterierit. Tunc. n. (vel antè, si necessitas vigeat, aut purga-

C De pleuritide puerperæ a qua parte p. s. s. g. m. i. t. e. s. i. g. e. a. q. u. a. g. o. s. t. h.

tiones cessasse constet) leui aliquo expurgante non recusarem aliu subducere. **A**
De tussis in puerperis. Est quidem molestissimum enixis, ac periculosum accidens tussis. nam præter causam, quæ ipsam extitit, considerationem & periculum, motu illo vehementissimo ad superiora proculdubio puerperiu euocatur, sitq; sæpissimè causa maioris mali, quàm tussis ipsa sit. Quamobrem duo in hanc curationem summo pere obseruanda esse censeo: primum quidem, ne mēstrua purgatio subsistat, superprimaturve, facta summa diligentia, vt copiosior euocetur, ita vt quantum tussi ad superna retrahitur, auxilijs ad consuetum euocetur locum: secundum verò, vt omni arte vel humoris crassitiem inseindamus, tenuitatem compescamus, & aduersus vnamquanq; eius qualitatem ex aduerso pugnemus: exhibitis adinuicem, quæ tussim leniunt, pharmacis. Quippe hæc sola prodesse in hoc casu non rarò probauimus: quorum rationem, & copiam reperijs facilè lib. nostro de auxil. indic. c. de expurgantibus per sputum. In qua sanè re expendendum quoq; est, an vitio uteri, & ob aliquid ab eo ascendens halituosum, mordax, & acre tussis moueatur: cui prouidebis præmunito a causæ inclementia corpore, cauēs ne, si frigida fortè sit, nimium superiores partes calfacias, periculum. n. est, ne calore ad eas puerperium euoces. Verùm si ex utero fuerit damnum, maiori diligentia purgationem eius procurabis immissis pessarijs ex mercuriali, agarico, aut aloë. Solent non rarò hæc affectiones enixis superuenire vel vitio sanguinis fluentis vel defectu congruæ, & copiosæ purgationis. Sed delirium aliquò oriri ex melancholia, ob nimiam sanguinis suppressionem, qua crassior propter adustionem efficitur, aut ob nimiam profusionem qua relicto crassiore melancholiam fieri, mihi certum est. Dimitto aliquò ex adustis febre humoribus, caputq; irruentibus, vel ex tetro, deprauatoq; halitu posse quoq; fieri. Si tamen ex immodico fluore succrescat affectio, curandum semper est, vt sanguinis profusio cesset, vires reficiantur, & dittemperies frigida, ac sicca corrigatur, sicut in reliquis corporibus. Quod si ex vitio, vel suppressione purgationis fiat, studendum omni diligentia est, sanguinem euocare: vel, si id perdifficile fuerit, ipsum expurgare medicamentis, quæ aduersus adustos, sæculentos, & crassos humores pugnent: qualia retulimus lib. huius operis 2. c. de melancholia virginum, & vidu. Sed peculiarior prouidentia habenda est de talo inseindendo, scarificandisve suris, ac femoribus, & de crurum lauacris, ac omni deniq; auersione, & euocatione ad inferas partes, idq; maximè per hæmorrhoidum, pronocationē, & sanguine, ab ipsis per irudines vacuato, quòd magni momenti in his affectionibus esse solet. Necnon curandum est paulatinis purgationibus ab spurcitiis humorum sanguinem vindicare, donec purgationem vel redire comperiamus; vel si nõ redeat, ad maiora auxilia subsitaditus, vt deinceps sicut in reliquis corporibus curari possint prædicti affectus.

De pedum, totius corporis inflatione a partu. Non desunt quæ ex improbo vitæ studio toto gestationis tempore habito, à partu intumescant non solum pedes, verum, & vniuersum etiam corpus. Quod pulchrè aduertit Hipp. 2. pop. 2. dicens; Quæ filias peperit gemellas, & difficulter peperit, & non valde purgata est, tota intumuit, deinde venter ipsi magnus fiebat. Hanc sanè affectionem (vt ex loco citato colligi potest) tribus de causis prouenire posse censeo: vel ex improbo vitæ studio, vt dictum est: vel ex inimico potu post partum: vel ex copioso sanguine, quem fœtus non valuit continere,

A rere, neq; femina in partu purgare: & ob id superabundans, & recrudescens in tumorem eleuat partes, præsertim infimas. Sed cessat profectò hoc malum facta à partu copiosiore purgatione, vel superueniente alui fluxu, aut febre. In prima quidem causa curandum est, transactò purgationis statuto tempore, vel saltem diminutis purgamentis, corpus purgare, ac non semel, sed bis, & per epicrasim. In secunda verò, nisi puerperium vberimè fluxerit, sanguinè mittere est opus, præsertim si sanguis adsit, idque ex talo quantum sat sit pro affectus vehementia, & sanguinis redundantia: & postea cessante vteri purgatione pharmaco purgandum est. In vltima autem (nam de potu immodico nil aliud dicendum arbitror, quàm præsciendum esse, & calfactorijs, ac resoluentibus curandū, maximè puerperio transactò) puerperium omni arte euocare est opus, vel sanguinem ex talo mittere, aut cucurbitulas suris, & fremotibus affigere. In omnibus autem causis reliqua facies, sicut dictum est c. de hydropè vteri. Quibus et omnibus peculiari dote hepar ouillum conferre dixerat Hipp. lib. de nat. mulie. Si pariens (inquit) inflata fuerit, hepar ouillum aut caprilum calido cinere obrutum bibendum dato meracius ad dies quatuor, & vinum bibat vetus.

B Superfunt quidem ex affectionibus, quæ enixis accidunt, plures, veluti est conuulsio, tremor, rigor, paralyssis, & pleraq; alia. Quæ omnia Hipp. complexus est lib. 1. de morb. mulie. his verbis; Si verò processerit mulieri puerperij purgatio ad caput, thoracemq; ac pulmonem (sunt enim, & hoc) moriuntur sæpe statim si detineatur ac firmetur. Si vero probè exeat per os, aut nates sana euadit. Si vero morbus paulò diuturnior fiat, patietur sanè mulier ea, quæ dicta sunt de vtergine, cui primum menses comparentes, sursum impetum fecerunt. Narrat item eadem parte quas nam affectiones femina sic affecta pariat: & dum ad faciem fluxio fertur, quæ mala efficiat, ac quibus signis innotescat. Ex quo loco euidenter constat, talem fieri ex puerperio affectionem, qualis fuerit natura partis, in quam humor ille vitiosus incumbit, aut halitus ab eo ad partem ipsam transmissus. Quocirca cum omnibus ferè eandem sit, & communis causa, intellectis & exactè pensatis, quæ hucusq; diximus præcepta, haud difficile erit nosse, quid agendum, aut non agendum sit. Sic profectò multa alia in hac re prudenti medico pensanda dimitto, vt ea aptè disponat, sicut occasio ac tempus permiserint.

De vteri inflammatione, & vlceribus à partu relictis.

Cap.

12.



CONTINGIT non rarò in primiparis, vt strictis oris vteri feminis, vel ex laborioso partu, aut ex fetu grandiori, vel abortu vterum inflammari, & exulcerari. Quod sanè vel sterilitatis, vel grandioris mali causam præstare assolet: ob id profectò si quid huius à partu supererit, curandum est nosse, & præstò auxilijs esse antè, quam in maius vitium commigret. Dixerat enim Hippoc. libro 1. de morb. mulie. Si ex partu vteri fuerint inflammati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest, ex vêtre verò nunquā deficit calor, & sitis, & coxas dolet, & venter imus fortiter intumescit, & aliis tur-

Kk 2 batur,

batur; sedellus autem est humilis & solidus, & talorū vehemens corripit, & cibum
 auersatur, & dolor iuxta sinuiput est, & ventris stomachus non potest trahere
 bere cibos, ac potus, & concoquere nequit, & hili curentur statim; plurimum in-
 riantur. Ex hac affectione si forte femina euadat; suspensum proculdubio vlcus-
 scula, quæ peculiarem prærequirunt in artifice diligentiam, ut paulo inferius
 monstrabo. Sed primitus inflammationi medebris copiosius sanguinem misso p-
 venas tali, & tandem adhibita ea prouidentia & curandi ratione, quæ capite de vteri
 inflammatione adduximus; initium curationis sumentes à sanguinis detractio-
 ne ex talo: cauentes tamen ne vtero nimis frigida adhibeamus, ne puerperii purga-
 tio cohibeatur. Sed eodem lib. Hipp. peculiarem adducit curandi rationem vte-
 ris ex partu inflammatis, ac præter illam cōis inflammationis naturam, affert
 inflammationis rationem. Inquit enim; Si puerperæ inflāmati fuerint vteri in-
 tumescunt, & ubi puerperij purgamenta intus manserint, occultè distendun-
 tur: distenduntur autem ubi condensati fuerint à frigore. His si quidem perfrī-
 gerentur, calfacere cōducip. Si verò inflāmati fuerint, & frigus discesserit, me-
 dicamentum subditum facere, quod inflammationi aduersatur, & simul laua-
 re, ac fouere, & pharmaca adhibere, quæ ego adscribam. Verum ex iis, quæ ge-
 neraliter docet, constat, qualiter sit in hoc affectu agendum, licet quæ ibidē re-
 censer; non sint admodum præsentia: non quod mala sint, sed quod alia utiliora
 eligi possint. Sat. n. est docuisse primitus adhibenda esse quæ dolores leniant, quæ
 ventrē emolliant, & quæ inflammationi aduersentur lauacra, fomenta, & tandē
 reliqua, quæ cap. citato adduximus, quæ eo loco reperiet diligens lector.


Verum si aut inflammatio in vlcus degeneret, aut vlcus ob causas à me supe-
 rius adductas suboriat: id protinus diligenter nosse cōuenit, antea nimirum
 quam aut mali moris fiat, (ut facillimè ob loci conditionem, & excrementa,
 quæ expurgantur, fieri solent) aut in aliud grauius malum degenerent. Docuit
 quidem id cognoscere Hippoc. lib. 1. de morb. mulie. dicens; Si vteri exulcerati
 fuerint, aut sanguis, & pus, & serosa sanies fluit, putrescentibus enim vteris
 morbus ab ipsis fit, & venter inus eleuatur. Tandem subdit inferius. Morbus
 autem maxime corripit ex partu, siquid in ipsis diuulsum computruit. Item
 quæ ex abortu, & alias sua sponte. Ex paulo inferius inquit. Si verò vehemen-
 ter exulcerati fuerint, sanguis & pus purgatur, & dolor fit grauis, & cum dolor
 apprehenderit, velut à paruo dolore hūnt ea, quæ circa fluxum contingere so-
 lent; & cum tempus affuerit, crura & pedes intumescunt, & carani medici hūc
 morbum velut hydropem, verum hic talis non est. Docet autem eodem li. 1. cla-
 rius occasionem, & signa vlcetum, & curandi et rationē his verbis. Quum vlcē-
 rationes in vteris fuerint, ex abortu aut alia quædam causa eas omnes respectu
 ad totum corpus factū curare oportet, quacūq; curatione opus habere visa fue-
 rint: siue ex vniuerso corpore hominem curandam esse putaueris, siue ex ipsis
 vteris; cognosces autem an ab ipsis vteris sint hoc modo. Quum enim vlcera-
 tiones ab ipsis vteris sunt, purgationem exhibent purulentam, & compactam: quæ
 verò non ab ipsis tenuem, & saniosam. Curandi tamen rationem scribit; dicens;
 Quū igitur tenues sunt fluxiones, cum pharmaco eas curare oportet, & dare quod
 sursum, & deorsum purget: primum autem quod sursum, postea verò quod deor-
 sum.

- A sum. Eodem etiam loco docet dum exulcerationes fiunt ex partus, aut abortus labore euocata materia exedēti, & mordaci, quæ id malum efficiat ad vterum, omni arte finita puerperij purgatione pharmaco euacuandum esse, vt humores vomitibus, & alui excretionibus diuertantur, minuanturq; . Verum præmissa hac generali prouidentia studendum est, vt relictum vlcus quam citissime sanescat: quibus autem id fiat, dictum est abundè lib. huius operis. 2. ead. de vteri vlceribus. Caterum si exulceratio sola partus difficultate, vel fetu grandiori dilacerato vtero fiat, nulla totius corporis prouidentia habenda est, sed solius tantum vteri, vt c. nuper citato diximus. Hoc tamen in hac curatione expendendum p ius est, vt ea, quæ in vtero dilacerantur, non astringentibus (ne menses supprimantur) reduci debent ad pristinum statum, sed modicè siccis, & modicè quoq; glutinantib. qualia eodē c. non pauca reperies. Qd si ex dilaceratione in vlcus malum degenerasse cōperiamus: tunc sanè ve' ut quoduis aliud vlcus curari desiderat; hoc uno excepto, quod si menses adhuc fluxerint, velut vlcus cum sanguinis profusione curari debet, licet sanguis ab vlcere non prodeat. Quæ in re primò donec sanguinem cessasse comperias, vlceris curatio post habenda est: non autem fluxus compescendus, velut in prædictis vlceribus cū sanguinis fluxu, sed finiendus, vt sola subsit vlceris indicatio. Si verò fluere cessauerit, curationem institues iuxta vlceris naturam, & conditionem, vt abundè loco citato dictum est.
- B

De rugis, quæ post partum in ventre supersunt.

Cap.

13.

- C  D tantam plerunque magnitudinem excreuit in vtero fetus, vt ventris ipsius eadem non solum tensam reddat, verum, & scissuris non leuibus sæpius discindat, maximè in infima, & secunda cuticula. Quod sanè vitium licet omnibus vtero gerentibus commune sit, ijs præsertim peculiare existit, quæ (vt diximus) grandiores progignunt fetus: malum quidem feminis indecorum, & molestum. Quapropter non pauca ex feminis huic malo prouidentes, à quarto mense granidationis ventre imponunt linteū oleo amygdalarum dulcium, aut sesamino inunctum, & expressum: quo facilius citra scissuras cutis ipsa mollior fiat, extensionique aptior. Sed à partu rugas comprimat, & ad pristinum statum redigit vnguentum ex succo radicis liliorum alborum cum melle, & cera ad ignem compositum.

Confert etiam pinguedo recens, & actu calida cum modica cera rubra ventri apposita: vel mesenterium verbecis, vel caperæ; aut hædi calidum ventri adhibere, uel corium oleo inunctum, uel quod oleum continuerit. Benefacit non minus oleum nucis indicæ illitum: vel (vt ferunt) adipis detracti è vulua vallengæ ʒ. vj. in fictili liquato, & cum puluere cornu cerui fiat vnguentum, quo venter illiniatur: prodest quoque aqua ex albumine oui instillata: item

Kk 3 adeps

adeps agni illitus: cinis testudinis cum albo oui, vel lacte asinino illicus. Ad quorum etenim censum facile erit cuius alia rimari præsidia huic vsui proficua, dummodo quæ astringunt fugiat, ne menses quoque colibeat.

De virginali astrictione à partu comparanda. Cap. 14.



NISI de restrictione amplitudinis vteri propter honestam causam liceret tractare: nullam profectò eius mentionē fecissem. Verum cum ex huiusmodi laxitate aliquando sterilitatē proficisci comperiamus, nonnunquam vteri procidentia, vt Hip. insinuat lib. de nat. mul. præter quam, quod femina sic affectæ proprijs viris ingratiore sunt: ob id sanè pauca quædam studi huic malo asserre præsidia. Confert quidem primò post prægressam puerperij purgationem fomentum ex aluminosa aqua: profunt & pelli ex succo seminis rumicis aridi, & virentis: uel ex gallis in aqua maceratis, deinde siccatis, & lana exceptis. Semen etiam oxila pati tritum in vteri sinu impositum; uel gal lam in aceto maceratam, & postea siccata, cuius puluis super sinum mulieris ablutum conspergatur. Sed summopere profecisse scimus id præsidium, quod recipit sanguinis draconis, boli armeni, corticis mali granati, aluminis, mastichis, gallarum, ana .j. in puluerem redige, & omnia simul in aqua chalibea confice; quo illinito, pessarium ex grossipio factum, in uterum immittito. Prodest, & aliud, quod recipit gallarum, sumac, plantaginis, cōsolidæ maioris, aluminis, chinolix, chamæle ana .j. coquatur in aqua pluuiali, & hac decoctio ne foueantur pudibunda: cui quidem addes aliquid ex ijs, quæ astrictoriâ uim hēnt, velut folia oliuæ, folia vitis & quercus, balauistiū, cupressi poma, cortices granatorum, scoria ferri præparati cum aceto, & reliqua huius nature. Quorū vsum, sicut & reliquorum, quæ à principio diximus, cauere oportet ante integram purgationem, ne fortè ipsa simul suppressa, graue aliquod malum subsequatur.

De nutrice eligenda, & moderanda. Cap. 15.



Lectionem nutricis pulchrè Moschion visus est depinxisse, dicens; Adolescentula, quæ pulchro etiam sui corporis sit colore, & iam bis pepererit, & pectus latum habeat, ipsasq; mammas neq; nimium laxas, & rugosas, neq; interim valde tensas papillas: neq; multum graciles, neq; valde breues, & quæ nō multas cauernas habet, neque iterum parua, & breuis: animosa, & quæ cum integro affectu puerum amare possit, & quæ nunquam irascatur, si fieri potest, grata, & munda sit. Ex qua equidem sententia arbitror, apud omnes ferè peritiores decretum esse, eam in nutricem eligenda fore, cuius ætas sit inter vigesimum quintum, & trigessimum quintum annum, viridi coloris, foris ac robusti colli, pectorosa, musculosa, duræ ac multæ carnis: non obesa, non gracilis: cuius et mammae solidae, ac firmæ sint, mediam magnitudinem, mediamque duriciem obuenientes: quibus lac plurimum sit: à uiro seiuncta, abstemia,

A mia, à menstrua purgatione immunis toto nutritionis tempore: nullis sit affecta morbis, neque alicui peculiariter obnoxia. Quæ omnia expendenda sunt in nutrice, præsertim si addideris enixam esse duorum mensium, & non ultra decimum: non primiparæ, sed quæ purgatissimum habeat lac idque plurimum odoratum, candidumque mediocriter, neque subliuidum, nec gypso simile, nec subacidum, aut amarum, sed dulce, æquabile, non admodum crassum, neque tenue, cuius superuicuum umbonem recte probatio sit, si neque prorsus fluit, neque umbone reclinato omnino constet. Item si in vasculo illius lactis pars aliqua reponatur, cui tantillo myrrhæ adiecto feri pariter atque casei pars equa detur. Probatissimum est, si in ungue hæreat, nec protinus defluat. Ceterum inter reliqua conditiones potissima est, si laudatorum morum nutrix extiterit, quæ neque ocysimè animi passionibus afficitur, neque penitus obtusi sensus, & stolidi sit.

B Atqui licet has omnes dotes in nutrice exquirendas esse dictum sit, nihilominus tamen longè vtilius infanti æstimatur matris lac, quamuis his dotibus careat, quam sit, quod ex nutrice fingitur, quantumvis laudabile existat. Verum in nutrice ob id ea omnia exquiruntur, quæ indicium sint mediocris seu temperatæ lactis substantiæ, quæ cuique infantium temperamento proficuum fore scimus: medium. n. omnibus temperaturis vtile existit, & amicum, quod illis erat necessarium, quibus maternum lac, qualecunque fuisset, denegatur. Si tamen matri puerum committere studueris, vsque quo ipsius temperaturæ præstinæ natura restituitur, eundem nutrix supra electa interdum bis, aut ter lactet, donec puerperæ primum lac, quod colostrum appellatur, instillet, & loco eius probatius generet: qui. n. hoc vtuntur infantes, colostrati fiunt. Quamobrem nuper natis, nutricis lac potius exhiberi conuenit, quod matris exitiosum sit eo tpe: quoniam genitum fuit ex sanguine à quo iam optima pars secreta erat ad infantis alitionem intra uterum: ob idque, exungi debet, & abijci. Bonum autem est lac, quod prodit post purgationem puerperæ perfectam, hoc est, in masculo à trigésimo die: in femina vero, à quadragesimo secundo, vt refert Hip. lib. 1. de mor. mul. aut saltem, vt amice id intelligamus, donec impetus purgationis desierit: deinceps quidem maternum lac fetus suggat, quippe quod alimoniam, quæ, dum in utero infans erat, utebatur, perquam simile existat: muliebria namque in vbera delata, concoctione lactescunt. Quod si vel ex præstantia, & dignitate matris, vel quia lac integrum non sit, aut quia languida uel aliquo mammarum, capitis, oculorumve defectu parens affecta existat, tunc quidem eligenda nutrix est, qualem depinximus.

C Nutricis aut custodiam, & moderamen primò insitute oportet per id exercitium, quo partes supernæ magis exerceantur, vt lac copiosum, & probum gignat. Item viro non accedat, ne vsu ueneriorum menses proficiant. Lac quidem donec mulier conceperit, adseruari facile potest; ulterius aut minimè: ac si menses fluant, corrumpi necesse plerumque est. Ex quo vitio pueri citra dubitationem uel in epilepsiam, uel scabiem, aut alia mala maiori ex parte prolabuntur. Nam licet sint, qui existiment, prius & perfectius fieri lac fluëibus mensibus. duo certe suadent contrarium omnino accidere: primum, turbatio, quam natura perpetitur singulis mensibus. quia eo tpe quid deterius lacti, & nutrici accidere scimus quouis alio: fin, quibus menses non fluunt, id profecto necellum non est, siquidem

Kk 4 id natura

id natura non tentat: ex quo constabit purum superesse lac, sicut in reliquis, & longè magis: quandoquidem nil est, quod naturam turbet, & irritet: ex quo constabit fœtum immunem esse a menstruorum spurcitia. Quamobrem consilium est apud omnes ferè, probatissimos viros, lac statim post mensium exortum mutare: quanquam fœminis partus suos alentibus minus inconueniens existat: nec deest, qui asserat non corrumpi lac fœminis, si ex eodè viro rursus conceperint. Item nutrix admonenda est, vt probatis cibarijs vescatur, & primis diebus quaque vice ante lactationem puero mellis pauxillum lingendum tribuat. Præterea, vt lactis quicquam mulgeat, quod mamillæ præssione, pueri suctionem iuuet, ne fortè vehementi succugulæ instrumenta lædantur, & malarum articulationes laxentur: quod non rarò contigisse constat. Item instituenda est, ne singulis lactationibus vberem lactis copiam, sed parcam exhibeat. Insuper, dieb. primis, quibus lactare incipit, simplicem cibum accipiat, & aquam bibat (nā quæ ratione à pueris vinum arceri consulunt autores, eadem, & à nutrice) ne solidū lac nuper natis infantibus difficulter per angustos gutturis meatus descendat. Pari etiam ratione à falsis, acutis, & astringentibus absteineat, vt neq; porros, cepas, allia, aut cætera huius naturæ degustet. Sed cuique talis vitæ, & victus ratio instituenda est, qualis fuerit pueri natura, & cōditio, & parentum dignitas, aut præstantia permiserit. In qua sanè re cum non parua sit differentia, vna viuendi forma, quæ omnibus sit proficua, signari non potest. Quod si ne his quidem sana degat nutrix, non erit ab re corpus purgare; & vitæ rationem iuxta lactis vitium, & infantis indigentiam immutare.

De lactis defectu. Cap. 16.



INTER alia vitia, quibus mulieres, quæ pepererunt, & nutrices sunt affici solent, potissimum profectò est lactis defectus, cuius hac in parte rationem, causas, & præsidium scribere est in animo. Hanc sanè primam, & maximam, vt Gal. visum est 7. de vsu par. c. 22. animantibus mammae præbent vtilitatem, q̃ in eis ea parte, qua sitæ sunt in mulieribus, copiosissimum benigni alimenti residuum colligi possit, ex quo lac fieri contingit. Quod cum vtilis alimenti superfluum sit, cibus exactè confectus eo potissimum loco constituere mammas conueniebat, vbi facillimè simul, & citissime elaborari lactis copia perfectè cōsistere poterat idq; maximè vltimis gestationis tempore, vt Hip. testatur lib. 2. pop. p. 3. tex. 34. dicens, lac nutrimento mutationem accipere octi mēstri vero perficiente. Quo fit quod à principio gestationis in puerum insumatur materia illa, & postea in lac. Est sanè lac nil aliud, quàm quædam veluti superfluitas nutrimenti partis ipsum generantis, similis quidem ipsius naturæ existens. Quippe mammae adenes quosdam sortiuntur, vim quidem habentes alterandi alimentum ad ipsos confluens, ac sibi ipsis assimilandi: & quia exangues sunt, & albi quando plus alimenti ad ipsos deferretur, lac proculdubio efficere habent, vt Gal. est sententia 5. aphor. 3. 9. Sed Hip. modum generationis lactis, ac defectus eius clarius exponit lib. 1. de mor. mul. dicens; At verò lac quomodo fiat dictum est a me, in natura pueri in partu. Postquam autè prægnans fuerit mulier,

Alier, menses non valde prodeunt, præterquam quibusdam pauci: Dilectissimus. n. humor ex cibis, ac potibus ad mammas vertitur, ac exigitur, & necesse est etiā reliquum corpus magis euacuati, & minis sanguine plenum fieri: atq; hoc ita contingit. Sunt autem quæ natura sine lacte sunt, & quibus lac deficit ante tps. Hæ verò natura solidæ sunt, & dense carnis, & propterea sufficiens humor non penetrat à ventre in mammas, cum ita sit densa. Quam causam ad enixas, non minus transferendam esse censeo. Cum. n. humoris, qui veluti superfluitas alimentum ipsarum mammillarum est, vel admodum exiguus existit, vel omnino deficit lactis defectum seu inopiam appellamus. Atq; cum ad fetus alimoniam utriusque nas natura comparauerit, dum utero geritur, ac dum in lucem prodit mamas; et hac ratione certum quendam respectum inter has duas partes tribuisset: fit facile, ut è toto corpore in uterum sanguis dilabatur, & post partum ex utero, & reliquis partibus ad mammas relabatur, futurum infantis alimentum. Quod cum defecerit, vitium ipsarum mammillarum esse inficiabitur nemò, mò id per essentiam sit, modo per consensum vel a toto, vel ab utero. Ex quibus cum affectum prodire censemus, quem ad genus retentorum immodicè iure optimo reduxeris: Causam verò inuestigabis, si prius modum generationis contempleris: quippe generatur, vel non transmissio sanguine à reliquo corpore in mammas, vel ab ipsis non attracto: quamobrem, & mammillarum vim, & sanguinis copiam rimari prius oportet, & quantum qualisve in venis existat, ut Gal. optimè aduertit. 5. simpl. c. 20. & 21. Si quidem vel quia vitiosus est non trahetur, vel, quod parcissimi malit eius copia, aut corpus sit imbecille, non transmittetur. Quibus non raro accedit infantis imbecillitas, qui ob id lac suggere nequit: nam ad ualidam functionem certum est tractionem sequi. Rursus hic accedit corporis ariditas, cuius ratione auidè alimentum quævis particula ad sui alimoniam completitur ita ut nihil sit pro lactis generatione residuum. Extrinsecus insuper subitus aliquis casus adueniens, animæ perturbatio, dolorve frequentissimè illuc sanguinem, & humores alliciunt: quo fit, vel lac diminuat, ut vel auferatur omnino.

Quod si totius corporis habitus, vel temperamentum siccum existat, gracile, & ex carne: uel si præcesserint sanguinis copiosiores uacuationes, exercitiū uehemens, fames, uigilia, meror, sollicitudo, aut febris arida æstuansq; , ac id genus aliqui, quod plusquam expediat corpus dissipet; rationi uidetur consonum sanguinis defectum potissimam esse diminuti, uel deficientis lactis causam: nam hæc omnes causæ non solum sanguinem minuunt, uerum, & lac ipsum conterunt, aut saltem uitiāt, cuius naturæ censemus esse, quæ frigida sunt temperiei. Verum sine hæc quidem adesse constet, sed graciles, rugosas, & contractas esse mammas; ob propriam earum imbecillitatem, aut aridam intemperiem prone nire lactis defectum credendum est: quod trahere tamen sanguinis nequeant, quantum sat est ad lactis confectionem. Quod si ex uitio sanguinis lac defecerit, id facile distinguas signis, quæ ipsum esse biliosum, melancholicum, aut pituitosum ostendunt: quippe qui humori est sanguis, nequit in lac mutari, aut in uitiosum commigrat. Quod sanè ex lactis colore, substantia, & sapore potissimum inuestigandum est. Biliosum etenim sanguinem cognoscas ex lacte seroso, tenui, flauo, amaro, maxime si consideres nutricis habitum, & iecoris temperamentum. Pituitosum, si extiterit crassioris substantiæ, albi coloris, & saporis accidi: quibus maiore fidè præstāt

nutricis

Causa.

Signa.
causa-
tum.

nutricis temperies, ætas, & habitus pituitosis. Quemadmodum si lac fuerit maioris spissitudinis, paucum, obscuriorisque, & fusci coloris: tunc amplius id confirmabis, si cætera, quæ diximus in nutrice, melancholiam attestentur.

*Curadi
ratio.*

Si lac deficere sanguinis inopia compertum sit, vnica superest medendi ratio, quæ ipsum adaugere sit nata, velut est ea victus ratio, quæ plurimum sanguinis generare valeat. Quam equidem duplicis naturæ esse oportet, calidæ nimirum, & humidæ, neutra tamen excedat: nam talia esse, quæ lac generant, lib. 5. simpl. c. 20. Gal. dixerat, siue medicamentum sit, siue alimentum. Secundo etiam optimæ substantiæ, & multi nutrimenti, si quidem eiusdem naturæ lac esse oportet. Quo fit vt totum corpus humectare opus sit, & bonis cibis alere, qui copiosum sanguinem gignant. Præstat itaq; primo optimum alimentum lac è sanis animalibus desumptum, velut, & caprilum aut ouillum, lac decoctum cum vitellis ouorum, & saccharo: item pulmentum ex oriza prius in aqua, deinde in lacte elixa, & amyllum cum lacte, & melle. Carnes in super gallinarum, caponum, phasianorum, pauonum, præsertim eorum, quos ex India asportantur: caro hæduli, agni, & porcellorum assa, verum hæc carnes cum pane, & salsamentis edantur, eruca & melle confectis. Præstant ex piscibus barbuli, troctæ, hesucus, salmo, & id genus alij. Item cibus albus ex gallinarum pectoris, oriza saccharo, & lacte confectus. Cui quoq; vsui placentas formamus ex sesamo cum melle, quas nouimus abundè lac præstare, si post cenam exhibeantur, ac interdum. Conferunt & amygdalæ dulces, vuarum passæ, & amyllum cum lacte amygdalarum. Valent pistachia, nuclei pini, eruca, pastinaca assa sub cineribus. Potus optimus est ex nigro non austero, sed dulci, aut albo, & tenui. Sed quod mihi videtur huic vsui commodissimum est, lini semen cum melle confectum, & fœniculum, aut anisum cum ptisana decoctum, & butyrum cum saccharo. Ex quibus, & alijs similibus varia obsoniorum genera effingere facillimum erit.

*Si ex sã
guinis
initio.*

Lactis quidem velut, & seminis effectrices facultates partim in medicamentis duntaxat, partim quidem in alimentis consistunt, cum succos pituitosos ex calfacientes in sanguinem vertimus. Sic enim crassi, & pituitosi sanguinis vitium contemperamus: nam cum longius à natura lactis pituita, quam sanguis diffideat, ob id paulò calidiora medicamenta, & alimenta porrigere est opus, ea nepe quæ primo, aut secundo ordine calfaciant, desiccantia tamen non sint, vt Gale. aduertit loco nuper citato. Inter quæ sanè potiore obtinent locum, quæ non rantum sunt medicamenta, sed & nutrimenta, velut eruca, fœniculum, anethum, si virentia, & humida adhuc fuerint; sicca enim plus, quam par est, conterunt & exsiccant. Sic etiam conferunt smyrnium, apium, syon, polium, ac fœniculi radix ptisana incocta, cythi folia ex vino nigro dulci, & anethum, sesamum crudum cum vino. Intestina quoque terræ si quinque aut sex, teras, & cum duobus gallinarum ouis decoquas, paucò fœniculo, aut anetho addito, ex quo ferculum parabis huic vsui maximè proficuum si cum vino dulci, eius 3. ij. exhibeas: fœniculum etiam parabis, vt placuerit, nam multum ad bonitatem, & multitudinem lactis comparandam prodesse scribitur. Prodest, & potum tritum aqua dilutum potui datum: item fœniculi succus, & cythi decoctum; his enim sanguis attenuabitur, & ocyus in lac commigrabit.

Quod si caloris, vel flauæ bilis abundantia lac vitiosum efficiatur: purgationem


A nem eius humoris protinus institues, facta prius præparatione, ac deinceps refrigerantem, & humectantem victum porriges.

Verum si ex mammarum gracilitate sanguis non trahatur, frictione, fomento calido, & humido encurbita ad radices mammarum admota, sanguinem euocabis & lac augebis. Item pugnandum est eadem ratione aduersus dominantem in corpore intemperiem propriis contrarijs: siue sola existat intemperantia, siue cum humore adiuncta. Quod si hæc omnia prodesse non videantur, nutrice mutare, aliamq; seligere proba iorè opus erit. Sed antea (quia graue est lac infantibus immutare) multa experiri ex ijs, quæ lactis abundantiam præstare sciimus, oportet: quale est illud quod recipit pulueris seminis anisi 3.ij. ex iusculo caulium bibat, quando it dormitum: præstat & illud, quod recipit seminis anisi, feseleos ana 3. f.ervalli 3.j. cum saccharo, & vino albo fiat potio, quam duabus vicibus sumat. Confert aqua hordei cum semine fœniculi pota. Item pulueribus seminis viticis decorticati pisti 3.j. cum decocto anethi: etiam serpyllâ potum, cinis vnguis capræ potus: quatuor oua perdicis sorbilia epota, aut illita mammis cum adipe anseris. Hip. autem lib. i. de morb. mul. plura alia scribit

B dicens. Si lac fuerit extinctum, porrum tritum, & aqua dilutum bibendum dato. Lib. etiam de natu. mul. sic ait; Si lax extinctum fuerit, reliqua quidem eodem modo curato, fœniculi verò semen bibendum dato, & radices fœniculi decorticate, ac butyrum simul coquito; cum autem cocta fuerint, frigesacito, ac bibenda dato. Commodum est etiam hypomaritrum, & hyposelinum simul coctum. Refert in super eodem loco. Si lac extinctum fuerit, porrum tritum bibendum dato, & calida lauetur, & porrum ac brassicam edat, simul coctis cythi folijs, & succum sorbeat. Præterea inquit eadem parte. Si lac extinctum fuerit, salinam cedri aut iuniperi bacis adiectis coquat, & adiecto uino bibat, & ad cetera farina inspersa addito bulbo, modicoq; affuso oleo edat, & acia, & acida, & falsa, atque cruda olera omnia viter. Ferror etiam lac mirum in modum augere semen lactucæ tritum, & cum aqua vel iure ingestum. Folia item in aqua hordei cocta, aqua postea potui data, lac plurimum augent, si postmodum mamme blanda manu fricentur. Idem facit brassica decocta cum oleo comesta, sicut, & forus eiusdem decocti. Ferunt etiam succum menthe idem beneficium præstare: quod mihi suspectum videtur, præterquam in quibus lac concreuit; sed id præstantius efficit ocyimum hortense. Ad quorum sanè pensum facillè erit plura alia huic vsui proficua excogitare.

De lactis redundantia.

Cap. 17.



Abundantiam quidem lactis dupliciter hac in parte considerandam fore arbitror. Vno modo, cum femina lactare desinit, puero vel mortuo, uel grandiori facto, aut alteri nutrici commisso. Alio quidem, cum tanta ubertate abundat, tamq; parum puerulus conterit, ut vel sua sponte defluat, aut in graue aliquod mammarum vitium degeneret: utrisq; autem meminero initio sumpto ab ea abundantia, quam infans conterere nequit.

Causa.

Lac igitur cum plurimum in māmīs abundat, affectum sanè efficit in adaucta quanti-


quantitate: etenim lactis immodica copia, si detineatur, velut quævis alia pleni- **A**
tudo, causa morbi existit. Huic profectò causam seu materiam præstat boni san-
guinis multitudo, ea præsertim, quæ abundat in eis venis, quæ sunt intra mam-
mas, & uterum. Quod eûam euenit mulieribus utero gerentibus, interdum ob
conceptus imbecillitatem, interdum vero, cum neq; grauida est, neq; peperit;
sed, ut refert Hipp. 5. apho. 39. & 52. quia ei menstrua defecerunt. Verum si lac
multum è mammis effuxerit, non amplius causa morbi, sed symptoma erit, sub
genere excretorum modicè contentum. At nobis non est in animo de his affe-
ctionibus quicquam agere: sed tantum, de ea lactis abundàtia, quæ in mammis
existens, mammarum inflammationem minatur, concretionem vel coagulatio-
nem casei instar, seu commutationem in grumos, aut exulcerationem, & si vi-
tiarum quoq; lac sit, scabiem, pannos, & papillarũ eruptiones. Quamobrem sta-
tim præcauendum est, ne in prædicta mala, vel in furorẽ, ut ex Hip. constat, de-
Curandi generare contingat. Primò igitur curandum est vñctum instituere tenuissimum **B**
ratio. ac potum ex aqua, & aquam parçissimum exerceri in super partes infernas oportet,
& vinculis ac frictionibus ad eas quod redundat, euocare: & in vniuersum
prohibenda sunt ea, quæ lac aut sanguinem multum procreare, & ipsum ad mã-
mas allicere possunt. Ob id quidem vbi mammae dolitant, ut Soranus optimè
aduertit, neq; a mulieribus lac exugì debet: quippe suctione plus materiæ tra-
hitur ad ipsas. Quod decretum Paulum confirmasse constat lib. 3. c. 35. Cũ hoc
tamen, ut ex Aetij sententia colligi potest, vbi mammae non doluerint, vtilissimũ
esse censeo si leniter exugantur: effertur namq; foras leui hac eductione quod
præter modum in mamillis cõtinetur potius, q̃ aliquid amplius trahatur. Qd̃
si ne id quidem sufficere videatur, nullum præstantius auxilium reperies, quã
circa initia, si quid non obstiterit, tali venam secare, copiosumq; sanguinem ex
ea fundere. Verum si ob mensium retentionem id malum fieri constet, eos cuo-
care omni arte curandum est, quod Gal. aduertisse constat 5. simpl. c. 21. At si so-
la totius corporis abundantia lac exuberet, media, quæ in cubito est vena, aut
interna primò secanda erit (nisi menses, aut puerperium eo tpe fluxerint) mox
ea, quæ in talo est. Si verò nobis in animo fuerit lac ex toto non auferre, sed ex-
cessum, & copiam solum minuire, hæc mihi sufficere videntur, præsertim si lin- **C**

*De lacte
omnino
extinguen-
do.*

Verum si lac omnino restinguere in animo fuerit, tunc quidem consideran-
dum est, an femina partui proxima fuerit, vel iam diu peperit: Quod si mox a
partu lac auferre velis, cauendum eo tempore est a repellentium vsu, sed omni
arte curandum menstruam purgationem adaugere, & lac digerentibus, ac exsic-
cantibus minuire ips, quæ mox referam. Si autem longissimis intervallis a par-
tu distauerit mulier: tunc quidem præmissa vniuersali totius corporis prouidẽ-
tia, repellentibus primo vtendum est, velut est linteum posca madefactum, vel
spongia: & portulacæ folia cum aceto trita, aut apium, tritum cum aceto, & ro-
faceo. Præstat, & emplastrum, quod recipit farinæ fabarum, & lentium ana. 5. j.
succu plantaginis 5. iij. olei rosacei 5. ij. aceti 5. j. Valet ad id quoq; petroselinum
cum poscatritum: vel illud, quod recipit succu pl̃taginis, succu methæ an. 5. j. &
f. farinæ hordei 5. j. aceti 5. f. Item valët palmulæ cũ pane, & posca trita, ouũ agi-
tatu cũ rosaceo, vel decoctũ lentium cũ eodem rosaceo, aut lentes ipsæ cum de-
cocto

A cocto huiusmodi. Sed si efficacius aliud efformare velis, alumen, & psylli-
cum aceto, & rosaceo, addito modico succo coriandri adhibeto. Quibus non ut
pars est, praestantibus, digerentium pharumacorum non nihil aduiscere opor-
tet: velut est id, quod conficitur ex fenugraeci, seminis lini, & althae decocto cu
succo coriandri, aut pormulae, & farina hordei, ac lentium, additis rosaceo, &
croco. Cuminum etiam cum aceto illitum, lac inuit: similiter eius decoctum
cum modico croco, aut fenugraeci succo cum apio viridi, mentha, ac ruta, fari-
na lentium, rosaceo, ac postea impositum. Verum si nuper enixa lactare noluerit,
placet magis ea adhibere, quae lac ipsum exsiccant, ac digerant. quae tuncissima ad
modum existunt: sed praemissa, ut dictum est, vniuersali providentia. Huius na-
turae est illud mirabile praesidium, quod recipit feniculi, apij, oreoselini, mal-
uarum, & althae cum radicibus ana. p. j. foliorum lauri, & florum chamaemeli
singulorum m. s. quibus in aqua secundum arte decoctis, ac in grandiori vase
proiectis, tectis desuper panno lineo mammillis, eas fouere opis est, & abluere,
ac post ablutione rosaceo omphancino illinire: quo sane tpe, vt leniter exu-
gantur, permittendum. Sed mammis postea addiscendum erit id quod recipit
terebinthinae quum satis sit, quum vino albo odorifero, & aqua rosacea saepius ablu-
to, cui duo, aut tria oua tota, & croci 3. j. addicito, & ad emplastri seu cerati for-
mam cera addita redigito, quod super linteolum extensum iuxta papillas per-
feratum ad mammas adhibeto. Confert etiam oleum chamaemeli, & liliorum
mammas inungere, & ex praedictis oleis calidis, & terebinthina confectum ce-
ratum desuper apponere. Sed utilissimum semper fuit expertus illud, quod pa-
ri portione butyri recte, & terebinthinae vino, & aqua rosacea lota conficit.
Valet & basilicon maius: & sex vini combusta cum aceto peruncta. Ex usu quo
que est oleum, in quo raphanus minutim infusus diu incoctus fuerit: cuius p-
sidiij efficacia maximi profecto momenti est. Sed efficacius experimur, si mam-
mas inunxeris oleum, in quo diu ferbuerint radices iridis minutim insculae: vel si
ex eo, aut oleo raphani vnguentum cum cera, & pinguedine gallinae confeceris,
vel ceratum. Prohibet autem lactis vbertatem ante parum mammis appo-
nere emplastrum ex terebinthina, & oleo liliorum, ac modico omphancino co-
fectum, vel ex sola terebinthina purissima, ac saepius lota vino, & modica cera
alba. Quibus etenim similia facile tibi erit conficere, si quae nuper diximus, me-
moriam tenneris.

De lulis vitiosi emendatione. Cap. 18.



QUANTVM mali inferat puerulis vitiosum lac, is facile noscet, q
intellegerit, nutrium quoque; mammas quod tale est, erodere, ac
exulcerare acredine, & mordacitate. Cuius vitij principium dubi-
tabit nemo, ex vitiosi sanguinis affluxu proficisci, ac rursus san-
guinem talem fieri ex alimentis deprauatae substantiae, vel ex in-
debito vitae instituto. Praeterquam quod aliquando succrescere constat ex malo
corporis habitu, aut ex intemperamento alicuius membri praecipui, maxime ie-
coris, aut ventriculi.

Nosse vitiosum sanguinem docuimus c. de vitiosis menstruis, hac in parte de-
prauati


Signa.

Curā
ratio.

prauati lactis solum indicia scribam. Vitiosum igitur lac puerorum ora facile erodit: item mammas quoque exulcerat, & nomas siue depascentia vlcera, ac ser-
 pentia infert. Cuius naturam docet cognoscere Aetius dicens; Tenuia ac candi-
 dissima linteorum frustra eo lacte imbuta in umbra siccabimus, & in his quan-
 tum a nativo calore lac discessit speculabimur. Id quidem facile erit cognosce-
 re ex calore relicto in linteolis. At verò virosū ne sit, aut foetidū olfactu co-
 gnoscemus, sicut falsedinem, amaritudinem, acorem, & insipiditatem gustu:
 tenuitatē, crassitiē, ac lentorē ex vngue probabimus, & eo ēt mō, quo superius
 dictū est. Verum licet Aetius has minimē esse purgādas referat: nos tñ, aut infan-
 tes alijs lactandos cominitimus, aut eas purgamus, animaduersa humoris pec-
 cantis idea, vt apertē Hip. lib. 6. pop. consuluisse constat: quippe sic, & nutrice,
 & infanti prouidemus. Ob id primò victum instituimus contrariæ omnino na-
 turæ ei succo, quem redundare comperimus; & ea in super copia, quæ optimē
 conficiatur, confecta; puero, & nutrice sufficiat. Quo facto, ac pleniore semel
 instituta purgatione, proficuum est per epicrasim, & interualla, aut ter quater-
 ve in anno nutricem eo pharmaco purgare, quod vel humorem seligat peccan-
 tem, vel leniendo vias communes expurget, tum, vt attemperentur reliqui hu-
 mores: tum verò, vt si quid crudum, aut prauē confectum iuxta venas maiores,
 & iecur adheferit, ante q̄ venarum succū conspurcet, excernatur euacueturq̄.
 Tandē attēperamenti gratia alijs vtendum est medicamentis, & alimentis, q̄ ad-
 uersus cuiusque humoris conditionē pugnent: frigidis quidē calida adhibente
 & calidis frigida, ac sic de re reliquis iuxta cuiusque opposi-
 tionis naturam.

De lactis concretionē.

Cap. 19.



ACTIS conrescentiam si quis rectē examinet, reperiet duobus
 posse modis fieri: vno quidem, dum ingrumos, ac trombos concre-
 scit: altero verò, cum in casei speciem degenerat: quod idem esse (vt
 multi censent) vitium, falsum proculdubio arbitror. Ambo tamen
 (nisi ad immodicē retenta reducere volueris) ad morbum in ma-
 gnitudine omnes referri autuuant. Materia autem horum affectuum lac equi-
 dem est: ceterum siue crassum, siue multum fuerit, indifferenter in casei naturā
 vel in grumos conuerti poterit: id autem a longe diuersissimis causis. Quippe
 grumus non potest, nisi à frigiditate fieri: neq; in casei naturam lac mutari, nisi
 caliditatis, vi, & efficacia. Quanquam multis non placere hoc dogma scio:
 quod existiment viuente femina non posse tantam subesse frigiditatem, vt lac
 se binde concreseat. Nolle autem hac in re oportet, in casei speciem commutari
 lac ex immodica mammarum caliditate exsiccata, ac per halitum digesta parte
 eius tenui, & serosa. Quod facile probari potest ex Gal. lib. 4. simpl. indiget nan-
 que vt coaguletur, quod seruum eius, ac tenue separetur, & quod crassum est, in
 sese cohareat. Quæ sanē opera (vt ipse refert) absq; valido calore fieri nequeūt.
 Id quod etiam ex Aetio, & Paulo colligi facile potest, & medicamenta ēt huic
 affectioni proficua palam ostendunt. Verum quod lac in grumos conuerti ne-
 queat, nisi à frigido, iam probare aggredior, si prius dixerō certum mihi esse,
 lac non alio modo quam sanguinem in grumos posse degenerare: sed is nō nisi
 extraneus frigiditatem contrahens defectu, caloris valorum in grumos abit:
 ergo

A ergo neque lac. Probatur etiam id siquidem argumenta utr'q; concretioni proficua non humida, sed calida, & tenuium partium ab omnibus commendatur, qualia sunt, quæ ijs, quæ frigore desuntur, proficua esse comperimus. Præterea sanguis extra vasa, aut lac non opus est in grumos mutari à frigiditate positiua, sed solum ex defectu prærequisiti caloris: quo fit, ut sola hac ratione in quouis ventre sanguis, aut lac existant, ocysimè concrecant, destituta proprio, & prærequisito calore, licet ventres, & partes, vbi præsunt, actu calidissimæ existant. Sic quoque lac in mammis deficiente earum calore necesse est in grumos mutari: præsertim siue vasis mammarum in spongiosa spatia dilabatur, aut ob plenitudinem refudet. Quamobrem ni præsto auxilia sint, dubitandum non est, quin aut inflammationem, aut aliud malum affectio degeneret. Quam sanè cognoscere ex actu: quippe mamma eo tempore in trombosas durities, inæqualesq; & cum dolore non parum turgent, lacte nullo neque adhuc suctu ab eis instillant. Curandi quoq; ratione duplicem esse ipsa affectus natura, & differentia aperte docet curari: namq; curationem, quæ caseationi debetur ab ea, quæ grumoso lacti proficua est, nulli erit dubium. Sic enim vbi in grumos conuersum lac fuerit, victus rationem exequantem, & modice calidam instituire oportet: sed in curatione prodest pannos cum musco, aut hydraleo, vel cum perdicio herba viridi super mammas apponere. Super infusio etiam calentis olei dulcis plurimū conducit, aut fons aque calide, vel decoctum fenugreci, althææ, apij, aut chamæmeli, adhibito desuper emplastro ex farina seminis lini, fenugreci cum hydromelle, vel oleo sesamino, de semine lini anethi, & axungia gallinæ.

Curandi ratio.

Item coagulatum leporinum butyro, aut aliquo ex prædictis oleis liquatum illitum præstat: sicut potum cum vino lac in ventre coagulatum dissoluit. Bete item folia, si tandiu oleo fuerint incocta qd intabuerint cum pane, & fabarū farina, paucosq; oleo sesamino, permixta, & imposita cōferū. Mentha quoq; viridis idē bñficiū præstat: sed apiū hortense tritū, & māmīs duris appositū prodesse plurimū sciimus: sicut sitcus eius mica panis exceptus, & māmīs appositus: rursus idē cū sulphure, & paucis aceto cocta, māmīs adhibita, excepto papilla. Grume fecitiam quoq; dissoluit ammoniacū cū assa fetida, cera, & oleo ad formā emplastri. Præterea alia auxilia sic conficito: aque liliorum & menthe singulorum .j. iij. aquæ chelidō. .j. i. aquæ rosæ. & nymph. sing. .j. iij. misce, & frequenter mammās laua, pannosq; his madidos appone, vel ceratum ex cera, & oleo violarū. Utendum quoq; est puluisculis, quæ recipiunt seminis feni. .j. j. anisi .j. j. apij, petro. & agnicasti an. .j. j. coralli rubei, cornu cerui vsti, an. .j. j. sacchari duplum, quorū mane sumat eocleare vnū. Ex salina quoq; mentha, & virga pailo. fiat puluis, quo vtrūq; in iusculis. Quod si māmē in tumore attollatur, & doluerit, vnguentum sunt linimento, quod recipit vngu. ros. & cerathi santhal. sing. .j. j. olei ros. & chamæ. sing. .j. j. misce. Prodest, si vltra pgeat affectio, cataplasma, qd recipit farinæ fa. & orobi sing. .j. iij. succi chelid. mai. & menthæ, an. .j. iij. olei lili. & menthæ, an. .j. j. fiat cataplasma. Præstat & aliud, quod recipit farinæ fab. & hordei sing. .j. j. styracis in oleo ros. dissolutæ. .j. j. coagulū vnū hēdi, misce, & fiat cataplasma. idem efficit vngu. album Gal. aceto dissolutum: & butyrum cum aceto. Prodest & aqua rosacea cū aceto mixta: argilla in puluere redacta, & cum aceto mixta, maximè si dolor pungēs adsit, idē efficit nidū hirūdinis cū aceto. Quibus positus resolu-

resolutionis, & mitigationis gratia adhibere oportet cataplasma, quod recipit
 furfuris p. j. florum chamae. & meliloti an. p. j. & f. farinae fab. 5. iij. pinguedinis
 gallinae 3. x. croci. 3. ij. olei rosa. & anethi an. 3. ij. olei violarum 3. j. misce, & fiat
 cataplasma. Quod si ad suppuracionem tumorem deuenire constet, emplastro
 utendum est, quod conficitur ex maluis coctis, & butyro recenti, vel alio, quod
 recipit maluarum, violarum sing. m. j. florum chamae. & meliloti sing. p. f. fiat
 decoctio: cui adde micę panis lib. j. butyri 3. j. & f. vitellos oui ij. olei rosacei. 3. ij.
 olei chamae. 3. j. misce. Appones etiam micam panis albi ea decoctione imbuta
 vitellis ouorum, & croco admixtam. Curandum tamen est ante omnia sangui-
 nem mittere, & reliqua veluti inflammationibus efficere.

At dum lac casei formam acquirit, tunc quidem posca pane, vel spongia im-
 posita summopere prodest. Item succus solani cum aceto, aut succus portulacę:
 vel farina hordei cum aceto mulso, Furfures etiam cum aceto cocti, aut metha
 aceto admixta: folia alica. cabi cum brassicę folijs contrusa, pauca myrrha, croco
 & aceto adiectis, idem beneficium præstant. Item decoctum scenugraci cū oleo
 violaceo, rosaceo, & pauco aceto. Præterea succus herbar, quam appellant, mor-
 sus gallinae cum rosaceo in linteis exceptus. Verum si ob lactis copiam concre-
 scere, caseariq; contingat: scilicet emulgendum à catulo est, aut ab aliquo mini-
 stro, qui id probè efficere sciat: postea super manus lentium decoctum cum
 oxirhodino adhibere conuenit.

Ad mammarum rugas ea omnia ex usu esse scimus, quæ ad ventris rugas su-
 perius scripsimus: sed specialius confert ceratum, quod conficitur ex cera, &
 putaminibus ouorum perdicis.

De morbo pilari nil dicere studui: nam sicut inflammationis principium cu-
 rari proculdubio debet.

F I N I S.

VENETIIS, Apud Ioannem Guercilium.

M D X C V I I.

~~Handwritten text, heavily crossed out with dense, dark ink strokes.~~

10566010

